

30678/B

L XXVIII. 10

FARMACOPEA UNIVERSAL,

ó

REUNION COMPARATIVA DE LAS FARMACOPEAS

DE AMSTERDAM, AMBERES, DUBLIN, EDIMBURGO, FERRARA, GINEBRA, LÓNDRES, OLDEMBURGO, WURZBURGO; AMERICANA, AUSTRIACA, BÁTAVA, BÉLGICA, DANESA, ESPAÑOLA, FINLÁNDICA, FRANCESA, HANNOVERIANA, POLACA, PORTUGUESA, PRUSIANA, RUSA, SAJONA, SARDA, SUECA Y WURTEMBERGESA;

DE LOS RECETARIOS
de Brunswik, Fulda, Hesse, Lipa y Palatinado;

DE LAS FARMACOPEAS MILITARES
de Dinamarca, de Francia, de Prusia y de Wurzburgo;

DE LA FARMACOPEA DE POBRES DE HAMBURGO;

DE LOS FORMULARIOS Y FARMACOPEAS
DE AUGUSTIN, BORIES, BRERA, BRUGNATELLI, CADET DE GASSICOURT, COX, ELLIS, HUFELAND, MAGENDIE, PIDERIT, PIERQUIN, RATIER, SAINTE-MARIE, SAUNDERS, SPIELMANN, SWEDIAUR Y VAN MONS.

OBRA QUE CONTIENE

Los caracteres esenciales y la sinonimia de todas las sustancias citadas en dichas obras, con la indicacion de las que han adoptado cada preparacion, los diversos procedimientos recomendados para egecutarlas, variantes que presentan en los diferentes formularios, nombres oficiales con que se las designa en los diversos paises, y dósis á que se administran.

POR A. J. L. JOURDAN,
Doctor en Medicina, Caballero de la Legion de Honor, &c. &c. &c.

Morbos autem non eloquentia sed remediis curari.
CELSO.

TRADUCIDA AL CASTELLANO

POR DON JUAN GUALBERTO AVILÉS,
Médico de la Real Inclusa y Colegio de la Paz de esta Corte, y del Hospital de Convalecencia de la misma,
Y DON JUSTO ACEÑERO,
profesor de Medicina en esta Corte.

TOMO IV.

MADRID. *Imprenta que fue de* FUENTENEBRO, *calle de Fuencarral, n.º* 6.

1829.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

FARMACOPEA UNIVERSAL.

Simplex medicina non ubique sufficit, sed prestat sæpe nunc addere corrigens, nunc juvans.
BALDINGER.

Q

QUASIA.

Leño de Surinam; *Quassia amara*, L.

Quassienholz, americanisches; Bitterholz, Al.; quassie, F.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed f. fe. fi. fu g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww.

Arbol de Surinam (decandria monogynia, L.; simarubas, J.).

Se usa el leño del tronco, y particularmente de la raiz, que se encuentra cubierto con su corteza en pedazos de diversa longitud y grueso, siendo á veces como el dedo pequeño, y ya como el brazo, de muchos pies de longitud, cilíndricos, lisos, hendidos longitudinalmente, las mas veces derechos, rara vez encorvados y algunas nudosos y ramosos. La corteza es de color gris amarillo, poco gruesa, lisa al tacto y poco adherente al leño. Este es de un blanco amarillento, ligero y tierno en su interior. No tiene olor, y su sabor es estremamente amargo.

Este amargo se lo comunica un principio particular llamado *Quassina*; *Quassina.*

Se atribuye tambien este leño al *Quassia excelsa*, Sw., árbol de la Jamaica.

Es amargo, tónico, estomacal, usado en la dispepsia, la diarrea y las hemorragias.—Dósis del polvo; de un escrp. á med. drac.

ESPIRITU ACUOSO DE LEÑO DE QUASIA.

Extractum quassiæ. (am. ams. an. ba. br. han. he. o. p. po. pr. r. s. wu. *c. pid.)*

R. Raspaduras de leño de quasia, una lib.
Agua fria. . . . . diez lib.

Déjense en maceracion por dos dias, meneándolo de cuando en cuando; cuélese, déjese reposar, decántese el líquido y evapórese despues á un fuego manso. (po.)

R. Leño de quasia raspado, c. s. q.

Hágase hervir por una hora en c. s. de agua; cuélese por espresion, dejése

reposar y decántese el líquido, evaporándolo despues hasta la consistencia de miel espesa. (wu.)

p. prescribe una lib. de leño y seis de agua.

R. Raspaduras de leño de quasia, una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.

Déjese en digestion por cuatro dias en un sitio caliente, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion y evapórese hasta la consistencia de estracto. (br.) —am. he. *c.* y *pid.* prescriben se hierva una lib. de leño en ocho de agua, hasta que se consuma la mitad.

R. Raspaduras de leño de quasia, una lib.
Agua hirviendo, ... ocho lib.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues por un cuarto de hora y cuélese; hágase hervir otra vez el resíduo por igual tiempo en cuatro lib. de nueva agua y cuélese; reúnanse los dos líquidos, déjense reposar, decántense y evapórense. (an.)

ams. d. han. o. po. pr. r. y s. prescriben que se hierva muchas veces seguidas una parte de leño con diez de agua, y que se evaporen los líquidos reunidos y colados; —y ba. que se haga hervir una parte de leño, primero con cinco y despues con quince partes de agua, y que se reunan los líquidos.

Dósis; de diez á quince granos.

ESTRACTO ALCOHÓLICO DE LEÑO DE QUASIA.

Extractum quassiæ alcoholicum. (fu. li.)

R. Leño de quasia, ... una lib.
Aguardiente, ... seis lib.

Déjense en digestion por algunos dias á un calor suave, esprímase, filtrese y evapórese hasta la consistencia de miel; hágase hervir el resíduo con tres lib. de agua, esprímase, filtrese y evapórense del mismo modo; mézclense los dos líquidos y evapórense hasta la consistencia de estracto. (fu.)

li. prescribe se digiera lib. y med. de leño, primero en seis lib. de alcohol, por dos dias, y despues en nueve de agua hirviendo por veinte y cuatro horas, que se reunan las dos tinturas, y que se evaporen.

PÍLDORAS TÓNICAS. (*au. e.*)

R. Estracto de quasia, . . una drac.
Polvos de genciana, ... c. s.
Háganse veinte píldoras.

Dósis; una, tres ó cuatro veces al dia. (*e.*)

au. prescribe dos drac. de estracto y c. s. de polvos de gengibre para hacer píldoras de dos granos, cuya dósis es de diez.

ELIXIR ANTIÁCIDO.

Elixir cum aqua calcariæ ustæ. (*au.*)

R. Estracto de quasia, . . una drac.
Agua de cal, ... ocho onz.
Dósis; una cuchta.

INFUSION DE QUASIA.

Infusum quassiæ, s. *quassiæ excelsæ.* (am. b.* ed. lo. p. *c. e. sw.*)

R. Leño de quasia raspado, med. drac.
Agua hirviendo, ... ocho onz.

Déjese en digestion por dos horas y cuélese. (am. ed. *e.*)

b.* prescribe med. onz. de leño y una lib. de agua; —b.* y lo. un escrp. de leño y un cuartillo de agua; —*sw.* dos drac. de leño y una lib. de agua; —y p. tres drac. de leño y una lib. de agua.

R. Leño de quasia,
Serpentaria de Virginia y
Corteza de naranja, . a. med. onz.
Agua hirviendo, . . . una azumbre.
Infundánse y cuélese. (*e.*)

Amargo.—Dósis; de una á dos onz. muchas veces al dia.

INFUSION DE QUASIA CON SULFATO DE ZINC.

Infusum quassiæ cum sulphate zinci. (am. *e.*)

R. Raspaduras de leño de quasia, una drac.
Sulfato de zinc, ... ocho gr.
Agua fria . . . . . un cuartillo.
Déjense en maceracion por dos horas y cuélese.

POCION ESTOMACAL.

Haustus stomachicus. (b.)

R. Raiz de colombo. . . . . una drac.
Leño de quasia. . . . . drac. y m.
Agua. . . . . c. s.
para obtener ocho onz. de infusion.
Añádase al líquido colado
Elixir estomacal de Whytt, dos drac.
Para tomar poco á poco.

COCIMIENTO DE LEÑO DE QUASIA.

Decoctum ligni quassiæ. (fu. ham.)

R. Raspaduras de leño de quasia, una onz.
Agua de fuente . . . . . dos lib.
Hiérvase hasta que se reduzca á lib. y med. (han)

R. Raspaduras de leño de quasia, onz. y m.
Agua, ... cuatro lib.
Redúzcase á tres lib. y añádase á lo último
Flores de manzanilla, . . onz. y m.
Déjese reposar y decántese. (fu.)
Dósis; una cuch. cada dos ó tres horas.

COCIMIENTO DE QUASIA COMPUESTO.

Decoctum ligni quassiæ compositum, Decoctum amarum. (wu.)

R. Raspaduras de leño de quasia, una onz.
Flores secas de manzanilla, onz. y m.
Sub-carbonato de potasa, dos drac.
Agua de fuente, ... cuatro lib.
Redúzcase la cuarta parte por la ebulicion y cuélese.

TINTURA VINOSA DE QUASIA.

Tinctura quassiæ vinosa. (han.)

R. Raspaduras de leño de quasia, cuatro onz.
Vino de Málaga, ... dos lib.
Déjese en digestion lo suficiente y filtrese.

Amarga y tónica.—Dósis; de tres drac. á med. onz. dos veces al dia.

TINTURA ALCOHOLICA DE QUASIA.

Tinctura quassiæ, s. ligni quassiæ, s. quassiæ excelsæ. (am. ams. an. b. bc. du. ed. g. han. o. s. *c. sw. vm.*)

R. Raspaduras de leño de quasia, una onz.

Alcohol (0930), . . una azumbre.
Déjese en digestion por dos dias y filtrese. (am. du. *c.*)

ed. prescribe una onz. de leño y dos lib. y med. de alcohol (0,935); b. y be. una parte de leño y seis de alcohol de (15.°);—ams. una parte de leño y seis de alcohol (0,917);—*sw.* dos onz. de leño y dos lib. y med. de alcohol (0,935);—*vm.* una parte de leño y seis de aguardiente;—han. y o. cinco onz. de leño y dos lib. de alcohol;—d. una parte de leño y cinco de alcohol;—y s. una de leño y diez de alcohol.

R. Leño de quasia, ... una onz.
Alcohol (20.°), ... cuatro onz.
Déjense en digestion por cuatro dias al B. M. tibio; cuélese y échese sobre el resíduo
Alcohol (20.°), ... dos onz.
Cuélese al cabo de dos dias, mézclense y filtrense los dos líquidos colados. (am.)

R. Raspaduras de leño de quasia, dos onz.
Corteza de naranja, . . una onz.
Cardamomo menor, . . med. onz.
Aguardiente, ... dos lib.
Déjense en digestion por cuatro dias y cuélese. (g.)

QUINA.

Quinaquina; Cortex peruvianus.

Chinarinde, Al.; chinabark, In.; quinquina, F.; china, I.; quina, Por.

Es muy grande el número de cortezas designadas con este nombre en el comercio, y todavía no se tienen con respecto á muchas de ellas mas que datos vagos sobre los vegetales que las suministran; por lo que sería quizá imposible dar en el dia una historia suficiente y completa de ellas. Pero las dificultades son menos considerables si se limitase á las quinas mencionadas en las farmacopeas. Estas cortezas pueden reunirse en seis especies, á saber:

1.° *Quina de la Carolina.*

c.

Esta especie, poco conocida aun, proviene del *Pinckneya pubescens*, Mich., arbusto de la América septentrional (pentandria monogynia, L.; rubiaceas, J.).

2.° *Quina Caribea.*

d. am. w. *g. m. pa.*

Corteza en fragmentos cubiertos de una epidermis blanca, gruesa, dura y resquebrajada, ó delgados y cargados de criptógamos negros y tuberculosos, bajo de los cuales se encuentra una sustancia fibrosa, roja ó de un moreno negruzco, muy pesada y salpicada de puntos brillantes. Su sabor es muy amargo y desagradable, y tiñe la saliva de color de naranja. Su polvo se parece al de la quina amarilla.

Proviene del *Cinchona Caribœa*, Jacq., arbol de la Jamaica y de Guadalupe (pentandria monogynia, L.; rubiaceas, J.).

3.° *Quina gris ó parda; Cortex peruvianus fuscus*, s. *officinalis.*

a. am. b. ba. be. br. d dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. ham. he. li o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp.*

Parece que en América se reunen las cortezas llamadas quina atendiendo á su color solamente, y que tambien se despachan así en Europa. Pero las de muchas especies diferentes del género *Cinchona* se han asociado tambien á otras estrañas: por egemplo, las de *Mespilus arbutifolius*, del *Liriodendron tulipifera*, del *Swietenia Mahagon*, de *Achras mammosa*, de los *Sapota dissecta* y *Salicifolia*, del *Wrigtia antidysenterica*, del *Volkameria aculeata* &c., en cuya mezcla la verdadera quina existe algunas veces en cantidad tan pequeña, que segun el informe de Wylie, apenas se pueden encontrar en Rusia cinco á seis libras por quintal. Entre las diversas quinas gris ó pardas se distinguen mas particularmente las siguientes:

a. La *gris parda*, corteza enrollada, cubierta de una epidermis fina arrugada, resquebrajada transversalmente y de un moreno ó gris subido, es gruesa como de media á una línea, muy ligera, de un amarillo pálido ó un leonado rojizo en el interior, de fractura lisa, un poco fibrosa, de sabor astringente, y de un olor particular y muy pronunciado.

Parece pertenecer al *Cinchona nitida*, Ru. y Pav.

b. La *gris* es arrugada al esterior con pequeñas fisuras transversales, de color gris claro, casi papirácea, arrollada, de fractura lisa, de testura fibrosa y de color rojizo bastante vivo al interior. Su olor es débil y su sabor astringente y amargo.

Se cree proviene del *Cinchona nitida*, Ru. y Pav.

c. Otras son de un gris blanquecino, de un gris pardusco ó de color gris rojizo, y aun de ocre encarnado &c., las cuales son producidas por los *Cinchona lanceolata*, *ovata* y otros.

4.º *Quina amarilla*; *Cortex peruvianus flavus.*

a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. han. li. lo. o. po. pp. pr. s. su. w. *c. g. pa.*

Las cortezas designadas con este nombre dan un polvo amarillo leonado ó anaranjado. Tienen una testura muy fibrosa, un amargo muy fuerte y menos astringente que las precedentes. Se distingue entre ellas:

a. La *quina del Rey de España*, notable por su color vivo de amarillo naranjado, y por su olor fuerte, penetrante y análogo al del tabaco.

Parece ser producida por el *Cinchona condaminea*, L.

b. La *quina amarilla real ó calisaya*, presenta bajo una epidermis morena, arrugada y resquebrajada una sustancia amarilla pardusca al esterior, un poco amarilla al interior, de sabor muy amargo y un poco astringente, y de fractura muy fibrosa particularmente en el centro.

Se atribuye al *Cinchona lancifolia*, Mut.

5.º *Quina roja; Cortex peruvianus ruber.*

am. ams an. b. ba. be. d. du e. ed. f. fe. ff. fu. han. he. li. lo. p. po. r. s. su. w. *g. m. pa.*

Tiene este nombre por su color amarillo de ocre, que se hace mas subido humedeciéndola. Carece de olor y

su sabor es amargo y de una astringencia pronunciada.

Se atribuye, aunque no de cierto, al *Cinchona oblongifolia.* Mut.

6.º *Quina de Santa Lucía; Quinquina piton.*

fu. w. *g. m.*

Corteza arrollada, cilíndrica, delgada, ligera, muy fibrosa, de fractura gris amarillenta, y mas ó menos negra, con líneas longitudinales blancas en su cara interna. Su olor es débil y nauseabundo, y su sabor en estremo amargo y desagradable. Su polvo es de color moreno.

Proviene del *Cinchona floribunda*, L.

La quina de la Carolina contiene mucha cinchonina segun Ferr.

La gris contiene, segun Pelletier y Caventou, quinato de cinchonina, una materia colorante roja, llamada por Reuss *Rojo cinchonico*, otra colorante que se parece al tanino, otra materia grasa verde, quinato de cal, goma, almidon y leños.

La composicion de la quina amarilla es la misma, segun estos dos químicos, con la diferencia que no contiene goma y que la quinina reemplaza la cinchonina.

La quina roja contiene á la vez cinchonina y quinina en grandes proporciones.

En fin la de Santa Lucía no tiene absolutamente vestigio de una ni otra.

Debe por consecuencia preferirse la quina amarilla, y despues la roja y la gris.

Es bien generalmente conocida la accion tónica de la quina, y por esto se hace uso de ella en una multitud de circunstancias en las que su administracion está mas bien indicada por teorías poco justificadas, que por las nociones adquiridas sobre la naturaleza de las enfermedades y una esperiencia iluminada por la antorcha de la ciencia y de la crítica. Muchos médicos reconocen todavía en ella una virtud específica contra lo que llaman genio intermitente de las enfermedades. Carecemos sin embargo de un cuadro comparativo é imparcial de los casos en que esta sustancia ha sido útil, de aquellos en que ha sido inútil, y en fin de otros en que ha sido dañosa. Hasta que esto se verifique, las ideas que se ocultan bajo el nombre de específico, si efectivamente lo es así, estarán cubiertas largo tiempo de un velo denso.

Se administra la quina á la dósis de diez granos hasta dos dracmas, sin traspasar este último límite; y aun si se repite demasiado produce vómitos.

No deben asociarse á la quina para no descomponerla, las sales de hierro, el sulfato de zinc, el sublimado corrosivo, el nitrato de plata, ni el tártaro emético.

§. I. PREPARACIONES QUE CONTIENEN LA QUINA EN SUSTANCIA.

A. *Polvos.*

POLVOS DE QUINA. (f.)

R. Quina gris, ... c. s. q.

Macháquese primero en un mortero de hierro, desechando como inútiles los primeros polvos, que son producidos por los restos de cryptógamos, y

macháquese en seguida hasta que la corteza se reduzca á polvo impalpable.

Con la quina amarilla se hace al contrario, esto es, arrojándose las últimas porciones.

POLVOS DE QUINA ALCANFORADOS.
(g.)

R. Quina, ... med. onz.
Alcanfor, ... un escrp.
Goma arábiga, ... dos drac.
Divídase en doce papeles.

POLVOS DE CHOCOLATE CON QUINA.

Pulvis chocolatæ chinatæ. (b.* *au.*)

R. Almendras de cacao, tostadas y en polvo, ... seis onz.
Polvos de quina gris, . tres onz.
Azucar blanca, ... ocho onz.
Bálsamo del Perú negro, una drac.

Háganse hervir dos cuch. ó una onz. de estos polvos en tres de agua ó de leche.

POLVOS DE CAFÉ CON QUINA.

Cofea cum cortice Peruvianum. (*au.*)

R. Café tostado, ... dos drac.
Quina, ... una drac.
Pulverícense.

POLVOS ANTIFEBRILES ASTRINGENTES.
(ham.)

R. Polvos de quina, . . . una onz.
——— de canela, . . dos escrp.
——— de alumbre, . . dos drac.

POLVOS FEBRÍFUGOS ESTIBIADOS.
(*b. bo.*)

R. Quina roja en polvo, . una onz.
Cremor de tártaro, . . . dos drac.
Tártaro estibiado, . . cuatro gr.

Mézclense, pulverícense y divídanse en cuatro tomas. — Dósis; una cada cuatro horas, en cuatro onz. de cocimiento de centaura menor, durante la apirexia de las calenturas intermitentes.

R. Quina, ... una onz.
Tártaro estibiado, . . . dos gr.
Opio, ... un gr.

Divídase en cuatro papeles. — Dósis; uno cada una ó dos horas. (*b.*)

b. prescribe tambien dos onz. de quina, y dos gr. de emético, para dividirlos en ocho papeles, de los que se toma uno de dos en dos horas.

POLVOS FEBRIFUGOS É INCISIVOS.
(*bo.*)

R. Polvos de quina roja, med. onz.
——— de kermes mineral, seis gr.

Méz. y divídase en seis papeles, para tomar uno á uno cada cuatro horas en un vaso de infusion de borraja, edulcorada con una cuch. de jarabe de buglosa. — Se han preconizado estos polvos con particularidad en el intérvalo de los recargos en las perineumonias malignas, con petequias y hemorragias pasivas.

POLVOS ESTOMACALES. (*ra.*)

R. Polvos de quina, . . . tres gr.
——— de catecú, ... un gr.
Para una sola dósis.

POLVOS ASTRINGENTES.

Pulvis tonico-adstringens. (b.)

R. Quina, ... una onz.

Cola de pescado, . . drac. y med.
Divídase en diez y seis papeles.— Dósis ; cuatro primero , y despues seis cada dia en las hemorragias uterinas llamadas pasivas , la leucorrea , la diarrea antigua y la blenorrea.

POLVOS ANTISÉPTICOS. (han. *ca. sp. sw.*)

R. Polvos de quina y
——— de ruda , a. . . dos onz.
——— de alcanfor , . . tres onz.
Plenk cubria con ellos las partes gangrenadas. *(sp.)*

R. Polvos de quina ,
——— de árnica y
——— de alcanfor , a. . part. ig.
Propuestos por Swediaur para espolvorear las úlceras rebeldes ó amenazadas de gangrena. *(ca. sw.)*

R. Polvos de quina , . . una drac.
Alcanfor , ... tres gr.
Los mismos usos que los precedentes. (ham.)

POLVOS CORROBORANTES. (pp. *au. ca.*)

R. Polvos de quina , . . . med. onz.
——— de canela , ... seis gr.
Méz. — Para una sola dósis , en la convalecencia de las calenturas intermitentes. (*ca.*)

R. Polvos de quina , . . seis drac.
——— de canela , . . una drac.
Méz. y divídanse en doce papeles. (pp. *au.*)

POLVOS ANTIFEBRILES. (b.*)

R. Polvos de quina , . . cuatro onz.
——— de gengibre , . med. onz.
Méz. . . . . .

POLVOS TONICOS. (*e.*)

R. Quina y
Cremor de tártaro , a. . una onz.
Clavos , ... una drac.
Dósis ; drac. y med. cada dos horas.

R. Quina , ... med. onz.
Serpentaria de Virginia ,
. . . . . una drac.
Sub-carbonato de sosa ,
cuarenta gr.
Háganse cuatro papeles. — Dósis; uno cada dos horas.

POLVOS FEBRIFUGOS Y ANTICAQUÉCTICOS. (*bo.*)

R. Quina roja , ... dos drac.
Agarico , ... veinte gr.
Etíope marcial , . . . quince gr.
Ruibarbo , ... ocho gr.
Méz. — Para tomar de cuatro en cuatro horas en un vaso de infusion de camedrios, en la apirexia de las calenturas cuartanas, complicadas con caquexia general.

POLVOS FORTIFICANTES MARCIALES. (*ham.*)

R. Polvos de quina , . . . una onz.
——— de canela , . . una drac.
Limaduras de hierro porfirizadas, dos drac.

POLVOS FEBRÍFUGOS DE TRILLER. (*sp.*)

R. Quina , ... media onz.
Ojos de cangrejo empapados de zumo de limon , . . dos drac.
Conchas de ostra pp. , una drac.
Diaforético marcial y

Nitro a., ... med. drac.
Dósis; una drac.

POLVOS FEBRIFUGOS DE HOFFMANN.

Pulvis contra quartanam. (b.* *bo. sp.*)

R. Limaduras de hierro, una drac.
Quina, ... drac. y med.
Mercurio dulce,
Sal de agenjos y
Sulfato de potasa, a. . med. drac.
Opio purificado, . . gr. y med.
Pulverícense. — Para dividirlos en seis papeles. (b.* bo.)

R. Quina, ... tres drac.
Régulo de antimonio medicinal, dos drac.
Mercurio dulce,
Azafran de Marte aperitivo y
Sulfato de potasa, a. . una drac.
Aceite esencial de menta, tres got.
Méz. y pulverícese. (*sp.*)

Hoffmann los ha alabado con particularidad en las calenturas cuartanas. — Dósis; med. drac.

POLVOS FEBRIFUGOS DE FIZES. (*bo.*)

R. Quina roja, ... tres drac.
Cremor de tártaro, . quince gr.
Nitro, ... diez gr.
Para diluirlos en un vaso de cocimiento de dos dracmas de quina. — Se repite cada cuatro horas.

POLVOS FEBRIFUGOS DE GAUB. (*bo.*)

R. Quina, ... una onz.
Sal polycresta, . . . dos drac.
Aceite esencial de corteza de cidra, ocho got.
Mézclense y divídanse en diez y seis papeles, que se hacen tomar de dos en dos horas durante la apyrexia.

POLVOS CATARTICOS.

Pulvis e cinchona cathartícus. (*sm. sw.*)

R. Quina y
Sub-carbonato de magnesia, a. med. onz.
Divídase en cuatro dósis, de las que se toma una todas las mañanas en ayunas en una taza de té. — Se dice ser muy eficaz contra la constipacion de vientre.

R. Quina, . . . cuatro á seis drac.
Cremor de tártaro, . . . dos drac.
Aconsejados por Vogler. — Dósis; de treinta á cuarenta granos. (*sw.*)

POLVOS CATARTICOS FEBRIFUGOS. (*bo.*)

R. Quina roja, ... seis drac.
Magnesia calcinada, . . med. onz.
Flores de manzanilla, . . dos drac.
Divídanse en cuatro tomas, de las que se da una de cuatro en cuatro horas en una taza de infusion de achicorias.

POLVOS FEBRIFUGOS NERVINOS.

Pulvis febrifugus et nervinus. (*b.*)

R. Quina, ... una onz.
Valeriana, ... med. onz.
Divídase en ocho papeles. — Dósis, uno cada dos horas.

POLVOS FEBRIFUGOS OPIADOS. (dd. *bo.*)

R. Quina, ... med. drac.
Opio, . . una cuarta parte de gr.
Divídase en cuatro tomas, de las que se da una de cuatro en cuatro horas en una taza de infusion de achicoria cuan-

do la calentura está complicada con diarrea ó disenteria.

Se pueden añadir á cada toma diez granos de ruibarbo.

POLVOS DE QUINA COMPUESTOS. (*b.**)

R. Quina amarilla, . . . med. onz.
Raiz de cálamo aromático,
dos drac.
Polvos aromáticos, . drac. y med.

Propuestos por el médico aleman Heller. — Los polvos aromáticos son de la farmacopea prusiana.

POLVOS ESTOMACALES.

Polvos antiperiódicos y purgantes; Pulvis Peruvianus purgans, s. tonicus Bangii. (g. *bo. pie. ra.*)

R. Quina, ... una onz.
Ruibarbo y
Sal amoniaco, a. . drac. y med.

Divídanse en doce papeles. (g.)

R. Polvos de quina y
——— ruibarbo, a. . . part. ig.

Méz. (*bo. pie. ra.*)

Se hace tomar cosa de una drac. en un vaso de agua. — Los últimos polvos son un poco purgantes.

POLVOS FEBRIFUGOS DE JADELOT. (*bo.*)

R. Quina,
Corteza de naranja agria y
Raiz de genciana, a. . dos drac.
Sal amoniaco y
Ruibarbo, a. . . . . una drac.

Dósis; una drac. cuatro veces al dia en un poco de agua.

POLVOS DE QUINA CON SAL AMONIACO. (dd. ham. *b.*)

R. Quina, ... med. drac.
Sal amoniaco, ... seis gr.

Para una sola dósis. (dd.)

R. Quina, ... una onz.
Sal amoniaco, ... dos drac.
Zumo de regaliz, . . . una drac.

Méz. (ham.)

b. prescribe dos onz. de quina, una drac. de sal amoniaco y otro tanto de mirra.

POLVOS ANTISEPTICOS.

Pulvis chinæ, s. antisepticus. (*au.*)

R. Quina, ... med. drac.
Alcanfor, ... tres gr.

Para curar las heridas afectas de gangrena de hospital.

POLVOS ANTIESPASMODICOS. (b.* *ra.*)

R. Polvos de quina, . . . dos drac.
——— de valeriana, . una drac.

Méz. Para tomar en las veinte y cuatro horas, en porciones mas ó menos frecuentes. (*ra.*)

R. Quina y
Zumo de regaliz, a. . . tres drac.
Raiz de valeriana,
treinta y seis gr.

Divídase en nueve papeles. (b.*)

Esta última fórmula, propuesta por Niemann, se parece á la de Heller, tanto mas cuanto el autor permite reemplazar la valeriana por los polvos aromáticos. — Dósis; un papel cada dos horas en la apirexia de las calenturas intermitentes.

POLVOS FEBRIFUGOS DE LESCURE. (*bo.*)

R. Quina roja, ... tres drac.
Resina de quina, . . . una drac

Sub-carbonato de potasa,
med. drac.

Divídase en cuatro dósis, de las que se toma una cada tres horas en un vaso de infusion de manzanilla.

POLVOS BEZOARDICOS.

Pulvis chinæ antisepticus, s. bezoardicus curbi. (e.)

R. Raiz de contrayerba,
——— de carlina,
——— de tormentila,
——— de dictamo blanco,
Flores de amapola,
Hojas de escordio y
——— de cardo santo, a. . dos drac.
Antimonio diaforético lavado,
Perlas porfirizadas,
Raspaduras de c. c.,
Ojos de cangrejo pp.,
Piedra de Cananor,
Bezoárdico occidental y
Piedra cordial de Goa, a. una drac.
Quina escogida, ... dos onz.
Háganse polvos muy finos.

Esta preparacion absurda se parece á muchas de las que con este nombre se indican en el artículo antimonio.

POLVOS DENTIFRICOS. (b.* f.** fu. he. r. *br. ca. pid. sw.*)

R. Quina, ... med. onz.
Leño de sándalo rojo, . . dos drac.
Alumbre, ... med. drac.
Aceite de bergamota y
——— de clavo, a. . . una got.
Méz. (b.* f.**)

*br.** trae un poco despues la misma fórmula: onz. y med. de quina, med. onz. de sándalo rojo, nada de alumbre y doce got. de cada uno de los dos aceites.

R. Quina,
Magnesia calcinada y
Coral rojo pp., a. . . . med. onz.
Canela, ... dos escrup.
Háganse polvos. (*ca.*)

R. Polvos de aeróforos, . . seis onz.
——— de carbon animal y
——— de quina, a. drac. y med.
——— de canela, . . med. drac.
Méz. (*sw.*)

R. Polvos de quina, . . . dos drac.
——— de coral rojo, . una drac.
——— de mirra y
——— de cremor tártaro,
a. med. drac.
Méz. (*sw.*)

R. Quina, ... tres drac.
Coral rojo, ... drac. y med.
Canela, ... med. drac.
Mirra y
Cremor de tártaro, a. med. drac.
Mézclense todas estas sustancias pulverizadas cada una por sí. (*br.*)

R. Polvos de quina, . . . una onz.
——— de lirio de Florencia,
——— de hojas de salvia y
——— de mirra, a. . med. onz.
Méz. ex. (fu.)

R. Polvos de quina, . . . tres onz.
——— de hojas de salvia,
——— de cremor de tártaro y
——— de mirra, a. . med. onz.
——— de catecú, . . seis drac.
Aceite de clavo, diez y seis got.
Méz. (he.)

R. Polvos de quina, . . . dos onz.
——— de lirio de Florencia,
una onz.

Polvos de sal amoniaco, med. onz.
——— de catecú y
——— de mirra, a. . . . seis drac.
Aceite de clavo, ... doce got.
Méz. ex. (f.** r. *pid.*)

B. *Bolos y píldoras.*

BOLOS DE QUINA. (ff. *sa. sw.*)

R. Quina en polvo, . . . med. drac.
Jarabe comun, . . . drac. y med.
Mézclense y háganse diez y ocho bolos.

A estos bolos simples puede añadirse segun ff. doce granos de canela en polvo *(bolo de quina aromatizado)*, doce gr. de tintura de opio *(bolo de quina opiado)*, doce gr. de esta misma tintura, y otro tanto de canela *(bolo de quina opiado y aromatizado)*; segun *sw.* cinco gr. de sal amoniaco, diez de alumbre, cinco de óxido de hierro negro, med. drac. de valeriana, ó en fin diez gr. de serpentaria, todo en razon de las circunstancias; y segun *sa.* un gr. de ruibarbo, diez de alumbre, una got. de tintura thebaica, med. escrup. de serpentaria, tres gr. de sal amoniaco ó cinco gr. de moho de hierro.

BOLOS DE QUINA Y DE RUIBARBO. (*ra.*)

R. Quina, ... cinco drac.
Ruibarbo, ... med. drac.
Sal amoniaco, ... treinta gr.
Jarabe de flores de melocoton, c. s.
Divídanse en diez dósis, de las que se toma una cada tres horas en las calenturas intermitentes, las nevralgias y otras afecciones nerviosas periódicas.

BOLOS FEBRIFUGOS. (*ra.*)

R. Quina en polvo, . . . una onz.
Sal amoniaco y
Sub-carbonato de amoniaco,
a. veinte y cuatro gr.
Tártaro estibiado, diez y ocho gr.
Jarabe comun, ... c. s.
para dividir en mas ó menos dósis, que se administran en la apirexia.

BOLOS TONICOS. (*bo.*)

R. Quina, ... un escrp.
Casia leñosa,
Leño de quasia amarga y
Etíope marcial, a. . . . seis gr.
Conserva de énula, ... c. s.
para hacer un bolo, que se toma por la mañana en ayunas en una pequeña cantidad de tisana apropiada.

BOLOS CONTRA LAS CUARTANAS.

Boli ad quartanam. (ra. sm. sp.)

R. Quina, ... una onz.
Sub-carbonato de potasa,
una drac.
Tártaro estibiado, . diez y seis gr.
Jarabe comun, ... c. s.
Háganse sesenta bolos. (*ra. sm.*)

Para tomar en veinte y cuatro horas en las calenturas intermitentes y las enfermedades periódicas.

Esta fórmula es de Desbois de Rochefort. Laennec la habia modificado como sigue:

R. Quina, ... seis drac.
Tártaro estibiado, ... seis gr.
Estracto de enebro, ... c. s.

Modificacion poco feliz que no se halla menos en contradiccion de los principios de la química.

La antigua fórmula de estos bolos célebres que se encuentra en Richard de Hautesiérk es como sigue:

R. Quina, ... seis drac.
Escila pp., ... dos escrp.
Kermes mineral, ... seis gr.
Espíritu de sal amoniaco,
una drac.
Conserva de rosas, ... c. s.
para hacer doce bolos. *(sp.)* — Dósis; cuatro cada dia á intervalos iguales.

PILDORAS DE QUINA. (sa.)

R. Quina, ... onz. y med.
Sal febrífuga de Sylvius,
Estracto de camedrios,
——— de agenjos y
——— de centaura menor,
á. med. onz.
Triaca, ... una onz.
Hágase masa de píldoras.

PILDORAS FEBRIFUGAS INGLESAS. (*ca.*)

R. Quina,
Sal de agenjos y
— amoniaco, a. . . . una onz.
Tártaro estibiado, diez y ocho gr.
Jarabe de quina, ... c. s.
Háganse treinta y seis píldoras.
Se parecen mucho á los bolos *ad quartanam.* — Dósis; doce cada vez en la época mas distante del acceso.

PILDORAS ANTIDISENTERICAS. (*pie.*)

R. Quina roja, ... una drac.
Alcanfor, ... cuatro gr.
Ipecacuana, ... dos gr.
Conserva de rosas y
Jarabe de limon, a. . . . . c. s.
Hágase masa de píldoras. — Se repite la dósis de cuatro en cuatro horas, en la disenteria llamada maligna, añadiendo med. ó un gr. de opio, si los dolores son vivos.

PÍLDORAS TÓNICAS Y CALMANTES.
(*bo. pie.*)

R. Quina roja y
Succino blanco, a. . . . una drac.
Canela y
Flores de azufre, a. . . med. drac.
Ipecacuana, ... veinte gr.
Estracto de amapola, cuarenta gr.
Jarabe de naranja agria, . . . c. s.
Háganse píldoras de cuatro gr. — Dósis; una ó dos cada cuatro horas, aumentando progresivamente hasta doce ó quince cada dia.

C. *Pastillas.*

PASTILLAS DE QUINA.

Morsuli chinati. (fu. he. *pid.*)

R. Azucar blanca, ... una onz.
Agua, ... med. lib.
Cuézase y añádase
Polvos de quina, ... tres lib.
Corteza de naranja confitada y partida menudamente, . . una onz.
Especies para pastillas imperiales, tres drac.
Háganse pastillas de dos drac. (*pid.*)
he. suprime la corteza de naranja y reemplaza las especies por la canela; — y fu. conserva la naranja; pero prescribe en lugar de las especies los polvos aromáticos.
Son tónicas, antisépticas y antihelmínticas — Dósis; una, dos ó tres al dia.

D. *Cataplasmas.*

CATAPLASMA ANTISÉPTICA. (f.)

R. Harina de cebada, . . . seis onz.
Agua comun, ... una lib.
Quina en polvo, . . . una onz.

Hágase hervir por un cuarto de hora meneando sin cesar, y añádase á la masa medio fria

Alcanfor pulverizado, . . una drac.

CATAPLASMA ANTISÉPTICA DE REUS. (f.*)

R. Polvos de quina,
——— de ruda y
Alcohol alcanforado, a. sesenta y cuatro p.
Alcanfor pulverizado, . . . doce p.
Vinagre, ... c. s.
Méz. en frio.

E. *Electuarios.*

ELECTUARIO FEBRÍFUGO.

Opiata febrífuga. (b.* fe. *bo. ca. sm. sp.*)

R. Quina en polvo
Conserva de agenjos y
——— de coclearia, a. siete drac.
Jarabe de fumaria, ... c. s.
para hacer una masa blanda (*ca.*)
Dósis; de tres á cuatro drac.

R. Arrope de sahuco, ... med. onz.
Polvos de quina, ... seis drac.
——— de flores de manzanilla ordinaria, ... dos drac.
———de clavos de especia y
Estracto de centaura menor, a. media drac.
Jarabe de zumo de limon, onz. y m.
Méz. ex. (b.*)
Alabado por Hoffmann. — Dósis; med. drac. cada dos horas.

R. Polvos de quina, . . . cuatro onz.
———de nitro y
Conserva de rosas rojas, a. dos onz.
Jarabe de achicorias con ruibarbo, ... c. s.
Méz. (*sp.*)

R. Quina, ... dos onz.
Diascordio, ... dos drac.
Jarabe de agenjos, ... c. s.
Méz. (fe.)

R. Polvos de quina y
Triaca, a. . . . . med. onz.
Miel de Narbona y
Jarabe de achicorias compuesto, a. una onz.
Esencia de canela, . . . una got.
Méz. (*sm.*)

R. Polvos de quina, . . . med. onz.
——— de canela, . . . un escrp.
——— de cardo estrellado,
——— de manzanilla romana,
——— de valeriana silvestre,
——— de agenjos y
——— de centaura menor, a. una drac.
Miel, ... c. s.
Méz. (bo.) — Para tomar en cuatro veces en la apirexia.

R. Quina, ... seis drac.
Magnesia blanca, ... dos drac.
Jarabe de agenjos, ... c. s.
Méz. (*sm.*)
Para concluirla á dósis mas ó menos considerables, segun la duracion de la apirexia.

R. Quina, ... dos onz.
Serpentaria de virginia y
Canela, a. . . . . dos drac.
Alcanfor, ... dos escrp.
Opio, ... tres gr.
Jarabe de agenjos, ... c. s.
Méz. (*bo.*) — Para tomar cada dos horas en la apirexia.

ARROPE TÓNICO Y ANTI-PERIÓDICO. (*pie.*)

R. Corteza de cidra y

Corteza de naranja, a. . onz. y m.
Macháquense las cortezas y échense encima poco á poco
Infusion de hojas de ulmaria, med. lib.
Agua de flores de naranjo, . c. s.
Cuélese por espresion y añádase al líquido
Polvos de quina, ... dos drac.
Jarabe de corteza de naranja, dos onz.

OPIATA FEBRÍFUGA PURGANTE. (*sp.*)

R. Polvos de quina, . . cuatro onz.
——— de jalapa y
——— de nitro, a. . . tres drac.
Conserva de rosas rojas, dos onz.
Jarabe de achicorias con ruibarbo, c. s.
Méz.

ELECTUARIO ANTICARDIÁLGICO. (*sm.*)

R. Polvos de quina, . . . una onz.
——— de alcanfor y
——— de mirra, a. . med. drac.
Jarabe de cabezas de adormidera y
——— de menta, a. . diez drac.
Se toma el volúmen de una nuez moscada seis veces al dia.
Dehaen le ha alabado en la cardialgia atribuida á espasmo ó á la debilidad del estómago.

ELECTUARIO FORTIFICANTE. (*sa.*)

R. Polvos de quina, ... med. onz.
Conserva de rosas rojas, seis drac.
Estracto acuoso de mirra, med. drac.
Arrope de sahuco, ... c. s.

ELECTUARIO DE QUINA ALCALINO. (*au. sy.*)

R. Polvos de quina, ... una onz.
Sub-carbonato de sosa, . dos drac.
Mucílago de goma arábiga. . . c. s.
Aconsejado en las escrófulas complicadas de viruelas. —Dósis; dos drac. dos ó tres veces al dia.

ELECTUARIO TÓNICO. (*ca. sw.*)

R. Quina, ... seis drac.
Limaduras de hierro puras y
Triaca, a. . . . . dos drac.
Jarabe de canela, ... c. s.
Méz. (*ca.*)
Dósis; una drac. por mañana y tarde. —Se ha aconsejado en la asci-tis despues de la evacuacion de las aguas.

R. Quina, ... una onz.
Canela, ... una drac.
Etíope marcial, ... dos drac.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (*sw.*)—Dósis; el volúmen de una nuez moscada dos ó tres veces al dia.—Se ha alabado en la leucorrea, la atonia reputada general, la ataxia y las enfermedades flatulentas.

ELECTUARIO ASTRINGENTE. (*sm.*)

R. Quina en polvo y
Triaca, a. . . . . una onz.
Limaduras de hierro, . dos drac.
Jarabe de catecú ó de azafran, c. s.
Util en las leucorreas inveteradas.
Dósis; una drac. tres veces al dia.

ELECTUARIO ANTIFEBRIL. (f.* *b. bo. pie. sm. sp.*)

R. Quina, ... doce drac.

Miel blanca, ... cuatro onz.
Sub-carbonato de hierro, med. onz.
Polvos de valeriana, . . . dos drac.
Ojos de cangrejo, . . . una drac.
Jarabe de agenjos, ... c. s.
Méz. (*sm.*)—Dósis; una cuhta. cada cuatro horas en la apirexia.

R. Polvos de quina, ... una onz.
——— de genciana y
Flores de sal amoniaco marciales, a. . . . . una drac.
Ojimiel escilítico y
Jarabe de las cinco raices, a. . c. s.
Méz. (f.* *bo. pie.*)

Quarin le aconseja en la hidropesía con cuartanas.—Dósis; dos drac. cada tres horas.

R. Polvos de quina, ... una onz.
——— de flores de manzanilla, dos drac.
——— de nitro y
Diaforético marcial, a. una drac.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (*sp.*)—Alabado estremadamente contra las calenturas intermitentes de todos géneros por Triller, que aun le ha exagerado en versos bastante malos.

R. Quina, ... dos drac.
Sal de agenjos
— amoniaco
— de marte de Riviere, a. diez gr.
Ruibarbo, ... ocho gr.
Jarabe de las cinco raices, . . c. s.
Méz. (*pie.*)

Preconizado con particularidad en las cuartanas.

R. Quina, ... una onz.
Valeriana, ... med. onz.
Canela, ... un escrp.
Miel despumada, ... c. s.
Para tomar en cuatro veces. (*b.*)

R. Opio, ... un gr.
Tártaro estibiado, ... tres gr.
Sal de agenjos, ... dos escrp.
Polvos de quina, . . . onz. y m.
Jarabe de agenjos, ... c. s.
Para tomar poco á poco en el dia. (*b.*)

ELECTUARIO ASTRINGENTE.

Opiata astringente. (e. *ca. pie. sa. sm.*)

R. Quina pulverizada y
Corteza de naranja, a. . seis drac.
Ojos de cangrejo, ... dos drac.
Conserva de rosas rojas y
———— de cynorrodon, a. . . . . seis drac.
Jarabe de catecú, ... c. s.
Méz. (*sm.*)—Util en la diarrea crónica que sucede á las abundantes supuraciones.—Dósis; una drac. dos ó tres veces al dia.

R. Quina y
Conserva de romero, a. . una onz.
———— de rosas rojas, . tres onz.
Almáciga y
Catecú, a. . . . . dos drac.
Esencia de canela, . . tres got.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (*ca. sm. pie.*)

En la leucorrea.—Dósis; dos drac. por mañana y tarde.—Tissot le prescribia con frecuencia.

R. Quina, ... una onz.
Bálsamo de Tolú y
Catecú, a. . . . . una drac.
Jarabe de consuelda mayor, . c. s.
Méz. (e. *pie.*)—Divídase en diez dósis, de las que se dan dos ó tres cada dia en un vehículo apropiado.—Ha sido muy alabada contra las emo-

tipsis y otras enfermedades atribuidas á la astenia.

R. Quina,
Raiz de tormentila y
Ojos de cangrejo, a. . . . una drac.
Jarabe de cabezas de adormidera, una onz.
Méz. (*sa.*)

R. Quina, ... una onz.
Conserva de fumaria, . . dos onz.
Espíritu de coclearia, . med. drac.
Jarabe de fumaria y
——— de vinagre, a. . . . c. s.
Méz. (*pie.*)—Para tomar á cuch.

ELECTUARIO DE QUINA.

Opiata febrífuga. (f. *ca.*)

R. Quina, ... diez drac.
Sal amoniaco, ... una drac.
Miel pura y
Jarabe de agenjos, . a. dos drac.
Méz.
Dósis; de dos drac. á med. onz. repetida tres veces antes del acceso. (f. *ca.*)

R. Quina,
Diapruno solutivo y
Jarabe de flores de melocoton, a. una onz.
Sal amoniaco, ... un escrp.
Méz. (*ca.*)
Para tomar en doce dósis, dos veces cada dia.

ELECTUARIO FEBRIFUGO DE SENAC. (*bo. pie.*)

R. Polvos de quina, . . cuatro drac.
——— cornaquinos, . veinte gr.
Agarico, ... quince gr.
Sal amoniaco, ... una drac.
Jarabe de achicorias, . . . c. s.
Para tomar en cuatro veces de tres en tres horas en la apirexia de las calenturas cuartanas.

OPIATA FEBRIFUGA É INCISIVA. (*bo.*)

R. Quina, ... una onz.
Sal de agenjos,
— amoniaco y
Flores de sal amoniaco marciales, a. . . . . treinta gr.
Ruibarbo, ... med. drac.
Jarabe de las cinco raices, . c. s.
Para tomar en cuatro veces de cuatro en cuatro horas en una taza de infusion de camedrios. — Ha sido alabada con particularidad en las cuartanas complicadas con obstrucciones.

OPIATA FEBRIFUGA. (*pie. sa.*)

R. Quina, ... seis drac.
Ruibarbo,
Cascarilla y
Sal amoniaco, a. . . . dos drac.
Lirio de Florencia, . . una drac.
Jarabe de achicorias, . . . c. s.
Méz. (*pie.*) — Aconsejada en la calentura cuartana. — Dósis; una á dos drac. cada dia.

R. Quina, ... una onz.
Sal amoniaco, ... una drac.
Jarabe de flores de manzanilla, c. s.
Méz. (*sa.*)

ELECTUARIO DE QUINA ANTIMONIADO.

Confectio quinæ antimonialis. (e.)

R. Tártaro estibiado, . . . seis gr.
Crémor de tártaro, . . tres drac.
Tritúrense juntos por media hora y añádase

Polvos de quina, . . . una onz.
Jarabe de vinagre,
tres onz. y med.

ELECTUARIO ANTIEPILEPTICO.

Electuarium antiepilepticum, s. *antispasmodicum; Confectio chinæ antiepileptica.* (b.* e. fu. *bo. ca. pie. sw.*)

R. Quina, ... una onz.
Valeriana, ... med. onz.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (b.* fu. *sw.*)
Aconsejado en la epilepsía, la corea y el histerismo. — Dósis; una drac. por mañana y tarde.

R. Polvos de quina, . . . seis drac.
——— de serpentaria de Virginia,
dos drac.
Jarabe de peonía, . . . tres onz.
Méz. (e.)

R. Polvos de quina, ... una onz.
——— de estaño y
——— de valeriana, a. med. onz.
Jarabe comun, ... c. s.
Méz. (*ca.*) — Dósis; una drac. por mañana y tarde.

R. Polvos de quina, . . . una drac.
——— de valeriana, . treinta gr.
——— de visco de encina,
veinte gr.
——— de cinabrio, . . diez gr.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (*bo. pie.*) — Dósis; uua drac. por mañana y tarde.

ALIMENTO ANTIESCORBUTICO. (f.**)

R. Patatas cocidas al vapor, mil pt.
Polvos de quina, . . . sesenta pt.
Jarabe comun,
doscientas cincuenta pt.
Agua, ... mil pt.
Hágase una masa. — Aconsejado por Guyton. — Dósis; cuatro onz. que se duplican al quinto ó sesto dia.

F. *Pociones.*

POCION CON QUINA EN POLVO.
(b.* ff. *au. bo. pie. ra.*)

R. Quina en polvo, . . drac. y med.
Dilúyase en
Agua, ... cuatro onz.
Jarabe comun, ... una onz.
Méz. ex. (*ra.*)

R. Quina en polvo, . . . dos drac.
Agua de menta piperita,
cuatro onz.
Añádase
Tintura de canela, . . una drac.
Méz. (ff.)

R. Quina, ... dos drac.
Nitro, ... cinco gr.
Láudano líquido de Sydenham,
sesenta got.
Vehículo apropiado, ... c. s.
Méz. ex. (*pie.*)

R. Quina roja en polvo, . dos drac.
Cocimiento de quina, . siete onz.
Tintura de quina, . . . una onz.
Elixir vitriólico, . . . dos drac.
Méz. (*pie.*) — Aconsejada con particularidad en la hemacelinosis.

R. Quina en polvo, . . . med. onz.
Sal amoniaco, ... doce gr.
Vino tinto, ... cuatro onz.
Méz. (*ra.*)

R. Quina en polvo, . . . dos drac.
Mil pies y
Centaura menor, a. . . una drac.
Vino generoso, ... ocho onz.
Méz. (*bo. pie.*)

R. Quina en polvo, . . . med. onz.
Vino tinto,
Miel depurada y
Infusion de culantrillo, a. dos onz.
Méz. *(bo. pie.)*

R. Quina roja en polvo, . una onz.
Alcohol, ... doce onz.
Eter sulfúrico, ... dos drac.
Méz. (b.*)

Estas pociones han sido aconsejadas en las enfermedades atribuidas á la adinamia. La última lo ha sido en el tifus grave por Rademacher. — La dósis es general de una ó dos cuch., de una en una ó de dos en dos horas.

POCION FEBRIFUGA AMARGA.

Decoctum amarum antifebrile. (b.)

R. Cocimiento amargo, lib. y med.
Polvos de quina, ... una onz.
—— de valeriana, . . med. onz.
Háganse hervir por una hora y cuélese. — Para tomar en cuatro veces.

§. II. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DE LA QUINA SIN EL VEHICULO EMPLEADO PARA SU ESTRACCION.

ESTRACTO ACUOSO DE QUINA.

Extractum cinchonæ, s. *corticis peruviani aquosum*, s. *gummosum.* (a. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.)*

R. Quina en polvo, ... una pt.
Agua fria, ... diez pt.
Pónganse en maceracion por dos dias; déjese reposar y decántese el líquido, y evapórese despues á un fuego manso hasta la consistencia de estracto. (po. *sw.*)

fe. han. o. pr. y s. prescriben se macere por cuarenta y ocho horas una pt. de quina en doce de agua; que se evapore ligeramente el líquido colado hasta que no queden mas que dos lib.; que se deje enfriar, se filtre y se evapore al B. M.; — sa. que se triture la corteza en un mortero de mármol, añadiendo poco á poco agua; que se decante esta cuando esté muy turbia, que se reemplace con nueva agua y que se continúe de este modo hasta que no tome color; que se dejen reposar las tinturas, que se cuelen y se evaporen á un fuego suave ó al sol, hasta la sequedad; — f. que se maceren dos lib. de quina en doce de agua fria por veinte y cuatro horas, meneandolo de cuando en cuando y que se cuele; que se repita la maceracion con el residuo y ocho lib. de agua fria y que se cuele tambien; que se reunan los dos líquidos y que se evaporen al B. M. hasta la consistencia de jarabe; que se eche despues en platos á la altura de dos líneas y que se evapore hasta la sequedad al horno ó al B. M. para desprender en seguida las costras ó cortezas que forman; — y wu. que se maceren por dos dias dos onz. de quina en cuatro lib. de agua fria; que se evapore el líquido colado hasta que no quede mas que una lib.; que se filtre despues de frio y que se deje secar espontáneamente en platos.

R. Quina en polvo pasada por tamiz, c. s. q.
Humedézcase mucho con agua; dé-

jese en maceracion por veinte y cuatro horas; añádase en seguida una cantidad de agua fria igual al peso de toda la masa; hágase hervir por quince ó veinte minutos; cuélese hirviendo por una franela; échese sobre el resíduo el doble de su peso de agua; hiérvase por un cuarto de hora y cuélese; déjese reposar un poco; decántese y evapórese haciéndole hervir sin cesar. *(vm.)*

R. Quina, ... una pt.
Agua de fuente, ... seis pt.

Déjense en digestion por cuatro dias en un sitio caliente; cuélese por espresion y evapórese el líquido colado hasta la consistencia de estracto. (br.) *sw.* prescribe se trituren juntas por muchas horas una parte de quina y otra de agua; que se cuele y se evapore en seguida hasta la sequedad á un fuego manso; — w. que se ponga en infusion una parte de quina en treinta y dos de agua hirviendo, por cuarenta horas; que se filtre el líquido; que se evapore suavemente hasta que quede una lib.; que se deje enfriar; que se filtre despues y que se estienda sobre platos puestos sobre un hornillo, á fin de que se seque, en forma de escamas brillantes; — fu. y li. que se ponga una lib. de corteza pulverizada en una manga, y que se eche encima agua hirviendo hasta que esta pase á insípida, y que se evapore despues el líquido.

R. Quina en polvo, ... una pt.
Agua, ... doce pt.

Déjense en infusion por dos dias al B. M. ó á un calor suave, meneándolo con frecuencia; repítase la infusion con nueva agua hasta que esta salga insípida; fíltrense todos los líquidos reunidos y evapórense hasta la sequedad, primero al fuego y despues al B. M. (e.)

an. prescribe se haga infundir una parte de corteza en seis de agua por veinte y cuatro horas; que se hierva despues por un cuarto de hora en cuatro partes de agua; que se evapore el cocimiento, y que se añada á lo último el líquido obtenido primeramente, reduciéndolo todo despues á la consistencia de estracto al B. M.

R. Quina pulverizada, . . . una pt.
Agua, ... doce pt.

Hágase hervir por hora y media; cuélese el líquido estando aun caliente y evapórese lo conveniente. *(br.)*

R. Quina, ... una pt.
Agua hirviendo, . . . ocho pt.

Hágase hervir ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hiérvase otra vez el resíduo con cuatro partes de agua, y cuélese del mismo modo; mézclense los dos líquidos; decántense despues del reposo suficiente, y evapórense hasta la consistencia de estracto. (d. han. o. po. pr.)

a. prescribe se estraigan los principios de la corteza por muchas ebuliciones sucesivas, y que se evaporen al B. M. los líquidos reunidos despues de la decantacion: — du. f. fi. y *c.* que se hierva por un cuarto de hora con seis partes de agua, despues otra vez con nueva agua, y que se evaporen al B. M. los líquidos reunidos; — *br.* que se prolongue la primera ebulicion hasta dos horas; — b. que se hierva la corteza dos veces seguidas,

con doce partes de agua cada vez; — su. que se empleen tres partes de agua en cada ebulicion; — lo. que se hierva cuatro veces seguidas una lib. de quina en cuatro azumbres de agua, reduciéndolas á tres; — y g. que se hierva tres ó cuatro veces la corteza en quince partes de agua cada vez, hasta que el líquido no tome color.

Pueden reducirse todos estos diversos procedimientos á tres, que consisten en evaporar una infusion hecha en frio, otra hecha en caliente ó un cocimiento. El estracto preparado del primer modo, contiene quinato de cal, goma, materia colorante roja, materia colorante amarilla, un poco de rojo cinconico y muy pocas sales de base de quinina ó de cinconina; porque estas sales, aunque solubles en el agua fria, estan de tal modo envueltas por una materia grasa ó por materias colorantes, que apenas las ataca el agua. En cuanto al cocimiento, con particularidad prolongado, se apodera bien de los quinatos alcalinos, y con ellos de la goma, el almidon, el tanino, la materia colorante amarilla, el rojo cinconico, y una parte de la materia grasa; pero cuando el líquido se enfria, ademas de que el compuesto que resulta de la union del almidon con el tanino se hace insoluble á menos que el líquido no esté muy dilatado por el agua, se precipita una grande cantidad de álcalis orgánicos con gran porcion de materias grasas y colorantes. Por consiguiente la infusion caliente debe preferirse segun lo advierte Idt y Cheballier. Se echa c. s. de agua á 30.° sobre la corteza quebrantada; se menea de cuando en cuando, y al cabo de veinte y cuatro horas se cuela esprimiendo con fuerza; se echa sobre el resíduo una cantidad de agua igual á la primera y á los mismos grados de temperatura, se reunen las dos infusiones, se filtran y se evaporan al B. M. hasta la consistencia de masa de píldoras; ó bien se concentra hasta la de jarabe espeso, se estiende este con un pincel sobre platos, que se ponen en la estufa, y al cabo de algunos dias se rae con un cuchillo romo las capas delgadas que se hayan formado. El estracto de quina debe efectivamente prepararse blando y seco; en este último estado se llama *Sal esencial de quina, sal de Lagaraye.*

Es tónico, fortificante, antiséptico, febrífugo y antielmíntico. — Dósis; de diez á treinta gr.

ESTRACTO EMULSIVO DE QUINA. (*vm.*)

R. Quina gris en polvo y
Agua fria, a. cuarenta y ocho pt.

Póngase en maceracion; añádase en seguida media parte de goma arábiga con agua caliente añadida con lentitud y hágase una emulsion; cuélese, trátese el resíduo del mismo modo, con una nueva cantidad de agua caliente y otra media parte de goma; reúnanse los dos líquidos colados; déjense reposar; decántense y evapórense despues sin hervir, hasta la consistencia de estracto.

ESTRACTO VINOSO DE QUINA.

Extractum corticis peruviani vinosum.
(he. sa. *pid.*)

R. Quina, ... una pt.

Vino blanco, ... ocho pt.

Déjense en digestion por tres dias; cuélese por espresion y evapórese hasta la consistencia de estracto. (he. *pid.*)

R. Quina, ... una pt.
Vino blanco generoso,
cinco ó seis pt.

Déjense en digestion por tres dias al B. A.; cuélese esprimiendo con fuerza; hágase hervir el resíduo con c. s. de nuevo vino, hasta que se consuma la mitad; reúnanse las dos tinturas y evapórense hasta la consistencia de estracto. (sa.)

Este estracto está justamente abandonado.

ESTRACTO ALCOHÓLICO-ACUOSO DE QUINA.

Resinoso-estractivo de quina; Estractum corticis peruviani alcoholico-aquosum. (am. ba. du. ed. f. ff. li. lo. p. pa. w. wu. *pie.*)

R. Quina en polvo, . . . una pt.
Alcohol de 22.°, . . cuatro pt.

Déjese en infusion por seis dias y filtrese; destílese al B. M. hasta que se consuma la cuarta parte, y evapórese en el mismo baño. (f. ff. lo.)

pie. prescribe aguardiente de 20.°

R. Quina, ... c. s. q.
Alcohol, ... c. s.

para cubrir cuatro dedos el polvo; déjese digerir á un calor suave y decántese; hágase hervir el resíduo con agua por una hora y cuélese por espresion; evapórese el líquido al B. M. hasta la consistencia de miel, y añádase poco á poco, y á lo último, la tintura, meneando sin cesar para obtener una pasta homogénea y sin grumos. (wu.)

R. Quina, ... una lib.
Alcohol, ... cinco ó seis lib.

Déjese en infusion lo suficiente; cuélese por espresion; póngase en digestion y hágase hervir un poco el resíduo con tres lib. de agua; clarifíquese el cocimiento con clara de huevo; reúnanse los dos líquidos; estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese lo demas hasta la consistencia de estracto. (fu. li. pa. w.)

du. y p. prescriben se dejen en digestion por cuatro dias una lib. de corteza en dos azumbres de alcohol (0,830); que se hierva despues con cinco azumbres de agua, reducidas á una; que se destile la tintura; que se evapore el cocimiento; que se reunan los líquidos cuando principien á espesarse, y que se evaporen hasta la consistencia de masa de píldoras; — am. ed. y c. que se deje en digestion por cuatro dias una lib. de quina con cuatro de alcohol (0,835); que se hierva despues el resíduo por un cuarto de hora en cinco lib. de agua; que se repita segunda vez la ebulicion con igual cantidad de agua; que se evaporen los dos cocimientos hasta la consistencia de miel líquida; que se destile la tintura para estraer el alcohol; que se mezclen los dos líquidos luego que lleguen á un mismo grado de concentracion, y que se concluya de evaporarlos al B. M.; — ba. que se deje en digestion por dos dias una parte de quina en una mezcla de seis partes de agua y cuatro de alcohol; que se hier-

va el resíduo por un cuarto de hora con cinco partes de agua; que se reunan los dos líquidos colados, y que se evaporen despues de haber destilado el alcohol.

Tónico, fortificante, antiséptico y febrífugo. — Dósis; de diez á veinte granos.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE QUINA.

Resina de quina; Extractum chinæ alcoholicum; Resina corticis peruviani. (am. ams. b. be. f. fe. fi. g. s. *br. pie.*)

R. Quina quebrantada, . cuatro lib.
Alcohol (30.°), ... diez lib.

Déjense en digestion por tres dias al B. A. y decántese; repítase la operacion del mismo modo con el resíduo y diez lib. de alcohol; decántese despues; esprímase el resíduo; reúnanse los tres líquidos y déjense reposar; añádanse ocho lib. de agua despues de la decantacion y estráigase el alcohol por la destilacion á un calor suave; lávese la resina que se halla adherida al fondo de la vasija hasta que el agua salga insípida; evapórese el líquido que sobrenade, y recójase la resina que se precipite para lavarla tambien; ablándese todo en un poco de alcohol de (20.°) para reunirlo en una sola masa y séquese esta á un calor suave. (am. b. be. fe. fi. g. s.)

R. Quina quebrantada, . cuatro lib.
Alcohol (0,907), diez y seis lib.

Destílense dos lib. de líquido á un fuego lento; cuélese por espresion el resíduo despues de frio, y déjese reposar; añádase al espíritu doce lib. de alcohol (0,907); échese la mezcla sobre el resíduo y destílese lib. y med. de líquido; cuélese por espresion despues de frio; mézclense los dos líquidos; déjense en reposo por ocho dias, y decántense; añádanse despues seis lib. de agua, y destílese á un fuego manso para estraer el alcohol; lávese bien la resina con agua hirviendo; reblandézcase con un poco de alcohol, y cuando esté reunida en una sola masa, séquese suavemente. (ams.)

R. Tintura alcohólica de quina,
c. s. q.

Destílense las tres cuartas partes del líquido al B. M.; añádase al resíduo una cantidad de agua igual á la suya; recójase y lávese el precipitado; déjese escurrir; esprímase con precaucion; disuélvase en alcohol tibio, y evapórese despues el líquido hasta la sequedad. (f.)

br. y *pie.* prescriben se destilen tres cuartas partes de la tintura, para estraer el alcohol, y que se evapore el resíduo hasta la sequedad sin añadir agua.

Irritante que produce con frecuencia abundantes deyecciones alvinas. — Se ha aconsejado en la apirexia de las calenturas intermitentes á la dósis de una drac. en dos, tres ó cuatro onz. de un vehículo apropiado, que se toma á cuch. de dos en dos horas.

POLVOS FEBRIFUGOS. (b.*)

R. Quina, ... onza y med.
Raiz de yaro,
—— de eléboro negro y
—— de genciana, a. . dos drac.

POLVOS ANTISEPTICOS. (*sm.*)

R. Estracto de quina y

Estracto de mirra, a. . dos drac.
Azucar de leche, . . . dos onz.
——— blanca, ... seis onz.
Pulverícense.

Aconsejados por Stoll. — Dósis; una cuchta. tres ó cuatro veces en las veinte y cuatro horas.

BOLOS FEBRIFUGOS. (*ra.*)

R. Estracto de quina y
Arrope de sauco, a. . una drac.
Conserva de cinorrodon,
dos drac.

Usados por Dupuytren.

BOLOS ANTIESCORBUTICOS. (*pie.*)

R. Estracto de quina, . quince gr.
Ruibarbo, ... cuatro gr.
Jarabe de corteza de naranja,
c. s.

BOLOS TONICOS. (*pie.*)

R. Estracto vinoso de quina,
veinte gr.
Nitro, ... treinta gr.
Conserva de corteza de naranja,
c. s.

PILDORAS ANTIFEBRILES. (*sa.*)

R. Estracto de quina y
——— de trebol acuático,
a. dos drac.
Ruibarbo, ... un escrp.

Háganse píldoras de dos granos.

PILDORAS ESTOMACALES. (*sm.*)

R. Estracto de quina,
——— de cardo santo,
——— de genciana y
——— de ruibarbo, a. part. ig.

Háganse píldoras de cuatro gr. — Dosis; una ó dos, tres veces al dia.

PILDORAS DE QUINA ALCANFORADAS. (*ra.*)

R. Estracto de quina, . . una drac.
——— de opio, ... un gr.
Alcanfor, ... doce gr.
Quina en polvo, ... c. s.

Háganse doce píldoras. — Usadas por Dupuytren.

GRAGEA DE QUINA. (*sa.*)

R. Quina, ... med. onz.
Estracto de quina seco,
onz. y med.
Azucar clarificada, . lib. y med.

Mézclense los dos polvos y échense en un perol de cobre; échese encima la azucar cocida al grado de pluma, y menéese hasta que los polvos perfectamente cubiertos de azucar se conviertan en granos.

PASTILLAS ANTIPERIODICAS.

Pastillas de quina. (f. *bo. pie.*)

R. Resina de quina, . . . una drac.
Azucar blanca, ... dos onz.
Mucílago de goma arábiga, c. s. para hacer sesenta pastillas.

f. prescribe med. onz. de estracto seco, cuatro onz. de azucar, med. drac. de canela, y c. s. de mucílago de goma tragacanto para hacer pastillas de ocho granos, que se cubrirán con polvos de azucar.

Son tónicas y febrífugas, segun la dósis. — Una drac. equivale á una onz. de quina.

POCION TONICA. (*e. fp. ra. sw.*)

R. Estracto de quina, . . dos drac.
Agua comun, ... dos onz.
Añádase á la solucion
Jarabe de bálsamo de Tolú,
dos onz.

Méz. ex. (*ra.*)

R. Estracto de quina, . . una onz.
Agua, ... doce onz.
Añádase á la solucion
Tintura de canela y
Jarabe balsámico, a. . dos onz.

Méz. (*sw.*)

R. Estracto de quina, . . dos drac.
——— vinoso de opio, dos gr.
Jarabe de quina, dos onz. y med.
Agua destilada de menta y
——— de canela,
a. . . . . cuatro onz.

Mez. (*ra.*)

R. Estracto de quina, . . una drac.
Cocimiento de quina, . seis onz.
Tintura de cardamomo,
cuatro drac.

Méz. (*fp.*)

POCION ASTRINGENTE. (*au. ra.*)

R. Estracto blando de quina y
Tintura de canela, a. med. drac.
Agua de azahar, ... tres onz.
Jarabe de membrillos, med. onz.

Aconsejado por Fouquier en la disenteria crónica. (*ra.*)

R. Estracto de quina, . med. onz.
Agua de canela, . . . seis onz.
Acido sulfúrico, . . treinta got.
Tintura de canela, . . dos drac.

Dósis; una cuch. cada dos horas. (*au.*)

POCION ANTIESCORBUTICA. (*ca.*)

R. Estracto de quina, . . seis drac.
Cocimiento de quina, . seis onz.
Agua de canela vinosa, dos onz.
Jarabe de adormideras blancas,
una onz.

Para tomar á cuch. de med. en med. hora.

LAVATIVA TONICA.

Enema chinæ cum opio. (au. e.)

R. Estracto de quina, . . med. onz.
Agua tibia, ... cuatro onz.
Aceite comun, ... med. onz.
Tintura de opio, . . . diez got.

Util en las calenturas intermitentes.

POCION FEBRIFUGA. (*bo. pie. ra. sw.*)

R. Estracto de quina, . . un escrp.
Agua de menta piperita,
ocho onz.
——— de canela y
Jarabe de corteza de cidra,
a. . . . . una onz.

Méz. (*sw.*)

R. Estracto de quina, . . una drac.
Alcohol de melisa, . . dos drac.
Pocion gomosa, . . cuatro onz.
Jarabe de quina, . . . una onz.

Méz. (*ra.*)

R. Estracto de quina, . . una onz.
Cocimiento de quina y
Agua de canela, a. . . ocho onz.
Tintura de quina,
dos á cuatro onz.

Méz. (*sw.*)

R. Estracto de quina, . . dos drac.
Infusion de quina, . . ocho onz.

Jarabe de quina, . . . una onz.
Méz. *(bo.)*

R. Estracto de quina, . . una drac.
——— de opio, . uno á dos gr.
Pocion gomosa, . . . cuatro onz.
Méz. *(ra.)*

R. Estracto de quina, . . dos drac.
Kirschwasser, ... diez onz.
Añádase á la solucion
Jarabe de cidra, . . onz. y med.
Méz. *(pie.)*

R. Estracto de quina y
Triaca, a. . . . . una drac.
Agua de escabiosa, . . ocho onz.
Eter sulfúrico, ... un escrp.
Méz. *(pie.)*

MISTURA CONTRA LA TOS CONVULSIVA. (ham.)

R. Estracto de quina, . . una drac.
Agua destilada, ... tres onz.
Miel glicirrizada, ... una onz.
Vino antimonial de Huxham, una drac.
Tintura de cantáridas, med. drac.
Méz.

MISTURA ANTIFEBRIL. (*sa.*)

R. Estracto de quina y
Sub-carbonato de potasa líquido, a. . . . . dos drac.
Agua de menta piperita, una onz.
——— de cascarilla, . . dos onz.

MISTURA ANTIPERIODICA. (*bo. pie.*)

R. Resina de quina, . . una drac.
Sal de agenjos, . . . med. drac.
Agua destilada, dos onz. y med.
Jarabe comun, ... med. onz.
Méz. *(bo. pie.)*

R. Resina de quina, . . . dos drac.
Sal de agenjos, ... una drac.
Valeriana en polvo, . dos drac.
Agua, ... seis onz.
Méz. *(pie.)*

R. Resina de quina, . . una drac.
Sal de agenjos, ... med drac.
Jarabe de melisa, . . med. onz.
Agua de tilo, ... dos onz.
Méz. *(pie.)*

POCION TONICA Y ANTIESPASMODICA, (*pie.*)

R. Resina de quina, . . . una drac.
Sal de agenjos, . . . med. drac.
Alcanfor, ... veinte gr.
Agua de cardo santo, cuatro onz.
Para tomar á cuch. de dos en dos horas.

POCION FEBRIFUGA Y LAXANTE. (*pie.*)

R. Resina de quina, . . una drac.
Sub-carbonato de potasa, med. drac.
Magnesia calcinada, . una drac.
Agua de tilo, ... tres onz.
Jarabe de culantrillo, . una onz.
Dósis; dos cuch. á la vez.

MISTURA FEBRIFUGA. (*bo.*)

R. Resina de quina, . . una drac.
Quina roja en polvo, . tres drac.
Sub-carbonato de potasa, med. drac.
Miel blanca, ... cuatro onz.
Jarabe de agenjos,
——— de flores de naranjo y
——— de las cinco raices aperi-

tivas, a. . . . . una onz.
Dósis; una cuch. cada tres horas en el intérvalo de los accesos.

POCION ANTIHEMORRAGICA. (*pie.*)

R. Resina de quina, . . . dos drac.
Sal de agenjos,
Catecú y
Jarabe de rosas rojas,
a. . . . . una drac.
Alumbre, ... med. drac.
Agua de rosas, ... tres onz.
Para tomar á cuch. de dos en dos horas en las hemorragias pasivas.

POCION TONICA ALCANFORADA. (*bo.*)

R. Resina de quina, . . drac y med.
Sub-carbonato de potasa,
med. drac.
Alcanfor, ... un escrp.
Agua destilada de arnica,
——— de serpentaria de virginia,
——— de escabiosa y
——— de canela ordeada,
a. . . . . una onz.
Rom de la Jamaica, . med. onz.
Jarabe de quina, . . . dos onz.
Eter sulfúrico,
veinte y cinco got.
Se hace tomar helada y á cuch. de tres en tres horas en las calenturas asténicas.

POCION ANTIESPASMODICA Y TÓNICA. (*pie.*)

R. Estracto de quina, . med. drac.
Almizcle, ... cuatro gr.
Vehículo apropiado, ... c. s.
Méz. ex.
R. Resina de quina, . . med. drac.
Sub-carbonato de potasa, veinte gr.
Alcanfor, ... diez gr.
Almizcle, ... med. gr.
Elixir vitriólico de Mynsicht,
quince got.
Méz.
Para tomar á cuch. de dos en dos horas.

MISTURA ANTIPERIÓDICA. (*pie.*)

R. Estracto de quina, . . seis drac.
Zumo de limon, ... una onz.
Sal de agenjos, ... med. drac.
Elixir de Mynsicht, sesenta got.
Agua de melisa simple,
——— de azahar y
——— de menta, a. . . . dos onz.
Para cuatro tomas, de cuatro en cuatro horas.

POCION TÓNICA. (*ra.*)

R. Estracto de quina, . . . dos drac.
Acetato de amoniaco, . una drac.
Agua de azahar, ... dos drac.
Miel escilítica y
Jarabe comun, a. . . una onz.
Agua de goma, ... tres onz.

POCION ANTISÉPTICA. (ff.)

R. Serpentaria de virginia, . ocho p.
Agua hirviendo, ... c. s.
Déjese en infusion por un cuarto de hora, y échese el líquido colado sobre una mezcla de
Estracto de quina, . . cuatro p.
Jarabe comun, . . . treinta p.
Tritúrense y añádase
Tintura de quina, . . . ocho p.
Acetato de amoniaco, . treinta p.
Se puede añadir med. part. de alcanfor.

MISTURA ASTRINGENTE. (b.*)

R. Salep, ... dos drac.
Agua hirviendo, . . . diez onz.
Tritúrese sobre el fuego por algun tiempo y añádase
Borax, ... med. drac.
Estracto de quina y
———de leño campeche,
a. . . . . una drac.
Jarabe de altea, ... una onz.
Alabado por Lentin en la diarrea de los recien nacidos.—Para tomar á cuch.

POCION ESTIMULANTE Y TÓNICA. (*sm.*)

R. Estracto de quina y
Triaca, a. . . . . una drac.
Elixir vitriólico de Mynsicht, un escrp.
Agua de escabiosa, . . ocho onz.
Dósis; una cuch. cada med. ó una hora.

CERATO DE QUINA. (f. *ca pie.*)

R. Cerato simple, ... ocho p.
Estracto alcohólico de quina, disuelto en una cantidad pequeña de alcohol, ... una p.
Méz. por trituracion. (f.)

ca. y *pie.* prescriben partes iguales del uno y del otro.

Se aconseja aplicarle á las partes amenazadas de gangrena.

MISTURA ESCITANTE. (*au.*)

R. Estracto de quina y
Eter sulfúrico, a. . . . una drac.
Alcohol, ... siete drac.
Tres veces al dia en fricciones á la espina dorsal en la paralísis.

§. III. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DE LA QUINA, CON EL VEHICULO EMPLEADO PARA SU ESTRACCION.

A. *Estraido por medio del agua.*

1.º Por infusion.

INFUSION DE QUINA HECHA EN FRIO.

Infusum cinchonæ frigidum, s. *sine calore.* (br. du. fe. fi. li. p. wu. *c. ra.*)

R. Quina quebrantada, . . una onz.
Agua fria, ... doce onz.
Tritúrese la corteza con un poco de agua, añádase poco á poco lo restante del líquido, déjese en maceracion por veinte y cuatro horas meneándolo de cuando en cuando, y decántese. (br. du. li. wu. *c. ra.*)

fi. prescribe dos onz. de quina y lib. y med. de agua;—p. una onz. de corteza y onz. y med. de agua;—y fe seis drac. de quina y una lib. de agua.

Es tónica.

INFUSION CALIENTE DE QUINA.

Infusion cinchonæ calidum. (am. b.* ed. fi. lo. su. *br. c.*)

R. Quina quebrantada, . med. onz.
Agua hirviendo, . . . un cuartillo.
Déjese en maceracion por dos horas y cuélese (am. b.* lo. *c.*)

ed. prescribe una onz. de quina, una lib. de agua y veinte y cuatro horas

de infusion; — *br.* las mismas dósis, pero seis horas solamente de digestion; — fi. dos onz. de quina, lib. y med. de agua y tres de maceracion; — y su. onz. y med. de quina, quince onz. de agua y tres horas de maceracion.

R. Quina en polvo, ... una onz.
Mucílago de goma arábiga, dos onz.

Tritúrense juntos y añádase poco á poco

Agua hirviendo, ... una lib.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas, y cuélese (*br.*)

Es tónica.

EMULSION DE QUINA. (*su.*)

R. Infusion de quina, . . . lib. y m.
Jarabe de almendras, . . dos onz.
Méz.

POCION PECTORAL AMARGA. (*ra.*)

R. Infusion de quina, . . cuatro onz.
Jarabe de goma, ... una onz.
Agua de azahar, . . . dos drac.

Escitante, usada algnna vez en las afecciones catarrales crónicas, cuando es dificil la espectoracion.

ra. trae tambien otra fórmula; especies benignas un escrp.; quina med. drac.; jarabe una onz., y agua cuatro onz. — Se puede variar al infinito.

POCION DE QUINA COMPUESTA. (*ra.*)

R. Infusion de quina, . . cuatro onz.
Agua destilada de menta y
—— de canela, a. . . una onz.

Es tónica que puede muy bien reemplazar la precedente.

AZÚCAR DE QUINA. (*bo.*)

R. Tintura alcohólica de quina, siete onz.
Azúcar blanca en polvo, tres onz.

Hágase evaporar en la estufa hasta la sequedad. Entonces

R. De esta azúcar, ... cuatro onz.
Infusion acuosa de quina, una lib.

Hágase evaporar del mismo modo, meneándolo tres ó cuatro veces cada dia.

Dósis; de veinte gr. á una drac.

INFUSION DE QUINA CON MAGNESIA.

Infusum chinæ, s. *cinchonæ cum magnesia usta.* (am. b.* han. *au. c. vm.*)

R. Quina en polvo, ... una onz.
Magnesia calcinada, . . una drac.
Agua caliente, ... doce onz.

Hiérvase por un cuarto de hora, déjese despues en digestion por una hora y cuélese. (am. b.* *c.*)

han. trae la misma fórmula; pero duplica la dósis de la magnesia, y prescribe veinte y cuatro horas de maceracion; — y *au.* una onz. de quina, tres drac. de magnesia y ocho onz. de agua.

R. Magnesia calcinada, ... una p.
Quina pulverizada, . . . cuatro p.

Tritúrense juntas y añádase

Agua pura, ... ocho p.

Déjese en maceracion por doce horas y añádase

Agua, ... cuarenta p.

Déjese todavía en infusion por doce horas, cuélese por espresion, y decántese despues de algun tiempo de reposo. (*vm.*)

Se ha creido hacer de este modo la infusion mas estiptica y amarga; pero en realidad se la priva de su principio activo, pues que la magnesia apoderándose del ácido quínico separa el álcali orgánico de la quina, que es di-

soluble en agua. Esta preparacion debe desecharse.

INFUSION DE QUINA CALCÁREA.

Infusum cinchonæ cum aqua calcis, s. *calcis cinchonatum*; *Aqua calcis cum china.* (am. p. *c. sw.*)

R. Quina en polvo, ... una onz.
Agua de cal, . . . med. azumbre.
Déjese en infusion por veinte y cuatro horas y fíltrese. (am. *c. sw.*)

R. Quina pulverizada, ... dos onz.
Cal viva, ... una onz.
Tritúrense juntos y añádase poco á poco
Agua de cal, ... dos onz. y m.
Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y cuélese. (p.)

Esta preparacion está absolutamente en el mismo caso que la precedente.

INFUSION DE QUINA POTASADA.

Tintura aquosa alcalina de quina; Tinctura aquosa corticis peruviani kalina. (pa. *ca.*)

R. Quina en polvo, ... tres onz.
Sub-carbonato de potasa, dos drac.
Agua hirviendo, . diez y seis onz.
Déjese en digestion lo suficiente en un sitio caliente y cuélese. (pa.)

ca. prescribe se dejen en infusion por dos dias á la temperatura ordinaria, una onz. de quina y un escrp. de sub-carbonato de potasa en una lib. de agua.

Lo que se ha dicho de la infusion de magnesia, se aplica igualmente á esta.

INFUSION DE QUINA COMPUESTA.

Infusum chinæ aquosum compositum. (fu. sa. *sw.*)

R. Quina quebrantada, . diez drac.
Agua hirviendo, ... una lib.
Déjese en infusion por cuatro horas, hiérvase despues por medio cuarto de hora, y añádase en seguida
Serpentaria de virginia, . dos drac.
Déjese en digestion por dos dias y cuélese. (sa.)

R. Polvos de quina, . . . onz. y m.
——— de valeriana, . . med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjense en maceracion por doce horas en un sitio fresco. (fu.)

R. Quina en polvo y
Alcohol de canela, a. . . dos onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjense en digestion por dos dias meneándolo con frecuencia y cuélese. (*sw.*)

Tónica, antiséptica y antielmíntica.

Para tomar á cuch. ó á vasos, segun las circunstancias.

INFUSION ESTOMACAL. (*pie. sm.*)

R. Quina, ... dos á cuatro drac.
Hojas de naranjo, . . . una drac.
Flores de manzanilla romana, un puñto.
Agua hirviendo, . . . un cuartillo.
Déjese en infusion por doce horas.

Para tomar en un dia en tres dósis, una hora antes de comer.

TINTURA HEMASTÁTICA. (*pie.*)

R. Quina quebrantada, . una drac.
Ipecacuana quebrantada, diez gr.

Raiz de consuelda mayor,
med. drac.
Cocimiento hirviendo de cabezas de adormideras, ... una lib.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas y añádase al líquido colado

Jarabe de yedra terrestre, med. drac.

Tónica. — Para tomar á cuch. tres veces al dia.

TINTURA TONICA Y CALMANTE. (*bo.*)

R. Quina quebrantada, . . una drac.
Ipecacuana quebrantada,
quince gr.
Cocimiento de cabezas de adormidera, ... una lib.

Déjense en infusion por cuatro horas en vasija tapada, cuélese y añádase al líquido

Jarabe de karabé y
——de tortuga, a. . . tres drac.

Tónica y estomacal. — Dósis; una cuch. antes de cada comida.

TINTURA TONICA. (*pie.*)

R. Quina roja, ... onz. y med.
Agua hirviendo, . . cuatro vasos.

Déjense en infusion y añádase despues

Raiz de serpentaria de virginia,
med. onz.
Yerba de cardo santo y
Flores de manzanilla, a. med. puñ.

Esprímase.

Para tomar en cuatro dósis, á cada una de las cuales se añaden diez gr. de alcanfor y diez got. de elixir vitriólico de Mynsicht.

INFUSION TONICA. (*bo.*)

R. Quina roja y
Bayas de enebro, a. . . . una drac.
Corteza fresca de naranja y
Casia leñosa, a. . . . . dos drac.
Corteza de Winter, . . med. drac.
Ipecacuana quebrantada, quince gr.
Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener seis onz. de líquido colado. Añádase á este

Estracto de enebro, drac. y med.

Dósis; una ó dos cuch. repetidas con mas ó menos frecuencia, segun la indicacion.

JARABE DE BOULLAY.

Syrupus ad pertussim. (br. ca. sw.*)*

R. Ipecacuana en polvo, nueve drac.
Quina calisaya, ... seis onz.
Opio crudo, ... una drac.
Agua, ... dos lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas; decántese y añádase nueva agua hasta que el residuo quede insípido; reúnanse los líquidos, fíltrense y añádase

Jarabe comun, ... nueve lib.

Cuézase hasta la consistencia de jarabe. *(br.* ca.)*

Se puede tambien preparar este jarabe estemporáneamente, como sigue:

Jarabe de quina, . . . tres onz.
——— de ipecacuana, onz. y med.
——— de opio, ... una onz.

Méz. *(sw.*)*

Util en la coqueluche. — Dósis; de una cuchta. repetida muchas veces al dia, á una cuch., segun la edad de los niños.

INFUSION DE QUINA ACIDULADA.

Infusum cinchonæ cum succo limonum. (am. *c.*)

R. Quina en polvo, ... una onz.

Zumo de cidra, ... dos onz.
Tintura opiada de alcanfor, ... tres onz.
Agua fria, ... dos cuartillos.
Déjese en maceracion por doce horas y filtrese.

INFUSION DE QUINA COMPUESTA. (e.)

Decoctum chinæ antisepticum.

R. Raiz de escorzonera partida, una onz.
Simiente de cidra quebrantada, dos drac.
Agua, ... seis lib.
Redúzcase á cuatro por la ebulicion. Echese el líquido hirviendo sobre
Quina quebrantada, . . dos onz.
Raiz de contrayerba, . . una onz.
Déjese en infusion por un cuarto de hora; cuélese y añádase
Miel de sauco, ... tres onz.
Méz. ex.

2.° Por decoccion.

COCIMIENTO DE QUINA.

Decoctum cinchonæ, s. *corticis cinchonæ*, s. *cinchonæ tancifoliæ*, s. *corticis peruviani*. (am. ams. b. bc. dd. du. ed. fe. fi. fu. g. ham. li. lo. pp. su. ww. *br. c. hp. ra. sw.*)

R. Quina quebrantada, . . una onz.
Agua, ... dos cuartillos.
Hágase hervir por diez minutos en vasija medio tapada, y cuélese el líquido estando caliente. (du. lo. *hp.*)

fe. fu. li. y pp. prescriben una onz. de quina y doce de agua, reducidas á tres cuartas partes; — b. bc. una onz. de corteza y catorce de agua, reducidas á diez; — dd. fe. ham. su. ww. *br.* y *sw.* una onz. de corteza, diez y seis de agua, y que se consuma generalmente la mitad; — y am. ed. *c.* y *ra.* una onz. de corteza, tres cuartillos de agua y diez minutos de ebulicion.

b. y bc. recomiendan que cuando se haga con quina roja, se tome por cada onz. de corteza diez y seis de agua, reducida á diez (b.) ó á doce (bc.).

ra. indica una *Lavativa de quina* preparada con med. ó una onz. de quina gris, cocida en una lib. de agua.

R. Quina, ... onz. y med.
Agua pura, ... cinco lib.
Redúzcase á la mitad á un fuego lento en vasija tapada, y cuélese el líquido estando caliente. Echese sobre el residuo
Agua pura, . . diez lib. y med.
Hiérvase de nuevo y redúzcase á la mitad, cuélese el líquido caliente, reúnanse los dos líquidos y evapórese la mezcla hasta que se haya reducido á una lib. (ams.)

R. Quina, ... dos onz.
Agua, ... cuatro lib.
Redúzcase á dos lib. por la ebulicion y añádase á lo último
Regaliz raspado, ... una onz.
Cuélese. (g.)

POCION TONICA. (*au. e. pie.*)

R. Quina, ... onz. y med.
Agua, ... c. s.
Hiérvase y añádase al líquido colado
Jarabe de achicorias, cuatro onz.
Para tomar en las veinte y cuatro horas. (*pie.*)

R. Cocimiento de quina, . tres onz.
Tintura de quina, . . . una onz.
Quina en polvo, ... dos drac.
Jarabe comun, ... med. onz.

Dósis; una cuch. cada una ó dos horas. *(e.)*

R. Cocimiento de quina, . seis onz.
Tintura de quina, . . . una onz.
Acido sulfúrico aromatizado,
treinta got.

La misma dósis que en la precedente. *(e.)*

R. Cocimiento de quina, . ocho onz.
Estracto de quina pp. en frio,
med. onz.

Dósis; med. taza de hora en hora. *(au.)*

LAVATIVA ANTIPERIODICA. (*pie.*)

R. Quina, ... una onz.
Agua, ... c. s.

Hiérvase y añádase al líquido colado
Jarabe de cabezas de adormidera,
una onz.

Aconsejada en los casos en que la quina no puede administrarse por la boca.

COCIMIENTO DE QUINA OPIADO.

Decoctum chinæ opiatum. (b.)

R. Cocimiento de quina, . seis onz.
Láudano de Sydenham, veinte got.

Para tomar poco á poco en las fiebres adinámicas.

POCION ANTIESCROFULOSA. (*pie.*)

R. Quina en polvo, . . . una onz.
Agua, ... med. azumb.

Redúzcase á la mitad por la coccion y añádase á lo último
Raiz de regaliz partida, med. onz.

Cuélese y añádase todavia al líquido
Agua de nuez moscada, dos onz.

Alabada mucho por Baumes. — Dósis; tres ó cuatro cuch. con diez á sesenta got. de tintura de guayaco, dos ó tres veces al dia.

POCION CON EL COCIMIENTO DE QUINA. (ff.)

R. Quina quebrantada, . . diez pt.
Agua, ... c. s.

Déjese en infusion despues de una ligera ebulicion; cuélese estando caliente y añádase al líquido
Jarabe comun, ... tres pt.
Tintura de canela, . . cinco pt.

COCIMIENTO DE QUINA NITRADO.

Decoctum febrifugum. (*sp.*)

R. Quina, ... dos onz.
Agua, ... ocho lib.

Despues de med. hora de ebulicion cuélese y disuélvase en el líquido
Nitro purificado, . . . una drac.

Dósis; un vaso cuatro veces al dia.

BEBIDA ANTIESCROFULOSA.
(*ca. pie. sm.*)

R. Cocimiento de quina y
Agua de mar, a. . . . . pt. ig.

Bebida escitante muy activa aconsejada por Russel. — Se hace tomar med. botella en tres ó cuatro dósis, en el espacio de veinte y cuatro horas, aumentando poco á poco la cantidad de agua de mar, hasta que el enfermo consuma una ó dos lib. cada dia. En defecto del agua de mar se usa la destilacion de sal comun. La orchata sirve para apagar la escesiva sed que produce esta bebida en un principio.

LOCION ANTISEPTICA. (*pie.*)

R. Cocimiento de quina, cuatro onz.

Alcanfor, ... una drac.
Aconsejada por Megean en la angina gangrenosa.

LAVATIVA ANTISEPTICA. (*ra.*)

R. Quina quebrantada, . . una onz.
Agua, ... dos lib.
Hiérvase y añádase al líquido colado
Alcanfor, ... dos drac.

CERATO DE QUINA ALCANFORADO. (*vm.*)

R. Cerato sin agua, ... ocho onz.
Alcanfor, ... drac. y med.
Tritúrense juntos é incorpórese poco á poco
Cocimiento concentrado de quina, una onz.

LOCION ANTISEPTICA.

Fomento antiséptico. (ca. pie.)

R. Cocimiento de quina, . una lib.
Aguardiente alcanforado, med. onz.

INYECCION TONICA. (*sm.*)

R. Quina quebrantada, . med. onz.
Agua comun, . . cuartillo y med.
Redúzcase la tercera parte por la ebulicion, y apáguese muchas veces en el líquido frio un yerro hecho ascua, y añádase en seguida
Láudano de Sydenham, med. drac.
Para inyectar en las llagas con pérdida de sustancias que da lugar á supuracion escesiva.

INYECCION ANTISEPTICA.

Injectio chinæ antiputrida. (e.)

R. Quina quebrantada, . . med onz.
Agua, ... lib. y med.
Consúmase la tercera parte por la ebulicion, y añádase al líquido colado
Mirra líquida, ... una drac.
Los mismos usos que la precedente. — Se pueden usar tambien estas dos inyecciones en la gonorrea crónica.

POCION TONICA. (*ra.*)

R. Cocimiento de quina y
Vino generoso, a. . . . tres onz.
Jarabe de claveles, . . una onz.
Alcohol de melisa, . . med. onz.
Para tomar á cuch.

GARGARISMO ANTISEPTICO. (*pie.*)

R. Cocimiento de quina, . seis onz.
Vinagre, ... tres drac.
Miel, ... una onz.

POCION ASTRINGENTE Y TONICA. (*pie.*)

R. Cocimiento de genciana, ocho onz.
Tintura de quina compuesta y
Acido sulfúrico dilatado en agua, a. . . . . una drac.
Tintura de opio, . . . diez got.

COCIMIENTO DE QUINA ALUMINOSO.

Decoctum chinæ cum alumine. (au.)

R. Quina, ... onz. y med.
Agua, ... veinte onz.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion, y añádase al líquido colado
Alumbre, ... una drac.
Jarabe de grosellas, . . una onz.
Dósis; med. taza cada dos horas.

POCION TONICA. (*pie.*)

R. Cocimiento de quina, med. onz.
Triaca y

Confeccion de jacintos, a. una drac.
Elixir de Mynsicht,
veinte y cinco got.
Alcanfor, ... doce gr.
Aconsejado en las calenturas intermitentes.

JARABE ACUOSO DE QUINA.

Syrupus cinchonæ, s. *chinæ chinæ*, s. *corticis peruviani*, s. *de kinkina.* (ams. an. b. ba. be. f. *pie. vm.*)

R. Quina quebrantada, . cuatro onz.
Agua pura, . . . dos lib. y med.
Hágase hervir por un cuarto de hora en vasija tapada; redúzcase en seguida el líquido turbio á la mitad por la evaporacion á un fuego manso y añádase
Azucar blanca, ... una lib.
Cuézase hasta la consistencia de jarabe. (f.) . . . . . .

b. y be. prescriben se cuezan dos onz. de quina en veinte y ocho de agua hasta la reduccion de diez y ocho, que se añadan seis onz. de azucar y que se haga el jarabe por coccion; — ba. que se haga hervir una pt. de quina en doce de agua, reducidas á ocho; que se cuele el líquido caliente y que se añadan en seguida diez y seis pt. de azucar; — *vm.* que se cueza una pt. de quina pulverizada en doce de agua; que se cuele el líquido hirviendo; que se decante despues del suficiente reposo, y que se evapore con cuatro partes de azucar hasta la consistencia de jarabe; — y ams. que se cueza med. lib. de azucar en una de cocimiento de quina.

R. Quina quebrantada, . . una onz.
Agua destilada, . . . ocho onz.
Déjese en maceracion en vasija tapada y de la capacidad de diez onz. solamente, por veinte y cuatro horas, meneándolo con frecuencia, cuélese esprimiendo con fuerza y añádase
Azucar blanca, . . . catorce onz.
Hágase jarabe. (*au.*)

POCION TONICA. (*ra.*)

R. Jarabe de quina, . . una onz.
Alcohol de melisa, . . dos drac.
Pocion gomosa, . . . cuatro onz.

GELATINA DE QUINA. (*bo. pie.*)

R. Quina quebrantada y
Agua de fuente, a. . cuatro onz.
Hiérvase y añádase al líquido frio
Azucar blanca, . . . onz. y med.
Gelatina, ... tres drac.
Para tomar á cuch. en la apirexia de las calenturas intermitentes.

COCIMIENTO DE QUINA Y DE ARNICA.

Decoctum chinæ cum arnica. (*au.*)

R. Quina, ... una onz.
Sumidades de árnica, . med. onz.
Agua, ... dos lib.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion, y añádase á lo último
Serpentaria en polvo, . tres drac.
Añádase al líquido colado
Jarabe de corteza de naranja,
una onz.

POCION TONICA. (*b.*)

R. Quina, ... med. onz.
Raiz de bistorta, . . una drac.
Agua, ... c. s.
para obtener ocho onz. de cocimiento. Infúndase en este
Flores de arnica, . . . dos drac.

Añádase al líquido colado
Vino antimonial, . drac. y med.
Jarabe de corteza de naranja, una onz.
Para tomar poco á poco en el dia.

POCION ANTISEPTICA.

Mixtura tonico-antiseptica. (b.)

R. Cocimiento de quina, . ocho onz.
Infusion de flores de arnica, seis onz.
Alcanfor, ... dos escrp.
Jarabe de bálsamo de Tolú, una onz.
Emulsion gomosa, . cuatro onz.
Para tomar poco á poco en el dia.

LAVATIVA ESCITANTE.

Clysma excitans. (b.)

R. Cocimiento de quina é
Infusion de arnica, a. . dos onz.
Alcanfor triturado con yema de huevo, ... med. drac.

COCIMIENTO DE QUINA CON CARIOFILATA Y OPIO.

Decoctum chinæ cum radice caryophyllatæ et opio. (dd.)

R. Quina, ... med. onz.
Agua pura, , . diez y seis onz.
Redúzcase á diez onz. por la ebulicion y añádase
Raiz de cariofilata partida, ... med. onz.
Redúzcase á ocho onz. de líquido colado en vasija tapada, y cuando esté frio añádase
Mucílago de goma arábiga, una onz.
Tintura espirituosa de opio, dos drac.
Dósis; med. onz.

FOMENTO ANTISEPTICO.

Fotus ad gangrænam. (ca. sp.)

R. Quina quebrantada, . . una onz.
Agua de fuente, . . . cuatro lib.
Redúzcase á treinta y dos onz. por la ebulicion y añádase
Flores de manzanilla romana y —— de tanaceto, a. . med. onz.
Despues de algunos hervores cuélese y añádase
Aguardiente alcanforado, dos onz.
Acido hidroclórico, . . . una onz.

COCIMIENTO DE QUINA ACIDO.

Decoctum chinæ acidum. (dd.)

R. Quina, ... una onz.
Yerba de agenjos, . . . dos onz.
Agua, ... treinta y seis onz.
Redúzcase á veinte onz. por la ebulicion; cuélese por espresion y añádase al líquido
Vinagre bueno, . . . cuatro onz.
Méz.
R. Cocimiento simple de quina, ocho onz.
Elixir aromático ácido, dos drac.
Méz.
Dósis; med. onz.

LAVATIVA FORTIFICANTE. (*sw.*)

Quina en polvo, . . . una onz.
Manzanilla comun, . dos drac.
Agua, ... una lib.
Hiérvase hasta que se consuma la tercera parte y añádase al líquido colado

Vino tinto, ... tres onz.

INYECCION ASTRINGENTE.

Injectio chinæ. (au.)

R. Quina en polvo, . . . una onz.
Agua, ... doce onz.
Hiérvase y añádase al líquido colado
Vino tinto, ... dos onz.
Alumbre crudo, . . . una drac.

Se inyectan dos cuch. tres veces al dia en la leucorrea llamada atónica.—Becker aconseja tambien esta inyeccion para disminuir la capacidad escesiva de la vagina.

COCIMIENTO DE QUINA CON CASCARILLA.

Decoctum chinæ cum cascarilla. (dd.)

R. Quina roja, ... una onz.
Cascarilla, ... dos drac.
Agua pura, ... doce onz.

Redúzcase á ocho onz. por la ebulicion; cuélese por espresion y añádase al líquido colado y frio
Eter sulfúrico, . . . dos drac.
Méz. ex.

Dósis; med. onz.

TISANA ANTIESCROFULOSA. (*bo.*)

R. Quina roja quebrantada, dos drac.
Raiz de genciana, . . . una drac.
—— de rubia, ... dos drac.
Sumidades de lúpulo y
———— de centaura menor, a. . . . . un puñ.

Para dos cuartillos de cocimiento; añádase al líquido colado
Jarabe de corteza de naranja amarga, ... tres onz.
Tintura de Marte tartarizada, una drac.

Tónica y aperitiva, recomendada en las afecciones del sistema linfático.

COCIMIENTO DE QUINA CON LIQUEN.

Cocimiento antiperiódico y pectoral, Apocema febrífugo y pectoral; Decoctum chinæ cum licheno. (bo. pie. sa.)

R. Quina en polvo, . . . una onz.
Agua de fuente, ... c. s.

Déjense en infusion por una hora y añádase despues
Liquen islándico, . . . una onz.

Redúzcase por la ebulicion á dos lib. de líquido colado y añádase
Jarabe de cabezas de adormidera, dos onz.
Méz. (*sa.*)

R. Quina roja y
Liquen islándico, a. . . dos onz.
Hojas de yedra terrestre y
Flores de tusílago, a. dos puñtos.
Agua, ... c. s.

para obtener un vaso de líquido colado, y añádase á este
Jarabe de bálsamo de Tolú, seis drac.
Méz. (*bo.*)

pie. añade una cabeza de adormidera y prescribe una cuch. de jarabe.

Aconsejado en las enfermedades crónicas del pecho, acompañadas de exacerbacion febril por la tarde.—Dósis; un vaso por la mañana.

POCION FORTIFICANTE. (f. *bo. sa.*)

R. Polvos de quina, . . . una drac.

Polvos de corteza de naranja,
. . . . . dos drac.
Agua, ... cuatro onz.
Hiérvase y añádase al líquido colado
Agua de menta piperita,
una onz.
Méz. ex. *(sa.)*

R. Polvos de quina, . . . med. onz.
—— de corteza de naranja,
dos drac.
Agua de corteza de naranja,
seis onz.
Hiérvase y añádase al líquido colado
Jarabe de corteza de naranja,
una onz.
Méz. *(sa.)*

R. Quina, ... treinta pt.
Agua, ... c. s.
Hiérvase ligeramente en vasija tapada por media hora, y añádase á lo último
Corteza de naranja amarga mondada, ... cuatro pt.
Déjese en infusion y cuélese. (ff.)
R. Cocimiento de quina,
cuatro onz.
Tintura de malato de hierro,
una drac.
Agua destilada de trementina,
cuatro onz.
Jarabe balsámico, . . . una onz.
Para tomar poco á poco (*b.*)

COCIMIENTO DE QUINA CON POLIGALA.

Decoctum chinæ cum senega. (dd.)

R. Quina, ... una onz.
Raiz de polígala de virginia,
dos drac.
Agua, ... diez y seis onz.
Redúzcase á ocho onz. por la ebulicion; cuélese por espresion, y añádase al líquido frio
Eter sulfúrico, . . . dos drac.
Méz. — Dósis; med. onz.

POCION TONICA.

Mixtura tonico balsamica diaphoretica. (*b.*)

R. Quina, ... med. onz.
Raiz de polígala de virginia,
dos drac.
Agua, ... c. s.
para obtener diez onz. de cocimiento. Añádase al líquido colado
Jarabe de bálsamo de Tolú,
una onz.
Vino antimonial, . . . dos drac.
Jarabe de violetas, . . seis drac.
Para tomar poco á poco en el dia.

JARABE DE LESCURE. (*bc.*)

R. Quina roja, ... dos drac.
Raiz de polígala, . . med. drac.
—— de regaliz, . . . una drac.
Cabezas de adormidera, . n.º 3.
Ipecacuana quebrantada,
un escrp.
Hojas de yedra terrestre,
—— de hisopo y
—— de poleo, a. . . . un puñ.
Azucar, ... una lib.
Hágase jarabe.

Este jarabe, que se parece al de Boullay, ha sido aconsejado tambien contra la coqueluche. — Dósis; tres cuch. al dia.

COCIMIENTO DE QUINA CON POLVOS DE QUINA.

Decoctum chinæ cum china pulverata. (dd.)

R. Quina, ... una onz.
Agua, ... diez y seis onz.

Redúzcase á ocho onz. por la ebulicion; cuélese por espresion y añádase al líquido caliente

Polvos de quina, . . . dos drac.

y despues de frio

Eter sulfúrico, ... dos drac.

Dósis; med. onz.

COCIMIENTO DE QUINA CON RUIBARBO.

Decoctum chinæ cum rheo. (dd.)

R. Quina, ... una onz.
Ruibarbo en polvo, . una drac.
Agua, ... diez y seis onz.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion, y añádase al líquido colado y frio

Eter sulfúrico, . . . dos drac.

Dósis; med. onz.

APOCEMA FEBRIFUGO Y TONICO.

(*pie.*)

R. Raiz de romaza, . . . una onz.
——— de énula, ... dos drac.
Hojas de achicoria silvestre y
——— de pimpinela, a. un puñ.
——— de escolopendra, . n.º 3.
Cangrejos vivos machacados, n.º 2.
Mil pies vivos machacados, n.º 10 á 12.
Flores de manzanilla y
Flores de melocoton,
a. . . . . uno ó dos puñ.
Quina,
Ruibarbo y
Cascarilla, a. . . . . una drac.
Agua, ... una lib.

Hágase hervir por una hora.

Para tomar en dos veces. Se añaden á la primera toma dos onz. de jarabe de flores de melocoton, y á la segunda una onz. de jarabe de las cinco raices aperitivas.

POCION ASTRINGENTE.

Mixtura tonico adstringens. (*b.*)

R. Quina y
Raiz de ratania, a. . . med. onz.
Agua, ... c. s.

para obtener nueve onz. de cocimiento. Añádase al líquido colado

Estracto vinoso de quina, cuatro escrp.
Elixir estomacal de Whytt, una drac.
Agua de cidra, ... una onz.

Para tomar poco á poco en la diarrea crónica.

GARGARISMO ANTISÉPTICO. (fu. *sw.**)

R. Polvos de quina, . . . una onz.
Agua, ... dos lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion, añadiendo á lo último y dejándolo en infusion

Hojas de ruda, ... un puñ.

Cuélese el líquido todavía caliente, y añádase

Alcanfor, ... una drac.
Goma arábiga, . . drac. y med.
Jarabe de vinagre, . . una onz
Méz. (*sw.**)

R. Quina, ... dos onz.
Hojas de ruda, ... una onz.
Agua, ... tres lib.
Redúzcase á dos terceras partes por la ebulicion y añádase
Alcanfor triturado con mucílago de goma arábiga, . . dos drac.
Méz. ex. (fu.)

COCIMIENTO DE QUINA CON SERPENTARIA.

Decoctum cinchonæ cardiacum, s. *chinæ compositum*, s. *antifebrile*. (p. *e. sw.*)

R. Quina en polvo y
Serpentaria de virginia, a. . . . . med. onz.
Agua, ... lib. y med.
Redúzcase á una lib. por la ebulicion, y añádase
Alcohol de canela, . . . dos onz.
Méz. (p.)
R. Quina pulverizada, . . dos onz.
Agua, ... dos lib.
Hágase hervir por un cuarto de hora y añádase á lo último
Serpentaria de virginia, una onz.
Déjese en digestion por una hora y cuélese (*sw.*)

e. prescribe una onz. de quina, dos cuartillos de agua, diez minutos de ebulicion, med. onz. de serpentaria, dos drac. de corteza de naranja y med. hora de infusion.

Dósis; dos onz. cada dos, cuatro ó seis horas.

POCION TÓNICA. (*b. pie.*)

R. Quina quebrantada y
Serpentaria de virginia, a. una onz.
Agua, ... c. s.
para hacer tres vasos de cocimiento que se dividen en cuatro tomas. Añádase á cada una de estas
Elixir vitriólico, ... seis got.
Almizcle, ... dos gr.
Jarabe de kermes, . . tres drac.
Méz. (*pie.*)

R. Quina, ... una onz.
Agua, ... c. s.
para obtener ocho onz. de cocimiento; póngase en infusion en este
Serpentaria de virginia, . dos drac.
Añádase al líquido colado
Eter sulfúrico, ... dos drac.
Alcanfor, ... dos escrp.
Agua de canela, ... una onz.
Para tomar poco á poco en las veinte y cuatro horas (*b.*)

COCIMIENTO DE QUINA CON VALERIANA.

Decoctum chinæ cum valeriana (dd. *e. sw.*)

R. Quina y
Valeriana, a. . . . . una onz.
Agua, ... una azumbre.
Hágase hervir la corteza por diez minutos en dos cuartillos de agua, infúndase la raiz por media hora en lo restante de agua, y mézclense los dos líquidos colados (*e*).

R. Quina, ... una onz.
Agua, ... diez y seis onz.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion y añádase á lo último
Raiz de valeriana partida, dos drac.
Cuélese por espresion y añádase al líquido ya frio

Eter sulfúrico, ... dos drac.
Méz. (dd.)

R. Quina en polvo, ... tres onz.
Agua, ... dos lib.
Hiérvase por un cuarto de hora y añádase á lo último
Valeriana pulverizada, . una onz.
Déjese en digestion por una hora en vasija tapada y añádase al líquido colado
Tintura de espliego compuesta, una onz.
Méz. *(sw.)*

R. Cocimiento de quina simple, ocho onz.
Raiz de valeriana en polvo, dos drac.
Méz. ex. (dd.)
Dósis; dos ó tres onz. muchas veces al dia.

POCION ESCITANTE. (*au.*)

R. Quina, ... una onz.
Agua, ... diez y seis onz.
Redúzcase á ocho onz. por la ebulicion, y añádase al líquido colado
Serpentaria en polvo y
Valeriana pulverizada, a. dos drac.
Despues de la suficiente infusion cuélese y añádase al líquido
Eter sulfúrico, de med. á una drac.
Dósis; una cuch. de hora en hora.

APOCEMA TONICO Y DULCIFICANTE. (*pie.*)

R. Quina, ... med. onz.
Agua de fuente, ... c. s.
Hágase hervir por un cuarto de hora y añádase á lo último
Hojas de agrimonia y
—— de mil en rama, a. un puñ.
A cada lib. de líquido colado añádase
Jarabe de karabé, . . onz y med.

COCIMIENTO NEGRO DE ALLEN. *Decoctum nigrum Allenii.* (b.*)

R. Quina, ... dos onz.
Limaduras de hierro porfirizadas, una onz.
Agua de fuente, ... tres lib.
Hiérvase suavemente hasta reducirlo á dos lib. y med., añadiendo á lo último
Canela, ... dos drac.
Cuélese y añádase al líquido
Agua de agenjos compuesta, med. lib.
Dósis; medio vaso.

COCIMIENTO DE QUINA ALCALINO. (f. *fp.*)

R. Quina, ... una onz.
Agua comun, ... dos lib.
Hiérvase por algunos minutos en vasija tapada, y añádase á lo último
Sub-carbonato de potasa, veinte gr.
Cuélese por espresion y añádase
Jarabe de quina, ... med. onz.
Méz. ex.
Se puede reemplazar el sub-carbonato por veinte gr. de sal amoniaco. (f.)

fp. prescribe una onz. de quina, una azumbre de agua, treinta y seis gr. de sub-carbonato de potasa, y dos drac. de regaliz ó dos onz. de jarabe de quina.

COCIMIENTO FEBRÍFUGO MAGISTRAL. *Decoctum febrifugum magistrale.* (*sw. om.*)

R. Quina en polvo, . . . una onz.
Agua, ... c. s.
para obtener quince onz. de líquido colado, despues de una hora de ebu-

licion; cuélese por espresion, y déjese reposar. Al mismo tiempo tritúrense juntos

Goma arábiga y
Bálsamo de Tolú, a. . . una drac.

Añádase una parte del cocimiento frio para hacer una emulsion espesa. Añádase entonces

Aceite de macías, ... seis got.
Jarabe de claveles, . . dos onz.

y en fin, lo restante del cocimiento.

Dósis; med. vaso, dos, tres ó cuatro veces al dia.

APOCEMA ANTIICTERICO. (*pie.*)

R. Quina, ... dos drac.
Berros de fuente,
Achicorias de jardin y
Grama, a. . . . . diez puñ.
Agua, ... c. s.

para hacer dos vasos de líquido, que se toman en ayunas por cuatro ó cinco dias, añadiendo á la primera toma una onz. de jarabe de achicorias compuesto, y á la segunda una onz. del de rosas solutivo.

APOCEMA FEBRIFUGO Y PURGANTE.

Cocimiento de quina compuesto y purgante; Decoctum febrifugum laxans, s. quinæ antisepticum purgans, s. chinæ compositum et laxans. (e. f. *bo. pie. sm. sp.*)

R. Quina, ... una onz.
Agua comun, ... dos lib.

Hiérvase por un cuarto de hora, retírese del fuego y añádase

Folículos de sen y
Sulfato de sosa, a. . . . . dos drac.
Sal amoniaco, ... veinte gr.

Déjese en infusion por med. hora, cuélese por espresion y añádase

Jarabe de sen compuesto, una onz.

Méz. ex. (f.)

R. Quina quebrantada, . una onz.
Agua comun, ... dos lib.

Hiérvase y añádase á lo último

Folículos de sen. . . . . una drac.
Hojas de borraja y
——— de buglosa, a. . . med. puñ.
Sal de Epsom, ... cuatro drac.

Déjese en infusion lo suficiente, cuélese y añádase

Jarabe de violetas, ... dos onz.

Méz. ex. (*bo. pie.*)

R. Quina, ... dos onz.
Agua comun, ... ocho lib.

Redúzcase á seis lib. por la ebulicion y añádase

Yerba fresca de achicoria silvestre y
——— escarola, a. dos puñ.
Hojas de sen, , ... med. onz.

Déjense en digestion lo suficiente y añádase

Sal de Glaubero, ... med. onz.
Jarabe de achicorias con ruibarbo, dos onz.

Méz. ex. (*sp.*)

R. Raiz de escorconera, . . una onz.
Simiente de cidra quebrantada, dos drac.
Agua, ... seis lib.

Redúzcase á cuatro lib. por la ebulicion y échese el líquido hirviendo sobre

Quina quebrantada, . . dos onz.
Raiz de contrayerba, . . una onz.

Cuélese entonces y échese de nuevo sobre

Hojas de sen, ... una onz.

Déjese en infusion por un cuarto de hora en vasija tapada, cuélese y añádase

Miel de sauco y

Jarabe de rosas blancas, a. dos onz.
Méz, ex. (e.)

R. Quina quebrantada y
Cremor de tártaro, a. . med. onz.
Hojas de diente de leon, un puñ.
Agua hirviendo, ... tres vasos.
Redúzcase á dos vasos por la ebulicion. *(sm.)*

R. Quina,
Folículos de sen y
Cremor tártaro, a. . . med. onz.
Flores de manzanilla, dos puñitos.
Agua comun, ... dos vasos.
Redúzcase á un solo vaso por la ebulicion. *(bo. pie.)*

Para beber á vasos por la mañana en ayunas, y en los intervalos se toma un caldo.

B. *Estraido por la cerbeza.*

CERBEZA DE QUINA. (f. *vm.*)

R. Quina en polvo, ... una pt.
Cerbeza fuerte, veinte y cuatro pt.
Déjese en maceracion por muchos dias meneándolo de cuando en cuando y cuélese.

CERBEZA PROFILACTICA. (*ca. pie.*)

R. Cerbeza, . doce azumbres y med.
Azúcar, ... cuatro lib.
Quina amarilla, ... cuatro onz.
—— gris y
—— roja, a. . . . . dos onz.
Canela, ... dos drac.
Nueces moscadas, . . . n.º media.
Es tónica.—Dósis; dos ó tres vaso cada dia

C. *Estraido por el vino.*

VINO DE QUINA.

Vinum chinatum, s. *corticis peruviani; Infusium corticis peruviani vinosum.* (b.* f. ff. fu. li. *br. vm.*)

R. Quina quebrantada, . . una pt.
Vino blanco, ... doce pt.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, meneándolo con frecuencia, y cuélese. (b.* fu. li. *br.*)

R. Quina en polvo, ... una pt.
Vino de Madera, . . diez y seis pt.
Déjense en maceracion fria por un mes, esprímase y filtrese. (*vm.*)

R. Quina en polvo, . . . una pt.
Alcohol (22.º) . . . . . dos pt.
Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas, y añádase vino tinto generoso, ... doce pt.
Déjese todavia en maceracion por algunos dias, meneándolo de cuando en cuando, cuélese y filtrese. (f.)

R. Vino tinto, ... veinte pt.
Tintura de quina, ... una pt.
Méz. (b.* ff.)

Segun las observaciones de Henry, resulta que los vinos cargados de tanino y de materia colorante se apoderan de los alcaloides de la quina, los que se precipitan con estas sustancias; por lo que deben preferirse los vinos menos colorados, escepto cuando contienen menos alcohol; y añaden que esta circunstancia da al líquido la propiedad de disolver una mayor cantidad de qninina y de cinconina (f.*). La consecuencia que el médico debe deducir de estas consideraciones es que pudiendo usar de un medicamento bien cono-

cido, y cuyos efectos pueden hasta cierto punto ser calculados ó previstos por sus principios constituyentes, debe desechar todos los vinos de quina, cualquiera que sean, y solo debe emplear el vino de quinina.

Dósis; de una á diez onz.

JARABE VINOSO DE QUINA.

(e. f. fe. he. sa. w. *pie. sp. vm.*)

R. Quina pulverizada, . . dos onz.
Vino generoso, ... dos lib.

Déjense en infusion por dos ó tres dias en vasija tapada, sobre rescoldo, y meneándolo de cuando en cuando; decántese el líquido y añádase

Quina pulverizada, . . dos onz.

Reiterese la digestion del mismo modo por dos ó tres dias; cuélese y añádase

Azucar blanca, ... cuatro lib.

Hágase jarabe. (sa.)

R. Quina roja, ... una pt.
Vino tinto, ... tres pt.

Déjese en infusion por veinte y cuatro horas al B. M. tibio, y despues de frio esprímase con fuerza y añádase

Azucar blanca, ... cinco pt.

Lícuese al B. M. (*vm.*)

he. prescribe dos onz. de quina, veinte onz. de vino y dos lib. de jarabe comun; — *pid.* dos onz. de corteza, dos lib. de vino y dos lib. de jarabe comun; — *sp.* cuatro onz. de corteza, treinta y dos de vino tinto y sesenta de azucar; — fu. cuatro onz. de quina, dos lib. de vino y dos lib. de azucar pluma; — y fe. seis onz. de corteza, dos lib. de vino, cuatro dias de infusion y tres lib. de azucar.

R. Quina pulverizada, . cuatro onz.
Canela escogida, ... una onz.
Vino tinto, ... dos lib.

Déjese en maceracion por dos dias en vasija tapada, meneándolo con frecuencia, esprímase, cuélese y añádase

Azucar blanca, treinta y dos onz.

Disuélvase. (w.)

R. Quina quebrantada, . . dos onz.

Macháquese en un mortero y añádase poco á poco

Alcohol (22.°), . . . una onz.

Introdúzcase la parte clara en una botella y añádasele

Vino blanco de Lunel, una lib.

Déjense en maceracion por dos dias, meneándolo de cuando en cuando, cuélese y disuélvase en el líquido

Estracto de quina, . . seis drac.

Añádase en seguida

Azucar blanca, . . . lib. y med.

Lícuese al B. M. (f.)

R. Quina en polvo, . . cuatro onz.
Vino blanco, ... tres lib.
Alcohol, ... tres onz.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas en un matraz; fíltrese despues de frio y á cada lib. de infusion añádase

Azúcar blanca pulverizada, dos lib.

Lícuese á un fuego suave. (e)

VINO DE QUINA FERRUGINOSO.

Vino tónico, Vino tónico y antiperiódico; Vinum chinæ martiatum, s. *roborans.* (han. *au. bo. pie. sa. sm.*)

R. Quina amarilla y
Limaduras de hierro, a. dos onz.
Vino generoso, ... dos lib.

Déjese en infusion y cuélese. (*sm.*)

au. prescribe una onz. de quina,

med. onz. de hierro y dos lib. de vino.

R. Quina machacada y
Corteza de naranja, a. . dos onz.
Vino de Portugal, . . . dos lib.
Despues de seis dias de digestion, fíltrese y añádase
Vino marcial, ... cuatro onz.
Méz. ex. (han.)

R. Quina en polvo, . . onz. y med.
Limaduras de hierro, . med. onz.
Canela, ... dos drac.
Azucar, ... una onz.
Vino blanco generoso, . dos lib.
Digiérase por uno ó dos dias y fíltrese. *(bo. sa.)*

R. Quina,
Canela,
Corteza de Winter y
Limaduras de hierro, a. med. onz.
Vino generoso, ... dos lib.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas y decántese. *(pie.)*
Es tónico. — Dósis; dos onz. dos ó tres veces al dia.

VINO DE QUINA AROMATIZADO. (*au.*)

R. Quina, ... dos onz.
Corteza de naranja, . med. onz.
Vino blanco, ... dos lib.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, menéándolo con frecuencia, y añádase al líquido colado
Aguardiente, . . dos onz. y med.
Dósis; med. onz. en algunas onz. de vino marcial.

R. Quina, ... onz. y med.
Vino, ... quince onz.
Déjese en digestion por dos dias y añádase al líquido colado
Aceite de Cajeput, cincuenta got.
Azucar blanca, ... una onz.
Eter sulfúrico, ... dos onz.
Dósis; dos ó tres onz. dos ó tres veces al dia.

VINO DE QUINA COMPUESTO.

Vino febrífugo; Vinum chinæ compositum, s. *roborans*, s. *chinæ amarum*, s. *tonico-stimulans*. (am. f. han. p. su. wu. *au. c. ca. sw. sy. vm.*)

R. Quina, ... una onz.
Serpentaria de Virginia, una onz.
Vino blanco, . . diez y seis onz.
Déjese en infusion por ocho dias y cuélese. *(au.)*

R. Quina, ... tres onz.
Genciana y
Corteza de naranja, a. . una onz.
Vino blanco de España, dos lib.
Déjense en maceracion por quince dias y fíltrese. (ham.)

su. prescribe cuatro onz. de quina, onz. y med. de genciana, otro tanto de corteza de naranja y cuatro lib. de vino de España; — y *au.* una onz. de quina, seis drac. de genciana, dos drac. de corteza de naranja, y dos lib. de vino.

R. Quina, ... dos onz.
Genciana, ... una onz.
Corteza de naranja, . . dos drac.
Vino blanco, ... dos lib.
Aguardiente, ... cuatro onz.
Déjese en maceracion por ocho dias y fíltrese (p.)

R. Quina, ... una onz.
Genciana, ... med. onz.
Corteza de naranja, . . dos drac.
Canela, ... una drac.
Aguardiente, ... cuatro onz.
Vino, ... cinco cuartillos.

Déjense en infusion primero por veinte y cuatro horas en el aguardiente, despues por diez dias en el vino y cuélese. (am. *c.*)

R. Quina,
Genciana,
Corteza de naranja y
Flores de manzanilla,
a. cinco onz. y diez y ocho gr.
Alcohol (20.°), ... una onz.
Vino de España, . . . dos lib.

Déjese en infusion lo suficiente y filtrese. (*ca.*)

R. Quina, ... dos onz.
Raiz de colombo, . . med. onz.
Canela, ... dos drac.
Vino tinto, ... tres lib.

Déjense en maceracion por algunos dias y filtrese. (wu.)

R. Quina en polvo, . . . med. lib.
Leño de quasia amarga,
Corteza de Winter y
——— de naranja amarga,
a. . . . . med. onz.
Alcohol (22.°), ... una lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas meneándolo de cuando en cuando, y añádase en seguida

Vino generoso, ... seis lib.

Déjese en maceracion por cuatro dias, cuélese y filtrese. (f.)

R. Quina en polvo, ... tres pt.
Corteza de Winter, part. y med.
Vino de Madera,
setenta y dos pt.

Déjense en maceracion por ocho dias y añádase

Corteza de naranja, . . una pt.

Déjese todavía en maceracion por algunos dias, cuélese por espresion y filtrese. (*vm.*)

R. Quina quebrantada, . . dos onz.
Leño de Surinam, . . una drac.
Alcohol de (35.°), . med. onz.
Vino de España, ... dos lib.

Déjense en maceracion por ocho ó diez dias y cuélese. (*ca.*)

R. Quina, ... dos onz.
Clavos de especia, . . med. drac.
Vino generoso, ... una lib.

Déjense en infusion por dos dias; decántese y échese sobre el resíduo

Agua hirviendo, ... una lib.

Déjense en maceracion por doce horas; filtrese y reúnanse los dos líquidos. (*ca. sw.*)

R. Quina, ... una onz.
Serpentaria de virginia,
med. onz.
Cardamomo menor, . una drac.
Vino de Madera, . . . dos lib.

Déjese en maceracion por dos dias á un calor suave y cuélese. (*sw.*)

R. Quina, ... onz. y med.
Vino generoso, diez y seis onz.

Déjense en infusion por dos dias, meneándolo con frecuencia; decántese despues y añádase

Aceite de Cajeput, triturado con una drac de azucar blanca,
ochenta got.
Eter sulfúrico alcoholizado,
dos onz.

Méz. ex. (*sy.*)

R. Quina, ... dos onz.
Agallas, ... dos drac.
Clavos de especia, . . med. drac.
Vino tinto, ... una lib.

Déjense en infusion por dos dias, meneándolo con frecuencia; decántese y échese sobre el resíduo

Agua de fuente, ... una lib.

Cuélese pasada una hora y mézclense los dos líquidos. *(au. sy.)*

Todas estas tinturas son mas ó menos tónicas y febrífugas; las de *sv.* y *sy.* se recomiendan con particularidad en las gonorreas de mucho tiempo. —

Para tomar á cuch. ó vasos, segun exijan las circunstancias.

VINO ANTIPERIÓDICO. (*pie. sm.*)

R. Quina y
Flores de manzanilla, a. dos onz.
Sumidades de centaura menor, una onz.
Coral rojo en polvo, . dos drac.
Vino blanco generoso, una azumb.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas. *(pie.)*

R. Polvos de quina, . . . una onz.
—— de centaura menor,
—— de genciana,
—— de coral y
—— de ojos de cangrejo,
a. . . . . dos drac.
Vino blanco añejo, dos cuartillos.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas, meneándolo con frecuencia, y cuélese. *(sm.)*

Dósis; un vaso todas las mañanas.

TINTURA BURGUNDICA.

Tinctura burgundica. (b.*)

R. Quina en polvo, . . . seis drac.
Raiz de cálamo aromático y
Canela, a. . . . . una drac.
Corteza de naranja, . . dos drac.
Cochinilla, ... med. drac.
Vino blanco de Portugal, dos lib. y med.

Déjense en maceracion por dos dias.

Es tónica. — Dósis; de dos á cuatro onz.

VINO ANTISÉPTICO. (fe.)

R. Quina, ... una onz.
Azucar blanca, ... seis drac.
Zumo de limon, . . cuatro onz.
Vino, ... doce lib. y med.

Cuélese al cabo de dos dias. — Dósis; hasta seis onz.

VINO ANTILEUCORRAICO. (*ca.*)

R. Quina gris, ... seis onz.
Leño de quasia amarga y
Raiz de cálamo aromático,
a. . . . . onza y med.
Canela y
Flores de sauco, a. . seis drac.
Alcohol, ... tres lib.
Agua pura, . . . diez y ocho lib.

Déjese en digestion lo suficiente; cuélese y añádase al líquido
Tintura de Marte, . . doce onz.
Agua de azahar, , . . lib. y med.
Jarabe comun, ... seis onz.

Tónico, recomendado en la leucorrea y blenorrea. — Dósis; dos onz. por mañana y tarde.

ELIXIR BALSAMICO DE WERLHOF.

(b.* br. *ca. sp.*)

R. Quina y
Corteza fresca de naranja,
a. . . . . med. onz.
Mirra y
Costo arábigo, a. . . . dos drac.
Azafran, ... una drac.
Sub-carbonato de potasa, med. onz.

Vino de Madera, . . . una lib.
Déjense en digestion lo suficiente, y añádase al líquido colado
Estracto de cardo santo y
——— de centaura menor,
a. . . . . dos drac.
Dilúyanse y fíltrese. (b.* br. *sp.*)

ca. prescribe se digiera onz. y med. de quina, otro tanto de corteza de naranja amarga, dos drac. de mirra, otro tanto de estracto de genciana, lo mismo del de cardo santo, una drac. de azafran y med. onz. de sub-carbonato de potasa, en una lib. de vino de España, por cuatro ó cinco dias, y que despues se filtre.

Dósis; de una á dos drac.

VINO ESTOMACAL. (fe.)

R. Raiz de cálamo aromático,
—— de galanga,
—— de cedoaria,
Corteza de naranja y
Quina, a. . . . . med. onz.
Agenjos,
Centaura menor y
Flor de manzanilla, a. dos drac.
Alcohol, ... dos onz.
Vino de España, . . lib. y med.
Déjense en digestion por cuatro dias, esprímase y fíltrese. — Dósis; una á dos drac.

D. *Estraido por el alcohol.*

TINTURA DE QUINA GRIS.

Tinctura, s. *Essentia cinchonæ*, s. *cinchonæ lancifoliæ*, s. *chinæ*, s. *corticis peruviani.* (am. an. b. bc. br. du. ed. f. fe. ff. fu. li. lo. pa. pr. w. wu. *br. c. sw. vm.*)

R. Quina gris en polvo, . una pt.
Alcohol (20.°), . . . cuatro pt.
Déjese en digestion por seis dias y cuélese. (f. fu. li.)

am. ed. *c.* y *sw.* prescriben cuatro onz. de corteza, dos lib. y med. de alcohol (0,935), y ocho dias de digestion; — lo. siete onz. de corteza, una azumbre de alcohol (0,930), y quince dias de digestion; — b. y be. una parte de corteza, ocho de alcohol (20.°) y seis dias de digestion; — fe. una parte de quina, nueve de alcohol y tres dias de digestion; — pr. cinco onz. de corteza y dos lib. de alcohol; — wu. cuatro onz. de corteza y dos lib. de alcohol; — br. pa. y w. tres onz. de corteza y doce de alcohol; — *br.* tres onz. de corteza y doce de aguardiente; — *vm.* una parte de corteza y ocho de aguardiente; — y *sw.* dos onz. de corteza y lib. y med. de aguardiente.

R. Quina gris en polvo y
Corteza de naranja amarga,
a. . . . . una pt.
Alcohol (22.°), . . . cuatro pt.
Fíltrese al cabo de seis dias. (ff.)

R. Quina gris, ... una onz.
Alcohol (20.°), . . . cuatro onz.
Déjense en maceracion por cuatro dias al B. M. tibio, cuélese y échese sobre el resíduo
Álcohol (20.°), ... dos onz.
Déjese en maceracion lo suficiente, cuélese, mézclense y fíltrense los dos líquidos. (an.)

R. Quina, ... cuatro pt.
Azucar, . . . veinte y cinco pt.
Agua, ... cien pt.
Añádase un poco de levadura de cerbeza; espóngase todo á una temperatura de quince á veinte y cinco gra-

dos de R., y decántese despues de la fermentacion. (fc.)

TINTURA DE QUINA AMARILLA.
(ams. an. han. o. po. s.)

R. Quina amarilla, ... una pt.
Alcohol (0,907), . . ocho pt.
Déjese en maceracion por ocho dias y fíltrese. (ams.)

han. o. y po. prescriben cinco onz. de corteza, y dos lib. de alcohol; — y s. una de corteza y seis de alcohol.

R. Quina amarilla, . . . una onz.
Alcohol (20.°), . . cuatro onz.
Déjense en digestion al B. M. tibio por cuatro dias; cuélese y échese sobre el resíduo
Alcohol (de 20.°), . . . dos onz.
Déjese en digestion lo suficiente y cuélese; méz. los dos líquidos y filtrense. (an.)

TINTURA DE QUINA ROJA. (ams. be. f. han. *pie.*)

R. Quina roja, ... una pt.
Alcohol (22.°), ... cuatro pt.
Déjense en digestion por seis dias y cuélese. (f.)

be. prescribe una parte de corteza y ocho de alcohol (20.°); — ams. una de corteza y ocho de alcohol (0,907); — han. cinco onz. de corteza y dos lib. de alcohol; — y *pie.* una onz. de corteza y doce de alcohol. (36.°)

TINTURA DE QUINA AMONIACAL.

Tinctura cinchonæ, s. *corticis peruviani ammoniata*, s. *volatilis.* (fu. lo. *c. sw.**)

R. Quina gris, ... cuatro onz.
Tintura aromática amoniacal, una azumb.
Déjense en maceracion por diez dias y cuélese. (lo. *c.*)

*sw.** prescribe dos onz. de quina y diez y ocho de alcohol amoniacal simple; — y fu. cuatro drac. de corteza y cuatro onz. de alcohol amoniacal.

TINTURA DE QUINA POTASADA.

Tinctura corticis peruviani kalina.
(*pie.*)

R. Quina en polvo, . . . tres onz.
Sub-carbonato de potasa, una drac.
Alcohol rectificado, . . una lib.
Déjese en digestion, esprímase y fíltrese.

ROSOLI DE QUINA. (*pie.*)

R. Tintura saturada de quina roja, ocho onz.
Agua de azahar y
Azucar en polvo, a. . . ocho onz.
Jarabe de culantrillo, . ocho onz.
Para tomar á cuch.

ESENCIA DE QUINA DE HELLWIG.
(w. *sm.*)

R. Quina, ... tres onz.
Serpentaria de virginia, dos onz.
Contrayerba, ... una onz.
Aguardiente, . . diez y seis onz.
Déjense en digestion al B. M. por veinte y cuatro horas, esprímase y fíltrese. (w.)

vm. prescribe veinte y cuatro onz. de aguardiente.

Tónico, alexifarmaco, carminativo y febrífugo. — Dósis; de cincuenta á sesenta gotas.

TINTURA FORTIFICANTE.

Tinctura roborans. (sw.)

R. Quina y
Goma kino, a. . . . . una onz.
Alcohol (0,935), . . . una lib.

Déjense en digestion por tres dias y cuélese.

Tónico, astringente, que se ha aconsejado en la menorragia, la diarrea y la astenia general. — Dósis; de una á dos drac. muchas veces al dia.

ELIXIR ESTOMACAL. (fe.)

R. Quina amarilla, ... tres onz.
Corteza de naranja, . . dos onz.
Canela, ... una onz.
Angustura, ... cuatro drac.
Alcohol, ... tres lib.

Esprímase al cabo de ocho dias. — Dósis; de una á dos drac.

TINTURA FEBRIFUGA DE HUXHAM.

Tintura alexifarmaca ó antiseptica de Huxham, Tintura alcohólica de quina compuesta, Tintura tónica, Esencia de quina compuesta; Essentia chinæ, s. *corticis peruviani alexipharmaca Huxhami, Essentia antiseptica Huxhami, Tinctura alexipharmaca Huxhami*, s. *alexipharmaca corticis peruviani Huxhami, Tinctura alcoholica chinæ composita.* (am. b.* bc. du. e. ed. f. han. he. lo. p. *c. ca. pid. sp. sw. vm.*)

R. Quina en polvo, ... dos onz.
Corteza seca de naranja,
onz. y med.
Serpentaria de virginia, dos drac.
Aguardiente, ... veinte onz.

Déjense en maceracion por seis dias y cuélese. (p.)

R. Quina, ... dos onz.
Corteza seca de naranja,
onz. y med.
Serpentaria de virginia, tres drac.
Aguardiente (10.°), veinte onz.

Déjense en digestion por cuatro dias y cuélese. (bc. *sa.*)

pid. prescribe dos onz. de quina y med. de corteza de naranja, dos drac. de serpentaria, dos escrp. de azafran y veinte onz. de alcohol.

R. Quina roja, ... dos onz.
Corteza de naranja amarga,
onz y med.
Serpentaria de virginia, tres drac.
Azafran, ... una drac.
Cochinilla, ... cincuenta gr.
Alcohol (12.°), ... dos lib.

Déjese en maceracion por quince dias, cuélese y fíltrese. (f.)

du. lo. *ca. sw.* y *vm.* prescriben dos onz. de quina, onz. y med. de corteza de naranja, tres drac. de serpentaria, una de azafran, dos escrp. de cochinilla y veinte onz. de aguardiente; — e. han. *sp.* y *vm.* dos onz. de quina, onz. y med. de corteza de naranja, tres drac. de serpentaria, cuatro escrp. de azafran, dos de cochinilla y veinte onz. de aguardiente; — y am. b.* ed. y *c.* dos onz. de quina, dos y med. de corteza de naranja, tres drac. de serpentaria, una de azafran, dos escrp. de cochinilla y veinte onz. de aguardiente.

Dósis; de una drac. á med. onz. en vino ó en una agua aromática cualquiera. Se repite esta dósis de cuatro en cuatro horas, añadiendo cada vez diez got. de elixir vitriólico.

TINTURA FEBRIFUGA DE MUTIS. (fé.)

R. Agua, ... cien pt.
Azucar, . . . veinte y cinco pt.
Levadura de cerbeza, . . dos pt.
Quina, ... pt. y med.
Canela, ... un cuarto de pt.
Nuez moscada, siete octavos de pt.

Déjese fermentar y cuélese. — Dósis; de una á tres ó cuatro onz.

ELIXIR FEBRIFUGO DE WHYTT.

Tintura tónica ó estomacal de Whytt, Elixir amargo de Whytt, Elixir estomacal de Whytt, Tintura de quina de Whytt, Tintura de quina amarga; Elixir antihypocondriacum, s. *roborans Whyttii, Elixir roborans*, s. *Whyttii, Essentia corticis peruviani composita, Tinctura corticis chinæ*, s. *peruviani composita, Tinctura alcoholica corticis aurantiorum Whyttii, Tinctura kinkinæ*, s. *cinchonæ amara, Tinctura chinæ composita, Elixir stomachicus spirituosus.* (b.* ba. be. d. c. fi. fu. han. he. li. lo. o. po. pr. s. su. w. *ca. pid. sm. sp. sw. vm.*)

R. Quina, ... ocho pt.
Raiz de genciana y
Corteza de naranja mondada,
a. . . . . tres pt.
Alcohol (0,900),
noventa y seis pt.

Déjense en digestion por tres dias y filtrese. (b.* ba. fi. li. su. w. *pid. sm. sp. vm.*)

han. y po. prescriben tres partes de quina, una de genciana, otra de corteza de naranja y veinte y cuatro de aguardiente; — e. dos de quina, una de genciana, cuatro de corteza de naranja y veinte y cuatro de aguardiente; — d. ocho de quina, cuatro de genciana, una de corteza de naranja y noventa y seis de aguardiente; — y s. ocho de quina, tres de genciana, tres de corteza de naranja y ciento cuatro de aguardiente.

R. Quina, ... tres pt.
Genciana y
Corteza de naranja, a., una pt.
Alcohol, ... diez y ocho pt.
Agua de canela simple, . seis pt.

Déjese en digestion lo suficiente, y cuélese. (b.* pr.)

o. y *sw.* prescriben tres partes de quina, una de genciana, una de corteza de naranja, diez y seis de aguardiente y ocho de agua de canela; — y *ca.* tres de quina, dos de genciana, dos de corteza de naranja, diez y seis de aguardiente y ocho de agua de canela.

R. Quina,
Genciana y
Corteza de naranja, a. cuatro onz.
Aguardiente (10.°), cuatro lib.

Déjense en maceracion por cuatro dias, cuélese y añádase al líquido

Espíritu de espliego, . ocho onz.

Méz. ex. (be.)

R. Quina, ... una pt.
Aguardiente, ... ocho pt.

Déjese en digestion al B. M. por seis horas, y despues de frio añádase

Genciana, ... una pt.

Déjese en digestion fria por muchos dias, cuélese esprimiendo ligeramente, filtrese y añádase

Tintura de espliego compuesta,
— . . . . dos pt.

Méz. ex. (*vm.*)

R. Quina, ... cuatro onz.
Genciana y

Corteza de naranja, a. . . dos onz.
Cilantro, ... una onz.
Aguardiente, ... cuatro lib.
Déjese en infusion y fíltrese. (b.)

R. Quina, ... ocho pt.
Corteza de naranja y
Galanga menor, a. . . . una pt.
Alcohol, . . noventa y seis pt.
Déjese en digestion lo suficiente, esprímase y fíltrese. (he.)

R. Quina, ... cuatro pt.
Aguardiente y
Vino de Madera,
a. . . . . veinte y cuatro pt.
Déjese en infusion fria y cuélese esprimiendo con fuerza. Añádase al líquido
Corteza seca de naranja y
Genciana, a. . . . . pt. y med.
Déjense en maceracion por muchos dias, cuélese sin esprimir y fíltrese. (*vm.*)

R. Quina, ... doce pt.
Raiz de cálamo aromático y
Naranjas verdes, a. . . una pt.
Alcohol, . . . setenta y dos pt.
Déjense en digestion por ocho dias y cuélese. (b.*)

R. Tintura de quina, . . . dos pt.
——— de genciana y
——— de corteza de naranja,
a. . . . . una pt.
Méz. (fu.)
Dósis; una cuch. en cuatro de agua.

ELIXIR ANTIFEBRIL. (br. w.)

R. Quina, ... onz. y med.
Raiz de genciana, . . una onz.
Flores de sal amoniaco marciales, seis drac.
Cascarilla y
Corteza de Winter, a. med. onz.
Serpentaria de virginia,
Yerba de cardo santo,
——— de centaura menor,
——— de trebol acuático y
——— de agenjo marino,
a. . . . . tres drac.
Alcohol, ... dos lib.
Déjese en digestion por cuatro dias, cuélese por espresion y fíltrese.

Es tónico que se daba en otro tiempo en la declinacion de las calenturas intermitentes para fortificar y estimular el apetito. — Dósis; de med. drac. á dos escrp.

MISTURA TONICA. (*au. sa.*)

R. Tintura de quina y
——— de serpentaria de virginia, a. . . . . tres drac.
Espíritu de nitro dulce, . dos drac.
Méz. (*sa.*)

R. Tintura de quina compuesta, dos onz.
Láudano de Sydenham, . dos drac.
Eter sulfúrico, ... dos drac.
Dósis; treinta got. cada dos ó tres horas. (*au.*)

ELIXIR ANTISEPTICO.

Tintura de quina etérea compuesta; Tinctura cinchonæ ætherea composita. (f. *vm.*)

R. Quina, ... dos onz.
Cascarilla, ... onz. y med.
Canela, ... tres drac.
Azafran, ... med. drac.
Vino moscado, ... doce onz.
Aguardiente, ... veinte onz.
Déjense en digestion á un calor suave por muchos dias; cuélese esprimien-

do con fuerza, fíltrese al cabo de algunos dias y añádase al líquido

Azúcar blanca, ... cuatro onz.
Eter nítrico, ... drac. y med.
Méz. ex. (*vm.*)

f. prescribe dos onz. de quina, med. onz. de cascarilla, tres drac. de canela, med. de azafran, cuatro onz y seis drac. de azúcar, una lib. de vino blanco de España, otro tanto de alcohol (de 16.°) y drac. y med. de eter sulfúrico.

Preconizado por Chaussier.

TINTURA PARA LAS ENCIAS.

Tinctura chinæ gingivalis. (au.)

R. Tintura de quina, . . . dos onz.
——— de mirra, . . . med. onz.
——— de goma quino, dos drac.
Espíritu de coclearia, . . una onz.
Méz. ex.

R. Quina, ... una onz.
Clavos de especia, ... dos drac.
Cálamo aromático,
Lirio de Florencia y
Catecú, a. . . . . med. onz.
Pétalos de rosas y
Flores de naranjo, a. . tres drac.
Alumbre crudo, . . . dos drac.
Alcohol, ... dos lib.
Agua de coclearia, . . lib. y med.
Cochinilla, ... tres drac.

Digiérase y cuélese.

QUININA.

Kininum, Chinina, Quina.

f.* fe. *ma.*

R. Quina amarilla, ... e. s. q.

Trátese con el alcohol, lávese el extracto obtenido con una disolucion de potasa, hasta que esta no tome color, lávese en seguida el residuo con agua destilada para desembarazarlo de la potasa, y disuélvase despues en ácido hydroclórico, fíltrese el líquido, hágase hervir con tres veces su peso de magnesia, fíltrese, evapórese hasta la sequedad, trátese el residuo con alcohol, evapórese la tintura y consérvese el residuo. (*ma.*)

R. Quina amarilla, ... cien pt.
Agua, ... quinientas pt.
Acido sulfúrico, . . cincuenta pt.

Hágase hervir por dos horas, cuélese por espresion y reitérese dos ó tres veces la operacion; reúnanse los líquidos, y cuando esten frios añádasele en varias veces cal apagada y hecha polvos muy finos, hasta que el todo esté ya sensiblemente alcalizado, y que se haya formado una especie de coágulo rojizo en el líquido; hágase escurrir el depósito sobre un lienzo, séquese en la estufa, y despues de pulverizado póngase en digestion en muchas porciones en alcohol (32.°); decántese ó fíltrese y destílense las tinturas; trátese el residuo en caliente con agua acidulada y una pequeña cantidad de carbon animal; fíltrese el líquido, y cuando esté frio, añádasele un ligero esceso de amoniaco; recójase el precipitado y lávese y séquese suavemente. (f.*)

La quinina, descubierta por Pelletier y Caventou, existe solo en la quina amarilla; está mezclada con cinconina en la roja; y la gris no contiene nada. Son necesarias setecientas partes de agua para disolverla. No tiene uso en medicina.

SULFATO DE QUININA. (f.* f.** fe. *bo.*)

1.° Procedimiento de Pelletier y Caventou.

R. Estracto alcohólico de quina amarilla, . . , ... c. s. q.

Trátese en caliente con agua activada con ácido hidroclórico, hiérvase el líquido ácido con un esceso de subcarbonato de magnesia hasta la decoloracion perfecta, filtrese, recójase el precipitado, lávese con agua fria, séquese, póngase en digestion en tres ó cuatro porciones con alcohol (36.°), destílense las tinturas y combínese el residuo con ácido sulfúrico (f.**)

2.° Procedimiento de Henry.

R. Quina amarilla en polvo, dos lib.
Agua pura, . . . diez y seis lib.
Acido sulfúrico, ... dos onz.

Hiérvase por una hora y cuélese; añádase una nueva cantidad de agua y de ácido sobre el residuo, hiérvase y cuélese; repítase la operacion por tercera vez y reúnanse los líquidos; satúrese en frio su ácido con ocho onz. de cal viva en polvo; cuélese por un cedazo de seda; déjese reposar, séquese el precipitado, trátesele tres veces por el alcohol (de 36.°) y fíltrese; destílense las tinturas reunidas hasta las tres cuartas partes; añádase al residuo ácido sulfúrico muy dilatado en agua, fíltrese estando aun caliente, añadiendo una cierta cantidad de carbon animal, y recójanse los cristales que se depositen cuando se enfrie. (f.* f.** fe. bo.)

Bernardet ha modificado este procedimiento del modo siguiente. Se hace hervir por una hora la quina con agua acidula, y se renueva esta hasta siete veces; se tratan los cocimientos hirviendo por la cal pasada por tamiz, se deja enfriar, se lava el precipitado, se seca en la estufa, se pulveriza y se le trata en muchas porciones al B. M. con alcohol (de 36.°) que se estrae en seguida todo por la destilacion; se calienta el residuo, se disuelve en alcohol, se mezcla la solucion con agua muy acidulada con el ácido sulfúrico, y se calienta al B. M.; se filtra, se decolora con carbon animal, se filtra de nuevo y se evapora.

Resulta de los esperimentos de Pelletier y Caventou que se estrae de un quintal de quina dos lib., una drac. y treinta gr. de sulfato de quinina, lo que hace dos drac., sesenta y seis gr. y un décimosesto de gr. por lib., ó trece gr. y dos décimo octavos por onz. Pues como el sulfato de quinina se compone de nueve partes y nueve décimas de ácido sulfurico, sobre noventa y una décima de quinina, resulta que si la dósis ordinaria de quinina en sustancia es de dos drac., se da entonces al enfermo tres gr. y nueve trigésimas segundas partes de sulfato de quinina, ó tres gr. y med. de quinina, sin contar con una pequeña cantidad de sulfato de cinconina que puede encontrarse mezclado. Cuatro gr. de sal es un equivalente á la dósis que se acostumbra á prescribir cuando se usa la quina en sustancia. Así los que la han administrado á la dósis de treinta y seis hasta setenta y dos gr. han prescrito, haciendo astraccion del grado de concentracion y de energía, veinte y siete drac. de quina en el primer caso y cincuenta y cuatro en el segundo. ¿Quién se atreverá á prescribir

semejantes dósis de corteza del Perú, y aun mucho menos repetirlas muchas veces?

Se toma el sulfato de quinina envuelto en una hostia mojada, y se da despues una taza de infusion de manzanilla.

POLVOS ANTIPERIODICOS. (*pie.*)

R. Sulfato de quinina, . . . seis gr.
Sub-carbonato de magnesia,
treinta y seis gr.

POLVOS DENTRIFICOS DE PELLETIER. (f.* f.**)

R. Sulfato de quinina, . cuatro gr.
Coral pp., ... una onz.
Laca carminada, ... ocho gr.
Esencia de mirra, . . . dos got.

POCION FEBRIFUGA. (*bo. e.*)

R. Sulfato de quinina, . . diez gr.
Jarabe comun, ... una onz.
Agua pura, ... tres onz.
un poco acidulada con
Acido sulfurico, . . med. drac.
Méz. (*bo.*)

R. Sulfato de quinina, . . . doce gr.
Azucar y
Goma arábiga, a. . . una drac.
Agua de canela, dos onz. y med.
Dósis; una cuchta. de hora en hora (*e.*)

R. Sulfato de quinina, . . doce gr.
Acido sulfúrico aromatizado,
diez got.
Azucar, ... una drac.
Agua de canela, dos onz. y med.
Para tomar como la precedente. (*e.*)

JARABE DE SULFATO DE QUININA.

Jarabe de quinina (f.* f.** fe. *bo. ca. ma. ra.*)

R. Sulfato de quinina,
sesenta y cuatro gr.
Disuélvase en un poco de agua acidulada con algunas gotas de ácido sulfúrico y échese encima
Jarabe comun tibio, . . dos lib.

JARABE DE SULFATO DE QUININA COMPUESTO. (*bo.*)

R. Café tostado y molido, cuatro onz.
Agua hirviendo,
dos libras y cuatro onz.
Déjese en infusion en vasija tapada, cuélese despues de frio y añádase
Azucar en polvo, . . cuatro lib.
Lícuese al B. M. y añádase entonces
Sulfato de quinina disuelto en un poco de agua algo acidulada con ácido sulfúrico, . . . sesenta gr.

TINTURA DE SULFATO DE QUININA. (f.** fe. *bo. ma. pie. ra.*)

R. Sulfato de quinina, . . . seis gr.
Alcohol (34.°), ... una onz.
Disuélvase. (f.* fe. *bo. ma. pie.*)

ra. indica dos escrúp. de la sal para una lib. de alcohol, lo que da una tintura tres veces menos cargada.

Sin duda es un error tipográfico que en Chevallier é Idt se lea nueve gr. de sal por onz. de alcohol. La fórmula de Magendie no es seguramente mejor que otra; pero puesto que ha principiado á adoptarse es preciso respetarla.

VINO DE SULFATO DE QUININA.

(f.** fe. *bo. ca. ma. pie. ra.*)

R. Sulfato de quinina, . . . doce gr.
Vino de Madera, ... una lib.
Disuélvase. (f.** fe. *bo. ma. pie. ra.*)

ca. prescribe ocho gr. de sal por cada lib. de vino, proporcion demasiado fuerte si se quiere respetar la fórmula de Magendie, porque son suficientes seis gr.

R. Vino, ... med. azumb.
Tintura de quinina, . . dos onz.
Méz. (*ma.*)

BOLOS EMENAGOGOS.

Boli incitantes emmenagogi. (b.)

R. Etíope marcial, . . . treinta gr.
Sulfato de quinina, seis á doce gr.
Polvos de rosas y
Estracto de marrubio,
a. . . . . drac. y med.

Háganse ocho bolos.—Dósis; uno cada dos, tres ó cuatro horas.

BOLOS FEBRIFUGOS.

Boli antifebriles. (b.)

R. Sulfato de quinina, . . . tres gr.
Miga de pan, ... c. s.
para hacer un bolo.

Dósis; cuatro, seis ú ocho cada dia de dos en dos horas.

R. Sulfato de quinina, . . doce gr.
Opio, ... dos gr.
Miel, ... c. s.

Háganse cuatro bolos.—Dósis; uno de cuatro en cuatro horas.

PILDORAS TONICAS. (*e.*)

R. Sulfato de quinina, . . . diez gr.
Conserva de rosas, ... c. s.

Háganse diez pildoras.—Dósis; una de hora en hora.

R

RABANO.

Dos plantas de este nombre se usan en medicina.

1.° *Rábano silvestre; Raphanus sativus*, L.

Rettig, Ratich, Reddik, Al.; raifort, F.; radish, In.; rafano, I.; rabao, Por.

ams. br. d. e. f. fe. pa. w. wu. *b. g. m. pid. sp.*

Planta anua y bienal, originaria de la China, segun se dice, y cultivada en todas partes (tetradinamia siliquosa, L.; cruciferas, J.).

La raiz (*radix Raphani nigri*, s. *hortensis*) es gruesa, orbicular, negra por fuera, blanca por dentro, su parénquima es firme y suculento. Tiene un olor fuerte particular, y un sabor muy acre, especialmente en la corteza.

2.° *Rábano silvestre; Cochlearia Armoracia*, L.

Meerettig, Meeretigsscharbockheil, Al.; raifort sauvage, F.; broad horse radish, In.; armoraccio, peperello bobrasso, I.; rabao rusticano, Por.

a am. ams. an. b. ba. be. br. d. du e. ed. f. fe. ff. fi fu. g. ham. han. he. li lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. c. g. m pa. sa. sp. z.*

Planta que crece en diversos puntos de Europa (tetradinamia siliquosa, L.; cruciferas, J.).

La raiz (*radix Armoraciæ*, s. *Rafani rusticani*, s. *rustici*, s. *marini*) es larga, cilíndrica y gruesa, amarilla por fuera, y blanca y fibrosa por dentro. Su olor es muy penetrante, y su sabor acre, picante y amargo.

Contiene almidon y un aceite volátil, del que el azufre parece ser uno de los principios constituyentes.

Estimulante enérgico, estomacal y antiescorbútico. — Dósis; del zumo, med. drac. en leche ó en vino.

PEDILUVIO IRRITANTE.

Pediluvium ex armoracia. (*au.*)

R. Agua caliente, . . . cuatro lib.
Raiz de rábano machacada,
dos á cuatro onz.

Schlegel le recomienda para atraer el sudor de pies suprimido.

ESPECIES ANTIESCORBUTICAS.

Species contra scorbutum. (pa.)

R. Yerba de coclearia,
—— de berros de fuente,
—— de becabunga,
—— de marrubio blanco,
—— de fumaria y
—— de trebol acuático, a.
med. onz.
Raiz de rábano silvestre, md. lib.
—— de polipodio y
—— de zarzaparrilla, a. tres onz.
Simiente de anís, . . . seis drac.
Pártanse, quebrántense y méz.

ZUMO DIURETICO.

Succus armoraciæ compositus. (b.* su.)

R. Zumo de rábano silvestre,
cuatro onz.
Ogimiel escilítico, . . . una onz.
Méz. (b.*)

R. Zumo de rábano silvestre,
una onz.
Aguardiente, ... seis onz.
Vinagre, ... dos onz.
Méz. (su.)
Dósis; dos cuch.

BEBIDA ANTICATARRAL. (*pie. sm.*)

R. Zumo esprimido de rábanos cocidos y
Agua comun, a. . . . ocho onz.
Miel blanca, ... dos onz.
Para tomar en el dia á tazas.

MIEL DE RABANOS.

Mel armoraciæ. (b.* su. *vm.*)

R. Zumo de rábano silvestre,
tres onz.
Miel blanca, ... una lib.
Méz. en frio. (su.)

vm. prescribe una parte de zumo y cuatro de miel; — y b.*, segun el formulario de pobres de Praga, una parte de zumo y dos de miel, que se debe espesar lo conveniente á un fuego suave.

AGUA DE RABANO SILVESTRE.

Aqua armoraciæ. (b.*)

R. Raiz fresca de rábano silvestre,
una pt.

Agua pura, ... cinco pt.
Destílense dos partes.

AGUA DIURÉTICA. (sa. *ca. pie.*)

R. Raiz de rábano silvestre,
—— de peregil y
—— de saxifraga, a. . una lib.
Enebro, ... seis onz.
Zumo de limon y
Agua de gatuña, a. . . tres lib.
Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas, y destílese al B. M. (sa.)

R. Zumo de puerros,
—— de cebollas y
—— de rábano silvestre,
a. . . . . dos lib.
—— de parietaria y
—— de limon, a. . . med. lib.
Déjense en digestion por tres dias, y destílese suavemente. *(ca. pie.)*

Dósis; una onz. por mañana y tarde.

ESPIRITU DE RABANO SILVESTRE.

Spiritus raphani rusticani. (he. sa.)

R. Raiz fresca de rábano silvestre,
Zumo de rábano silvestre y
Agua comun, a. . . . . seis lib.
Alcohol, ... dos lib.
Destílese la mitad y añádase al producto

Raiz fresca de rábanos, tres lib.
Destílese al B. M. (sa.)

R. Raiz de rábano silvestre y
Agua comun, a. . . . . seis pt.
Alcohol, ... cuatro pt.
Destílense dos partes. (he.)

ESPIRITU DE RABANOS COMPUESTO.

Spiritus armoraciæ compositus.
(b.* fu. lo.)

R. Raiz de rábano silvestre, tres lib.
Alcohol, ... cuatro lib.
Destílense al B. M. cuatro lib. y añádase
Agua de pimienta de la Jamaica, ocho lib.
Méz. ex. (fu.)

R. Raiz de rábano silvestre y
Corteza seca de naranja, a. una lib.
Nuez moscada, . . . med. onz.
Aguardiente, . . cuatro azumb.
Agua comun, ... c. s.
Para evitar el empireuma. Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas y destílense suavemente cuatro azumbres. (b.* lo.)

Para tomar á cuch.

TISANA ANTIESCORBUTICA. (*fp.*)

R. Espíritu de rábano silvestre, una onz.
Infusion de achicorias, dos cuart.
Méz.

CERBEZA ANTIESCORBUTICA.

Cerevisia armoraciæ. (ca. hp. vm.)

R. Rábanos silvestres, . cinco onz.
Cerbeza, ... dos lib.
Déjense en infusion por veinte y cuatro horas y añádase al líquido colado
Jarabe comun, ... una onz.
Méz. ex. *(hp.)*

R. Cerbeza nueva, . . ocho azumb.
Sumérjase en ella durante la fermentacion un saco de lienzo que contenga

Betónica,
Salvia,
Agrimonia,
Coclearia y
Agenjo menor, a. . . . un puñ.
Raiz de énula y
—— de rábano, a. . cuatro onz.

Al cabo de dos ó tres dias cuélese. *(ca.)*

R. Naranjas, ... n.° 3.

Esprímase el zumo y échese en
Cerbeza fuerte,
sesenta y cuatro pt.

Póngase en maceracion fria con la mezcla
Hojas frescas de coclearia,
———— de berros y
———— de salvia, a. una pt.
Simiente de mostaza y
Raiz de rábano, a. . . . una pt.

Cuélese esprimiendo ligeramente al cabo de muchos dias. *(vm.)*

Dósis; dos ó tres vasos cada dia en el escorbuto y en las enfermedades de los riñones, de la vegiga y del hígado.

CERBEZA DE ABETO. *(ca.)*

R. Cerbeza, ... cuatro lib.
Raiz de rábano, ... dos onz.
Hojas de coclearia, . onz. y med.
Yemas de abeto, ... una onz.

Déjense en infusion lo suficiente y esprímase.

Dósis; dos á cuatro onz. cada dia.

VINAGRE DE RABANOS.

Acetum coclearíæ armoraciæ. (sw.)

R. Raiz de rábano silvestre,
una onz.
Vinagre, ... una lib.

Déjense en maceracion por ocho dias y fíltrese.

Usada principalmente como cosmético contra las manchas del rostro, y tambien contra las ulceraciones escorbúticas de la boca.

AGUA EMÉTICA. *(pie.)*

R. Raiz de rábano silvestre y
Nueces verdes, a. . . . dos lib.
Vinagre, ... tres lib.

Déjense en maceracion á un calor suave por cinco ó seis dias, y cuelese en seguida.

Dósis; de med. á tres onz.

TINTURA DE RABANOS COMPUESTA.

Tinctura raphani composita. (b.* ff.)

R. Raiz fresca de rábanos, . dos onz.
Corteza seca de naranja, una onz.
Espíritu de coclearia, . cuatro lib.

Déjense en digestion por algunos dias y cuélese por espresion.

Escitante, recomendada en el escorbuto. — Dósis; una cuch.

GARGARISMO ANTIESCORBUTICO. *(ra.)*

R. Infusion amarga, . . . seis onz.
Tintura de rábanos, . med. onz.
Miel rosada, ... dos onz.

VINO DE RABANO SILVESTRE.

Vinum armoraciæ. (sw.)

R. Raiz de rábano silvestre,
med. lib.
Vino blanco . . . . . ocho lib.

Déjense en digestion por cuatro dias y cuélese.

Escitante y antiescorbútico.

VINO DE RABANOS COMPUESTO.

Vinum cochleariæ compositum (b.* ff. *sw.*)

R. Raiz de rábano silvestre, una onz.
Canela y
Simiente de mostaza negra,
a. . . . . onza y med.
Vino blanco, . . dos lib. y med.

Déjense en maceracion por tres dias meneando con frecuencia la vasija, y decántese despues la parte clara del líquido. *(sw.)*

R. Tintura de rábanos compuesta, una onz.
Vino blanco, ... una lib.
Méz. (b.* ff.)

Es escitante, aconsejado en el escorbuto, en los desórdenes de las funciones digestivas atribuidas á la debilidad del estómago y la paralísis. — Dósis; de cinco á seis cuch. dos veces al dia. Si se quiere puede darse con agua.

VINO ANTIESCORBUTICO.
(f. sa. *sp. vm.*)

R. Raiz de rábano silvestre, tres pt.
Simiente de mostaza, part. y med.
Yerba de berros de fuente,
——— de coclearia y
——— de becabunga, a. una pt.
Espíritu de coclearia, part. y med.
Vino del Rin, noventa y seis pt.

Déjense en digestion por ocho dias, esprímase un poco y fíltrese. *(vm.)*

R. Raiz fresca de rábano silvestre, una onz.
Hojas frescas de coclearia,
——— de berros de fuente,
——— de trebol acuático y
Simiente de mostaza, a. med. onz.
Sal amoniaco, ... dos drac.
Vino blanco, ... dos lib.

Déjense en digestion por treinta y seis horas meneándolo de cuando en cuando; cuélese esprimiendo un poco y añádase al líquido
Alcohol de coclearia, . med. onz.
Méz. ex. (f.)

R. Raiz fresca de rábano silvestre, doce onz.
——— de bardana, cinco onz.
Hojas frescas de coclearia,
——— de berros,
——— de becabunga,
——— de fumaria y
Simiente de mostaza, a. seis onz.
Sal amoniaco, ... tres onz.
Vino blanco, trescientas ochenta onz.

Déjense en digestion por ocho dias; esprímase con fuerza y fíltrese. *(sp.)*

R. Raiz fresca de rábano silvestre, cuatro onz.
Hojas frescas de coclearia y
——— de trebol acuático,
a. . . . . dos puñ.
——— de salvia, . un puñ.
Vino blanco, ... seis lib.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas á un calor suave y fíltrese. (*sa.*)

VINO DIURETICO. (*sa.*)

R. Raiz de rábano silvestre y
——— de lirio de Florencia,
a. . . . . seis onz.

Vino blanco, ... c. s.
para obtener despues de una hora de infusion dos lib. de líquido colado, al que se añade

Jarabe de hinojo y
——— de enebro, a. . . dos onz.

JARABE ANTIESCORBUTICO.

Jarabe de cocleária compuesto, Jarabe de rábanos compuesto; Syrupus antiscorbuticus, s. *antiscorbuticus compositus*, s. *cochleariæ officinalis compositus*, s. *de armoracia compositus.* (an. be. f. *sp. sv. vm.*)

R. Canela quebrantada, . . una pt.
Hojas frescas y machacadas de coclearia,
——————— de becabunga y
——————— de berros, a. . . . . treinta pt.
Simiente de mostaza quebrantada, treinta y cinco pt.
Raiz fresca de rábanos, cuarenta y cinco pt.
Zumo de naranja, . . noventa pt.
Vino tinto, doscientas sesenta pt.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas á un calor suave; cuélese por espresion despues de frio, y disuélvase en el líquido á un calor moderado

Azúcar blanca,
cuatrocientas ochenta pt.

Cuélese el jarabe por una franela. (*vm.*)

R. Hojas frescas y machacadas de coclearia,
Hojas frescas y machacadas de trebol acuático,
——————— de berros de fuente,
Raiz de rábano silvestre y
Naranjas agrias partidas,
a. . . . . una lib.
Canela quebrantada, . onz. y m.
Vino blanco generoso, cuatro lib.

Déjense en maceracion por dos dias en alambique de estaño cubierto de una cabeza bien tapada. Destílese en seguida al B. M. una lib. de líquido, con el cual y

Azúcar blanca, ... dos lib.

Hágase jarabe al B. M. en vasija tapada. Cuélese sin esprimir lo que quede en el alambique; déjese reposar el líquido, decántese y cuézase hasta la consistencia de jarabe con

Azúcar blanca, ... dos lib.

Clarifíquese este jarabe, y cuando no esté mas que tibio mézclese con el precedente. (f.)

R. Yerba fresca de coclearia,
——————— de mastuerzo y
——————— de berros de fuente,
a. . . . . cinco lib.
Raiz de rábano silvestre, . diez lib.
Canela en polvo, ... seis onz.
Naranjas agrias partidas con su corteza, ... una lib.
Alcohol (20.°), ... dos lib.
Agua destilada, ... ocho. lib.

Echense en un alambique, y destílense lentamente cinco lib. de líquido, con las cuales y

Azúcar blanca, ... diez lib.

hágase jarabe al B. M.; esprímase fuertemente lo que queda en el alambique y al líquido que pase añádase

Azúcar blanca, ... diez lib.
Clarifíquese, cuézase lentamente hasta la consistencia de jarabe, y despues de frio mézclese con el precedente. (*au. be.*)

sw. prescribe en lugar de la mezcla de alcohol y de agua diez lib. de vino blanco, y quiere tambien que al líquido esprimido del residuo se añadan diez lib. de agua y veinte de azucar para hacer el segundo jarabe.

R. Zumo no depurado de coclearia,
——————— de becabunga,
——————— de berros de fuente y
——————— de raiz de rábano silvestre. a. . . doce onz.
——————— de naranjas agrias, ... veinte onz.
Cortezas frescas de naranjas agrias una onz.

Dejénse en digestion fria por unas doce horas en vasija tapada meneándolo con frecuencia; fíltrese y añádase al líquido
Azúcar blanca, ... el doble.
Añádase tambien despues de la solucion
Espíritu de coclearia y
Agua de canela, a. . . . . una onz.
Déjese reposar y decántese. (*sp.*)

JARABE DEPURATIVO AMARGO. (*ca.*)

R. Vino blanco, . . . diez y seis lib.
Hojas de coclearia, . . tres lib.
——— de trebol acuático y
Raiz de rábano silvestre, a. . . . . dos lib.
——— seca de genciana, . una lib.

Déjense en maceracion por algunos dias y entonces
De este vino, ... una lib.
Azúcar . . . . . dos lib.

Disuélvase á un calor suave y añádase á cada lib. de este jarabe una onz. del otro hecho con el espíritu de coclearia.

INFUSION DE RABANOS.

Infusum armoraciæ, s. *armoraciæ compositum*, s. *seminum sinapios*, s. *raphani.* (am. b.* g. lo wu. *c.*)

R. Raiz de rábano silvestre y simiente de mostaza, a. . . . una onz.
Agua hirviendo, . med. azumbre.

Déjense en maceracion por dos horas en vasija medio tapada, y añádase
Espíritu de coclearia compuesto, una onz.

Méz. ex. (b.* lo.)

am. y *c.* traen la misma fórmula; pero omiten el espíritu de coclearia.

R. Raiz de rábano silvestre,
Simiente de mostaza y
Conserva de coclearia, a. una onz.
Agua hirviendo, . . . dos lib.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas en vasija tapada y cuélese (b.* wu.)

R. Raiz de rábano silvestre y
Simiente de mostaza, a. una onz.
Canela blanca, ... tres drac.
Agua hirviendo, . . . lib. y med.

Déjese en infusion por dos horas y añádase al líquido colado
Agua de anís, ... dos onz.
Méz. (*g.*)

Escitante aconsejado en el escorbuto, la paralísis, las hidropesías y las calenturas intermitentes.—Dósis; de una á tres onz.

JARABE DE RABANOS.

Syrupus armoraciæ, s. *raphani rusticani.* (b.* fu. li. su. wu.)

R. Zumo reciente de rábano silvestre, c. s. q.
Azúcar blanca, ... c. s.
para dar al zumo la consistencia de jarabe. (su.)

fu. y li. prescriben partes iguales de zumo y de azúcar.

R. Raiz raspada de rábano cultivado y
Agua, a. . . . . part. ig.
Tritúrense bien juntos, esprímase el zumo, y á nueve partes de este último añádase
Azúcar blanca, ... siete pt.
Lícuese en vasija tapada. (*vm.*)

Cullen quiere que se deje en infusion una drac. de raiz de rábano silvestre en dos onz. de agua caliente, y que se añada al líquido colado el doble de azucar. (b.*)

Dósis; de una á tres drac.

INFUSION CONTRA LA PARALISIS.

Infusum paralyticum, s. *ad paralysim.* (*sa. sw.*)

R. Raiz de rábano silvestre y
Simiente de mostaza, a. onz. y med.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjense en maceracion por dos horas y añádase al líquido colado
Alcohol, ... dos onz.
Méz.

Escitante preconizado en las paralísis. — Dósis; cuatro onz. dos veces al dia.

INFUSION ANTIHIDROPICA.

Infusum antihydropicum, s. *ad hydropicos.* (*sa. sw.*)

R. Infusion amarga y
——— contra la paralísis,
a. . . . . una lib.
Méz.
Dósis; cuatro onz. dos veces al dia.

COCIMIENTO ANTIESCORBUTICO.

Apocema antiescorbútico; *Decoctum antiscorbuticum.* (f. *bo. ca. sp.*)

R. Raiz de rábano silvestre, dos onz.
Agua, ... ochenta onz.
Hágase hervir por un cuarto de hora y añádase
Yerba de becabunga,
——— de berros,
——— de coclearia y
——— de acedera, a. . dos puñ.
Hágase hervir un poco, cuélese y añádase
Vinagre, ... cuatro onz.
Méz. ex. (*sp.*)

R. Raiz de rábano,
——— de romaza y
——— de trebol acuático,
a. . . . . med. onz.
Berros de fuente,
Coclearia y
Becabunga, a. . . . . un puñto.
Agua, ... c. s.
para hacer tres vasos de cocimiento.
Añádase al líquido colado
Jarabe antiescorbútico de Portal sin sublimado, . . . una onz.
Méz. (*bo.*)

R. Raiz de romaza y
——— de bardana, a. . . una onz.

Agua, ... cuatro lib.
Hágase hervir por veinte minutos y añádase
Raiz de rábano silvestre, una onz.
Hojas de coclearia,
—— de trebol acuático y
—— de berros, . . . a. seis drac.
Cuélese despues de diez minutos de infusion. (f. *ca.*)

Aconsejado en los herpes rebeldes, el escorbuto y las enfermedades del sistema linfático.

Dósis; muchos vasos al dia.

APOCEMA DIURETICO. (*pie. sm.*)

R. Raiz de rábano silvestre,
dos á cuatro drac.
Enebro quebrantado, med. puñto.
Marrubio blanco, . un gran puñ.
Agua hirviendo, tres vasos grand.
Déjense en infusion sobre rescoldo por una hora, y cuélese despues de frio.

Para tomar en tres veces por la mañana en ayunas; á cada dósis se añade una cuch. de una mezcla de cuatro onz. de jarabe escilítico, con cuatro de polígala de virginia ó vino blanco.

RAIZ DE JUAN LOPEZ.

Radix Lopeziana.

ams. an. b. be. br. f. fe. fu. w. *a. m. sp.*

Se obtiene esta raiz en pedazos bastante grandes, leñosos, cuyo leño es de un blanco amarillento, compacta, con vetas, inodora y muy amarga. La corteza se compone de una capa interna rojiza, amarga y estíptica, y de otra esterna granulosa, pulverulenta y de un amarillo claro, debida probablemente á algun criptógamo.

Se ignora qué vegetal produzca esta corteza que viene del Africa; ¿será el *Morus indica*? Por un error singular, fe. la cree del *Lopezia racemosa*, Cav., de Méjico.

Escitante y tónica, usada en las diarreas crónicas.

Dósis del polvo; seis á veinte gr. tres ó cuatro veces al dia.

JARABE ASTRINGENTE. (*sm.*)

R. Raiz de Juan Lopez partida en pedazos pequeños, . . una onz.
Agua hirviendo, . tres cuartillos.
Déjese en digestion sobre rescoldo por cuarenta y ocho horas, cuézase despues á fuego manso hasta que no quede mas que un cuartillo de líquido, cuélese este y disuélvase en él
Azucar blanca, ... una lib.
Hágasele dar uno ó dos hervores.
Dósis; seis cuch. ó menos cada dia.

ELECTUARIO ASTRINGENTE. (*sm.*)

R. Raiz de Juan Lopez, . dos drac.
Conserva de rosas rojas y
———— de cynorrodon,
a. . . . . dos onz.
Jarabe de goma, ... c. s.
Dósis; una cuchta. dos ó tres veces al dia.

TINTURA ASTRINGENTE. (*sm.*)

R. Raiz de Juan Lopez, drac. y med.
Alcohol, ... dos onz. y med.
Déjense en digestion lo suficiente y fíltrese.

Dósis; una cuchta. tres veces al dia en un vehículo apropiado.

RAIZ DE LA SERPIENTE.

Ofioglosa; *Ophiorrhiza Mungos*, L.

Indische Schlangenwurz, Al.; mungos, F.; indian snake root, In; radice di serpe, I.; colubrina, Por.

br. e. w. *a. m. sp.*

Planta bienal de las Indias (pentandria monogynia, L.; gencianas, J.) que es simple, acanalada, de corteza arrugada y porosa, inodora y muy amarga.

En otro tiempo se consideraba como un específico contra la mordedura de animales venenosos, y por consecuencia como un alexifarmaco.

RANUNCULO.

Cuatro especies de este género se citan en las farmacopeas.

1.º *Boton de oro*, *Ranúnculo de los prados*, *Yerba belida*, *Ranúnculo acre*; *Ranunculus acris*, L.

Scharfar Hahnenfuss, Al.; renoncule âcre, F.

br. e. f. *g. m. sp.*

Planta bienal muy comun en toda Europa (polyandria polygynia, L.; renunculaceas, J.).

Se usa la yerba y las flores.

La yerba (*herba Ranunculi*, s. *Ranunculi acris*, s. *pratensis*) se compone de hojas divididas en tres lóbulos, tambien muy divididos; los superiores son lineales. Las flores son amarillas.

2.º *Ranúnculo acuático*; *Ranunculus acuatilis*, L.

Wasserhahnenfuss, Al.; renoncule aquatique, F.

e.

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba y las flores.

La yerba se compone de hojas, las unas cortadas finamente en segmentos capilares, y las otras enteras. Su sabor es acre. Las flores son blancas.

3.º *Ranúnculo bulboso*, *Batrachion*, *Pie de cuervo*, *Pie de gallo*, *Yerba velluda*; *Ranunculus bulbosus*, L.

Knolliger Hahnenfuss, Al.; bulbous crausfoot, In.; renoncule bulbeuse, F.

f. g. *m.*

Planta bienal comun en Europa.

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz (*bulbi Ranunculi bulbosi*) es simple, redonda, tuberculosa y blanca.

La yerba consiste en un tallo derecho y de hojas compuestas.

Toda la planta es de una estremada acritud.

4.º *Sardonia*, *Apio de risa*, *Ranúnculo malvado*, *Ranúnculo palustre*, *Riso sardónico*; *Ranunculus sceleratus*, L.

Giftiger Hahnenfuss, Froscheppich, Al.; renoncule des marais, F.; marsh crowfoor, I.

f. c. g. *m.*

Planta ánua comun en Europa en los sitios pantanosos.

Se usa la yerba (*herba Ranunculi palustris*, s. *aquatici*) que se compone de un tallo lampiño, fistuloso y muy ramoso, de hojas que nacen del tallo, pecioladas, redondas, lampiñas, medio cortadas en tres lóbulos dentados, lisas, de un verde pálido, y de otras tambien del tallo y con dientes mas profundos, mas estrechas, lineales, recortadas ó palmeadas.

Es un veneno irritante y acre de los mas violentos. Este ranúnculo es considerado por algunos autores como la *herba Sardoa* de Saluste, de cuyo nombre viene el de *Sardónica* dado á la risa aparente producida por la concontraccion espasmódica de los músculos de la boca y los carrillos á que escita el uso de esta planta.

RAPONTICO.

Rapóntico, Ruibarbo inglés, Ruipóntico; Rheum Rhaponticum.

Pontischer Rhabarber, Al.; rapontic, F.; rapontico, I. Por.

br. e. fe. ff. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Planta bienal originaria de la Rusia meridional y cultivada en Francia (eneandria trigynia, L.; polygonas, J.).

Se usa la raiz *(radix Rhapontici veri, s. Rhabarbari Rhapontici)* que se presenta bajo dos formas diferentes; una de las variedades es gruesa como el puño, ó menos, de apariencia leñosa, de un gris rojizo al asterior, jaspeada de rojo y blanco en su quebradura transversal, que forma estrias muy apretadas, radiadas del centro á la circunferencia; tiene un sabor muy astringente y mucilaginoso, y tiñe la saliva de amarillo; su olor es análogo al ruibarbo y mas desagradable; su polvo es amarillo con un tinte rojizo. La otra es de tres ó cuatro pulgadas de larga, de dos ó tres de gruesa, de apariencia menos leñosa, de un amarillo pálido mas puro ó menos rojizo; su quebradura es radiada, su sabor astringente y mucilaginoso, y su olor semejante al del ruibarbo.

Contiene, segun Henry, mucho mas almidon y menos oxalato de cal que el ruibarbo; pero mas principio colorante, el cual es rojo. Hornemann ha encontrado una sustancia particular que ha llamado *Raponticina.*

Tónico y laxante.

ESTRACTO DE RAPONTICO.

Extractum rapontici. (ff.)

R. Raiz fresca de rapontico, una pt.
Agua fria, ... cuatro pt.

Déjese en infusion por veinte y cuatro horas, cuélese esprimiendo ligeramente, infúndase el residuo en

Agua fria, ... dos pt.

y cuélese.

Reúnanse los dos líquidos y evapórense al B. M. hasta la consistencia de estracto.

RATANIA.

Ratania; Krameria triandria, Ru. y Pav.

b. be. e. f. fe. han. s. *c. pa.*

Planta bienal de la América meridional (tetrandria monogynia, L.; polygalas, J.).

Se usa la raiz, que es leñosa, dura y redonda. Se compone de una corteza bastante gruesa y un poco irregular en la superficie, de un color rojo que tira algo á negruzco y de sabor amargo y astringente, y de un leño bastante compacto, blanquecino ó un poco amarillento, inodoro y sin sabor.

Peschier ha descubierto en ella un ácido particular, el *Acido kramérico.*

Se debe evitar asociarle á la gelatina, á las sales ferruginosas, y á los ácidos minerales.

Astringente muy enérgico y muy usado en los flujos mucosos antiguos y en las hemorragias llamadas pasivas.

ESTRACTO DE RATANIA.

Extractum ratanhiæ. (b.* e. f. fe. s. *vm.*)

R. Corteza de ratania, . . . una pt.
Agua pura, ... ocho pt.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas; hiérvase despues por un cuarto de hora y cuélese esprimiendo con fuerza; hiérvase todavía el resíduo con cuatro partes de agua; mézclense los dos líquidos, y despues de veinte y cuatro horas de reposo evapórense hasta la consistencia conveniente. (b.* fe. s.)

R. Corteza de ratania en polvo, una lib.
Agua, ... doce lib.

Déjense en infusion por dos dias al B. M. ó á un calor lento meneándolo con frecuencia; repítase la infusion con nueva agua hasta que esta salga insípida; fíltrense los líquidos reunidos y evapórense, primero á fuego descubierto y despues al B. M. hasta la sequedad. (e.)

R. Corteza de ratania en polvo, c. s. q.

Humedézcase bien con agua, y déjese en maceracion por veinte y cuatro horas; añádase en seguida un peso de agua fria igual al de la masa entera; hágase hervir por quince ó veinte minutos; cuélese el líquido hirviendo por una franela; échese sobre el resíduo el doble de su peso de agua hirviendo; hágase hervir todavía por un cuarto de hora; cuélese; mézclense los dos líquidos; déjense reposar un poco; decántese y evapórese sin que deje de hervir. (*vm.*)

R. Tintura alcohólica de ratania bien cargada, ... c. s. q.

Destílese la cuarta parte al B. M., y evapórese el resíduo á un fuego lento hasta la consistencia de estracto seco. (f.)

Dósis; de veinte gr. á med. onz.

COCIMIENTO DE RATANIA.

Decoctum radicis ratanhiæ. (b.* fe.)

R. Raiz de ratania, . . . med. onz.
Agua de fuente, ... dos lib.

Hiérvase hasta que se reduzca á med. lib. de líquido colado. (b.*)

fe. trae la misma fórmula; pero prescribe se añada al líquido colado dos drac. de vinagre y cuatro de azucar.

Astringente. —Dósis; de una cuch. hasta med. vaso.

TINTURA ACUOSA DE RATANIA. (fe.)

R. Estracto seco de ratania, cinco drac.
Lepidio, . . cuatro onz. y med.
Agua, ... nueve onz.

Déjense en maceracion por tres dias y cuélese.

TINTURA ACETOSA DE RATANIA. (fe.)

R. Estracto seco de ratania, una drac.
Sulfato de sosa, ... una onz.
Agua, ... seis onz.

Añádase á la solucion

Vinagre, ... una drac.

TINTURA DE RATANIA.

Tinctura ratanhiæ. (b.* fe. *vm.*)

R. Corteza pulverizada de raiz de ratania, ... tres onz.
Alcohol, ... dos lib.
Déjese en digestion por ocho dias á un calor suave y cuélese. (b.*)

vm. prescribe una parte de ratánia y seis de aguardiente.

R. Estracto de ratania, cuatro drac.
Alcohol (24.°), . . . cuatro onz.
Vinagre, ... ocho onz.
Déjese en digestion por tres dias y fíltrese. (fe.)

Astringente. — Dósis; de treinta á ochenta gotas.

TINTURA DE RATANIA COMPUESTA.

Tinctura ratanhiæ composita. (b.* fe.)

R. Raiz de ratania en polvo, tres onz.
Corteza de naranja, . . dos onz.
Serpentaria de virginia, med. onz.
Azafran, ... una drac.
Alcohol, ... dos lib.
Déjense en digestion por doce horas y cuélese.

Astringente. — Dósis; de sesenta á ochenta gotas.

GARGARISMO ASTRINGENTE. (fe.)

R. Estracto de ratania, cuatro drac.
Agua, ... veinte onz.
Añádase á la solucion
Vinagre, ... cuatro onz.

UNGUENTO ASTRINGENTE. (fe.)

R. Estracto de ratania é
Incienso, a. . . . . cuatro onz.
Gálbano, ... dos onz.
Ungüento defensivo rojo, seis onz.
Trementina, . dos onzas y med.
Aceite comun, ... dos onz.
Para aplicarle en las hernias.

PILDORAS ASTRINGENTES. (fe.)

R. Estracto de ratania, . una drac.
Agua, ... c. s.
para ablandar el estracto. — Háganse diez ó doce píldoras.

ELECTUARIO ASTRINGENTE. (fe.)

R. Polvos de ratania, . . una onz.
—— de gengibre, . . una drac.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Dósis; una cuchta. en las calenturas y en los accesos de epilepsía.

BOLOS ASTRINGENTES. (*ca.*)

R. Polvos de estracto de ratania, escrp. y med.
—— de alumbre, . . diez gr.
Conserva de cynorrodon, una drac.
Jarabe astringente, ... c. s.
Háganse veinte bolos. — Dósis; dos cada tres ó cuatro horas.

POCION ASTRINGENTE. (fe. *bo. ca. ra.*)

R. Estracto de ratania, . una drac.
Alumbre, ... diez gr.
Agua de rosas, . . . cuatro onz.
Jarabe de quina, . . . una onz.
Méz. *(ra.)*

R. Estracto de ratania, . med. drac.
Alumbre, ... diez gr.
Infusion de rosas, . . cinco onz.
Jarabe de rosas y

Jarabe de catecú, a. . una onz.
Agua de Rabél, . . . quince got.
Méz. *(ca.)*

R. Tintura de ratania compuesta,
Polvos de ratania, a. . seis drac.
Agua, ... seis onz.
Méz. (fe.)

R. Infusion de rosas, . . . una onz.
Acido sulfúrico dilatado en agua, cuarenta got.
Estracto de ratania, . dos drac.
Jarabe de moras, . . . seis drac.
Méz. *(be.)*

Para tomar á cuch. — La última ha sido recomendada con particularidad en la menorragia, y alabada últimamente en las calenturas y en los accesos de epilepsía.

REGALIZ.

Las farmacopeas mencionan dos especies de este género.

1.° *Adipsos de Plinio*, *Alsus*, *Alcacas*, *Alcacuz*, *Glyceraton*, *Glycyphyton*, *Orozuz*, *Polvo dulce*, *Regaliz*, *Regaliza y Regalicia; Glycyrrhiza glabra*, L.

Süssholz, Lakritzenholz, Al.; reglisse, F.; liquerice, In.; regolizia, I.; alcacaz, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. sy. z.*

Planta que crece en las regiones calientes y templadas de Europa (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.).

Se usa la raiz (*radix Liquiritiæ*, s. *Glyzyrrhizæ*) que es muy larga, cilíndrica, ramosa, leñosa, del grueso de un dedo, de color ceniciento, leonado por fuera, amarillento por dentro é inodora. Su sabor es azucarado y un poco mucilaginoso, que se vuelve amargo y un poco nauseabundo cuando se mastica por mucho tiempo.

Contiene, segun Robiquet, almidon, albumina, un aceite volátil acre, un principio azucarado particular, *Glyzyrrhizina ó Sacco-gomita*, y otro principio cristalizable, igualmente particular, que se llama *Agedoïde*.

2.° *Regalicia erizada; Glycyrrhiza echinata*, L.

Igelsschottensüssholz, In.; reglisse epineuse, F.

d. fi. han. he. o. pr. r. *m.*

Planta del Asia y del Mediodia de Europa.

Se usa la raiz, que es semejante á la precedente, aunque mas gruesa.

ESPECIES BEQUICAS. (b.)

R. Raiz de alelí de montaña, dos onz.
—— de regaliz, . . onz y med.
Yerba de verónica y
—— de yedra terrestre,
a. . . . . un puñ.
—— de hipericon, tres puñtos.
Simiente de hinojo, . . tres drac.
Pártanse y quebrántense.

ESPECIES PECTORALES.

Species pro decocto propotu infantum. (pa. w. *sp.*)

R. Raspaduras de c. c.,
diez y seis onz.
—— de marfil, cuatro onz.
Raiz de regaliz, . . . doce onz.
—— de polipodio, . . cuatro onz.
Flores de tilo, ... dos onz.
Higos y

Algarrobas, a. . . . . ocho onz.
Simiente de anís y
——— de hinojo, a. cuatro onz.
Pártanse y méz. *(sp.)*.

R. Raspaduras de c. c., . . dos lib.
——————— de marfil, . una lib.
Raiz de regaliz, ... cuatro lib.
——— de polipodio, . . . dos lib.
Higos, ... cinco lib.
Dátiles y
Azofaifas, a. . . dos lib. y med.
Simiente de cilantro y
——— de hinojo, a. lib. y med.
Flores de borraja,
——— de buglosa y
——— de violetas, a. . . dos onz.
Pártanse y méz. (pa.)

w. prescribe dos lib. de cuerno de ciervo, med. lib. de marfil, otra med. de regaliz y otro tanto de polipodio, una lib. de higos y otra de algarrobas, med. de hinojo y otro tanto de anís, cuatro onz. de flores de tilo y una lib. de cuerno de ciervo quemado.

ZUMO DE REGALIZ.

Succus liquiritiæ. (ams. an. b. br. ed. ff. fu. han. o. po. pr. s. su. *g. m.)*

Se encuentra en el comercio bajo la forma de cilindros, de unas seis pulgadas de largos y de una ó mas de gruesos, y envueltos en hojas de laurel, que tienen un sabor dulce mezclado con un poco de amargura.

Este es un estracto que se obtiene evaporando hasta la sequedad el cocimiento de la raiz de regaliz. Siempre está mas ó menos quemado, y con frecuencia contiene partículas de cobre. Se esporta de la Sicilia y con particularidad de España.

ZUMO DE REGALIZ DEPURADO.

Succus liquiritiæ depuratus. (b. ba. be. d. han. he. pr. s. *vm.*)

R. Zumo de regaliz, ... c. s. q.

Disuélvase en agua caliente, cuélese por una franela, evapórese hasta la consistencia de masa dura, háganse pequeños cilindros sobre una piedra de mármol untada con aceite, séquense despues al fuego y pártanse en pedazos de dos á tres pulgadas de largo *(vm.)*.

ba. prescribe se deje en maceracion una pt. de zumo en doce de agua por veinte y cuatro horas, que se cuele por espresion, y que se evapore el líquido colocado hasta la sequedad.

ZUMO DE REGALIZ GOMADO. (*vm.*)

R. Goma arábiga y
Zumo de regaliz, a. . . . pts. ig.

Disuélvanse separadamente en agua, cuélense las soluciones por una bayeta, méz. y evapórense hasta la consistencia de masa dura, meneando sin cesar.

ZUMO DE REGALIZ ANISADO. (*vm.*)

R. Zumo de regaliz depurado y acabado de enfriar
cuarenta y ocho onz.
Aceite de anís, ... tres drac.

Incorpórese todo, háganse cilíndros pequeños sobre una piedra de mármol untada de aceite, y despues de secos dividanse en pedazos pequeños.

ESTRACTO DE ZUMO DE REGALIZ. (*vm.*)

R. Zumo de regaliz partido en pedazos delgados, ... c. s. q.
Agua fria, ... el doble.

Déjense en maceracion por tres dias en una vasija ancha y poco profunda, decántese sin mencarlo, fíltrese y evapórese hasta la consistencia de estracto.

ESTRACTO DE REGALIZ.

Extractum glyzyrrhizæ. (a. an. b. br. d. du. e. f. fe. fu. li. lo. po. r. sa. wu. *c. pid. vm.)*

R. Raiz de regaliz, ... cuatro lib.
Agua hirviendo, . diez y seis lib.

Déjense en infusion por doce horas, cuélese, decántese y evapórese al B. M. á lo último, hasta la consistencia de estracto. (e.)

an. y be. prescriben se dejen en infusion en dos veces una libra de raiz en ocho de agua cada vez, y que se evaporen los líquidos reunidos; — y fe. que se dejen en infusion por dos dias dos onz. de regaliz en diez lib. de agua, y que se evapore el líquido colado.

R. Raiz de regaliz, ... c. s. q.

Macháquese en un mortero con un poco de agua, esprímase el zumo, déjese depurar por el reposo y evapórese despues al B. M. hasta la consistencia de estracto (fu.)

R. Raiz de regaliz, ... una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.

Déjense en maceracion por cuatro dias en un sitio caliente, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion y evapórese el líquido hasta la consistencia conveniente. (br.)

sa. prescribe se consuma la tercera parte de la infusion antes de colarla, y que se evapore; — lo. y *c.* que se hierva una lib. de regaliz en cuatro azumbres de agua, hasta reducirlas á cuatro, despues de veinte y cuatro horas de maceracion; — y li. que se dejen en infusion tres lib. de raiz en nueve de agua hirviendo por doce horas, que se hierva despues un poco, que se deje el líquido colado en reposo por seis horas, y que se evapore en seguida.

R. Raiz de regaliz, ... una pt.
Agua, ... ocho pt.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion, cuélese por espresion y evapórese el líquido colado á un fuego suave hasta la consistencia de masa de píldoras. (du.)

r. prescribe se cueza una parte de raiz seca en seis de agua, ó una de raiz fresca en dos ó tres de agua, que se cuele por espresion y se evapore el líquido hasta el grado conveniente; — d. que se cueza una parte de raiz en ocho de agua, que se cuele por espresion y se evapore el líquido hasta la consistencia de masa de píldoras; — wu. que se hierva la raiz por una hora en c. s. de agua, y que se evapore el cocimiento decantado hasta la consistencia de miel espesa; — y *pid.* que se haga hervir una lib. de raiz en seis de agua, y que se evapore al B. M. el líquido colado y depurado por el reposo.

R. Raiz de regaliz, ... una lib.
Agua fria, ... diez lib.

Déjese en maceracion por dos dias, meneándolo de cuando en cuando, cuélese, déjese reposar y decántese el líquido, y evapórese despues hasta la consistencia de estracto. (a. po.)

R. Raiz de regaliz quebrantada, c. s. q.

Humedézcase con agua fria en la prensa de Real, y despues de doce horas

de maceracion, llénese de agua á fin de esprimir la tintura, y póngase esta á un fuego lento hasta que adquiera la consistencia de estracto. (*vm.*)

R. Raiz de regaliz, ... una lib.
Agua fria, ... cuatro lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas meneándolo de cuando en cuando y cuélese; déjese otra vez en maceracion el residuo con nueva agua y cuélese; mézclense los dos líquidos y evapórense hasta la consistencia de estracto. (f.)

PASTA DE REGALIZ.

Regaliz real, Gelatina de regaliz; Pasta, s. *Gelatina*; s. *Mucílago liquiritiæ*, s. *glyzyrrhizæ*, *Saccharum glycyrrhisatum*, *Glyzyrrhiza lucida*, *Gluten pectorale*. (a. b.* br. d. f. han. li. o. pa. po. pr. r. su. w. wu. *sp. vm.*)

R. Raiz de regaliz raspada, cuatro onz.
Agua hirviendo, ... ocho lib.

Déjense en maceracion por doce horas, cuélese y disuélvase en el líquido colado.

Goma arábiga, . . . dos lib. y med.
Azúcar blanca, ... lib. y med.

Cuélese otra vez, evapórese suavemente hasta que una gota echada sobre una plancha de vidrio fria se convierta en jaletina, quítese entonces la película y échese en moldes de hoja de lata untados de aceite, séquese á un calor moderado y divídase en pastillas. (b.* han. o. po. pr.)

li. prescribe dos onz. de raiz, cuatro lib. y med. de agua, dos lib. de goma y otro tanto de azúcar; — r. ocho onz. de raiz, cuatro lib. de agua, dos lib. y med. de goma y otro tanto de azúcar; — s. una parte de raiz, veinte y dos de agua, nueve de goma y seis de azúcar — fi. una lib. de raiz, c. s. de agua, tres lib. de goma y dos lib. y med. de azúcar; — d. una onz. de raiz, cinco lib. de agua, cuatro lib. de goma y dos lib. de azúcar; — wu. una onz. de regaliz, cuatro lib. de agua, diez y seis onz. de goma y otro tanto de azúcar; — y *sp.* una onz. de regaliz, ciento veinte de agua, sesenta de goma y cuarenta de azúcar.

R. Raiz de regaliz, . . . cuatro onz.
Agua, ... treinta y dos onz.

Redúzcase á veinte y cuatro onz. por la ebulicion y disuélvase en el líquido colado.

Goma arábiga, ... dos lib.
Azúcar blanca, ... lib. y med.

Cuézase ligeramente hasta la consistencia necesaria. (br.)

su. prescribe nueve onz. de raiz, diez y seis de agua, reducidas á diez, tres lib. de goma y otro tanto de azúcar.

R. Raiz de regaliz, . . . med. onz.
Agua hirviendo, ... tres lib.

Déjense en infusion por dos horas y disuélvase en el líquido colado.

Goma arábiga, ... una lib.
Azúcar blanca, . . . cuatro lib.

Cuélese, redúzcase á la mitad por la ebulicion, despúmese y añádase

Agua de flores de naranjo, med. onz.

Viértase en moldes. (a.)

R. Raiz de regaliz, ... una pt.
Agua, ... setenta y seis pt.

Déjese en infusion fria la raiz, en la cuarta parte del agua, y despues en caliente en lo restante de ella, cuélese despues de frio y disuélvase en el líquido

Goma arábiga, cuarenta y ocho pt.
Azúcar cande, . veinte y cuatro pt.
Clarifíquese con clara de huevo, concéntrese lo conveniente y échese en moldes. (*vm.*)

Raiz de regaliz, ... cuatro onz.
Agua, ... cinco lib.
Déjense en infusion por doce horas y disuélvase en el líquido colado
Goma arábiga y
Azúcar blanca, a. . . . . dos lib.
Cuélese por un lienzo tupido, evapórese hasta la consistencia de estracto, bátase entonces con fuerza y añádase poco á poco por cada cinco lib. de masa
Claras de huevo, ... n.º 12.
batidas con
Agua de flores de naranjo,
cuatro onz.
Hágase espesar suavemente y estiéndase sobre un mármol espolvoreado de almidon. (f.)

pa. y w. prescriben cuatro onz. de raiz, ocho lib. de agua, reducidas á cuatro por la coccion, dos lib. y med. de goma, otro tanto de azucar y seis claras de huevo batidas con med. onz. de agua de flores de naranjo.

PASTA DE REGALIZ ANISADA.

Zumo de regaliz de Blois; Pasta liquiritiæ fusca. (f. sp.)

R. Estracto de regaliz y
Azucar blanca, a. . . . . una lib.
Goma del Senegal, . . . dos lib.
Raiz de lirio de Florencia,
una drac.
Aceite esencial de anís,
veinte y cuatro gr.
Disuélvase la goma en c. s. de agua, cuélese la solucion, añádase el estracto, evapórese lentamente hasta la consistencia de miel, añádanse los polvos de lirio, continúese la evaporacion hasta la consistencia de estracto y añádase el aceite. (f.)

R. Goma arábiga, treinta y dos onz.
Agua de fuente, ... c. s.
Cuélese la solucion y disuélvase en el líquido
Zumo de regaliz, . . . nueve onz.
Azucar blanca, . diez y seis onz.
Evapórese lentamente hasta la consistencia de jarabe espeso, y añádase entonces
Polvos de raiz de lirio de Florencia y
——— de canela, a. . med. onz.
Continúese la evaporacion hasta que la masa no se pegue á los dedos y añádase
Aceite esencial de anís, dos escrp.
Echese en una mesa de mármol untada de aceite. (*sp.*)

PASTA DE REGALIZ OPIADA. (b.*)

R. Goma del Senegal y
Azucar blanca, a. . quinientas pt.
Agua de azahar, . . . treinta pt.
Estracto de regaliz hecho en frio,
sesenta pt.
——— acuoso de opio, . dos pt.
Echese en la solucion espesada la goma, la azucar y los dos estractos disueltos con anticipacion en un poco de agua.

PASTILLAS DE REGALIZ. (*vm.*)

R. Estracto de regaliz, . . . una pt.
Azucar licuada al fuego,
diez y seis pt.

Incorpórese el estracto en polvo en el azúcar y cúbranse las pastillas con almidon.

TROCISCOS BEQUICOS BLANCOS.

Trochisci bechici albi, s. *glyzyrrhizæ*, s. *è glyzyrrhiza*, *Confectio de rebecha.* (pu. li. su. *au. sp.*)

R. Polvos de raiz de regaliz, una onz.
——— de lirio de Florencia, med. onz.
——— de azúcar cande, una lib.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse trociscos. (li.)

R. Polvos de raiz de regaliz, tres drac.
——— de lirio de Florencia, seis drac.
——— de almidon, . . med. onz.
——— de azúcar blanca, ocho onz.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse trociscos. (su.)

fu. prescribe ocho onz. de regaliz, cuatro de lirio, una y med. de almidon, seis de azucar y mucílago de goma tragacanto.

R. Polvos de raiz de regaliz, onz. y med.
——— de lirio de Florencia y
——— de goma arábiga,
a. . . . . med. onz.
——— de azucar blanca, cuarenta y ocho onz.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse trociscos. (*sp.*)

CILINDROS DE REGALIZ BLANCOS.

Baculi liquiritiæ albi. (w. *sp.*)

R. Goma arábiga,
Especies diaireos simples y
Especies diatragacanto,
a. . . . . med. onz.
Raiz de regaliz y
Almidon, a. . . . . una onz.
Azúcar blanca, ... dos lib.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse cilindros.

TROCISCOS BEQUICOS CETRINOS.

Trochisci bechici citrini, *Liquiritia cocta citrina*, *Tabellæ glyzyrrhizæ glabræ compositæ.* (an. pa. su. w. *sp.*)

R. Raiz de regaliz y
——— de lirio de Florencia,
a. . . . . una onz.
Azafran, ... dos escrp.
Azúcar blanca, ... una lib.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse trociscos. (pa. w. *sp.*)

R. Polvos de raiz de regaliz, ocho onz.
——— de goma tragacanto compuestos y
——— de lirio de Florencia compuestos, a. . . . onz. y med.
——— de azafran, . ocho escrp.
——— de azucar, . . . seis lib.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse trociscos. (an.)

R. Polvos de raiz de regaliz, una onz.
——— de lirio de Florencia y
——— de almidon, a. . med. onz.
——— de azafran, . . un escrp.
——— de azúcar blanca, doce onz.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse trociscos. (*sp.*)

su. prescribe tres. drac. de regaliz, seis de lirio, med. onz. de almidon, dos escrp. de azafran, ocho onz. de azúcar y mucílago de goma tragacanto.

CILINDROS DE REGALIZ CETRINOS.

Baculi liquiritiæ citrini. (o. s. w. *pid.*)

R. Azucar blanca, ... doce pt.
Raiz de regaliz, ... una pt.
—— de lirio de Florencia,
un cuarto de pt.
Azafran, . . . un octavo de pt.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Hágase una masa blanda y divídase en cilindros que se deben secar sobre un cedazo. (o. s.)

R. Azucar blanca, ... una lib.
Raiz de regaliz, . . . una onz.
—— de lirio de Florencia y
Almidon, a. . . . . med. onz.
Azafran, ... med. escrp.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse cilindros. (w. *pid.*)

TROCISCOS BEQUICOS NEGROS.

Trociscos de regaliz, Trociscos de regaliz y de goma; Trochisci liquiritiæ cum gummi, s. *bechici nigri*, s. *glyzyrrhizæ*, *Tabellæ anisi compositæ.* (ams. an. b. be. br. fc. fu. han. li. o. pa. w. wu. *au. br. c. pid. sp. sw. vm.*)

R. Zumo de regaliz y
Goma arábiga, a. . . . . pt. ig.
Disuélvase el zumo y la goma cada uno por sí en agua; reúnanse los dos líquidos, y evapórense lo suficiente para poder hacer pastillas. (fe.)

R. Estracto de regaliz y
Goma arábiga, a. . . . . una pt.
Azucar, ... dos pt.
Agua, ... c. s.
Evapórese la solucion lo conveniente y hágase pastillas. (*c.*)

R. Polvos de zumo de regaliz,
una pt.
Azucar cande, . . diez y seis pt.
Maná, ... cuatro pt.
Tritúrense juntos y añádase
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.
Háganse trociscos. (*vm.*)

R. Polvos de estracto de regaliz,
ocho onz.
—— de azucar, . . . una lib.
—— de goma arábiga, tres onz.
Agua de flores de naranjo, . c. s.
Háganse trociscos. (*br.*)

R. Polvos de zumo de regaliz y
—— de goma arábiga,
a. . . . . tres pt.
Agua de fuente, ... c. s.
Añádase á la solucion
Azucar en polvo, ... seis pt.
Evapórese suavemente hasta la consistencia conveniente. (ams. b. be. fu. li. p. wu. *sw.*)

R. Polvos de raiz de lirio de Florencia,
———— de regaliz,
—— de anís y
—— de hinojo, a. . . una onz.
Zumo de regaliz disuelto en agua de hisopo, ... cuatro onz.
Azucar blanca, . diez y seis onz.
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.
Háganse trociscos. (br. han. w.)
pa. suprime la azucar y p. el hinojo; siendo lo mismo lo restante de la fórmula; o. y s. prescriben se disuelva la azucar en agua de hinojo.

R. Polvos de raiz de regaliz y
———— de lirio de Florencia, a. . . . . tres onz.

Polvos de anís y
——— de hinojo, a. . med. lib.
Estracto de regaliz,
dos lib. y ocho onz.
Azucar blanca, ... doce lib.
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.

Háganse pastillas. (an.)

R. Almendras dulces peladas, dos onz.
Macháquense y añádase á la pasta
Polvos de zumo de regaliz,
cuatro onz.
——— de hinojo, . . med. onz.
——— de azucar, . . ocho onz.
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.

Háganse trociscos. *(au. pid.)*

R. Estoraque calamita, . . seis pt.
Azucar blanca,
ciento cuarenta y cuatro pt.
Tritúrense juntos y añádase
Almendras dulces peladas y
Raiz de lirio de Florencia,
a. . . . . dos pt.
Goma tragacanto . . . . una pt.
Estracto de regaliz líquido, . c. s.
Háganse trociscos. *(vm.)*

vm. propone tambien se tomen treinta y seis partes de trociscos blancos y una de estoraque calamita, para hacer una masa con c. s. de disolucion acuosa de zumo de regaliz.

R. Raiz de lirio de Florencia, tres onz.
——— de regaliz,
Anís é
Hinojo, a. . . . . cinco onz.
Zumo de regaliz, . . nueve onz.
Estoraque calamita, . . una onz.
Azucar blanca,
noventa y seis onz.
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.
Háganse trociscos. *(sp.)*

TROCISCOS REQUICOS OPIADOS.

Trochisci glyzyrrhizæ cum opio, s. *thebaici*, *Trochisci sedativo-balsamici*, s. *pectorales regis Danorum.* (ed. p. su. *br. e. sp. vm.*)

R. Zumo de regaliz y
Azucar blanca, a. . . . una onz.
Estracto de opio, . cuatro drac.
Háganse trociscos. *(sp.)*

R. Raiz de regaliz y
——— de malvavisco,
a. . . . . nueve drac.
——— de lirio de Florencia y
Goma tragacanto, a. . seis drac.
Opio, ... un escrp.
Azucar, ... diez y seis onz.
Agua, ... c. s.
Háganse trociscos. *(vm.)*

R. Zumo de regaliz y
Goma arábiga, . . a. cinco onz.
Opio, ... dos drac.
Tintura de bálsamo de Tolú,
med. onz.
Jarabe comun, ... ocho onz.
Tritúrese el opio con la tintura, añádase poco á poco el jarabe y el zumo de regaliz ablandado por el calor, despues la goma, y háganse setecientos veinte trociscos. (ed. p. su. *br. sw.*)

R. Goma arábiga,
Estracto de regaliz y
Azucar blanca, a. . . . dos drac.
Opio, ... seis gr.
Aceite de anís, . . . cuatro got.
Agua, ... c. s.
Háganse cuarenta pastillas. *(e.)*

Estas últimas pastillas son celebradas por los ingleses bajo el nombre de *Cough lozanges de Wistar*.

LOOC SANUM ET EXPERTUM.

(pa. w. *pid. sp.*)

R. Agua destilada de looc sanum et expertum, ... una onz.
Piñones mondados,
Almendras peladas y
Simiente de adormideras blancas,
a. . . . . med. onz.

Hágase una emulsion y añádase al líquido colado
Azucar blanca , . . . veinte onz.
Polvos de regaliz,
——— de goma tragacanto,
——————— arábiga y
——— de almidon , a. tres drac.
——— de lirio de Florencia,
dos drac.

Mézclese agitándolo rápidamente por mucho tiempo. (w.)

R. Raiz de regaliz,
Yerba de hisopo,
——— de culantrillo de Montpeller,
——— de calaminta de montaña,
a. . . . . med. onz.
Anís é
Hinojo, a. . . . . dos drac.
Agua de fuente,
veinte y cuatro onz.

Cuézase un poco y emulsiónese el cocimiento con
Almendras peladas,
Piñones mondados y
Simiente de adormidera blanca,
a. . . . . una onz.

Añádase al líquido colado
Polvos de regaliz,
——— de goma tragacanto,
——————— arábiga,
——— de almidon y
——— de lirio de Florencia,
a. seis drac.
Azucar blanca, . cuarenta onz.
Agua de canela, ... dos onz.

Méz (*sp.*)

R. Canela,
Hinojo,
Calaminta,
Lirio de Florencia,
Anís y
Hinojo, a. . . . . med. onz.
Culantrillo de Montpeller,
un puñ.
Agua de fuente, ... dos lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas; destílese despues una lib. de líquido con el cual y
Piñones mondados, . cinco drac.
Almendras dulces peladas,
tres drac.
hágase una emulsion, y añádase al líquido colado
Azucar blanca, ... dos lib.
Polvos de regaliz,
——— de goma tragacanto,
——————— arábiga y
Almidon, a. . . . . tres drac.
——— de lirio, ... dos drac.

Méz. (pa.)

R. Polvos de raiz de regaliz y
——————— de malvavisco,
a. . . . . una onz.
——————— de lirio de Florencia, ... seis drac.
——— de goma tragacanto,
una onz.

Pulverícense é incorpórense estempo-

ráncamente cuatro escrp. de estos polvos en dos onz. de jarabe de orchata. (*pid.*)

Dósis; de dos drac. á med. onz.

LOOC DE PULMON DE ZORRO.

Looch pulmonale, s. *de pulmone vulpis.* (li. w. *sp.*)

R. Polvos de pulmon de zorro,
——— de zumo de regaliz,
——— de culantrillo de Montpeller,
——— de anís y
——— de hinojo, a. . . una onz.
Azucar clarificada, . quince onz.
Méz. (w. *sp.*)

R. Estracto de regaliz, . . med. onz.
Agua de hinojo, ... dos onz.
Añádase á la solucion
Polvos de yedra terrestre,
——— de anís y
——— de hinojo, a. . . dos drac.
Jarabe de azucar, . . . seis onz.
Méz. (li.)

Es semejante al precedente en su modo de obrar. Introducido por Mesue ha gozado de una grande celebridad en la tos y en la tísis pulmonal. — Dósis; de dos á tres drac.

ELIXIR PECTORAL SIMPLE. (br. ham.)

R. Zumo de regaliz, . . . tres drac.
Agua de hinojo, . . . cuatro onz.
Disuélvase (ham.)

br. prescribe una lib. de agua de hinojo y seis onz. de zumo de regaliz.

INFUSION DE REGALIZ.

Infusum radicis glyzyrrhizæ, s *liquiritiæ.* (pp. ww. *au.*)

R. Raiz de regaliz partida, una onz.
Agua hirviendo, nueve á diez onz.

Déjense en digestion por media hora en vasija tapada y cuélese.

MIEL GLYZYRRHIZADA.

Miel glyzyrrhizatum, s. *liquiritiæ.* (f.** ham. po.)

R. Raiz de regaliz, . . . ocho onz.
Agua hirviendo, ... tres lib.

Déjense en maceracion por una hora, cuélese por espresion, redúzcase á catorce onz. por la evaporacion y añádase

Miel blanca, ... cinco lib.

Cuézase á un fuego suave hasta la consistencia de jarabe. (f.** po.)

ham. prescribe se deje en infusion por media hora onz. y med. de regaliz en c. s. de agua caliente para obtener diez onz. de líquido colado, que se añada á este el doble de miel despumada y que se reduzca á la consistencia de jarabe.

JARABE DE REGALIZ.

Syrupus glyzyrrhizæ, s. *liquiritiæ.* (br. han. pr. w. *sp. sw.** *vm.*)

R. Raiz de regaliz raspada, . una pt.
Agua, ... tres pt.

Déjese en infusion por una hora al B. M. tibio, y disuélvase despues en el líquido colado y frio

Miel blanca, ... dos pt. ó caliente
Azucar blanca, ... dos pt.

Consérvese. (*vm.*)

*sw.** trae la misma fórmula; pero prescribe se cueza el líquido colado hasta la consistencia de jarabe con la miel y la azucar.

R. Raiz de regaliz partida, ocho onz.
Agua hirviendo, ... tres lib.
Déjense en maceracion lo suficiente, hiérvase despues ligeramente por un cuarto de hora, cuélese, evapórese hasta que no quede mas que catorce onz. de líquido y añádase
Azucar blanca y
Miel despumada, a. . . . dos lib.
Hágase dar un hervor. (han. pr.)
R. Raiz de regaliz, ... dos onz.
Culantrillo de Montpeller, una onz.
Hisopo, ... med. onz.
Agua, ... dos lib.
Hágase jarabe con diez y seis onz. de azúcar, ocho de miel y cuatro de agua de rosas. (br. w. *sp.*)

COCIMIENTO PECTORAL. (*sw.*)

R. Raiz de regaliz,
Yerba de tusílago y
—— de yedra terrestre,
a. . . . . dos onz.
Raiz de énula, ... una onz.
Agua, ... nueve lib.
Redúzcase por la ebulicion á una lib. de líquido colado.
Dósis; tres ó cuatro onz. muchas veces al dia.—Se edulcora esta tisana con azucar, y mejor con miel.

ESENCIA DE REGALIZ.

Essentia liquiritiæ. (br.)

R. Raiz de regaliz partida, una onz.
Aguardiente, ... tres onz.
Déjese en infusion lo suficiente y cuélese por espresion.

ELIXIR DE RINGELMANN.

Elixir pectoral, Elixir de regaliz ó de zumo de regaliz, Elixir del rey de Dinamarca; Elixir pectorales regis Daniæ, s. *Danorum*, s. *Ringelmanni*, s. *ex succo glyzyrrhizæ*, s. *pectorale dulce*, s. *glyzyrrhizæ*, s. *è succo liquiritiæ.* (d. dd. fu. han. li. o. po. pp. pr. w. *s. sp. vm.*)

1.º Sin opio.

R. Zumo de regaliz, ... una pt.
Agua de hinojo, ... dos pt.
Alcohol amoniacal, . . . seis pt.
Déjense en digestion por tres horas á un calor suave y cuélese. (dd.)

li. prescribe una pt. de zumo, cuatro de agua de hinojo y dos de alcohol amoniacal;—s. dos de zumo, seis de agua de hinojo y dos de alcohol amoniacal;—fu. dos de zumo, seis de agua de hinojo y tres de alcohol amoniacal;—han. dos de zumo, seis de agua de hinojo y dos de alcohol amoniacal;—*sp.* una de zumo, dos de agua de hinojo y seis de alcohol amoniacal anisado;—y *vm.* dos de zumo, ocho de agua de hinojo y dos de alcohol amoniacal anisado.

R. Zumo de regaliz, ... seis pt.
Agua de hinojo, ... doce pt.
Simiente verde de anís, una pt.
Alcohol amoniacal, treinta y seis pt.
Déjense en digestion por veinte y cuatro horas y cuélese. (d.)

vm. prescribe se deje en digestion una parte de anís en seis de alcohol amoniacal, que se añada en seguida doce partes de agua de hinojo y seis de zumo de regaliz, y que se filtre despues de algunos dias.

R. Zumo de regaliz depurado, una onz.
Agua de hinojo, ... ocho onz.
Sub-carbonato de amoniaco lí-

quido, ... dos drac.
Méz. (pp.)

R. Raiz de regaliz, ... tres onz.
—— de apio, . . . med. onz.
Flores de manzanilla romana, onz. y med.
Anís, ... ocho onz.
Hinojo, ... cinco onz.
Macias, ... tres drac.
Nuez moscada y
Mirra, a. . . . . una onz.
Sub-carbonato de potasa, diez y ocho onz.
Alcohol, ... cuatro lib.
Agua de fuente, ... dos lib.

Déjense en digestion por tres dias y añádase

Sal amoniaco en polvos, una lib.

Destílese lentamente hasta que no quede mas que una lib. de líquido, y mézclese el producto con

Zumo de regaliz, . . . cinco onz.
disuelto en
Agua de hinojo, ... una lib.

Añádase en seguida

Azafran de Oriente, . . dos drac.

Déjense en digestion por algunos dias y fíltrese. (w.)

2.º Con opio. *Elixir amoniaco-opiado; Elixir ammoniato-opiatum, estractum thebaicum ammoniacale.*

R. Zumo de regaliz depurado, med. onz.
Agua de hinojo, ... med. lib.

Disuélvase y añádase al líquido colado

Espíritu de sal amoniaco anisado, dos drac.
Tintura tebaica, . . . med. drac.
Méz. ex. (o.)

po. y pr. prescriben dos onz. de zumo, seis de agua de hinojo, dos de alcohol amoniacal anisado y dos drac. de láudano; — *vm.* ocho partes de zumo, veinte y cuatro de agua de hinojo, ocho de alcohol amoniacal anisado y ocho de láudano líquido.

Estimulante recomendado con particularidad en otro tiempo en las afecciones crónicas de pecho, y reputado como pectoral, béquico, espectorante, carminativo, anticólico, estomacal y diurético. — Dósis; de treinta y seis á cincuenta gotas. — Esta es una preparacion que pueden variar mucho segun quiera el médico, y merece ser sepultada en el olvido.

RESINA CHIBOU.

Resina cachibou, Goma cachibou; Resina de la Bursera gummifera, L.

f. g.

Resina sólida al esterior, un poco blanda en el centro, de fractura vidriosa, trasparente, de un color amarillo pálido, de olor de trementina fina cuando se desmenuza, y de sabor suave, perfumado y nada amargo.

Fluye del tronco del *Bursera gummifera*, L., arbol de las Antillas (hexandria monogynia, L.; terebintináceas, J.).

Es escitante.

REINA DE LOS PRADOS.

Ulmaria; Spiræa Ulmaria, L.

Geisbartwurzel, Al.; reine des pres, F.; queen of the meadows, In.; regina degli prati, I.; rainha dos prados, Por.

br. e. f. g. w. *be. m. sp.*

Planta bienal de Europa (icosandria pentagynia, L.; rosaceas J.).

Se usa la raiz, las hojas y las flores.

La raiz (*Radix barbæ caprinæ*, s. *Barbulæ caprinæ*, s *Ulmariæ*, s. *Reginæ pratensis*) es cilíndrica, desigual, con muchas raicillas, de un color moreno negruzco por fuera y rojizo ó amarillento por dentro, y de sabor un poco amargo y estíptico.

Las hojas son almenadas, con un impar trilobado, y hojuelas alternativamente grandes y pequeñas.

Las flores son blancas. Tienen un olor débil, pero agradable, de almendras amargas, que pierden por la desecacion. Su sabor es dulce y un poco astringente.

RICINO.

Alcherba, Avanacu, Carapat, Catapucia mayor, Cerua ó Kerua, Cherva, Cici, Higuera infernal, Mugera, Palmacristi, Ricino vulgar; Ricinus communis, L.

Wunderbaum, Al.; ricin, F.; palma Christi, In.; ricino, I.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Planta anua del Mediodia de Europa y del Norte de Africa (monoecia monadelfia, L.; euforbiaceas J.).

Se usa la simiente (*semen Ricini*) que es oval y aplastada por las dos caras. Bajo de una película delgada, reluciente, quebradiza, jaspeada de gris y blanco, cuyo cordon umbilical es amarillento y prominente, encierra una almendra blanca y oleaginosa.

ACEITE DE RICINO.

Oleum ricini, s. *palmæ Christi.*

1.° Como se encuentra en el comercio. (d. du. ed. he. lo. o. po. pr. *sa.*)

2.° Preparado espresamente. (a. am. ams. an. b. be. d. e. f. fe. fi. fu. g. li. lo. p. r. s. su. wu. *br. c. sw. vm.*)

R. Simientes de ricino, maduras y separadas de la película y del embrion, ... c. s. q.

Macháquense en un mortero de mármol con mano de madera, échese la pasta en un lienzo tupido, esprímase gradualmente y fíltrese el aceite al calor del B. M.

Figuier ha aconsejado se machaquen las simientes con el alcohol del comercio, que se someta la masa á la prensa, que se destile el aceite que pase para estraer los dos tercios del vehículo alcohólico, y que se hierva en seguida el residuo hasta que se consuma la humedad. (f.*)

Este procedimiento es malo.

Henry aconseja se tuesten las simientes en una paila de hierro, que se machaquen despues de frias, que se diluya la pasta en cierta cantidad de agua, que se ponga al fuego meneando sin cesar hasta que hierva, que se separe entonces toda la materia hinchada del aceite que sobrenada, que se caliente aparte para evaporar el agua, y cuando el aceite esté separado que se deje reposar y que se decante. (f.*)

El aceite de ricino es acre muchas veces, cuya propiedad le ha sido atribuida ya á la película y ya al embrion de las simientes. Lecanu y Bussy han reconocido que sometiendo el aceite á

la destilacion da dos ácidos, el *Ricínico* y el *Oleo-ricínico*, los cuales se forman igualmente lo mismo que otro tercero, llamado *Stearo-ricínico*, por la reaccion de los álcalis; y que los dos primeros existen formados del todo en los aceites rancios lo que les hace volver acres.

El aceite de ricino es un purgante suave, cuando está fresco, usado con frecuencia como antielmíntico. — Dósis; de dos drac. á tres onz. en caldo, ó una cuch. de hora en hora hasta que haya producido el efecto.

EMULSION PURGANTE.
(f. *au. b. ca. e. pie. sm. vm.*)

R. Aceite de ricino, . . . una onz.
Tritúrese con yema de huevo y una almendra amarga, y disuélvase en
Caldo de carne, . . . tres onz.
Para tomarla al instante. *(b.)*

R. Aceite de ricino,
Emulsion de almendras amargas y
Caldo de carne, a. . . dos onz.
Para tomar á cuch. *(b.)*

R. Aceite de ricino, ... dos onz.
——— de almendras dulces,
onz. y med.
Emulsion gomosa, . cuatro onz.
Para tomar poco á poco. *(b.)*

R. Aceite de ricino, . . . tres onz.
Mucílago de goma arábiga,
dos drac.
Agua de menta, . . . ocho onz.
Dósis; dos cuch. de media en media hora. *(au.)*

R. Aceite de ricino, . . . una onz.
Goma arábiga, ... una drac.
Jarabe de malvavisco, med. onz.
Agua de flores de sahuco,
onz y med.
Eter nítrico, ... una drac.
Láudano de Sydenham, un escrp.
Dósis; una cuch. de hora en hora. *(au.)*

R. Aceite de ricino, . . onz. y med.
Goma arábiga, ... dos drac.
Azúcar blanca, ... una drac.
Agua de menta, . . . cuatro onz.
Tintura de opio,
cuarenta y cinco got.
Dósis; una cuch. cada dos horas. *(e.)*

R. Aceite de ricino, . . . tres onz.
Yemas de huevo, ... n.º 1.
Jarabe de altea, ... dos onz.
Agua, ... diez onz.
Dósis; dos cuch. cada med. hora *(au.)*

R. Aceite de ricino, ... tres onz.
Azúcar blanca, . . . med. onz.
Yemas de huevo, ... n. 1.
Agua de rosas, ... diez onz.
Dósis; dos cuch. cada med. hora. *(au.)*

R. Aceite de ricino, ... dos onz.
Yemas de huevo, ... n.º 1.
Jarabe de altea, ... una onz.
Tritúrense juntos y añádase poco á poco
Agua pura, ... ocho onz.
——— de canela ordeada,
dos drac.
Méz. ex. (*sm.*)

f. prescribe una onz. de aceite, media yema de huevo, dos onz. de agua pura, media onz. de agua de flores de naranjo, y otro tanto de jarabe comun; — *ca.* una onz. de aceite, dos de agua pura, c. s. de yema de huevo, media onz. de jarabe de achicorias compuesto, y otro tanto de agua de

flores de naranjo; — y *vm.* dos partes de aceite, una de yema de huevo, otra de jarabe comun, una de agua de flores de naranjo y cuatro de agua pura.

R. Aceite de ricino, . . . una onz.
Yemas de huevo, ... n.º 1.
Agua de hisopo, . . . ocho onz.
Magnesia blanca y
Maná, a. . . . . dos onz.
Hágase emulsion. *(pie.)*

POCION PURGANTE.

Mixtura laxante; Haustus catharticus oleosus. (au. b. bo. fp. ra. sw.)

R. Aceite de ricino, . . . dos onz.
Jarabe de limon, . . . una onz.
Méz. *(ra.)*

ra. indica tambien partes iguales de aceite y de jarabe de achicorias; — y *bo.* partes iguales de aceite y de jarabe de flores de melocoton.

R. Aceite de ricino, una ó dos onz.
Jarabe comun, ... una onz.
Goma arábiga, ... dos drac.
Agua pura, ... cuatro onz.
Hágase una pocion. *(ra.)*

R. Aceite de ricino, una ó dos onz.
Jarabe tartárico, . . . una onz.
Agua de achicorias . . . dos onz.
Méz. *(ra.)*

ra. indica tambien dos onz. de aceite, otro tanto de jarabe de espino serval y una onz. de agua de menta; ó dos onz. de aceite, otro tanto de jarabe de achicorias y dos drac. de agua de menta; ó seis drac. de aceite, media onza de ogimiel escilítico y una onza de jarabe de espino serval.

R. Aceite de ricino, . . . una onz.
Aguardiente y
Azucar, a. . . . . med. onz.
Méz. *(sw.)*

R. Aceite de ricino, . . . dos onz.
Caldo de carne, . . . tres onz.
Para tomar de una vez. *(b.)*

R. Aceite de ricino, . . . una onz.
Caldo de verduras, . cuatro onz.
Méz. *(sp.)*

R. Aceite de ricino, . . . tres onz.
Jabon medicinal, . . . med. onz.
Jarabe de corteza de naranja, tres onz.
Dósis; una cuch. cada media hora. *(au.)*

R. Aceite de ricino, . . . tres onz.
Sub-carbonato de potasa, una drac.
Miel, ... una onz.
Agua de tilo, ... diez onz.
Dósis; dos cuch. cada dos horas. *(au.)*

POCION ANTIELMINTICA.

Potio anthelmintica oleoso-aromatica. (b.)

R. Aceite de ricino y
Agua de menta piperita, a. . . . . dos onz.
Para tomar en una sola vez.

LAVATIVA VERMIFUGA.

Clysma emoliens anthelminticum. (b.)

R. Aceite de ricino, . . . tres onz.
Cocimiento de simiente de lino; cuatro onz.

ROCELLA FARMACEUTICA.

Orchilla.

Pasta tintorial sólida, de color rojo violeta muy subido y de olor fuerte y desagradable.

Se prepara con el *Rocella tinctoria*, Cand., criptógamo que crece sobre las rocas de las Canarias, Cabo Verde y el Archipiélago. Tambien la dá la *Variolaria orcina*; pero de inferior calidad.

RODODENDRO.

Rhododendrum chrysanthum, L.

Sibirische, Schneerose, Al.; rosage, F.; yellom flower'd rhododendron, In.

ed. fe. han. po. pr. r. s. w. wu. *c. m.*

Planta de los Alpes y de la Siberia (decandria monogynia, L.; rhodoraceas, J.).

Se usan los tallos y las hojas (*stipites et folia rhododendri chrysanthi*) que se componen de ramos del grueso de las plumas de ganso, largos, morenos, y de hojas oblongas, ásperas, lampiñas, y con pedúnculo corto.

Escitante, narcótica, sudorífica y diurética.

CONSERVA DE RODODENDRO.

Conserva Rhododendri chrysanthi. (*sv.*)

R. Hojas frescas de rododendro, una pt.
Azucar blanca, ... dos pt.
Tritúrense juntos, y hágase una pasta homogénea.

POLVOS ANTIARTRÍTICOS. (*ca.*)

R. Polvos de regaliz, . . dos drac.
——— de rododendro de flores blancas, ... diez gr.
Méz. y divídase en diez papeles, de los que se toma uno por mañana y tarde, aumentando uno cada dia hasta que el enfermo esperimente una diaforesis abundante.

INFUSION DE RODODENDRO DE FLORES BLANCAS.

Infusum rhododendri chrysanti. (*b.* au.*)

R. Hojas de rododendro de flores blancas, . de dos drac. á med. onz.
Agua de fuente, . . . diez onz.
Déjense en digestion por veinte y cuatro horas en vasija tapada y cuélese. (*b.**

R. Hojas de rododendro, . med onz.
Agua hirviendo, . . . ocho onz.
Déjense en infusion y añádanse al líquido colado
Tintura aromática, . . dos drac.
Méz. (*au.*)

Aconsejada por Koelpin en el reumatismo crónico. — Dósis; media taza dos ó tres veces al dia.

TINTURA DE RODODENDRO DE FLORES BLANCAS.

Tinctura rhododendri chrysanti. (b.*)

R. Hojas de rododendro de flores blancas, ... dos onz.
Aguardiente de Francia y
Vino de España, . . . med. lib.
Déjense en digestion por quince dias.

Escitante, un poco aromático y reputado por diurético. — Dósis; cinco cuch. en el cocimiento del residuo de la tintura con una lib. de agua.

ROMAZA.

Tres plantas de este nombre se citan en las farmacopeas:

1.ª *Acedera acuática, Romaza acuática; Rumex aquaticus*, L.

Waserampfer, Wasermaugold, Al.; patience d'eau, F.; waterdock, In.; labaca major, Por.

am. ams. b. be. br. du. f. fu. li. r. s. w. *be. c. m. sp.*

Planta bienal que se cria en los lugares pantanosos de toda la Europa (exandria trigynia, L.; polygonas, J.).

Se usa la raiz (*radix Lapathi aquaticis*, s. *Herbæ britannicæ*, s. *Hydrolapathi*, s. *Rhapontici*) que es grande, ramosa, ensortijada, de un moreno negruzco por fuera, azafranada por dentro é inodora. Su sabor es austero y amarescente.

Es tónica y diaforética muy usada en las enfermedades de la piel.

2.ª *Romaza crespa; Rumes crispus*, L.

Krauser ampfer, Al.; patience frise, F.

f. *c.*

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba (*Herba Lapathi crispi*) que se compone de un tallo cilíndrico, poco ramoso, guarnecido de hojas lanceoladas, muy ondeadas y como rizadas por los bordes. Tiene un sabor ligeramente estíptico.

3.ª *Romaza de color de sangre; Rumex sanguineus*, L.

Blutampfer, Blutkraut, Al.; patience rouge, F.; bloody dock, In.

f.

Planta bienal del Norte de América y de Europa.

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz (*radix Lapathi sanguinei*) tiene un sabor áspero y astringente.

La yerba se compone de un tallo ramoso, purpúreo, y de hojas cordiformes, lanceoladas, finamente dentadas y purpúreas.

ESTRACTO DE ROMAZA.

Extractum patientiæ. (f. *vm.*)

R. Raiz de romaza partida, . . c. s. q.

Echese encima bastante cantidad de agua para sumergirla, déjese en maceracion por doce horas, duplíquese entonces la cantidad de agua y prolónguese la maceracion por igual espacio de tiempo, cuélense y clarifíquense los líquidos reunidos y evapórense hasta la consistencia de estracto. (*vm.*)

R. Raiz de romaza, ... una lib.
Agua fria, ... cuatro lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas meneándolo de cuando en cuando y cuélese; déjese en maceracion el residuo del mismo modo con nueva agua y cuélese tambien; mézclense los dos líquidos y evapórense al B. M. hasta la consistencia de estracto. (f.)

Dósis; de uno á tres escrp.

COCIMIENTO DE ROMAZA.

Decoctum lapathi. (b.* ff. *ra. sp.*)

R. Raiz de romaza, . . . una onz.
Agua, ... dos lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion. (b.* *ra.*)

R. Raiz de romaza, . . . seis drac.
Agua, ... c. s.

para obtener dos lib. de líquido colado

despues de la coccion y añádase á lo último

Raiz de regaliz raspado, dos drac.

Déjese en infusion por algunos minutos y cuélese (b.* ff.)

R. Raiz de romaza, ... dos onz.
——de énula y
Enebro, a. . . . . med. onz.
Agua, ... seis lib.

Consúmase media lib. por la ebulicion, y añádase á lo último

Yerba de fumaria partida, un puñ.

Cuélese (*sp.*).

Escitante ligero, considerado como depurativo, y usado en las enfermedades de la piel.—Dósis; muchos vasos al dia.

ROMERO.

Romero silvestre; Ledum palustre, L.

Heydebienenkraut, Al.; romarin sauvage, F.; mars ledum, In.; ledo, I.

a. br. d. f. fe. fi. ham. han. li. o. po. pr. r. s. su. w. *be. m. sp.*

Planta bienal del Norte de Europa (decandria monogynia, L.; rhodoraceas J.).

Se usan las sumidades (*herba*, s. *folia Ledi palustris cum floribus*, s. *Rorismarini sylvestris*, s. *Anthos sylvestris*) que se componen de ramos vellosos, rojizos, con hojas lineales, casi sentadas, replegadas por los bordes, verdes por encima, felposas y rojizas por debajo, y terminadas por dos ombelas sentadas de flores blancas: su sabor es amargo y estíptico.

Esta planta, reputada por narcótica, ha sido preconizada en las enfermedades convulsivas y espasmódicas.

INFUSION DE ROMERO SILVESTRE.

Infusum ledi, s. *ledi palustris.* (b.* *sw. sy.*)

R. Hojas de romero silvestre,
de med. á una onz.
Agua hirviendo, ... una lib.

Déjense en infusion por una hora y cuélese.

Aconsejada en la lepra, la sarna, la tiña, la coqueluche y en las enfermedades venéreas.—Dósis; de media á una lib. dos veces al dia.

ROMERO OFICINAL.

Romero, Romero oficinal, Rosmarino; Rosmarinus officinalis, L.

Rosmarin, Al.; romarin, F.; rosemary, In.; rosmarino, I.; alecrim, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Planta del mediodia de Europa (diandria monogynia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba florida (*herba et flores Anthos*, s. *Rosmarini*, s. *Rorismarini hortensis*) que se compone de ramos lampiños, largos, cenicientos, que tienen hojillas sentadas, opuestas, un poco duras, estrechas, lineales, verdes por encima y blanquecinas por debajo, dobladas por los bordes y con flores de color azul pálido dispuestas en pequeños racimos apiñados, axilares y opuestos. Tienen un olor muy penetrante y agradable, y un sabor aromático, alcanforado y un poco acre.

Es escitante al interior y resolutivo al esterior,

Dósis del polvo; de diez gr. á dos escrp.

CONSERVA DE ROMERO.

Conserva anthos. (ams. b. be. sa. w. *ca.*)

R. Flores machacadas, . . . una pt.
Azucar blanca, ... tres pt.
Méz. (ams.)

b. be. y w. prescriben una pt. de flores y dos de azucar blanca; — sa. una pt. de flores y tres de azucar pluma; — y *ca.* una pt. de flores en polvo, cuatro de azucar y c. s. de agua.

POLVOS AROMATICOS. (*ra.*)

R. Polvos de romero,
——— de salvia y
——— de tomillo, a. cuatro onz.
Sal amoniaco y
Alcanfor, a. . . . . veinte gr.

Dupuytren los usa al esterior en la gangrena comun ó en la de hospital para reemplazar la quina.

ESPECIES AROMATICAS. (fu.)

R. Raiz de lirio de Florencia,
——— de cedoaria,
Yerba de melisa,
——— de romero,
——— de serpol y
Flores de espliego, a. . seis drac.
Clavos de especia,
Nuez moscada y
Canela, a. . . . . dos drac.

Son resolutivas, nervinas y fortificantes, que sirven para aplicarlas en un saquito.

ESPECIES DIANTHOS. (w.)

R. Raiz de regaliz, ... seis drac.
——— de gengibre,
Raiz de cedoaria,
——— de galanga,
Leño de aloes,
Canela,
Clavos de especia,
Cardamomo menor,
Macías,
Nuez moscada y
Nardo de Indias, a. cuatro escrp.
Flores de romero, . . . una onz.
——— de rosas y
——— de violetas, a. . seis drac.
Simiente de anís y
——— de hinojo, a. cuatro escrp.

Háganse polvos. — Dósis; de med. á una drac. — Cefálicas, estomacales y carminativas.

ESTRACTO DE ROMERO.

Extractum rorismarini. (wu.)

R. Sumidades floridas de romero y
Alcohol, a. . . . . una lib.
Agua comun, ... ocho lib.

Déjense en digestion por tres dias á una temperatura suave; cuélese por espresion; déjese reposar y decántese el líquido; estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese el residuo hasta la consistencia conveniente.

INFUSION DE ROMERO. (ff.)

R. Sumidades floridas de romero y
Regaliz raspado, a. dos drac. y med.
Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener dos lib. de líquido colado.

Dósis; de una á dos onz.

MIEL DE ROMERO.

Mel rorismarini, s. *anthosatum.* (fu. pa. sa. w. *sp.*)

R. Hojas frescas de romero, ocho onz.

Agua de fuente, . . cuatro onz.
Miel despumada caliente, dos lib.
Déjense en digestion por diez ó doce dias en un sitio caliente; hiérvase despues al B. M. y cuélese por espresion. (pa. w.)

sa. prescribe se dejen en digestion y despues se hiervan juntos al B. M. cuatro lib. de miel y dos lib. de flores; — *sp.* que se dejen en digestion por algunos dias ocho onz. de yerba seca de romero en veinte y cuatro onz. de miel despumada; — y fu. que se mezcle una pt. de infusion de romero con cuatro de miel despumada.

Escitante, cefálica, anticólica, carminativa y uterina. — Se puede tambien añadir á las lavativas.

BAÑO AROMATICO. (*ca.*)

R. Romero,
Tomillo,
Salvia,
Orégano y
Menta, a. . . . . med. lib.
Agua, ... c. s.
Añádase al cocimiento
Esencia de jabon, . . cuatro onz.
Sal amoniaco, ... dos onz.

VINAGRE DE ROMERO.

Acetum rorismarini. (f.)

R. Flores de romero, . . . una pt.
Vinagre blanco, . . diez y seis pt.
Déjense en maceracion por quince dias en vasija tapada meneándolo de cuando en cuando, cuélese y fíltrese.

VINAGRE AROMATICO.

Acetum, s. *Acidum aceticum aromaticum*, s. *odoratum*. (d. ed. f.** fe. han. o. po. pr. su. w. *c. hp. sp.*)

R. Sumidades de romero y
Hojas de salvia, á. . . . una lib.
Flores de espliego, . onz. y med.
Clavos de especia, . . med. drac.
Vinagre, ... dos lib.
Déjense en maceracion por ocho dias y fíltrese. (ed. *c.*)

f.** p. su. y *sw.* prescriben cuatro onz. de romero, otro tanto de salvia, dos onz. de espliego, dos drac. de clavos y ocho lib. de vinagre.

R. Yerba de agenjos,
——— de romero,
——— de salvia y
——— de menta piperita,
a. . . . . dos onz.
Canela, ... med. onz.
Clavos de especia y
Nuez moscada, a. . . . dos drac.
Vinagre, ... ocho lib.
Hágase digerir al B. A. tibio, cuélese por espresion y fíltrese. (d. o.)

R. Raiz de cedoaria y
Clavos de especia, a. . med. onz.
Yerba de agenjos,
——— de romero,
——— de salvia y
——— de menta piperita,
a. . . . . dos onz.
Vinagre, ... ocho lib.
Déjense en maceracion lo suficiente, cuélese por espresion y añádase al líquido
Espíritu de romero, . cuatro onz.
Mézclese. ex. (han. po. pr. *hp.*)

R. Raiz de juncia redonda,
——— de galanga menor y

Raiz de cedoaria, a. . med. onz.
Yerba de romero,
—— de salvia,
Flores de espliego,
—— de lirio de los valles y
—— de rosas rojas, a. tres drac.
Leño de Rodas,
Canela,
Clavos de especia y
Corteza fresca de limon,
a. . . . . dos drac.
Vinagre, ... dos lib.
Déjense en digestion por tres dias y filtrese. (w. *sp.*)

R. Raiz de cedoaria y
—— de galanga, a. . med onz.
Yerba de romero,
—— de ruda,
—— de maro y
Flores de espliego, a. . dos drac.
Corteza fresca de limon,
Clavos de especia,
Pimienta de cubebas y
Cardamomo menor, a. . med. onz.
Vinagre, ... cuarenta onz.
—— de lirio de los valles y
—— de claveles, a. . . . dos onz.
Macérese y cuélese (*sp.*)

R. Sumidades de romero,
———— de agenjos,
———— de salvia y
———— de ruda, a. onz. y med.
Cálamo aromático
Canela y
Clavos, a. . . . . dos drac.
Vinagre, ... seis lib.
Déjense en infusion por ocho dias, esprímase y añádase al líquido colado
Alcanfor, ... una onz.
Se puede añadir tambien dos drac. de ajos. (fe.)

Esta última fórmula forma una preparacion que se parece todavia mas que las precedentes al vinagre de los cuatro ladrones.

ESENCIA DE ROMERO.

Essentiæ rorismarini. (br.)

R. Sumidades floridas de romero,
onz. y med.
Espíritu de romero, . . seis onz,
Déjense en digestion lo suficiente, esprímase y filtrese.
Escitante.

FOMENTO AROMATICO.

Fomentum aromaticum. (*au.*)

R. Yerba de romero, . . med onz.
Vino tinto y
Agua, a. . . . . tres onz.
Infúndase y esprímase.

ACEITE DE ROMERO POR INFUSION.

Oleum rorismarini (e.).

R. Flores de romero, . . . tres lib.
Aceite comun, ... ocho lib.
Déjense en digestion por tres ó cuatro dias, cuézase despues hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion.

ACEITE ESENCIAL DE ROMERO.

Oleum anthos œthereum, Ætheroleum anthos, s. *rorismarini.* (a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fu. g. han. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. wu. *br. c. sw.*)

R. Flores de romero, ... c. s. q.
Agua, ... c. s.

Destílese. (am. ams. b. be. du. ed. fe. g. lo. r. su. *br. c.*)

an. prescribe tres partes de flores y siete de agua; — f. cinco de flores y diez de agua; — fu. y li. una de flores y tres de agua; — *sw.* una de flores y cuatro de agua; — d. una de flores y seis de agua; — han. o. po. pr. y s. una de flores y ocho de agua; — ba. una de flores y nueve de agua; — a. una de flores y doce de agua.

R. Yerba florida de romero, veinte y cinco pt.
Agua, ... setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.
Déjense en maceracion por tres dias y destílese. (br. pr. sa.)

R. Yerba de romero, . . . c. s. q.
Agua destilada de romero, . c. s.
Destílese. (wu.)
Dósis; de dos á cinco gotas.

BALSAMO NERVAL.

Bálsamo cefálico, Bálsamo Sajon, Linimento estomacal, Bálsamo aromático ó apopléctico; Balsamum apoplecticum, s. *aromaticum,* s. *cephalicum Saxonicum,* s. *nervinum,* s. *Scherzeri,* s. *stomachicum, Linimentum aromaticum stimulans, Unguentum aromaticum,* s. *nervinum.* (b.* br. d. f. fi. fu. han. he. li. pa. s. su. w. wu. *ca. pid. sp. sw. vm.*)

1.° *Con bálsamo del Perú.*

R. Aceite de nuez moscada por espresion, ... una onz.
—— esencial de romero y
———— de clavos,
a. . . . . una drac.
———— de succino, ... med. drac.
Bálsamo del Perú, . . una drac.
Méz. por trituracion. (li.)

pid. prescribe una onz. de aceite de nuez moscada, una drac. de aceite de clavo, otra del de espliego, un escrp. de aceite de succino y una drac. de bálsamo; — s. una onz. de aceite de nuez moscada, una drac. del de clavo, otra del de romero, un escrp. del de succino y drac. y med. de bálsamo; — he. una onz. de aceite de nuez moscada, una drac. del de clavo, otra del de menta piperita, un escrp. del de succino y drac. y med. de bálsamo; — *vm.* tres onz. de aceite de nuez moscada, med. onz. del de clavo, otra med. del de espliego, otro tanto del de succino y dos drac. de bálsamo; — *sw.* tres drac. de aceite de nuez moscada, un escrp. del de clavo, otro tanto del de succino y drac. y media de bálsamo; ó una onz. de aceite de nuez moscada, una drac. del de clavo, otro tanto del de espliego, un escrp. del de succino y drac. y med. de bálsamo; — d. una onz. de aceite de nuez moscada, med. drac. del de clavo, otro tanto del de espliego, lo mismo del de romero, med. escrp. del de succino y una drac. de bálsamo.

R. Aceite de nuez moscada, tres pt.
—— esencial de clavo,
———— de benjuí y
Bálsamo del Perú, a. . una pt.
Méz. ex. (b.*)

R. Aceite de nuez moscada, una onz.
—— esencial de agenjos,
———— de corteza de naranja
———— de clavos,
———— de macías y

Aceite esencial de menta,
a. . . . . med. drac.
Bálsamo del Perú, . . una drac.
Méz. (pa. w.)

han. trae la misma fórmula, pero suprime el aceite de corteza de naranja.

R. Aceite de nuez moscada, una onz.
—— esencial de romero,
———— de espliego y
———— de clavo,
a. . . . . med. drac.
———— de succino y
Almizcle triturado con alcohol,
a. . . . . med. escrp.
Bálsamo del Perú, . . una drac.
Méz. (br.)

R. Aceite de nuez moscada,
tres onz. y med.
—— de jazmin,
—— de canela y
—— de leño de Rodas,
a. . . . . drac. y med.
—— de espliego,
—— de mejorana y
—— de clavo, a. . . una drac.
—— de ruda y
—— de succino, a. . . un escrp.
Almizcle y
Ambar gris, a. . . diez y seis gr.
Algalia, ... med. escrp.
Bálsamo del Perú, . . dos escrp.
Marfil quemado, ... c. s.
Méz. (w. *sp.*)

pa. prescribe una onz. de aceite de nuez moscada, un escrp. del de romero, otro tanto del de clavo, igual cantidad del de canela, med. escrp. del de espliego, otro tanto del de leño de Rodas, lo mismo del de mejorana, igual cantidad del de ruda y del de succino, drac. y med. de bálsamo y c. s. de hollin de succino.

R. Aceite de palma,
—— de nuez moscada,
Médula de ciervo y
—— de caña de vaca,
a. . . . . cuatro onz.
Grasa de hombre,
—— de tejon y
—— de víbora, a. . . una onz.
Lícuense á un calor suave y añádase
Aceite esencial de espliego,
———— de menta,
———— de romero,
———— de salvia,
———— de tomillo y
———— de clavos,
a. una drac.
Alcanfor, ... dos drac.
Bálsamo del Perú, . . una onz.
Méz. (*sp.*)

R. Médula de vaca y
Aceite de nuez moscada,
a. . . . . cuatro onz.
Licuense juntos; échese en un frasco de cuello largo y añádase
Aceite esencial de romero,
dos drac.
———— de clavos y
Alcanfor, a. . . . . una drac.
Bálsamo del Perú, disuelto en med. onz. de alcohol (36.°),
dos drac.
Lícuese todo al B. M. (f. *ca.*)

2.° *Sin bálsamo del Perú.*

R. Aceite de nuez moscada,
una onz.
Cera amarilla, ... dos drac.
Lícuense suavemente y añádase

Aceite esencial de clavo y
———— de espliego,
a. . . . . dos drac.
———— de succino,
med. escrp.

Méz. (fi. su.)

R. Sebo de carnero, ... dos lib.
Aceite de manzanilla por decoccion y
———— de romero por coccion,
a. . . . . cuatro onz.

Lícuense y añádase al retirarlo del fuego

Aceite esencial de romero,
dos onz.

Méz. ex. (wu.)

R. Aceite de nuez moscada, una onz.
———— de succino y
———— de clavo, a. . med. drac.
———— de espliego y
———— de enebro, a. una drac.

Méz. en frio. (fu.)

R. Aceite de nuez moscada,
ciento veinte pt.
———— de espliego y
———— de succino, a. cuatro pt.
———— de romero, . . seis pt.
———— de mejorana y
———— de menta piperita,
a. . . . . tres pt.
———— de macías, . . . dos pt.

Tritúrense juntos. (b.*)

ca. prescribe treinta y tres drac. de aceite de nuez moscada, drac. y med. del de espliego, otro tanto del de succino, una drac. del de orégano, otra del de salvia, otra del de mejorana, y otra del de romero, dos escrp. del de ruda, otro tanto del de macías, é igual cantidad del de menta; —— *sp.* onza y med. de aceite de nuez moscada, dos drac. del de mejorana, otro tanto del de espliego, otro tanto del de romero, lo mismo del de succino, igual cantidad del de serpol, un escrp. del de ruda, otro tanto del de poleo, otro tanto del de melisa, lo mismo del de menta y otro tanto del de cardamomo; —— br. dos onz. y med. de aceite de nuez moscada, med. onz. del de menta, una drac. de cada uno de los de corteza de naranja, de clavos y de macías, med. drac. de cada uno de los de romero, espliego, agenjos, cominos y eneldo, una pequeña cantidad de aceite rosado, y med. onz. de cera blanca; —— y w. un escrp. de cada uno de los aceites de espliego y succino, quince gr. de los de poleo, mejorana, salvia, romero y agedrea, med. escrp. de los de ruda y macías, doce got. del de menta y del de orégano, y una onz. del de nuez moscada.

R. Aceite de nuez moscada, una onz.
———— de succino, . med. drac.
———— de rosas y
———— de canela, a. . un escrp.
———— de espliego y
———— de mejorana,
a. . . . . quince got.
———— de ruda y
———— de benjuí, a. med. escrp.
———— de clavos y
———— de corteza de cidra,
a. . . . . cuatro got.
Ambar gris, ... drac. y med.
Algalia, ... cuatro escrp.
Almizcle, ... una drac.

Méz. ex. (*sw.*)

Todas estas preparaciones que son muy semejantes las unas á las otras, á pesar de los nombres diferentes con

que se les designa, no se diferencian esencialmente del bálsamo de vida de Hoffmann, mas que por la falta del alcohol. Se usan con particularidad al esterior en fricciones al bajo-vientre en el cólico ventoso, la diarrea pertinaz, y dolores de tripas de los niños; en las sienes, en la cefalalgia; en las manos puestas delante de los ojos, en la debilidad de la vista y en las oftalmias purulentas, y sobre los miembros en los niños débiles. Tambien se hacen tomar algunas gotas con azucar en la dispepsia.

BALSAMO DE VIDA DE HOFFMANN.

Balsamum vitæ Hoffmanni, s. *ad modum Hoffmann*, *Mixtura oleoso-balsámica*, s. *succinea*, *Liquor balsamico-aromaticus*, *Tinctura succini aromatica*. (b.* br. d. o. pr. s. su. w. *au. bo. ca. sp. sw. vm.*)

R. Aceite de romero, . . med. onz.
——— de succino rectificado, dos drac.
Alcohol, ... una lib.
Méz. (pr.)

R. Hojas secas de mejorana
——— de ruda y
Flores secas de espliego, a. una onz.
Corteza fresca de cidra, med. onz.
Cardamomo menor,
Clavos de especia y
Macias, a. . . . . tres drac.
Aguardiente, . treinta y dos onz.
Agua, ... sesenta y cuatro onz.

Estraígase por la destilacion diez y ocho onz. de líquido y disuélvase en el producto
Bálsamo del Perú, . drac y med.
Aceite rectificado de succino, med. drac.

Consérvese. (*vm.*)

R. Aceite esencial de espliego
——— de mejorana,
——— de clavos,
——— de macias,
——— de canela y
——— de cidra,
a. . . . . un escrup.
——— de ruda, diez got.
Bálsamo del Perú, . med. drac.
Alcohol concentrado, . . diez onz.

Déjense en digestion fria, y filtrese por un lienzo. (b.* o. pr.)

s. prescribe una parte de aceite de espliego, otra del de mejorana, otra de aceite de clavo, otra del de macias, otro tanto del de canela y del de cidra, med. parte del de ruda, otra med. del de succino rectificado, parte y media de bálsamo del Perú, doscientas cuarenta partes de alcohol concentrado y cuatro dias de infusion fria; — d. un escrup. de espliego, otro del de clavo, lo mismo del de macias, igual cantidad del de canela, diez got. del de succino rectificado, med. drac. de bálsamo del Perú, diez onz. de alcohol concentrado y un poco de raiz de ancusa para dar calor á la tintura; — y *bo.* diez got. de aceite de canela, otro tanto del de espliego, otro tanto del de clavos; lo mismo del de cidra, igual cantidad del de romero, otro tanto del de succino, veinte gotas de bálsamo del Perú líquido y dos onz. de espíritu de vino rectificado.

R. Bálsamo del Perú
Aceite esencial de espliego,
——— de mejorana,
——— de clavos,

Aceite esencial de cidra,
———— de macias,
———— de canela,
———— de ruda,
———— de succino y
Ambar gris, a. . . . . un escrup.
Méz. ex. y disuélvase en

Alcohol concentrado, . diez onz.
Consérvese. (br. w.)

au. prescribe quince granos de bálsamo del Perú, diez gotas de aceite de espliego, mejorana, clavo, serpol, ruda y succino, y cinco onz. de alcohol; — *sp.* aceites de espliego, de mejorana, de clávos, de cubebas, de cardamomo, de canela y de cidra, de cada uno un escrup.; aceite de macias, dos escrup.; aceite de ruda, de succino, bálsamo del Perú y ambar gris, de cada uno med. escrup.; alcohol veinte onz.; — *ca.* aceites de espliego, de mejorana, de clavos, de macias, de canela y de cidra, de cada uno un escrup.; aceite de ruda, aceite de succino y ambar gris, de cada uno medio escrup.; alcohol, cinco onz.; — b.* y *hp.* aceites de espliego, de romero, de bergamota, de enebro, de trementina, de cada uno med. drac.; alcohol diez onz.; — *sw.* aceites de espliego, de mejorana, de clavo, de macias, de canela, de cidra, de ruda y de succino, de cada uno diez got.; bálsamo del Perú, med. drac.; alcohol, diez onz., y en fin si se quiere quince gr. de ambar gris y diez de almizcle.; — y li. aceites de romero, de mejorana, de clavo, de canela, de ruda y de cidra, de cada uno un escrup.; bálsamo del Perú, med. drac.; ambar gris, diez gr.; almizcle quince gr.; alcohol, diez onz. y cuatro dias de digestion en frio.

R. Aceite de succino rectificado, una pt.
Bálsamo del Perú, . . . tres. pt.
Agua de espliego y
—— de Colonia,
a. . . . . ciento veinte pt.
Disuélvanse y al cabo de algunos dias filtrese. (*vm.*)

R. Aceite esencial de clavo,
—— de canela,
—— de espliego y
—— de nuez moscada
a. . . . . un escrup.
Tintura de succino, . cuatro onz.
Méz. (su.)

Escitante reputado por nervino, cefálico y estomacal; — Dósis; diez á veinte gotas. — Se usa tambien al esterior en fricciones.

Hemos colocado esta preparacion en el artículo romero aunque no contiene mas que su aceite esencial en toda las fórmulas, á fin de no separarla de las precedentes con las que tiene las mas grandes relaciones.

BALSAMO OFTALMICO. (*au.*)

R. Bálsamo de vida de Hoffmann,
una onz.
Amoniaco líquido, . . una drac.
Aceite esencial de manzanilla,
veinte got.
Alcohol concentrado, . med. onz.

Recomendado por Lœbel de Lœbenstein en lociones sobre la frente, los párpados y megillas en la debilidad de la vista.

UNGUENTO DE ROMERO COMPUESTO.

Unguentum rorismarini compositum.
(pp.)

R. Cera amarilla, ... una onz.

Manteca de puerco, . . tres onz.
Líquese y añádase á la mezcla medio fria
Aceite esencial de romero y
Sub-carbonato de amoniaco,
a. . . . . med. onz.
Méz. ex. (pp.)

UNGUENTO AROMATICO.

Unguentum aromaticum. (au.)

R. Ungüento de romero compuesto, dos onz.
Aceite esencial de espliego,
—— de cajeput,
—— de menta y
—— de manzanilla, a. . un escrp.

Util en las enfermedades asténicas y nerviosas, así como en las paralísis.

AGUA DE ROMERO.

Aqua anthos. (a. ams. b. be. wu.)

R. Yerba florida de romero, una pt.
Agua, ... c. s.

Déjese en infusion por veinte y cuatro horas y destílense diez partes. (ams. b. be.)

w. prescribe una parte de yerba y seis de agua; — y a. una parte de yerba, doce de agua y que se destilen cuatro partes.

ESPIRITU DE ROMERO.

Spiritus anthos, s. *rorismarini.* (a. ams. an. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. li. lo. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. sp. sw.*)

R. Yerba florida de romero, una pt.
Alcohol (de 20.°). . . cuatro pt.

Déjense en digestion lo suficiente y destílese un espíritu que señale 28.° (ams. an.)

fu. g. y li. prescriben una parte de flores, seis de alcohol y que se destilen cuatro partes; — *sp.* una parte de flores y tres de alcohol; — du. parte y media de flores, ocho de alcohol y que se destilen cinco partes; — ed. dos partes de flores, ocho de alcohol y que se destilen siete partes; — br. pa. y w. una parte de flores y cuatro de alcohol; — p. dos partes y med. de flores, diez de alcohol y que se destilen cinco partes; — fe. una y med. de flores, ocho de alcohol, y que se destilen seis partes.

R. Flores secas de romero, . una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas, destílese al B. M. casi hasta la sequedad, échese el producto sobre nuevas flores, y vuélvase á destilar. (sa.)

d. prescribe se destilen los dos tercios de una mezcla de una lib. de flores y seis lib. de aguardiente, y que se repita la destilacion con el producto y media lib. de nuevas flores; — wu. que se destilen lib. y med. de flores con diez lib. de alcohol, y que se repita con el producto y tres onz. de flores.

R. Flores de romero, . . . una pt.
Alcohol (0,910), cuatro pt. y med.

Despues de veinte y cuatro horas destílense cuatro partes (0.913). (a.)

am. lo. y *c.* prescriben dos lib. de flores, cuatro azumbres de aguardiente, c. s. de agua para evitar el empireuma y que se destilen cuatro azumbres; — han o. pa. pr. y s. una parte de flo-

res, cuatro de alcohol y c. s. de agua; — *br.* una lib. y dos onz. de flores, ocho lib. de aguardiente y que se destilen las tres cuartas partes; — su. una parte de flores, cuatro de alcohol, dos de agua, y que se destilen dos partes; — y e. una parte de flores, dos de aguardiente y que se destile una parte.

R. Flores de romero, ... doce pt.
Alcohol, ... seis pt.
Agua, ... dos pt.
Destílense suavemente seis partes y échese el producto sobre
Flores frescas de romero, doce pt.
Agua, ... dos pt.
Destílense seis partes. (*sw.*)

R. Yerba florida de romero, doce pt.
Alcohol (22.°), treinta y seis pt.
Agua destilada de romero, doce pt.
Al cabo de cuatro dias, destílense treinta partes. (f.)

r. prescribe media lib. de romero, una lib. de agua de romero, cuatro lib. de alcohol, y que se destilen tres lib.

AGUA DE LA REINA DE HUNGRÍA.

Espiritu aromático, Agua de Hungría, Agua de romero compuesta; Aqua Hungárica, s. *reginæ Hungaricæ*, s. *anthos composita, Alcohol anthos compositum.* (br. d. fe. han. w. *sw. vm.*)

R. Flores de romero, ... una lib.
——— de espliego, . cuatro onz.
Aguardiente, ... seis lib.
Déjense en digestion por doce horas y destílense tres lib. (d.)

R. Flores de romero, ... tres pt.
——— de espliego, ... una pt.
Aguardiente, ... seis pt.
Agua pura, ... doce pt.
Destílense tres cuartas partes. (*sw.*)

vm. prescribe una pt. de espliego, tres de romero, doce de aguardiente, cuarenta de agua y que se destilen ocho pt.

R. Yerba florida de romero,
——— de serpol y
——— de tomillo, a. . . una pt.
Aguardiente, veinte y cuatro pt.
Agua, . . . cuarenta y ocho pt.
Destílense veinte pt. (*vm.*)

R. Yerba florida de romero, cuatro lib.
——— de salvia, . . . seis onz.
Gengibre, ... dos onz.
Aguardiente, ... doce lib.
Agua pura, ... dos lib.
Destílense once lib. (br. han. w.)

vm. prescribe una pt. de gengibre, tres de salvia, veinte y cuatro de romero, ochenta de aguardiente, ciento ochenta de agua y que se destilen sesenta y seis pt.

R. Yerba de romero, . . . dos lib.
——— de salvia, . . . tres onz.
——— de tomillo, . . . seis onz.
Alcohol (24.°), . diez y seis lib.
Déjense en maceracion por dos dias; destílese al B. M. y rectifíquese el producto. (fe.)

ESPIRITU CARMINATIVO.

Spiritus carminativus, Alcohol helenii compositum. (e.)

R. Raiz de énula y
——— de carlina, a. . . . med. onz.
Sumidades de romero y
——— de mejorana,
a. . . . . cuatro onz.
Bayas de laurel,
Hinojo,
Alcaravea y

Anís, a. . . . . una onz.
Pimienta de Tabasco y
Canela, a. . . . . med. onz.
Corteza fresca de naranja,
tres drac.
Aguardiente, ... tres lib.
Déjense en maceracion por dos dias en vasija tapada y destílese al B. M.

AGUA APLOPETICA.

Aqua aplopectica. (pa. w. *sp.*)

R. Yerba florida de salvia, ocho onz.
——— de mejorana y
——— de serpol, a. . . una onz.
Flores de lirio de los valles,
tres onz.
——— de espliego y
——— de romero, a. . . dos onz.
Canela, ... onz. y med.
Cubebas, ... med. onz.
Clavo, ... tres drac.
Macías, ... dos drac.
Vino blanco, ... doce lib.
Déjense en maceracion por tres dias y destílese la mitad. (w.)

R. Raiz de cálamo aromático,
——— de lirio de Florencia y
——— de aristoloquia redonda,
a. . . . . onz. y med.
Yerba de mejorana,
——— de camepíteos,
——— de romero y
Flores de primavera, a. un puñ.
Simientes de siler montano y
——— de hinojo,
a. . . . . drac. y med.
Cubebas,
Nuez moscada y
Clavo, a. . . . . tres drac.
Canela y
Leño de aloes, a. . . . dos drac.
Pimienta larga,
Sagapeno,
Opoponaco,
Mirra y
Sandaraca, a. . . . drac. y med.
Agua de flores de primavera,
——— de tilo y
——— de salvia, a. diez y ocho onz.
Déjense en infusion por ocho dias y destílese. (*sp.*)

R. Flores frescas de lirio de los valles,
——— de espliego,
——— de primavera,
——— de tilo,
——— de betónica y
——— de claveles, a. . una onz.
Yerba de romero,
——— de mejorana,
——— de albahaca,
——— de salvia,
——— de serpol y
——— de maro, a. . onz. y med.
Canela, ... dos onz.
Clavo, ... seis drac.
Nuez moscada, ... una onz.
Cardamomo menor,
Cubebas,
Cedoaria y
Sándalo cetrino, a. . . med. onz.
Alcohol y
Vino generoso, a. . . cinco lib.
Déjense en maceracion por una pt. las yerbas y las flores en el alcohol, y por otra los aromas en el vino; mézclense los dos líquidos; destílense suavemente; consérvese el primer producto, que es claro y trasparente, para el uso interno; y el otro que es blanco y oleaginoso para el uso esterno. (pa. w.)
Dósis; de dos drac. hasta una onz. en el cólico ventoso. Al esterior en fricciones ó fumigaciones.

ROSAL.

Cinco especies de este género se citan en las farmacopeas:

1.º *Rosal de cien hojas, de Holanda; Rosa Centifolia*, L.

Centifolienrose, Al.; rosier à cent feuilles, F.; hundred leav'd rose, In.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Arbusto cultivado en todos los jardines de Europa (icosandria poligynia, L.; rosaceas, J.).

Se usan las flores (*flores Rosarum incarnatarum, s. pallidarum*) que se componen de pétalos ovales, enteros, de un color rosado pálido. Son de un olor muy agradable que desaparece casi enteramente por la desecacion, y de sabor un poco amargo, acre y estíptico.

2.º *Rosa moscada; Rosa moschata*, L.

f.

Arbusto originario del norte de Africa.

Las flores sirven segun Willdenow para preparar la esencia de rosa.

3.º *Rosal blanco; Rosa alba*, L.

br. f. w. *be. m sp. z.*

Arbusto estendido por toda Europa. Sus flores (*flores Rosæ albæ*) son de un olor agradable, y un sabor amarescente y estíptico.

4.º *Rosal encarnado; Rosa Gallica*, L.

Essigrose, Al.; rose rouge, F.; red rose, In.; rosa vermalha, Por.

âms. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. han. he. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. ww. *be. br. c. g. m. sp.*

Arbusto del mediodia de Europa.

Se usan las flores (*flores Rosæ rubræ*) que se componen de pétalos todavia no abiertos y separados de sus uñas.

5.º *Rosal silvestre, Perruno, Zarza perruna; Rosa canina*, L.

Hundsrose, Hahnbuttenstrauch, Al.; rosie sauvage, F.; dogrose, In.; rosa selvatica, I.; rosa brava, Por.

ams an. br. d. e. ed. f. fe. fu. g. lo. w. *be. br. c. pid. sp. z.*

Arbusto que crece en toda la Europa (icosandria polygynia, L.; rosaceas, J.).

Se usan las flores, los frutos y la simiente.

Las flores (*flores Rosæ silvestris, s. rubræ vulgaris*) se componen de pétalos rosados ó casi blancos de un olor agradable. Son un poco laxantes.

Los frutos llamados *Escaramujo* (*fructus Cynosbati, Cynorrhodon*) es una baya oval, lisa, de color escarlata, que se hace secar despues de haber quitado las simientes y las sedas que se le adhieren. Su sabor es un poco estíptico. Pasa por muy diurética y antiespasmódica; pero es mas ciertamente un astringente y un irritante muy enérgico, de cuyo abuso se ocasiona la tos, los vómitos y los pujos.

La simiente (*semina Cynosbati*) es larga, angulosa, dura y bellosa. No se usa en el dia.

Todas estas plantas son mas ó menos astringentes y tónicas.

ZUMO DE ROSAS BLANCAS.

Succum rosarum pallidarum. (e. f. sa.)

R. Pétalos mondados de rosas blancas, ... c. s. q.

Macháquense en mortero de mármol ó de madera, y cuélese esprimiendo con fuerza; fíltrese el zumo y conservese en botellas con una capa de aceite. (e. f.)

sa. recomienda se pongan las flores en un saco, que se sumerja en agua hirviendo, que se mantenga suspendido en ella mientras pase un agua verdosa, y cuando pase roja que se esprima.

CONSERVA DE ROSAS.

Conserva, s. *Confectio rosæ*, s. *rosarum.* (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. **w.** wu. *br. c. ca. pid. sw. vm.*)

R. Pétalos frescos y mondados de rosas, ... una pt.

Macháquense en un mortero de piedra con mano de madera, y añádase poco á poco á la pulpa

Azúcar en polvo, . . . dos pt.

Hágase una masa homogénea. (an. b. ba. be. br. d. e. fu. han. he. o. pa. po. pr. r. s. **w.** wu. *br. vm. sw.*)

am. ams. du. ed. li. lo. y e. prescriben una parte de rosas y tres de azúcar; ——y ff. y su. part. ig. de rosas y azúcar.

R. Pétalos frescos de rosas, quince pt.

Azúcar en polvo, . . . treinta pt.

Tritúrense juntos, cuélese la pulpa por un cedazo de cerda, y añádase

Azúcar blanca cocida hasta la consistencia de electuario y un poco fria, ciento veinte pt.

Méz. ex. (f.)

R. Pétalos frescos, ... una lib.

Macháquense en mortero de vidrio, y añádase poco á poco

Jarabe comun muy espeso, dos lib.

Evapórese la humedad á un fuego lento hasta la consistencia conveniente (e.).

R. Rosas rojas mondadas, una lib.

Pónganse en un saco é introduzcase este por algun tiempo en agua hirviendo, suspéndase el saco hasta que el agua principie á tomar un color rojo, esprímase entonces con fuerza, macháquese el residuo en un mortero y cuézase con tres lib. de azúcar clarificada, añadiendo poco á poco el zumo esprimido hasta la consistencia de conserva. (sa.)

R. Pétalos secos de rosas en polvo, noventa pt.

Agua de rosas, ... c. s. para obtener una especie de pulpa. Déjense en maceracion por seis horas meneándolo con frecuencia; añádanse mil partes de azúcar disuelta en agua de rosas y cocida al punto de pastilla, y mézclese exactamente en un mortero de mármol con mano de madera (f.)

ff. prescribe agua comun, seis horas de digestion á un calor suave, y que se mezcle la pulpa con igual cantidad de azúcar;—p. tres onz. de polvos, ocho de agua de rosas, seis horas de infusion y lib. y med. de azúcar;——*ca.* seis onz. de polvos, c. s. de agua de rosas, y med. lib. de azúcar;——y fe. tres onz. de polvos, ocho de agua de rosas y dos lib. de azúcar.

R. Polvos de pétalos de rosas, tres onz.

Agua de rosas. . . . . ocho onz.

Déjense en maceracion por algunas horas y añádase

Azúcar blanca, . . . lib. y med.
reducida con anticipacion á jarabe espeso con c. s. de agua, y mézclese exactamente (g.).

Dósis; de med. á una drac.

CONSERVA DE ROSAS VITRIOLADA.

Conserva rosarum vitriolata. (br. sa. w.)

R. Conserva de rosas, . . . una lib.
Acido sulfúrico, . . . una drac.
Méz. ex. (br. sa.)

w. prescribe doble cantidad de ácido sulfúrico.

CONSERVA SECA DE ROSAS.

Tabellæ rosatæ, s. *manus Christi*, *Conserva rosarum sicca*, *Saccharum rosatum.* (br. pa. sa. w. *sp.*)

R. Pétalos secos de rosas rojas,
una onz.
Azúcar cocida al punto de caramelo, ... diez y seis onz.
Méz. ex. y háganse pastillas. (w. *sp.*)

br. prescribe se rocien con anticipacion los polvos de rosas con doce gotas de ácido sulfúrico; — y pa. seis drac. de polvos y tres onz. de azucar cocida.

R. Rosas secas, ... una onz.
Azucar blanca al punto de caramelo, ... lib. y med.
Zumo de limon, . . . dos drac.

Pulverícense las rosas; rocíense con el zumo de limon; mézclese todo con la azucar hirviendo y háganse pastillas. (pa.)

Añadiendo á lo último med. onz. de perlas pp., se obtiene la preparacion llamada en otro tiempo *Saccharum perlatum.*

PASTILLAS DE DIARRODON.

Tabellæ diarrhodon (sa.)

R. Polvos diarrodon, . onz. y med.
Azucar blanca, ... una lib.
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.

Háganse pastillas.

PULPA DE CINORRODON.

Pulpa cynorrhodontos. (f.)

R. Escaramujos encarnados aun no bien maduros, diez y seis pt.

Córtese el ombligo y el pezon; quítense las simientes y déjese lo restante en maceracion en dos partes de vino blanco, por tres ó cuatro dias, hasta que se ablande completamente; macháquese en seguida en un mortero de mármol con mano de madera, y cuélese la pulpa por un cedazo de seda tupido.

ARROPE DE CINORRODON.

Conserva de cynorrhodon; Conserva, s. *Confectio*, s. *Rob cynosbatos*, s. *fructus rosæ caninæ.* (b.* ed. f. fu. g. lo. pa. sa. w. *sw. vm.*)

R. Pulpa de cinorrhodon y
Azucar blanca, a. . . . tres lib.

Evapórese á fuego lento hasta la consistencia conveniente. (g. *sw.*)

fu. y pa. prescriben dos lib. de pulpa y una de azucar; — w. tres lib. de pulpa y dos de azucar; — p. y *vm.* una parte de pulpa y dos de azucar; — b.* ed. y sa. una parte de pulpa y tres

de azucar; — lo. una lib. de pulpa y veinte onz. de azucar; — y f. una parte de pulpa y una y media de azucar cocida hasta la consistencia de electuario.

Astringente ligero, diurético, antiespasmódico y estomacal. — Dósis; de cuatro á doce drac.

ELECTUARIO ASTRINGENTE.

Electuarium adstringens Fulleri, *Conserva rosarum rubrarum adstringens.* (e. *b. bo. pie. sm.*)

R. Conserva de rosas rojas, dos onz.
Diascordio, ... med. onz.
Bol arménico, ... dos drac.
Sangre de drago, . drac. y med.
Balaustias, ... med. drac.
Aceite de nuez moscada y
——— de canela, a. . . dos got.
Jarabe de rosas rojas, . una onz.
Méz. (e.)

R. Conserva de rosas rojas,
cuatro onz.
Nitro, ... una drac.
Jarabe diacodion, ... una onz.
Agua de azahar, ... dos drac.
Méz. (*bo. pie. sm.*)

R. Conserva de rosas rojas,
cuatro onz.
Jarabe de granada, . . dos drac.
——— de adormidera blanca,
una onz.
Nitro, ... dos escrp.
Méz. (*sm.*)

En el esputo de sangre. — Dósis; una cuchta. cada dos ó tres horas.

ELECTUARIO TRAUMÁTICO. (br.)

R. Conserva de rosas rojas,
dos onz.
Bálsamo de Locatelli, una onz.
Jarabe balsámico, . med. onz.
Méz.

MISTURA ASTRINGENTE.

Linctus communis. (*sa. sm.*)

R. Aceite comun, . . dos onz. y med.
Conserva de cinorrodon,
med. onz.
Jarabe de adormideras, una onz.
Méz. (*sa.*)

R. Conserva de rosas rojas,
dos onz.
——— de romero,
——— de énula y
Jarabe de karabé, a. . una onz.
Méz. ex. (*sm.*)

Dósis; una cuchta. tres veces al dia. — En la leucorrea inveterada.

TISANA ASTRINGENTE. (*bo. pie. sm.*)

R. Flores de gordolobo, . . un puñ.
Agua, . . . , . . . med. azumb.
Redúzcase á la mitad por la coccion y dilúyase en el líquido colado
Conserva de rosas rojas,
una onz.

Aconsejada por Fouquet contra la disenteria.

INFUSION DE ROSAS.

Infusum, s. *Mucharum*, s. *Brodium rosarum.* (fe. he. li. sa. w. *pid.*)

R. Pétalos frescos de rosas,
dos lib.

Agua hirviendo, . . . ocho lib.

Déjense en digestion por ocho horas; cuélese esprimiendo un poco; échese el líquido colado sobre una cantidad igual de nuevas flores; repítase la operacion por tercera vez, y consérvese el líquido en una botella de cuello largo con una capa de aceite. (sa.)

R. Pétalos frescos de rosas y
Agua hirviendo,
a. . . . . diez y ocho lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas, cuélese y consérvese el líquido en una botella con una capa de aceite comun. (w.)

li. prescribe partes iguales de flores y de agua y tres dias de digestion; — fe. partes iguales de flores y de agua y doce horas de digestion; — y he. y *pid.* una lib. de rosas, dos cuartillos de agua y algunos dias de infusion.

Esta infusion sirve principalmente para la preparacion del jarabe de rosas y la miel rosada.

INFUSION DE ROSAS ACIDULA.

Infusion astringente; Infusum rosæ accidulum, s. *compositum.* (am. b.* du. e. ed. g. lo. su. *br. c. ra.*)

R. Pétalos secos de rosas rojas, med. onz.
Agua hirviendo, . cinco cuartill.
Acido sulfúrico dilatado en agua, tres drac.

Déjense en maceracion por media hora, cuélese y añádase

Azucar blanca, . . onza y med.

Lícuese. (am. b.* lo. su. *c.*)

ed. prescribe una onz. de rosas, dos lib. y med. de agua, med. onz. de ácido, cuatro horas de digestion y una onz. de azucar; — du. med. onz. de rosas, tres lib. de agua, tres drac. de ácido, med. hora de infusion y onz. y med. de azucar; — *br.** una onz. de rosas, cinco lib. de agua, una drac. de ácido sulfúrico, veinte y cuatro horas de infusion y dos onz. de azucar; — e. med. onz. de rosas, tres lib. de agua, un cuarto de hora de infusion, la adicion de un escrp. de ácido y nada de azucar; — *ra.* med. onz. de rosas, una lib. de agua, onz. y med. de azucar y med. drac. de ácido; — y g. med. onz. de rosas, dos lib. y med. de agua, un escrp. de ácido y onz. y med. de azucar.

Es un astringente ligero y acídulo. — Rara vez se prescribe sola esta infusion. Sirve con particularidad para dar color y acidular las bebidas acuosas. Se usa tambien como vehículo de diversos medicamentos; se añade á los gargarismos, y se usa alguna vez en las hemorragias reputadas pasivas, es decir, en las que se creen independientes de toda irritacion.

TÉ HEMASTATICO. (*pie.*)

R. Flores de rosas secas, . med. onz.
Vinagre blanco, . . . tres cuch.
Azucar, ... una onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.

Déjense en infusion por dos horas y cuélese. — Para tomar á tazas en todo el dia. — Contra la diarrea y las hemorragias.

INFUSION ASTRINGENTE. (*bo.*)

R. Rosas rojas y

Los cinco mirabolanos quebrantados, a. . . . . med. onz.
Agua comun, ... una lib.
Déjense en digestion sobre rescoldo, cuélese y añádase al liquido
Jarabe de granada, . . med. onz.
Astringente aconsejado en la diarrea y en las hemorragias. — Se toma en tres ó cuatro veces durante el dia.

JARABE DE ROSAS ROJAS.

Syrupus rosarum rubrarum, s. *rosæ gallicæ*, s. *è rosis siccis*, *Rhodosacharum.* (ams. an. be. e. ed. f. w. *c. vm.*)

R. Zumo depurado de rosas rojas, dos lib.
Azucar blanca, . . . cuatro lib.
Agua, ... c. s.
Cuézase hasta la consistencia de jarabe. (e.)

R. Pétalos frescos de rosas rojas, cuatro lib.
Agua hirviendo, ... ocho lib.
Déjense en infusion por doce horas en vasija tapada; esprímase un poco; déjese en reposo por algunas horas; decántese y añádase al líquido
Azucar blanca, ... el doble.
Hágase jarabe al B. M. (f.)

w. prescribe med. lib. de rosas secas, lib. y med. de agua hirviendo, veinte y cuatro horas de maceracion y diez y seis onz. de azucar por cada nueve onz. de líquido colado; — y an. y be. una lib. de flores, tres de agua, doce horas de digestion y cuatro lib. de azucar.

R. Pétalos frescos de rosas rojas. una pt.
Agua fria, ... tres pt.
—— hirviendo, ... siete pt.
Déjense en infusion por seis horas; cuélese por un cedazo sin esprimir mucho y añádase
Azucar blanca, . . . cuatro pt.
Clarifíquese y hágase jarabe. (*vm.*)

R. Pétalos secos de rosas rojas, una pt.
Agua hirviendo, . . . nueve pt.
Déjense en maceracion por doce horas; hiérvase despues un poco; cuélese y añádase al líquido
Azucar blanca, ... diez pt.
Hágase jarabe. (ed. *c.*)

R. Pétalos de rosas rojas, ocho onz.
Agua hirviendo, cinco lib. y med.
Déjense en digestion por doce horas; redúzcase despues á la mitad por la ebulicion; cuélese por espresion; déjese depurar por el reposo y evapórese despues hasta que añadiendo
Azucar pura, . . diez y seis onz.
se haga el jarabe sin que haya necesidad de cocerle. (ams.)

JARABE DE ROSAS BLANCAS.

Syrupus rosæ, s. *de rosis pallidis*, s. *rosarum pallidarum*, s. *rosatus simplex*, s. *rosarum solutivarum*, s. *rosatus solutivus.* (ams. an. e. ed. f. fe. g. lo. sa. w. *c. vm.*)

R. Zumo esprimido de rosas blancas y
Azúcar blanca, a. . . . part. ig.
Cuézase á fuego lento hasta la consistencia de jarabe (f.).

sa. prescribe el jarabe comun en lugar de azúcar.

R. Pétalos frescos de rosas blancas, una pt.

Agua hirviendo, . . . catorce pt.
Déjense en maceracion por doce horas, cuélese y añádase al líquido
Azúcar blanca, ... tres pt.
Hágase jarabe (ed. *c.*)

e. prescribe tres partes de pétalos, seis de agua hirviendo, doce horas de infusion y dos partes de azúcar;—fe. una parte de pétalos, ocho de agua hirviendo, veinte y cuatro horas de infusion y seis partes de azúcar.

R. Pétalos frescos de rosas blancas, una pt.
Macháquense para reducirlos á pasta y añádase
Agua caliente, . . dos pt. y med.
Déjense en maceracion por doce horas, cuélese esprimiendo ligeramente y añádase al líquido
Azúcar blanca, . . . peso igual.
Clarifíquese y hágase jarabe (*vm.*)

R. Pétalos frescos de rosas blancas, doce lib.
Macháquense en un mortero de mármol y déjense despues en maceracion por doce horas en
Agua, ... cuatro lib.
Añádase al líquido esprimido,
Azúcar blanca, . . . cuatro lib.
Clarifíquese y cuézase á un calor suave hasta la consistencia de jarabe. A cada lib. de este añádase otra de jarabe frio preparado con
Agua de rosas blancas, diez drac.
Azúcar blanca, ... dos onz.
Méz. ex. (an.)

R. Azucar pura, ... dos lib.
Agua, ... c. s.
Cuézase hasta la consistencia de jarabe, y échese hirviendo sobre
Pétalos frescos de rosas blancas, ... dos lib.
Déjense en maceracion por tres dias, cuézanse un poco y cuélese esprimiendo con fuerza (g.).

R. Pétalos frescos de rosas blancas, una lib.
Agua hirviendo, . . . cuatro lib.
Déjense en maceracion por doce horas; redúzcase despues á la mitad por la ebulicion, agitándolo sin cesar; cuélese por espresion y añádase al líquido depurado por el reposo
Azúcar pura, ... dos lib.
Cuézase hasta la consistencia necesaria. (ams.)

R. Pétalos secos de rosas blancas, ... siete onz.
Agua caliente, . . . dos azumbres.
Déjense en maceracion por doce horas, evapórese al B. M. hasta que no queden mas que cinco cuartillos de líquido y añádase
Azúcar pura, ... seis lib.
Lícuese al B. M. (lo.)

R. Pétalos de rosas blancas, cuatro lib.
Agua hirvieudo, . . . ocho lib.
Déjense en infusion por veinte y cuatro horas, cuélese despues esprimiendo con fuerza, hágase digerir el líquido con nueva cantidad de flores, repítase la operacion por tercera vez, y añádase á cada nueve onz. del último líquido
Azúcar blanca, . diez y seis onz.
Hágase jarabe (br. pa. w.)
Este jarabe se llama *Jarabe de rosas solutivo*, para distinguirle del *Jarabe de rosas simple*, preparado con la misma infusion triple; pero solamente con

treinta y dos onz. de azúcar por cada lib. y med. de líquido.

JARABE DE ROSAS COMPUESTO.

Syrupus rosarum solutivus cum senna, s. *de senna rosaceus*. (ams. ba. wu.)

R. Pétalos frescos de rosas blancas, una lib.
Agua hirviendo, ... seis lib.

Déjense en maceracion por doce horas, redúzcase despues á cuatro lib. por la ebulicion, cuélese por espresion y hágase macerar por dos horas en el líquido

Hojas de sen mondadas, ocho onz.

Cuélese por espresion y añádase al líquido depurado por el reposo

Azúcar pura, ... dos lib.

Cuézase hasta la consistencia de jarabe, y añádase despues de frio

Aceite esencial de anís y
———— de hinojo,
a. . . . . cinco got.

wu. prescribe se echen dos lib. de infusion de rosas blancas sobre una onza de sen, y despues de algunas horas de digestion, añadir al líquido colado el doble de azúcar para hacer el jarabe;---y ba. que se dejen en infusion por media hora una parte de pétalos y dos de sen en ochenta de agua caliente, y que se añadan dos part. de azúcar á cada una de líquido colado.

MIEL ROSADA.

Melite de rosas; *Mel rosatum*, s. *rosaceum*, s. *de rosis*, s. *rosæ gallicæ Rhodomel*. (a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. om.*)

R. Pétalos secos de rosas rojas, diez onz.
Agua hirviendo, ... seis lib.

Déjense en maceracion por doce horas; hiérvase despues á un fuego suave; cuélese por espresion; déjese reposar, decántese y añádase

Miel despumada, . . . cuatro lib.

Evapórese suavemente hasta la consistencia de jarabe. (b.)

an. y ff. prescriben una pt. de rosas secas, cuatro de agua, doce horas de digestion y seis pt. de miel; — br. y w. seis pt. de rosas frescas, seis de agua, veinte horas de digestion y seis pt. de miel; — pa. nueve pt. de rosas frescas, doce de agua, la reduccion á cinco de líquido colado y cuatro de miel; — han. o. po. y *sw.* ocho pt. de rosas secas, cuatro de agua, doce horas de digestion y ocho pt. de miel; — ed. una pt. de rosas secas, doce de agua, seis horas de digestion y diez y seis pt. de miel; — fi. p. y su. media pt. de rosas secas, tres de agua, doce horas de digestion y seis pt. de miel; — pr. cuatro pt. de rosas secas, ocho de agua, doce horas de digestion y ocho pt. de miel; — ba. una pt. de rosas secas, ocho de agua, tres horas de digestion y doble cantidad de miel que de líquido colado; — a. y r. tres pt. de rosas secas, doce de agua, tres horas de digestion y veinte y cuatro pt. de miel; — br. una pt. de rosas secas, cuatro de agua, seis horas de digestion y cinco pt. de miel; — *sp.* seis pt. de rosas, seis de agua, veinte y cuatro horas de digestion y ocho pt. de miel; — s. una pt. de rosas secas,

seis de agua, doce horas de digestion y doble cantidad de miel que de líquido; — du. lo. y *c.* cuatro onz. de rosas, seis cuartillos de agua, seis horas de digestion y cinco lib. de miel; — g. tres onz. de rosas secas, dos lib. de agua, algunas horas de digestion y dos lib. y med. de miel; — y ams. ocho onz. de rosas secas, seis lib. de agua, doce horas de maceracion y dos lib. de miel despumada.

R. Pétalos de rosas rojas, . una pt.
Agua, ... ocho pt.

Hágase infundir en dos veces colando cada una sin esprimir, bátase en el líquido colado la clara de uno ó dos huevos, hágase dar un hervor, cuélese por una manga y añádase

Azucar blanca, ... una pt.
Miel blanca, ... cinco pt.

Evapórese hasta la consistencia de jarabe. (*vm.*)

R. Pétalos secos de rosas rojas, una pt.
Cocimiento de cálices separados de estas mismas rosas, cuatro pt.

Déjense en infusion por dos horas; cuélese sin esprimir y añádase al líquido

Miel escogida, ... seis pt.

Clarifíquese con clara de huevo y evapórese hasta la consistencia de jabe. (f.)

ff. prescribe el mismo procedimiento; pero sustituye el agua comun al cocimiento de los cálices, que suministra á la composicion una gran proporcion de tanino y de ácido gálico. Henry hace observar ademas que la albumina de la clara de huevo indicada para la clarificacion, debe unirse á mucho tanino y destruir una parte del principio activo de este jarabe.

R. Zumo depurado ó infusion saturada de rosas rojas, . . med. pt.
Miel cruda, ... una pt.
Méz. ex. (he.)

pid. prescribe se cuezan hasta la consistencia de jarabe nueve onz. de infusion saturada de rosas, y lib. y med. de miel despumada; — e. pt. iguales de zumo depurado de rosas y de miel comun; — sa. una pt. de zumo depurado y dos de miel despumada; — li. una pt. de infusion y cuatro de miel; — wu. una de infusion y dos de miel; — y fe. partes iguales de infusion y de miel.

R. Agua de rosas, ... una onz.
Miel despumada, . . cuatro onz.
Méz. (d. fe. fu.)

Las grandes diferencias que resultan de la diversidad infinita de estos procedimientos son poco importantes, porque es un medicamento que no sirve mas que al esterior. Siendo un poco astringente, se usa con este título en gargarismos, colutorios é inyecciones.

MIEL ROSADA SOLUTIVA.

Mel rosatum solutivum. (sa. w.)

R. Miel buena, ... dos lib.
Zumo de rosas blancas, . tres lib.

Hágase hervir, despúmese y evapórese lentamente hasta la consistencia necesaria. (w.)

sa. prescribe partes ig. de miel y de zumo depurado.

Se usa rara vez al interior y alguna vez entra en la composicion de lavati-

vas; — Dósis; de onz. y med. á dos onz.

GARGARISMO DETERSIVO.

Gargarisma commune. (ff. g. *ra. sm. sp.*)

R. Infusion de rosas acídula, med. lib.
Miel rosada, ... una onz.
Méz. (g.)

R. Miel rosada, ... quince pt.
Cocimiento de cebada, . . cien pt.
Méz. ex. (ff.)

ra. prescribe una onz. de miel rosada, y una lib. de cocimiento de cebada.

R. Hojas de agrimonia, . . un puñ.
—— de salvia, . . . un puñto.
Agua, ... cuartillo y med.

Hágase hervir por un cuarto de hora y añádase al líquido colado

Miel rosada, ... dos onz.
Méz. ex. (*sm.*)

R. Cebada entera, ... una onz.
Agua, ... treinta y dos onz.

Redúzcase á la mitad por la coccion y añádase

Hojas de agrimonia y
—— de zarza, a. . dos puñtos.

Cuélese y disuélvase en el líquido

Nitro, ... una drac.
Miel rosada, ... una onz.
Méz. ex. (*sp.*)

COLUTORIO DETERSIVO.

Colutorium detergens, s. *adstringens.* (*b.*)

R. Miel rosada, ... una onz.
Cocimiento de cebada, . una lib.
Tintura de goma laca, . . veinte got.
Méz.

R. Miel rosada, ... una onz.
Espíritu de coclearia y
Licor de Hoffmann, a. treinta got.
Cocimiento de cebada, . . dos lib.
Méz.

R. Miel rósada, ... una onz.
Cocimiento de cebada, . una lib.
Licor de Hoffmann, . . treinta got.
Méz.

TINTURA DE ROSAS. (*vm.*)

R. Pétalos frescos de rosas, . una pt.
Aguardiente, ... cuatro pt.

Déjese en maceracion fria por dos dias, cuélese por espresion y fíltrese.

VINAGRE DE ROSAS.

Acetum rosæ, s. *rosarum.* (br. d. e. fe. han. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *vm.*)

R. Pétalos de rosas rojas, . una pt.
Vinagre tinto, . . . diez y seis pt.

Déjense en maceracion por quince dias en vasija tapada meneándolo de cuando en cuando, cuélese y fíltrese.

sa. prescribe una parte de rosas, cuatro de vinagre, seis dias de maceracion, y la infusion repetida una ó dos veces sobre nuevas flores, cuando se quiera obtener el vinagre mas cargado; — d. fe. han. o. po. pr. s. y *vm.* una parte de rosas, ocho de vinagre y diez dias de maceracion en frio; — wu. una parte de rosas, nueve de vinagre y tres semanas de maceracion al sol; — su. una parte de rosas, doce de vinagre y cuatro dias de maceracion; — y br. pa. y w. una parte de rosas y seis de vinagre.

R. Pétalos secos de rosas rojas,
una lib.
Vinagre blanco, ... ocho lib.

Déjense en maceracion por algunos dias al sol, ó por algunas horas al B. M., cuélese sin espresion y añádase

Aguardiente, ... dos onz.
Méz. (e.)

p. prescribe se dejen en infusion por seis dias una lib. de rosas en seis de vinagre, que se hierva despues un poco y que se añada med. lib. de alcohol.

VINAGRE DE ROSAS COMPUESTO.

Acetum rosarum compositum. (sw. vm.)*

R. Flores secas de rosas rojas, pt. y med.
——— de zumaque, . una pt.
Vino de membrillos, . cuatro pt.
Vinagre tinto, ... dos pt.

Déjese en maceracion fria por diez dias, cuélese por espresion y filtrese. (*vm.*)

*sw.** prescribe una parte de rosas, otra de zumaque, doce de vinagre y la infusion á un calor suave.

Astringente y antiséptico, aconsejado al esterior en las hemorragias y los equimosis.

ACEITE ROSADO.

Oleum rosarum, s. *rosatum.* (br. e. f. sa. w.)

R. Rosas frescas, ... pt. y med.
Aceite comun, ... tres pt.

Déjense en digestion por dos dias al B. M., esprímase despues de frio y repítase segunda vez la operacion. (sa.)

R. Rosas machacadas, . . cuatro pt.
Aceite comun, ... cinco pt.

Déjese al sol por ocho dias, cuétase hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion. (br. e. w.)

R. Rosas machacadas, ... una pt.
Aceite comun, ... cuatro pt.

Espóngase al sol por tres dias, cuélese por espresion y repítase la operacion por tres veces, prolongando la última hasta tres meses. (f.)

Preconizado contra los sabañones.

ACEITE DE ROSAS.

Oleum rosarum œthereum, Ætheroleum rosarum. (f. sa.)

R. Pétalos frescos de rosas, cinco pt.
Agua, ... siete pt.

Destílese. (f.)

sa. prescribe veinte y cinco partes de rosas, setenta y cinco de agua y tres de sal.

AGUA DE ROSAS.

Aqua rosæ, s. *rosarum.* (a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. r. s. su. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

R. Pétalos frescos de rosas, tres pt.
Agua, ... c. s.

para evitar el empireuma.

Destílense ocho partes (fe. he. *pid.*)

p. prescribe seis partes de flores, c. s. de agua para evitar el empireuma, y que se destilen ocho partes;——fi. y su. tres partes de flores, c. s. de agua para evitar el empireuma, y que se destilen seis partes;——g. cuatro partes de flores, c. s. de agua para evitar el empireuma, y que se destilen seis partes——ams. b. y be. una parte de flores, c. s. de agua para evitar el empireuma, y que se destilen

diez partes;—du. seis lib. de flores, c. s. de agua y que se destilen cuatro azumbres,---han. o. y po. una parte de flores, c. s. de agua, y que se destilen cinco partes;---am. y lo. ocho lib. de flores, c. s. de agua, y que se destilen cuatro azumbres;---an. una parte de flores, cinco de agua, y que se destilen cuatro partes;---*br.* tres partes de flores, quince de agua, y que se destilen ocho partes;---sa. y wu. una parte de flores, cuatro de agua, y que se destilen dos partes;---f. una parte de flores, cuatro de agua, y que se destile una parte;---r. diez partes de flores, cuarenta de agua, y que se destilen quince partes;---ba. una parte de flores, nueve de agua, y que se destilen tres partes;---s. una parte de flores, diez de agua, y que se destilen cuatro partes;---y pa. y w. una parte de flores, tres de agua, y que se destile la mitad.

R. Pétalos frescos de rosas, tres pt.
Agua, ... doce pt.

Pónganse las flores en un saco de lienzo suspendido en medio de un alambique, de modo que no toque al agua, y destílense seis partes sin hacerle hervir. (fu. li.)

R. Pétalos frescos de rosas, cuatro pt.
Agua, ... c. s.
Sal comun, ... una pt.

Destílense veinte partes. (*sw.*)

a. prescribe una parte de flores saladas, ocho de agua, y que se destilen tres partes;—y d. una parte de flores saladas, seis de agua, y que se destilen tres partes.

R. Pétalos frescos de rosas, . diez pt.
Aguardiente, ... med. pt.
Agua, ... ciento sesenta pt.

Destílense cuarenta partes (*vm.*).

R. Pétalos frescos de rosas, una lib.
Agua, ... c. s.

para evitar el empireuma; déjese en maceracion por dos dias, destílense diez lib., y añádase al producto

Aguardiente, ... cinco onz.

Méz. ex. (ed. *c.*)

Dósis; de una á dos onz.

ESPIRITU DE ROSAS.

Spiritus rosarum. (br. pa. s. w.)

R. Rosas frescas, ... dos pt.
Alcohol y
Agua, a. . . . . una pt.

Destílese una parte (s.)

R. Pétalos de rosas, ... una lib.
Vino blanco, ... diez lib.
Alcohol, ... lib. y med.

Destílese la mitad, échese el producto sobre nuevas flores, y destílese todavía la mitad. (br. w.)

R. Pétalos de rosas blancas, doce lib.
Azúcar blanca, ... dos lib.
Levadura, ... med. lib.
Agua tibia, ... treinta lib.

Déjese fermentar hasta que exhale un olor vinoso, destílese entonces y rectifíquese el producto. (pa. w.)

Cordial y nervino, nada usado en el dia, y antiguamente con mas frecuencia al esterior que al interior.

TINTURA ACIDA DE ROSAS.

Tinctura florum rosarum, s. *rosarum acidula.* (br. o. po. pr. s. w. *vm.*)

R. Pétalos de rosas blancas,
med. onz.

Acido sulfúrico, . . . una drac.
Agua de rosas, ... cuatro onz.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas, cuélese por espresion y fíltrese.

han. o. pr. y s. prescriben onz. y med. de pétalos, med. de ácido, doce de agua hirviendo y doce horas de maceracion; — y po. una drac. de pétalos, otro tanto de ácido, una onz. de agua y tres horas de maceracion.

Atemperante y calmante. — Dósis; de med. á una onz.

JULEPE ROSADO.

Julapium rosatum, s. *rosarum*, s. *regium*, *Syrupus regius*, s. *alexandrinus*. (br. he. pa. w. *pid. sp.*)

R. Agua de rosas, . . . veinte onz.
Azúcar blanca, . . dos lib. y med.

Hágase dar un hervor y cuélese. (pa. w. *sp.*)

br. prescribe diez y seis onz. de agua, y dos lib. y med. de azúcar; — y he. y *pid.* nueve onz. de agua y diez y seis de azúcar.

COLIRIO ASTRINGENTE. (*ra.*)

R. Agua de rosas é
Infusion de melitoto, a. cuatro onz.
Méz.

MISTURA DETERSIVA. (*sm.*)

R. Agua de rosas, ... tres onz.
Crema de leche,
Clara de huevo y
Jarabe violado, a. . . . . una onz.

Aconsejado por Boerhaave en las aftas y en los infartos de las encías en forma de colutorio.

POMADA DE ROSA Ó ROSADA.

Unguentum rosatum, s. *rosarum*, s. *pomadinum*, s. *refrigerans*, s. *Aquæ rosæ*. (am. b.* br. e. f. fe. fi. fu. han. he. li. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*)

R. Manteca de puerco, . . . c. s. q.

Añádase meneando sin cesar con mano de madera

Agua de rosas, ... c. s.

ó hasta que la manteca se ponga de un blanco de nieve (s. su.)

fi. y p. prescriben ocho partes de manteca y una de agua de rosas.

R. Manteca de puerco,
treinta y dos onz.

Añádase gota á gota

Agua de rosas, . . . cuatro onz.

Cuando la manteca esté bien blanca, añádase un aceite esencial como el de espliego. (r.)

br. w. y wu. prescriben una lib. de manteca lavada con agua de rosas y doce got. de aceite de leño de Rodas; — *sp.* doce onz. de manteca lavada con agua de rosas, y diez y seis got. de aceite de leño de Rodas; — y *sw.* una lib. de manteca lavada con agua de rosas, y una drac. de aceite del mismo leño.

R. Manteca de puerco, . . dos lib.
Sebo de carnero, . . . tres onz.

Lícuense juntos; échese todo en agua de rosas; meneése bien; déjese enfriar y séquese. Puede añadirse á cada lib. una drac. de aceite de leño de Rodas. (br.)

am. y *c.* prescriben se licue med. onz. de esperma de ballena y una drac. de

cera blanca en dos onz. de aceite de almendras dulces; que se añadan dos onz. de agua de rosas y que se menee hasta que se enfrie.

R. Manteca de puerco lavada con agua de rosas, ... ocho onz.
Cera blanca, ... dos onz.
Lícuense lentamente y despues de frio añádase poco á poco
Agua de rosas, ... tres onz.
Aceite esencial de cidra, una drac.
Méz. ex. (han. po. pr.)

vm. prescribe se licue una pt. de cera blanca, se añadan cuatro pt. de manteca, y se incorpore poco á poco en la mezcla onz. y med. de agua de rosas; — fu. que se trituren treinta y dos onz. de manteca con cuatro de agua de rosas; que se licue en seguida la manteca al fuego; que se separe del agua y que se triture con sesenta got. de aceite esencial de cidra; — li. que se triture una lib. de manteca con dos onz. de agua de rosas, y otro tanto de agua de azahar; que se derrita la manteca; que se separe del agua y que se triture con veinte y cuatro got. de aceite de bergamota y quince del de espliego.

R. Manteca de puerco, . . una lib.
Agua de rosas y
—— de azahar, a. . . dos onz.
Aceite esencial de cidra, veinte y cuatro got.
———— de espliego, quince got.
———— de clavo, doce got.
Méz. (he. o. *pid.*)

sw. prescribe una lib. de manteca, med. onz. de agua de azahar, tres onz. de agua de rosas, doce got. de aceite de cidra, otro tanto del de espliego é igual cantidad del de clavo.

R. Manteca de puerco, . . diez onz.
Cera blanca, ... dos onz.
Lícuense juntos y añádase
Agua de rosas, ... tres onz.
—— de azahar, . . . una onz.
Déjense en reposo por veinte y cuatro horas; decántese el agua y tritúrese la manteca con
Aceite esencial de espliego y
———— de cidra,
a. . . . . med. drac.
Méz. ex. (b.*)

R. Manteca lavada con agua de rosas, ... doce onz.
Añádase poco á poco triturando siempre
Agua de rosas, ... tres onz.
—— de azahar y
Espíritu de rosas, a. . . med. onz.
Aceite esencial de espliego, med. drac.
———— de leño de Rodas y
———— de cidra,
a. . . . . diez y seis got.
Méz. ex. (*sp.*)

R. Aceite de rosas por infusion, una lib.
Cera blanca, ... tres onz.
Lícuense juntos, lávese la mezcla en agua y bátase bien para darle blancura. (w.)

sa. prescribe lib. y med. de aceite rosado y seis onz. de cera.

R. Manteca de puerco, . . tres lib.
Estoraque calamita,
Benjui y
Lirio de Florencia, a. . una onz.
Limones y
Naranjas, a. . . . . n.º 2.
Manzanas de la Reina, . n.º 4.
Cuézase hasta que se consuma la hu-

medad y añádase

Aceite esencial de canela y
——————— de clavo,
a. . . . . veinte y cinco got.

Bátase todo en seguida con el espíritu de rosas por fermentacion. (pa.)

R. Clavos de especia, . . . dos drac.
Canela,
Benjuí y
Estoraque calamita, a. tres drac.
Almáciga, ... dos escrp.
Espliego, ...
Leño de aloes y
—— de Rodas, a. . . una drac.
—— de sasafras, . . med. drac.
Lirio de Florencia, . . una onz.
Agua de rosas, ... med lib.
Manteca de puerco, . . una lib.
Pulpa de manzanas de la reina, ... seis onz.
Sebo de carnero, . . cuatro onz.

Cuézase lentamente; déjese despues en digestion por tres dias; cuézase en seguida hasta que se evapore toda el agua; bátase el líquido colado con agua de rosas hasta que se blanquee, y añádase

Aceite de leño de Rodas, ... veinte got.

Méz. ex. (b.*)

Esta fórmula es la de Cartheuser y la que ha dado á la preparacion el nombre de pomada ó de ungüento de camuesas.

R. Manteca lavada con agua de rosas y
Rosas blancas peladas, a. pt. ig.

Déjense juntas por dos dias; lícuese la manteca y déjese en maceracion por otros dos dias con una igual cantidad de rosas; liquídese en seguida al B. M. y déjese reposar. (f.)

br. prescribe se derritan juntas dos lib. de manteca y tres onz. de sebo; que se añadan dos onz. de rosas rojas machacadas y med. onz. de ancusa; que se cuele y se deje enfriar lentamente, meneandolo con una espátula; — sa. que se deje en digestion al B. M. por tres dias dos lib. de rosas rojas y otro tanto de rosas blancas en seis lib. de manteca; que se esprima en seguida; que se añadan seis onz. de cera; que se licuen sobre cenizas calientes y que se deje reposar y enfriar.

R. Manteca de puerco, . . doce lib.
Pétalos de rosas blancas, seis lib.

Déjense en maceracion por tres dias; cuézase hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion. (e.)

pa. y w. prescriben se cueza una lib. de manteca con cuatro onz. de rosas hasta que se consuma la humedad; que se cuele por espresion y se añadan tres got. de esencia de rosas.

R. Manteca de puerco, . nueve lib.
Sebo de carnero, ... una lib.
Pétalos frescos de rosas, . . nueve lib.

Déjense en digestion por un dia los pétalos en las dos grasas licuadas y cuélese por espresion. (fe.)

ESPECIES DE JACINTO. (br. pa. w.)

R. Jacintos pp.,
Bol arménico,
Tierra de Lemnos y
Coral rojo pp., a. . . drac. y med.
Perlas de Oriente pp. y
Esmeraldas pp., a. . . una drac.
Cuerno de ciervo pp. filosóficamente,
Raspaduras de marfil pp.,

Hueso de corazon de ciervo pp.,
Raiz de fraxinela,
—— de tormentila,
Sándalo blanco,
—— cetrino,
—— rojo,
Pétalos de rosas rojas,
Grana de kermes.
Simiente de acedera,
—— de cidra,
—— de verdolaga,
Azafran y
Mirra, a. . . . . cuatro escrp.

Se llaman *completas*, *completæ*, cuando se añade

Ambar gris y
Almizcle, a. . . . . cuatro escrp.

Pulverícense.

Es un astringente ligero.

Dósis; de med. á un escrp.

POLVOS CONTRA EL ABORTO.

Pulvis contra abortum. (pa. w.)

R. Grana de kermes, . med. onz.
Leño de sándalo rojo,
Pétalos de rosas rojas,
Coral rojo pp. y
Raspaduras de marfil, a. tres drac.
Almáciga y
Nuez moscada, a. . . una drac.
Azucar blanca, . . . peso igual á lo demas. (w.)

pa. prescribe una drac. de grana de kermes, med. drac. de sándalo rojo, un escrp. de clavo, dos escrp. de nuez moscada, med. drac. de raiz de tormentila, un escrp. de perlas, otro tanto de coral rojo, lo mismo de coral blanco y tres drac. de azucar.

Dósis; una drac.

Como todos los escitantes, estos polvos serán mas propios á provocar que á precaver el aborto.

POLVOS CEFALICOS ROJOS. (*vm.*)

R. Polvos de rosas rojas, . seis onz.
—— de ácido tartárico, med. onz.
—— de lirio de Florencia, seis onz.

Méz. y humedézcase la masa con agua de rosas.

POLVOS OLOROSOS.

Pulvis nasalis odoratus. (pa.)

R. Pétalos de rosas rojas, seis drac.
Flores de cardo estrellado,
—— de caléndula y
—— de alelí, a. . . una drac.
Lirio de Florencia, . . dos drac.
Mejorana,
Serpol y
Tomillo, a. . . . . un escrp.

Añádase á los polvos

Aceite esencial de leño de Rodas, cuatro got.
—— de clavo, seis got.

ESPECIES DIARRODON.

Pulvis, s. *species diarrhodon.* (pa. sa. w.)

R. Pétalos de rosas rojas, dos onz.
Sándalo blanco y
—— rojo, a. . . . med. onz.
Raiz de regaliz y
Simiente de anís, a. . dos drac.
—— de albahaca,
Canela,
Nardo de Indias,
Ruibarbo,

Azafran,
Raspaduras de marfil,
Cuerno de ciervo pp. filosóficamente,
Almáciga y
Madre de perlas pp., a. una drac.
Pulverícense. (pa. w.)

R. Rosas rojas, ... dos onz.
Sándalo cetrino, ... una onz.
Cardamomo menor,
Canela,
Azafran,
Almáciga,
Nardo de Indias é
Hinojo, a. . . . . una drac.
Háganse polvos. (sa.)
Estomacales.
Dósis; de med. drac. á dos escrp.

ESPECIES PARA EPITEMA.

Species pro epithemate cordis et pulsuum.

(pa. w. *sp.*)

R. Yerba de romero,
——— de mejorana,
——— de melisa,
Flores de alelí amarillo y
——— de claveles, a. . med. onz.
——— de espliego y
——— de rosas, a. . . . seis drac.
Almáciga,
Nuez moscada,
Leño de aloes y
——— de Rodas, a. . . seis drac.
Canela, ... seis drac.
Corteza de cidra y
——— de naranja, a. tres drac.
Pártanse, quebrántense y méz. (w.)
sp. prescribe se pulvericen.

R. Flores de buglosa,
——— de borraja y
Flores de melisa, a. . med. puñ.
Sándalo blanco,
——— rojo,
——— cetrino y
Pétalos de rosas rojas, a. dos drac.
Corteza de cidra,
Simiente de acedera,
Leño de aloes y
Clavos de especia, a. drac. y med.
Dorónico,
Behen rojo,
——— blanco y
Succino, a. . . . . cuatro escrp.
Háganse polvos. (pa.)

ESPECIES CONTRA LA GANGRENA.

Species pro decocto ad gangrœnam.

(pa. w. *vm.*)

R. Hojas de marrubio,
——— de poleo,
——— de ruda,
——— de romero,
——— de salvia y
——— de escordio, a. . una pt.
Flores de manzanilla ordinaria,
——— de rosas rojas y
——— de sauco, a. . . . dos pt.
——— de malvavisco, . seis pt.
Simiente de alholba, . . ocho pt.
——— de lino, veinte y cuatro pt.
Pártanse, quebrántense y mézclense. (*vm.*)

R. Yerba de mil en rama y
——— de agenjos, a. . . seis drac.
——— de escordio,
——— de salvia,
——— de hisopo,
——— de ruda,
Flores de sauco y
——— de hipericon, a. med. onz.

Flores de rosas, ... una onz.
Mirra, ... seis drac.
Acibar y
Asafétida, a. . . . . med. onz.
Litargirio, ... seis onz.

Pártanse, quebrántense y mézclense. (pa. w.)

Se hacen hervir en cinco lib. de agua de cal y dos de vinagre, y se aplica el cocimiento caliente por medio de una bayeta. Pueden añadirse cuatro á seis onz. de aguardiente alcanforado. En el dia se prefieren con razon los emolientes á los escitantes para combatir la gangrena.

ROSOLIS Ó ROCÍO DEL SOL.

Se usan en medicina dos especies de este género.

1.º *Rosolis de hojas largas; Drosera longifolia*, L.

f.

Planta perenne de Europa (pentandria pentagynia, L.; cappariideas, J.).

Esta especie no se diferencia de la siguiente mas que por las hojas ovales y oblongas.

2.º *Drosiobotanon*, *Rocío del Sol*, *Yerba de la gota*; *Drosera rotumdifolia*, L.

Sonnenthau, Al.; rosolis à feuiles rondes, F.; roud leav'd sundew, In.; rugiasa del sole, I.; rosolina, Por.

br. f. w. *be. m. sp.*

Planta perenne ó bienal comun en los pantanos de Europa.

Se usa la yerba (*herba Roris solis* s. *Rorellæ*) que se compone de una roseta de hojas redondas, viscosas, muy pecioladas, guarnecidas de pestañas rojizas y glandulosas por el vértice. Carece de olor, y su sabor es amargo, un poco acre y caústico.

Escitante violento, epispástico al esterior, que ha sido aconsejado en otro tiempo al interior en la hidropesía, las enfermedades de pecho, la oftalmia y las calenturas intermitentes. La especie de rocío acre que fluye de sus glándulas era muy estimado de los alquimistas.

RUBIA Ó GRANZA.

Rubia tinctoria, L.

Krapp, Krappwurzel, Al.; garance, F.; red matter, In.; ruida, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal que se cultiva en Europa. (tetandria monogynia, L.; rubiaceas, J.)

Se usa la raiz (*Radix rubiæ tinctoriæ*, s. *sativæ*, s. *majoris*) que es larga, ramosa, articulada, cilíndrica, del grueso de una pluma de ganso, y mas roja por fuera que por dentro. Tiene un olor muy débil, y un sabor amarescente y ligeramente estíptico.

Contiene mucho tanino, ácido gálico, almidon, ácido oxálico, y un principio colorante particular que Collin y Robiquet llaman *Alizarina; Izarimum*. Dœbereiner habia ya hallado otro llamado por él *Erythrodanino*.

En las Indias Orientales se sostituye á esta especie la *Rubia Manjista*, Roxb.

Astringente, célebre por la propiedad que tiene de teñir de encarnado los

huesos de los animales que se nutren de ella. Se ha aconsejado en el raquitismo. — Dósis del polvo; de med. á una drac.

ESPECIES RESOLUTIVAS.

Species resolventes. (*hp.*)

R. Raiz de rubia,
— de grama,
— de diente de leon,
— de saponaria,
Yerba de fumaria y
Sumidades de mil en rama,
a. . . . . pt. ig.

ESTRACTO ACUOSO DE RUBIA.

Extractum rubiæ tinctoriæ aquosum. (fc.)

R. Raiz de rubia, ... una lib.
Agua, ... tres lib.

Hiérvase, cuélese por espresion, clarifíquese el líquido con clara de huevo y evapórese lo conveniente.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE RUBIA.

Extractum rubiæ tinctoriæ alcoholicum. (br. han.)

R. Raiz de rubia, ... dos pt.
Alcohol, ... tres pt.
Agua, ... nueve pt.

Déjese en dijestion en vasija tapada, cuélese por espresion, estráigase el alcohol por una evaporacion lenta y redúzcase lo restante á la consistencia de estracto. (han.)

br. prescribe se estraigan los principios del leño por el alcohol, que se filtren las tinturas reunidas, que se estraiga el alcohol por la destilacion y que se evapore lo restante hasta la consistencia de estracto.

POLVOS ANTIRAQUÍTICOS. (*sm.*)

R. Rubia en polvos, . . . dos drac.
Conchas de ostra pulverizadas,
med. onz.

Divídase en diez y ocho papeles. — Dósis; dos ó tres todos los dias en agua de azúcar, para los niños.

POLVOS DE RUBIA COMPUESTOS. (wu.)

R. Rubia, ... med. onz.
Mirra y
Borax, a. . . . . una drac.

COCIMIENTO DE RUBIA.

Decoctum rubiæ tinctoriæ. (*sw.*)

R. Raiz de rubia, ... una onz.
Almáciga, ... dos drac.
Agua, ... tres lib.

Consúmase la tercera parte por la ebulicion, y añádase al líquido colado
Tintura aromática, . . dos drac.
Jarabe de ácido cítrico, dos onz.

Astringente aconsejado en la ictericia, la clorosis, la amenorrea y las afecciones catarrales crónicas. — Dósis; tres onz. tres ó cuatro veces al dia.

TISANA ANTIESCROFULOSA. (*ca. sm.*)

R. Raiz de rubia, . . . med. onz.
Lúpulo, ... un puño.
Hojas de nogal, ... n. 3.
Agua, ... cuartillo y med.

Redúzcase á un cuartillo por la ebulicion, y añádase al líquido colado y frio
Tintura de marte tartarizada,
una cuchta.

Dósis; dos vasos por mañana y tarde.

TISANA TONICA Y ANTIERPETICA. (*pie.*)

R. Raiz de rubia, ... una onz.
Flores de arnica y
Tallos de dulcamara, a. med. onz.
Agua, ... seis vasos.
Hiérvase y añádase
Hojas de coclearia, . . . med. onz.

CALDO APERITIVO. (*bo. ca. pie. sm.*)

R. Pescuezo de carnero, cuatro onz.
Raiz de saponaria, . . . dos drac.
—— de rubia, ... dos drac.
Hojas de achicorias amargas,
un puñ.
Agua, ... tres cuartillos.
Cuézase hasta que se consuma la tercera parte.

Para tomar en cuatro veces por la mañana en ayunas contra los infartos de las vísceras del bajo vientre. Se añade á la primera taza un escrp. de acetato de potasa, aumentando poco á poco la dósis.

TISANA ANTIHICTERICA. (b.*)

R. Raiz de rubia y
—— de curcuma, a. . una onz.
—— de celidonia mayor y
Sumidades de centaura menor,
a. . . . . un puñ.
Agua de fuente y
Vino del Rhin, a. . . . dos lib.
Hiérvanse juntos y añádase al líquido colado
Jarabe de las cinco raices aperitivas, ... dos onz.

Alabada contra la ictericia por Sydenham, quien hacia tomar med. lib. por mañana y tarde.

BEBIDA ANTIRAQUITICA. (*b.* sm.*)

R. Raiz seca de rubia, . . med. onz.
Tártaro soluble, ... dos drac.
Agua, ... sesenta y cuatro onz.
Hágase hervir por una hora á un fuego lento, cuélese y añádase
Miel despumada, ... dos onz.

Alabada en el raquitismo. — Levret hacia tomar á los niños ocho onz. cada dia. — Se duplica la dósis de la rubia cuando se usa fresca.

COCIMIENTO DE RUBIA ALCALINO.

Decoctum rubiæ compositum. (Wu.)

R. Raiz de rubia y
—— de ruibarbo, a. . tres drac.
Sub-carbonato de potasa,
dos drac.
Agua de fuente, . tres lib. y med.
Hágase hervir por una hora y añádase al líquido colado
Jarabe de gengibre,
dos onz. y med.

APOCEMA TONICO. (*bo.*)

R. Raiz de rubia y
—— de ononis, a. . . . med. onz.
Hojas de marrubio,
—— de matricaria,
—— de artemisa y
—— de romero, a. . . med. puñ.
Simiente de peregil, . . un puñto.
Azafran y
Canela, a. . . . . un escrp.
Agua, ... c. s.
para obtener ocho onz. de líquido colado, y añádase á este
Jarabe de marrubio, . una onz.
Tártaro marcial soluble,
med. drac.

Alabado en la disminorrea, la clorosis, la leucorrea y las hemorragias causadas por la supresion de cualquier flujo habitual.

VINO ASTRINGENTE.

Vinum adstringens. (*au.*)

R. Raiz de rubia, ... una onz.
—— de tormentila y
Naranjas verdes, a. . med. onz.
Cascarilla, ... seis drac.
Estracto de leño de campeche, tres drac.
Vino, ... dos lib.

Déjese en digestion lo suficiente y cuélese. — Dósis; de med. á una onz. cada tres horas.

RUDA.

Ruda comun, de jardin, fétida, oficinal, silvestre; Ruta graveolens, L.

Raute, Gartenraute, Al.; rue, F.; common rue, In.; ruta, I.; arruda, Por.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Arbusto pequeño del mediodia de Europa (decandria monogynia, L.; rutaceas, J.).

Se usa la yerba y la simiente.

La yerba (*herba Rutæ*, s. *Rutæ hortensis*) se compone de un tallo cilíndrico y ramoso, guarnecido de hojas alternas, pecioladas, de color verde gai, casi dos veces aladas, compuestas de hojuelas un poco gruesas, ovales, oblongas, obtusas y estrechadas por la base. Su olor es fuerte, particular y muy desagradable. Su sabor es caliente, acre y muy amargo.

La simiente es pequeña, negruzca, reniforme, arrugada y un poco angulosa. Su sabor es aromático.

Escitante, estomacal, nervina, diaforética, carminativa, antipútrida, anodina y antielmíntica.—Dósis del polvo; de diez gr. á dos escrp.

CONSERVA DE RUDA.

R. Hojas machacados de ruda y
Azucar blanca, a. . . . una pt.
Méz. por la trituracion.

CONFECCION DE RUDA.

Confectio rutæ. (lo. *ca. vm.*)

R. Hojas secas de ruda,
Simiente de alcaravea y
Bayas de laurel, a. . onz. y med.
Sagapeno, ... med. onz.
Pimienta negra, ... dos drac.
Miel despumada, diez y seis onz.
Méz. Estimulante y emenagoga.

PASTA RUBEFACIENTE Y FEBRIFUGA. (*bo.*)

R. Sumidades frescas de ruda, dos onz.
Mostaza en polvo, . . dos drac.
Macháquense juntos. — Se aplica esta pasta á las muñecas antes del parosismo.

ESTRACTO ACUOSO DE RUDA.

Extractum rutæ aquosum. (br. du. ed. g. pa. w.)

R. Yerba de ruda, . , . . una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.
Déjese en digestion por cuatro dias

en un sitio caliente; hiérvase despues un poco; cuélese por espresion y evapórese el líquido colado hasta la consistencia conveniente. (br. pa. w.)

R. Hojas de ruda, ... una lib.
Agua pura, ... ocho lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion; cuélese por espresion y evapórese el líquido á un fuego lento hasta la consistencia de masa de píldoras. (du. ed. g.)

Dósis; de diez gr. á med. drac.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE RUDA.

Extractum rutæ alcoholicum. (wu.)

R. Yerba de ruda y
Alcohol, a. . . . . una lib.
Agua comun, ... ocho lib.

Déjese en digestion por tres dias á un calor suave; cuélese por espresion; déjese reposar y decántese el líquido; estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese el residuo hasta la consistencia conveniente.

POLVOS ANTILISICOS.

Pulvis antilyssus, s. *ad morsum canis rabidi.* (pa. w. *sp.*)

R. Hojas de ruda,
—— de verbena,
—— de salvia,
—— de llanten,
—— de polipodio,
—— de agenjo comun,
—— de menta,
—— de melitis,
—— de betónica,
Sumidades de hipericon y
—————— de centaura menor,
a. . . . . part. ig.

Preconizado por Paulmier. — Dósis; de med. á dos drac.

POCION EMENAGOGA. (*pie.*)

R. Zumo de ruda, ... una onz.
Ogimiel escilítico, . . . med. onz.

Para tomar á cuch. en las afecciones histéricas.

INYECCION DETERSIVA.

Injectio auricularis detersiva. (sp.)

R. Yerba de ruda, ... un puñ.
Agua de fuente, ... seis onz.

Déjese en infusion por doce horas y añádase al líquido colado

Esencia de mirra, . . med. drac.
Miel rosada, ... seis drac.

VINAGRE DE RUDA.

Acetum rutæ, s. *rutaceum.* (a. ams. br. he. o. p. pa. pr. sa. w. wu. *pid. vm.*)

R. Hojas frescas de ruda, . una pt.
Vinagre blanco, ... diez pt.

Déjese en maceracion fria por muchos dias; cuélese esprimiendo ligeramente y filtrese. (*vm.*)

sa. prescribe una parte de ruda, cuatro de vinagre, y seis dias de digestion á un calor suave; — br. he. pa. w. y *pid.* una parte de ruda, seis de vinagre y algunos dias de digestion; — ams. y pr. una parte de ruda, ocho de vinagre, y cuatro dias de maceracion fria; — wu. una parte de ruda, nueve de vinagre y tres semanas de infusion al sol; — y a. una parte de ruda, doce de vinagre y tres dias de maceracion.

R. Hojas frescas de ruda, . una lib.
Vinagre comun, ... seis lib.
Déjese en maceracion por seis dias; hiérvase despues un poco y añádase al líquido colado

Alcohol, ... med. lib.
Méz. ex. (p.)

a. prescribe tres onz. de ruda, dos lib. de vinagre destilado, algunos dias de digestion á un calor suave y la adicion de una octava parte de alcohol.

En este caso, lo mismo que en todos los otros vinagres simples ó compuestos, el alcohol sirve para precaver la descomposicion; — wu. cree que sea suficiente añadir una vigésima parte de alcohol.

VINAGRE DE RUDA ALCANFORADO.

Acetum rutæ camphoratum. (sw.)*

R. Sumidades floridas de ruda,
dos onz.
Vinagre. . . . . diez y seis onz.
Déjese en infusion á un calor suave por veinte y cuatro horas; cuélese y disuélvase en el líquido

Alcanfor, ... dos drac.
Filtrese.
Usado como profiláctico.

ACEITE DE RUDA POR INFUSION.

Oleum rutæ infusum. (br. e. f. sa. w. wu.)

R. Yerba fresca de ruda y
Aceite comun, a. . . . part. ig.
Déjese en digestion por tres dias y esprímase. (br. w.)

R. Yerba fresca de ruda,
part. y med.
Aceite comun, ... tres pt.
Déjese en digestion por tres dias al B. M.; esprímase despues de frio y repítase la maceracion con nueva yerba. (sa.)

f. prescribe se deje en digestion dos pt. de aceite con una de yerba sobre ceniza caliente por veinte y cuatro horas; que se repita la operacion por segunda vez; que se hierva un poco y que se esprima.

R. Yerba fresca de ruda, . . una pt.
Aceite comun, ... dos pt.
Déjese en digestion por tres dias á un calor suave; cuézase hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion. (wu.)

e. prescribe tres lib. de yerba y ocho de aceite.

Escitante, anticólico, antielmíntico y nervino, que se usa en fricciones y lavativas.

UNGUENTO DE RUDA.

Unguentum, s. Butyrum rutæ. (e.)

R. Hojas frescas de ruda,
—— de agenjos y
—— de menta, a. . . dos onz.
Manteca de puerco, diez y seis onz.
Cuézase hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion.

ACEITE ESENCIAL DE RUDA.

Oleum rutæ æthereum, Ætheroleum rutæ. (a. ams. an. b. ba. be. br. f. fe. fu. han. he. li. pa. po. pr. r. s. sa. wu. *br. c. pid. sw.*)

R. Yerba fresca de ruda, . . c. s. q.
Agua comun, ... c. s.
Destílese. (ams. b. be. du. fe. r. *br. c.*) ba. fu. y li. prescriben una pt. de yer-

ba y tres de agua; — *sw.* una de yerba y cuatro de agua; — f. cinco de yerba y siete de agua; — an. tres de yerba y diez de agua; — han. po. pr. y s. una de yerba y ocho de agua; — y a. una de yerba y doce de agua.

R. Yerba fresca de ruda,
veinte y cinco pt.
Agua, ... setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.
Destílese al cabo de tres dias. (br. he. pa. sa. *pid.*)

R. Yerba fresca de ruda, . . c. s. q.
Agua destilada de ruda, . . c. s.
Destílese. (wu.)

BALSAMO DE RUDA.

Balsamum rutæ. (w. *sp.*)

R. Aceite de nuez moscada,
dos drac. y med.
——— esencial de ruda, una drac.
Méz. ex.

AGUA DE RUDA.

Aqua rutæ. (a. ams. b. ba. be. han. pa. po. pr. s. sa. (*br. sw. vm.*)

R. Yerba fresca de ruda, . una pt.
Agua, ... c. s.
Al cabo de veinte y cuatro horas destílense diez pt. (ams. b. be. han. po. pr. *sw.*)

pa. prescribe una pt. de yerba, cuatro de agua y que se destilen dos pt.; — wu. y *br.* una pt. de yerba, seis de agua, y que se destilen dos tercios; — ba. una pt. de yerba, diez y seis de agua y que se destilen ocho pt.; — s. una pt. de yerba, quince de agua y que se destilen diez pt.; — y a. una pt. de yerba, doce de agua y que se destilen cuatro pt.

R. Yerba fresca de ruda, . una pt.
Agua, ... cuatro pt.
Destílese la mitad y repítase la destilacion con el producto y nueva yerba. (sa.)

R. Yerba fresca de ruda, . diez pt.
Aguardiente, ... med. pt.
Agua pura, . . ciento sesenta pt.
Destílense cuarenta pt. (*vm.*)

JULEPE ANTIHISTERICO. (*sm.*)

R. Agua destilada de ruda,
——— de brionia y
——— de azahar,
a. . . . . dos onz.
Jarabe de cantueso,
——— de valeriana y
——— de peonía, a. . . una onz.
Para tomar en tres ó cuatro dósis.

RUDA CABRUNA.

Las farmacopeas citan dos especies de este género.

1.º *Caprago, Galega, Ruda cabruna ó de cabras; Galega officinalis,* L.

br. e. f. w. *m. sp.*

Planta que crece en Europa (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.).

Se usa la yerba (*herba Galegæ*, s. *Rutæ capratiæ*) que se compone de un tallo ramoso, guarnecido de hojas compuestas de quince á diez y siete hojuelas ovales. Es inodora y su sabor es mucilaginoso y un poco amargo.

Alexifarmaca y sudorífica, segun se dice.

2.° *Galega de Virginia; Galega Virginiana*, L.

Virginian goats-rue, In.

Planta bienal de los Estados Unidos. La raiz pasa por muy antielmíntica.

RUDA DE MUROS Ó DORADILLA.

Asplenium ruta muraria, L.

Mauertrefffarren, Maverraute, Al.; asplenion, F.

an. be. br. f. fe. w. g. m. *sp.*

Planta que crece en toda la Europa (criptogamia, L.; helechos, J.).

Se usa la yerba *(herba Rutæ murariæ*, s. *Paronychiæ*, s. *adianti albi)* que se compone de hojas tres veces pinadas, de las que la primera subdivision es trifoliada, la hojuela superior trilobada y romboidea, y la estremidad de las hojuelas dentada. Es inodora y su sabor es algo dulce y áspero.

Es astringente, ligero, considerado como béquico y usado en la tos catarral.

RUIBARBO.

Rhabarbarum.

Rhabarber, Al.; rhubarbe, F.; rhubarb, In; rabarbaro, I.; ruibarbo, Por.

Las farmacopeas designan con este nombre las dos sustancias siguientes:

A. *Ruibarbo oficinal.*

a. am ams. an. b ba. be. br. d. dd du e. ed. f. fe. ff. fi. fu g. ham. han he li. lo. o. p. pa. po. pp. pr r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m pa. pid. sa. sp. z.*

Se distinguen muchas especies de ruibarbo oficinal:

1.° *Ruibarbo de la China* ó de las *Indias*; *Rhabarbarum*, s. *Rheum verum*, s. *Indicum*, s. *Sinense*, s. *Chinense*, s. *Danicum;* que se presenta en pedazos redondos de color amarillo, sucio al esterior, de testura compacta, de color de ladrillo, empañado y de sabor amargo. Cruge cuando se masca, y tiñe la saliva de amarillo anaranjado. Los polvos son de color entre leonado y naranjado. Viene de la China por el mar de Canton.

2.° *Ruibarbo de Moscovia, de Tartaria ó de Bucaria: Rhabarbarum Tartaricum*, s. *Moscoviticum*, s. *Russicum*, que se presenta en pedazos un poco aplastados, irregulares, angulosos, horadados con grandes agujeros, de color amarillo puro al esterior, menos compactos que los precedentes, jaspeados de venas rojas y blancas, muy manifestas é irregulares. Tiene un olor muy penetrante y un sabor amargo y astringente. Tiñe mucho la saliva de amarillo azafranado y cruge cuando se masca. Su polvo es de color amarillo mas puro que el precedente. Es el mas estimado, aunque el de la China se busca tambien cuando está puro. Viene igualmente de la China; pero por Kiaclita en Siberia.

Guibourt cree que estas dos variedades las suministra el *Rheum palmatum*, L., que crece en las cercanías de Kian-Sin y Chan-Sin en la Tartaria china. Pfaff sin rebatir este orígen le considera todavía como dudoso.

Otra especie se encuentra ademas en el comercio.

3.º *Ruibarbo de Europa; Rhabarbarum Britannicum*, s. *Gallicum*, s. *nostras*, que proviene de los *Rheum undulatum*, *compactum*, y aun del *palmatum*, cultivados en diversas provincias de Europa, en Francia, Inglaterra y Alemania. Este se diferencia de los precedentes por sus caracteres tanto fisicos como químicos, y escepto algunas ligeras modificaciones tiene los mismos que el de la segunda variedad de rapóntico, que es igualmente indígena.

El ruibarbo oriental contiene, segun Henry, un principio colorante particular, la *Rhabarbarina* ó la *Caphopicrita*, un aceite fijo, sobre-malato de cal, goma, almidon, oxalato de cal, que forma el tercio de su peso &c. Esta última sal es la que le hace crugir entre los dientes. Hornemann considera la rabarbarina como una sustancia impura, y atribuye al ruibarbo otro principio particular que nombra *Rheumino*, y que se parece á los ácidos, aunque muy diferente del *Acido rheumico* admitido por Henderson, y cuya existencia no ha podido ser confirmada. Ha reconocido tambien una sustancia sacarina, comprobada igualmente por Meissner.

B. *Ruibarbo de monges, bastardo.*

Mænchsrhabarber, Alpenampfer, Al.; bastard monks rhabarb, In; romice, I.; babaca menor, Por.

be. br. f. m. *sp.*

Esta es la raiz del *Rumex Alpinus*, L.

Planta perenne ó bienal que crece en los Alpes (hexandria trigynia, L.; polygonas J.).

Esta raiz (*radix Hyppolapathi*, s. *Rhabarbari monacorum*) es muy gruesa, leñosa, fibrosa, roja por fuera y amarilla por dentro. Su olor es desagradable, y su sabor amargo, acerbo y nauseabundo.

El ruibarbo es tónico ó purgante, segun la dósis; tónico á la de cinco á diez granos, y purgante á la de diez y ocho á veinte y cuatro ó mas.

§. I. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL RUIBARBO EN SUSTANCIA.

RUIBARBO TOSTADO.

Rhabarbarum tostum. (e. pa. sa.)

R. Ruibarbo en polvo, . . . c. s. q.

Póngase á un fuego moderado en una grande vacía de hierro, meneándolo sin cesar con una espátula hasta que adquiera un color moreno, déjese entonces enfriar y consérvese.

ESPECIES DIATURBIT CON RUIBARBO.

(pa. w. *vm.*)

R. Raiz de ruibarbo y
Turbit, a. . . . . dos onz.
Hermodatiles, ... una onz.
Diagridio sulfurado, triturado con piñones de Indias,
Cremor de tártaro y
Simiente de violetas, a. med. onz.
Pulverícense y añádase
Aceite de canela, ... diez got.
Consérvese. (pa. w.)

R. Canela. . . . . una pt.
Gengibre y
Simiente de anís, a. . . tres pt.
Escamonea, ... cuatro pt.
Hermodatiles y

Raiz de turbit, a. . . . ocho pt.
——de ruibarbo, . . . diez pt.
Pulverícense (*om.*)
Purgantes y antielmínticas.—Dósis; de uno á dos escrúpulos.

POLVOS ABSORVENTES. (*e.*)

R. Uñas de cangrejo pp., una drac.
Ruibarbo, ... dos escrp.
Divídase en cuatro papeles.—Dósis; uno ó dos cada dia.

POLVOS ESCITANTES. (*e.*)

R. Ruibarbo y
Ipecacuana, a. . . . . dos drac.
Se han aplicado con buen éxito sobre las úlceras indolentes.

POLVOS DE RUIBARBO Y DE TARTRATO DE POTASA.

Pulvis rhei cum tartaro, *Pulvis catharticus*, s. *rhei compositus*, s. *lenitivus*, s. *lenitivus tartarisatus*. (dd. fu. han. *sm. sy.*)

R. Ruibarbo y
Cremor de tártaro, a. . med. onz.
Pulverícense (dd.).—Dósis; un escrp.

sy. prescribe veinte granos de ruibarbo y diez de tártaro para una dósis;—y *sm.* partes iguales de ruibarbo y de tártaro soluble.

R. Polvos de ruibarbo
——— de cremor tártaro y
——— corteza de naranja,
a. . . . . una onz.
Méz. (han.)

fu. prescribe dos drac. de ruibarbo, med. onz. de tártaro tartarizado y cuatro escrup. de corteza de naranja.

Dósis; de med. á una drac.

POLVOS DE RUIBARBO Y DE SULFATO DE POTASA.

Pulvis rhei compositus, s. *antihecticus*, s. *purgans*. (pa. *sa. sp.*)

R. Ruibarbo, ... seis gr.
Sulfato de potasa, . . . doce gr.
Háganse polvos. (*sp.*)

pp. prescribe una parte de ruibarbo y tres de sulfato.

R. Ruibarbo, ... med. drac.
Sulfato de potasa, . . . diez gr.
Escamonea, ... ocho gr.
Aceite esencial de hinojo, una got.
Háganse polvos (*sa.*).

POLVOS DE RUIBARBO Y DE MAGNESIA.

Pulvis puerorum epilepticus cum rheo, s. *catharticus absorbens*, s. *laxans*, s. *infantum cum rheo*, s. *magnesiæ compositus*, s. *rhei salinus*, s. *rhei cum magnesia*, s. *digestivus*, s. *è rheo*. (b.* br. d. dd. fe. g. li. su. *e. sa. sw.*)

R. Ruibarbo, ... una pt.
Magnesia blanca, ... tres pts.
Háganse polvos. (*sw.*)

su. prescribe partes iguales de ruibarbo y de magnesia;——g. una parte de ruibarbo y cuatro de magnesia——y fe. una de ruibarbo y ocho de subcarbonato de magnesia.

R. Ruibarbo, ... un escrp.
Magnesia calcinada, . med. drac.
Aceite de canela, . . . una got.
Para tom. con jarabe. (*e.*)

R. Ruibarbo, ... med. onz.
Magnesia blanca,
Hinojo y

Azúcar blanca, a. . . dos drac.
Háganse polvos (su.).

br. prescribe una onz. de ruibarbo, otro tanto de magnesia, dos drac. de hinojo y med. onz. de azúcar.

R. Ruibarbo,
Magnesia blanca y
Oleosacaro de hinojo, a. part. ig.
Háganse polvos (d. dd.).---Dósis; un escrup.

R. Ruibarbo, ... med. onz.
Musgo de encina y
Raiz de regaliz, a. . . . seis drac.
Magnesia blanca, dos onz y med.
Háganse polvos (b.* li.)
Dósis; de un escrp. á med. drac.

POLVOS DE RUIBARBO JABONOSOS.

Pulvis ad tormina infantum. (au. sp.)

R. Ruibarbo, ... med. drac.
Jabon oficinal, ... una drac.
Ojos de cangrejo, . . . med. onz.
Anís y
Cominos, a. . . . . un escrp.
Azafran, ... cuatro gr.
Azúcar blanca, ... tres drac.
Méz. (*sp.*)

R. Polvos de jabon medicinal,
diez á veinte gr.
——— de sub-carbonato de magnesia,
——— de azúcar y
——— de ruibarbo, a. med. drac.
Méz. (*au.*)

BOLOS DE RUIBARBO.

Boli è rheo. (ff. sa. sw.)

R. Ruibarbo en polvo, . . med. drac.
Jarabe comun, ... c. s.
Méz. (*sa. sw.*)--Se añaden si es necesario cinco gr. de mercurio dulce ó diez de jalapa.

R. Ruibarbo en polvo, . . una pt.
Sulfato de sosa, ... dos pt.
Hágase un bolo con un poco de agua. (ff.)

BOLO ASTRINGENTE.

Bolus ad diarrhœam, s. è rheo sedativus. (sa. sw.)

R. Ruibarbo, ... quince gr.
Diascordio, ... med. drac.
Jarabe comun, ... c. s.
Hágase un bolo. (*sa.*)

R. Ruibarbo, ... doce gr.
Polvos aromáticos, ... tres gr.
Tintura sedante, . . veinte got.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (*sw.*)

BOLOS FUNDENTES.

Boli resolventes et purgantes. (b.)

R. Ruibarbo, ... una drac.
Jabon de Venecia, drac. y med.
Arrope de sauco, ... c. s.
para hacer ocho bolos.
Dósis; uno cada dos horas.

PILDORAS DE RUIBARBO.

Pilulæ rhei. (li. *sa.*)

R. Ruibarbo en polvo, . . . c. s. q.
Infusion de ruibarbo, . . . c. s.
Háganse píldoras de dos gr.— Dósis; de cinco á quince.

PILDORAS FUNDENTES.

Pilulæ resolventes cum rheo, s. è rheo cum natro acetico, s. ecpiracticæ. (li. pp. ww. *e. sm.*)

R. Polvos de ruibarbo,

Acetato de sosa y
Hiel de vaca espesada, a. dos drac.
Goma arábiga, . . . med. drac.
Háganse píldoras de dos gr. (pp. ww.)

R. Ruibarbo en polvo, drac. y med.
Jabon de Venecia, . cuatro drac.
Esencia de trementina, , . c. s.
Háganse píldoras de cinco gr. *(sm.)*

R. Hiel de vaca espesada,
Goma amoniaco en polvo y
Ruibarbo pulverizado,
a. . . . . una onz.
Háganse píldoras de dos gr. (li.)

R. Ruibarbo, ... una drac.
Jabon blanco, ... diez gr.
Agua, ... c. s.
Háganse quince píldoras. — Dósis; cuatro á la vez. (*e.*)

R. Ruibarbo, ... drac. y med.
Sulfato de hierro, . . med. drac.
Jabon blanco, ... dos escrp.
Agua, ... c. s.
Háganse cuarenta píldoras. (*e.*)

PILDORAS AMARGAS. (*vm.*)

R. Estracto de genciana y
Jabon blanco, a. . . . . una pt.
Ruibarbo, ... part. y med.
Tritúrense en un mortero para hacer masa de píldoras.

PILDORAS ABSORVENTES.

Pilulæ rhabarbarinæ antacidæ. (sw.)

R. Ruibarbo y
Magnesia calcinada, a. dos drac.
Estracto de genciana, . . . c. s.
Háganse píldoras de cinco gr.

PILDORAS ESTIMULANTES.

Pilulæ roborantes ad blennorrhœam. (sa. sy.)

R. Ruibarbo en polvo, . una drac.
Trementina cocida, . . dos drac.
Háganse treinta y seis píldoras. *(sa.)*

R. Ruibarbo y
Goma arábiga, a. . . . una onz.
Bálsamo de Copayba, . . . c. s.
Háganse píldoras de cuatro granos. *(sy.)*

ELECTUARIO ESTOMACAL.

Electuarium stomachicum. (sw.)

R. Ruibarbo en polvo, drac. y med.
Polvos de yaro y
——— aromáticos, a. una drac.
Oxido de hierro negro, un escrp.
Conserva de corteza de naranja, dos onz.
Dósis; el volúmen de una nuez moscada, dos veces al dia.

ELECTUARIO ANTIDISENTÉRICO. (*ca.*)

R. Confeccion jabonosa, . dos onz.
Bálsamo de Locatelli, . una onz.
Ruibarbo en polvo, . med. onz.
Jarabe de malvavisco, . . . c. s.
La misma dósis que de los precedentes.

MERMELADA PURGANTE.

Conditum purgatioum, Pulticula saponacea. (sa. sm. sp.)

R. Sulfato de potasa, . . una drac.
Cremor de tártaro, . . med. onz.
Ruibarbo, ... drac. y med.

Pulpa de tamarindos , . dos onz.
Méz. *(sa.)* — Dósis ; una cuchta.

R. Jabon oficinal , . . . med. drac.
Agua de menta , . . . tres drac.
Añádase á la solucion
Yema de huevo , . . . una drac.
Magnesia blanca, . . . dos escrp.
Ruibarbo , ... un escrp.
Jarabe de altea y
——— de manzanilla , a. dos drac.
Méz. *(sp.)* — Aconsejada en el cólico de los niños.

R. Ruibarbo y
Cremor de tártaro , a. . dos drac.
Pulpa de ciruelas. . . ocho onz.
Jarabe de membrillos , . . c. s.
Méz. *(sm.)* — Dósis ; cuatro cuchtas. cada dia.

PASAS VERMIFUGAS.

Passulæ anthelminticæ. (pa.)

R. Pasas de Corinto , . . med. lib.
Ruibarbo en una muñequita,
med. onz.
Coralina en id. , . . . una onz.
Agua de verdolaga, . cuatro onz.
Póngase al horno despues que se haya sacado el pan , y déjese la vasija hasta que las pasas se hayan hinchado y ablandado.

PASTILLAS DE RUIBARBO.

Tabellæ de rheo, s. *diarrhodon cum Rhabarbaro.* (f. sa.)

R. Ruibarbo en polvo , . med. onz.
Mucílago de goma tragacanto hecho con agua de canela, . c. s.
Háganse pastillas de doce granos. (f.)

R. Polvos de diarrodon y
Polvos de ruibarbo , a. una onz.
——— de azucar blanca , una lib.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse pastillas. (sa.)

R. Polvos de ruibarbo y
Cremor de tártaro, a. . dos drac.
Corteza fresca de naranja ,
med. drac.
Azucar disuelta en agua de azahar,
cuatro onz.
Háganse pastillas. (br.)

POCION PURGANTE.

Haustus catharticus pro infantibus.
(pie. sæ.)

R. Ruibarbo, ... doce gr.
Agua de achicorias, . . tres onz.
Jarabe de achicorias, . . una onz.
Se dá á cuch. á los niños de nueve á diez años. *(pie.)*

R. Ruibarbo , . . . seis á ocho gr.
Sub-carbonato de cal , . diez gr.
Agua pura , ... tres drac.
——— de canela , . . . dos drac.
Jarabe comun , ... una drac.
Para tomar como el precedente. (*sæ.*)

POCION PURGANTE Y VERMIFUGA.
(*pie.*)

R. Cinabrio , . , ... diez gr.
Resina de guayaco y
——— de jalapa , a. . cinco gr.
Ruibarbo, ... una drac.
Antimonio diaforético, quince gr.
Jarabe de achicorias compuesto ,
seis drac.
Agua de achicorias , . . dos onz.

MISTURA AMARGA.

Miatura amara cum rheo. (sæ.)

R. Sulfato de potasa, . . med. onz.

Ruibarbo y
Estracto de genciana, a. dos drac.
Agua de menta piperita,
ocho onz.

Para tomar á cuch.

§. II. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL RUIBARBO, SIN EL VEHICULO EMPLEADO PARA SU ESTRACCION.

ESTRACTO ACUOSO DE RUIBARBO.

Extractum rhei, s. *rhabarbari.* (ams. ba. br. d. e. f. fe. g. han. li. o. pa. pr. sa. w. *vm.*)

R. Ruibarbo partido en pedazos pequeños, ... c. s. q.
Agua fria, ... c. s.

para sumergirle un poco; al cabo de veinte y cuatro horas añádase una cantidad de agua igual á tres veces el peso del ruibarbo y cuélese sin esprimir; échese sobre el resíduo una cantidad de agua igual á su peso; cuélese esprimiendo un poco; reúnanse los dos líquidos; clarifíquense con clara de huevo y evapórense hasta la consistencia de estracto denso. (*vm.*)

ba. prescribe se haga macerar en dos veces, y por veinte y cuatro horas cada vez, una parte de ruibarbo en cinco de agua fria.

R. Ruibarbo escogido, . . una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.

Déjese en maceracion por cuatro horas en un sitio caliente; hiérvase despues un poco; cuélese por espresion y evapórese hasta la consistencia necesaria. (br. pa. w. fe.)

R. Ruibarbo escogido y partido menudamente, ... una lib.
Agua, ... diez y seis lib.

Déjense en maceracion por tres dias en una vasija de barro vidriada; cuézase despues un poco y cuélese sin espresion; evapórese despues el líquido depurado meneandolo siempre con una espátula hasta la consistencia de jarabe, y despues al B. A. hasta que no se pegue á los dedos. (e.)

R. Ruibarbo partido, . . . una lib.
Agua hirviendo, diez y seis lib.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas; déjese reposar y cuélese; échense sobre el resíduo ocho lib. de agua hirviendo y cuélese despues de veinte y cuatro horas; mézclense los dos líquidos y evapórense lo conveniente. (ams. sa.)

R. Ruibarbo escogido, . . . una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.

Hágase hervir ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hágase hervir otra vez el resíduo con cuatro partes de agua y cuélese del mismo modo; mézclense los dos líquidos; decántense despues del suficiente reposo y evapórense hasta la consistencia de estracto. (d. han. li. o. pr.)

su. prescribe tres ó cuatro ebulliciones sucesivas con tres partes de agua cada vez.

R. Ruibarbo, ... una lib.
Agua fria, ... cuatro lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas meneándolo de cuando en cuando y cuélese; échese nueva agua sobre el ruibarbo y déjese en maceracion del mismo modo; cuélese despues esprimiendo ligeramente; mézclense los dos líquidos; cuélese otra vez y e-

vapórese al B. M. hasta la consistencia conveniente. (f.)

R. Ruibarbo escogido, . . dos lib.
Agua fria, ... doce lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas, meneándolo con frecuencia y cuélese; déjese macerar el resíduo en ocho lib. de nueva agua fria y cuélese; mézclense los dos líquidos; evapórense al B. M. hasta la consistencia de jarabe; échense entonces unas dos líneas del líquido en platos; evapórese hasta la sequedad, al fuego ó al B. M., y despréndanse las escamas. (f.)

Esta es la *Sal esencial de ruibarbo*.

Dósis; de quince á veinte granos.

ESTRACTO ALCOHÓLICO DE RUIBARBO.

Extractum rhei, s. *rhabarbari alcoholicum*. (fu. lo. p. po. s. wu. *c.*)

R. Ruibarbo partido y
Alcohol, a. . . . . dos lib.
Agua comun, ... nueve lib.

Déjense en digestion por doce horas; cuélese por espresion; estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese el resíduo hasta la consistencia de estracto. (po.)

fu. y wu. prescriben una lib. de ruibarbo, otra de alcohol, ocho de agua y tres dias de digestion; — s. dos partes de ruibarbo, tres de alcohol, nueve de agua y veinte y cuatro horas de digestion; — lo. y *c.* una lib. de ruibarbo, med. azumbre de alcohol (0,930) y catorce cuartillos de agua.

R. Ruibarbo en polvo, . . una lib.
Alcohol, ... cuatro lib.

Déjense en digestion por cuatro dias; decántese y hágase hervir el resíduo con diez lib. de agua reducidas á dos; cuélese el cocimiento y evapórese despues; destílese la tintura hasta la consistencia de miel; mézclese entonces con el resíduo del cocimiento y evapórese todo meneando sin cesar hasta la consistencia conveniente. (p.)

La misma dósis que en el precedente.

ESTRACTO DE RUIBARBO COMPUESTO.

Extractum rhei compositum, s. *catholicum*, s. *panchymagogum*, s. *cnico-pharmacum*. (b.* d. o. pa. po. pr. s. *pid.*)

R. Estracto de ruibarbo, . tres onz.
——— de aloes, . . . una onz.

Háganse ablandar en alcohol al B. M. y evapórese despues hasta la consistencia de masa de píldoras. (po.)

R. Estracto de ruibarbo, . tres onz.
——— de aloes, . . una onz.

Méz. y añádase

Jabon de jalapa disuelto en c. s. de alcohol, ... una onz.

Evapórese al B. M. hasta la consistencia conveniente. (b.* o. pr. s.)

de. prescribe dos onz. de estracto de ruibarbo, cinco drac. de estracto de acibar y una onz. de jabon de jalapa disuelto en alcohol.

R. Estracto de ruibarbo, . dos onz.
——— acuoso de acibar, med. onz.
——— de eléboro negro, una drac. y treinta y seis gr.

Mézclense en un mortero caliente con

Resina de jalapa en polvo, dos drac. y veinte y cuatro gr.

Consérvese para el uso. (*pid.*)

R. Ruibarbo, ... una onz.
Simientes de alazor, . cuatro onz.
Polipodio de encina, . . dos onz.

:

Gengibre blanco, . . dos drac.
Hojas de sen y
Turbit, a. . . . dos onz. y med.
Agarico blanco, . . . seis drac.
Escamonea, ... diez drac.
Maná escogido, . dos onz. y med.

Déjense en infusion en muchas veces el agarico, la escamónea y el turbit en dos lib. de agua, para estraer sus principios; hágase macerar en seguida el resíduo en tres lib. de agua hirviendo; hiérvase despues hasta que se consuma la tercera parte añadiendo á lo último el resíduo de la primera infusion espirituosa; cuélese por espresion; disuélvase el maná en el líquido; clarifíquese la solucion; mézclese con el estracto espirituoso; disípese el alcohol por un calor suave y evapórese lo demas hasta la consistencia de emplasto blando. (pa.)

Es purgante. — La dósis del último es de un escrp. á med. drac. sin maná, y de una drac. á cuatro escrp. con él.

§. III. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL RUIBARBO CON EL VEHICULO EMPLEADO PARA ESTRAERLE.

A. *Estraido por el agua.*

Infusum rhei, s. *rhabarbari*, *Tinctura rhei aquosa*, *Anima rhei.* (a. b.* ba. ed. g. ham. lo. p. wu. *b. br. c. fp. ra.*)

R. Ruibarbo partido, . . una drac.
Agua hirviendo, . . . un cuartillo.

Déjese en maceracion por dos horas y cuélese. (b.* lo. *fp.*)

ba. prescribe una parte del ruibarbo y doce de agua; — a. med. onz. de ruibarbo y med. lib. de agua — *br.* tres onz. de ruibarbo y dos lib. y med. de agua; — *ra.* una onz. de ruibarbo y una lib. de agua; — ham. una onz. de ruibarbo y c. s. de agua para obtener ocho onz. de líquido colado; — y *b.* tres drac. de ruibarbo y seis onz. de agua.

R. Ruibarbo quebrantado, med. onz.
Agua hirviendo, . . . ocho onz.

Déjese en maceracion por doce horas en vasija tapada y añádase

Agua de canela vinosa, . una onz.

Cuélese. (ed. p. *c.*)

wu. prescribe tres drac. de ruibarbo, med. lib. de agua y seis drac. de agua de canela vinosa.

R. Ruibarbo en polvo, . . una onz.
Agua de menta piperita, doce onz.

Déjense en digestion á un calor suave y cuélese. (g.)

Tónico y purgante ligero aconsejado en algunas enfermedades crónicas, y en la convalecencia de las afecciones agudas que no han existido en los órganos digestivos.

POCION TONICA.

Infusum rhei amarum, *Decoctum amarum-aromaticum laxativum.* (an. *b.*)

R. Cocimiento amargo, . . una lib.
Infusion de ruibarbo, cuatro onz.
Agua de menta piperita, una onz.

Para tomar poco á poco. (*b*)

R. Ruibarbo, ... tres drac.
Corteza de naranja, . . med. drac.
Agua de menta piperita,
cuatro onz.

Disuélvase en el líquido

Estracto de centaura menor,
dos drac.

Para tomar en el dia. (*au.*)

POCION ESCITANTE Y FUNDENTE.

Haustus incitans resolvens. (b.)

R. Infusion de ruibarbo, . seis onz.
Jarabe de acetato de morfina, una onz.
Para tomar en dos veces, en los sujetos irritables.

R. Infusion de ruibarbo, . seis onz.
Agua de menta piperita, una onz.
Licor de Hoffmann, . un escrp.
Para tomar en cuatro veces.

POCION LAXANTE Y FUNDENTE.

Potio resolvens et laxans. (b.)

R. Infusion de ruibarbo, . ocho onz.
Sub-carbonato de potasa, tres drac.
Jarabe de achicorias compuesto, una onz.
Para tomar en dos ó tres veces.

COCIMIENTO DE RUIBARBO.

Decoctum rhabarbari, Anima rhabarbari. (e.)

R. Ruibarbo quebrantado, dos drac.
Agua, ... ocho onz.
Hiérvase ligeramente y cuélese.
Para tomar en una sola dósis.

JARABE DE RUIBARBO.

Syrupus rhei, s. *rhei palmati*, s. *de rheo*, s. *de rhabarbaro.* (am. an. b. ba. be. fi. he. p. su. *c. sw. vm.*)

R. Infusion de ruibarbo, . . una pt.
Azúcar blanca pulverizada, dos pt.
Hágase jarabe. (f. fi. he. p. su.)

R. Ruibarbo partido menudamente, una pt.
Agua hirviendo, ... doce pt.
Déjense en digestion por doce horas á la temperatura de 30 á 40.°, y añádase á una parte de líquido colado
Azúcar blanca, ... dos pt.
Hágase jarabe. (am. ba. *c.*)

R. Ruibarbo partido, . . . una pt.
Agua, ... ocho pt.
Déjese en infusion, repítase esta en la misma cantidad de agua, reúnanse los dos líquidos colados, y añádase
Azúcar blanca, ... catorce pt.
Clarifíquese con clara de huevo, y cuézase hasta la consistencia de jarabe. (*sw. vm.*)

R. Ruibarbo partido, . . . ocho onz.
Agua, ... cuatro lib.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, cuélese y añádase al líquido depurado por el reposo
Azúcar blanca, . . . cuatro lib.
Al magma ó residuo que queda, añádase
Agua, ... cuatro lib.
Déjese en infusion á un calor aumentado poco á poco hasta la ebulicion; cuélese por espresion, y añádase al líquido
Azúcar blanca, ... cuatro lib.
Clarifíquese, evapórese hasta la consistencia conveniente, y mézclese el jarabe medio frio al precedente. (an.)

R. Ruibarbo partido, . . . tres onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjese en maceracion por doce horas, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion, fíltrese, déjese reposar, decántese y añádase
Azúcar blanca, ... dos lib.
Hágase jarabe á un calor suave. (b. be.)

JARABE DE RUIBARBO AROMATICO.

Syrupus rhei aromaticus. (am. f. po. *c.*)

R. Ruibarbo, ... tres onz.
Canela, ... seis drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjese en digestion por una noche; cuélese por la mañana y añádase á veinte onz. de líquido
Azucar blanca, ... tres lib.
Hágase jarabe. (po.)

R. Ruibarbo en polvo, . diez drac.
Simiente de cilantro y
——— de hinojo, a. med. drac.
Agua, ... doce onz. y med.
Echese en una botella que se llene hasta el cuello; póngase esta al B. M.; hágasele hervir por veinte minutos; quítese el baño del fuego; déjese enfriar por grados; retírese la botella; decántese el líquido al cabo de veinte y cuatro horas; cuélese y añádase
Azucar blanca, veinte y cinco onz.
Disuélvase al B. M. (f.)

R. Ruibarbo, ... cinco drac.
Clavos de especia y
Canela, a. . . . . med onz.
Nuez moscada, ... n.º 2.
Agua, ... dos cuartillos.
Déjense en digestion; redúzcase despues á la mitad por la evaporacion y añádase
Azucar, ... una lib.
Alcohol debilitado, un cuartillo.
Hágase hervir un poco. (am. *c.*)

JARABE DE RUIBARBO COMPUESTO.

Jarabe de achicorias con ruibarbo; Syrupus de rheo, s. *de cichorio compositus.* (a. am. ams. br. e. f. g. han. pa. sa. w. wu. *bo. pid.*)

R. Yerba fresca de achicoria,
cuatro onz.
Agua, ... cuatro lib.
Cuézase hasta que se consuma la tercera parte y añádase á lo último
Ruibarbo escogido y partido,
cuatro onz.
Cuélese por espresion y añádase al líquido
Azucar blanca, . . . cuatro lib.
Clarifíquese y cuézase hasta la consistencia de jarabe. (e.)

R. Yerba y raiz fresca de achicorias,
dos onz.
Agua pura, ... tres lib.
Cuézase hasta que se consuma una tercera parte y añádase
Ruibarbo partido, . . . tres onz.
Déjese en digestion por doce horas; cuélese despues de una ligera ebulicion y añádase al líquido depurado por el reposo
Azucar blanca, ... tres lib.
Hágase jarabe por decoccion. (ams.)

R. Zumo depurado de achicorias,
dos lib.
Ruibarbo escogido y partido,
dos onz,
Déjese en digestion por una noche sobre cenizas calientes; esprímase por la mañana; déjese de nuevo en digestion el residuo con
Agua hirviendo, ... dos lib.
Despues de una corta ebulicion cuélese por espresion; reúnanse los dos líquidos y añádase
Jarabe comun, ... tres lib.
Hágase jarabe. (*sa.*)

R. Raiz de achicoria silvestre, seis onz.
Hojas de achicoria silvestre, nueve onz.
—— de fumaria y
—— de escolopendra, a. tres onz.
Bayas de alkekenge, . . dos onz.
Agua comun, ... catorce lib.

Cuézase hasta que no queden mas que doce lib. de líquido; cuélese y añádase al líquido

Azucar blanca, ... cinco lib.

Clarifíquese y hágase jarabe espeso á un fuego lento. Por separado

R. Ruibarbo quebrantado, seis onz.
Sándalo cetrino y
Canela, a. . . . . med. onz.
Agua comun, ... ocho lib.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas en vasija tapada; cuélese esprimiendo ligeramente y mézclese el líquido con el jarabe precedente; hágase dar un hervor y échese el jarabe todavía caliente sobre un saquito que contenga

Canela y
Sándalo cetrino, a. . . med. onz.

Déjense en infusion por seis horas y decántese. (f.)

Bosson aconseja que se cuezan las hojas y el leño por un cuarto de hora; que se infunda despues por dos horas en diez lib. de agua; que se cuele, se decante y se haga con veinte y cinco lib. de azucar un jarabe cocido á 25.º; y por separado, que se prepare el dia antes una infusion con el ruibarbo, los aromas, tres lib. de agua y dos drac. de sub-carbonato de potasa; que se cuele sin esprimir; que se mezcle el líquido con el jarabe; que se cueza lo necesario y que se eche la mezcla hirviendo sobre el sándalo y la canela. (f.**)

R. Raiz de achicoria silvestre y
—— de diente de leon,
a. . . . . cuatro onz.
Agua de fuente, ... c. s.

para reducirlo á tres lib. por la coccion. En este estado

R. Ruibarbo partido, . . . seis onz.
Agua hirviendo, ... tres lib.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas; esprímase, mézclese el líquido colado con el cocimiento precedente y cuézase todo con

Azucar blanca, ... seis lib.

Echese el jarabe hirviendo sobre

Leño de sándalo cetrino y
Canela, a. . . . . med. onz.

Esprímase despues de frio y cuélese por una manga. (g.)

R. Raiz de acebo menor y
—— de esparraguera, a. tres onz.
Hojas de achicorias silvestre,
—— de pimpinela,
—— de culantrillo,
—— de agrimonia y
—— de perifollo, a. . un puñ.
Agua, ... tres lib.

Hágase hervir é infúndase á lo último en el cocimiento

Sen mondado, ... tres onz.
Ruibarbo quebrantado, una onz.
Raiz de turbit y
Hermodatiles, a. . . . seis drac.
Flores de calendula,
—— de taray y
—— de sauco, a. . med. puñ.

Cuélese y añádase

Azucar blanca, . . . lib. y med.

Hágase jarabe. (h.)

R. Yerba de achicorias, . una onz.

Raiz de achicorias, . . tres onz.
Ruibarbo, ... cuatro onz.
Sub-carbonato de potasa,
med. drac.
Agua de fuente, ... ocho lib.

Cuézase hasta que queden seis lib. de líquido; cuélese esprimiendo con fuerza y añádase

Azúcar blanca, ... seis lib.

Clarifíquese y cuézase hasta la consistencia de jarabe. (a.)

R. Raiz de achicorias, dos onz. y med.
Agua de fuente, . . . lib. y med.

Hágase hervir hasta que no quede mas que una lib. de líquido y añádase entonces

Sub-carbonato de potasa,
veinte gr.

Hágase hervir lentamente, cuélese por espresion y añádase

Azúcar blanca, . diez y seis onz.

Clarifíquese, cuélese y añádase

Agua espirituosa de canela,
una onz.

Méz. ex. (br. han. pa. w.)

R. Raiz de achicoria silvestre,
tres onz.
Agua de fuente, ... tres lib.

Consúmase la tercera parte por la ebulicion y añádase

R. Ruibarbo partido, . . . dos onz.
Sub-carbonato de potasa,
med. drac.

Ténganse en digestion por algunas horas en un sitio caliente, hágasele dar en seguida uno ó dos hervores, cuélese por espresion y añádase al líquido

Azúcar clarificada,
treinta y dos onz.

Cuélese (wu.)

pid. que trae la misma fórmula, añade

Agua de canela espirituosa,
dos onz.

sp. prescribe dos onz. y med. de raiz de achicoria, diez y ocho onz. de agua reducidas á doce por la coccion, una onz. de ruibarbo; un escrp. de sub-carbonato y veinte y dos onz. de azúcar.

TINTURA ACUOSA ALCALINA DE RUIBARBO.

Tinctura rhei, s. *rhabarbari*, *Anima rhei*, *Infusum rhei alcalisatum*, s. *cum sub-carbonato potassæ*. (a. ams. an. b.* ba. br. d. dd. fu. han. li. o. pa. pr. s. w. *sw. vm.*)

R. Infusion de ruibarbo simple,
once pt.
Sub-carbonato de potasa, una pt.

Disuélvase. (ba.)

R. Ruibarbo partido, . . . tres pt.
Agua comun, . . . cincuenta pt.

Caliéntese hasta que el líquido principie á hervir; retírese entonces del fuego y añádase

Sub-carbonato de potasa, una pt.

Cuélese despues de frio. (*vm.*)

R. Ruibarbo, ... med. onz.
Sub-carbonato de potasa,
una drac.
Agua pura, ... seis onz.

Déjese en infusion por dos horas á un calor aumentado gradualmente hasta que el líquido dé un hervor; cuélese, déjese reposar y decántese. (a. an.)

d. prescribe una onz. de ruibarbo, dos drac. de sub-carbonato, diez onz. de agua hirviendo, y que se haga dar

un hervor; — y fu. una onz. de ruibarbo, cuatro escrp. de sub-carbonato, ocho onz. de agua y veinte y cuatro horas de digestion.

R. Ruibarbo, ... dos drac.
Sub-carbonato de potasa, med. drac.
Agua, ... c. s.

para obtener cuatro onz. de líquido colado. Añádase despues que el líquido haya dado un hervor

Jarabe comun, ... una onz.
Méz. ex. (*sw.*)

R. Ruibarbo, ... dos pt.
Agua hirviendo, . . diez y seis pt.

Déjese en digestion por dos horas, cuélese esprimiendo ligeramente y añádase

Sub-carbonato de potasa, med. pt.
Alcohol, ... una pt.
Méz. ex. (li.)

sw. prescribe una onz. de ruibarbo, tres drac. de sub-carbonato, dos onz. de agua hirviendo, veinte y cuatro horas de maceracion y dos onz. de alcohol de canela; — ams. una onz. de ruibarbo, seis de agua hirviendo, seis horas de digestion, cuatro onz. de agua de canela y dos drac. de sub-carbonato; — b.* han. o. pr. y s. onz. y med. de ruibarbo, tres drac. de sub-carbonato, doce onz. de agua, doce horas de maceracion y dos onz. de agua de canela vinosa; — dd. med onz. de ruibarbo, una drac. de sub-carbonato, cuatro onz. de agua hirviendo, doce horas de digestion y una onz. de agua de hinojo; — w. una onz. de ruibarbo, dos drac. de sub-carbonato, seis onz. de agua de achicorias, otro tanto de la de canela buglosada, y veinte y cuatro horas de digestion; — pa. una onz. de ruibarbo, dos drac. de sub-carbonato, diez y seis onz. de agua de achicorias y veinte y cuatro horas de digestion; — y br. una onz. de ruibarbo, drac. y med. de sub-carbonato, tres onz. de agua pura y otro tanto de agua de canela.

Tónica, considerada tambien como absorvente, y aconsejada contra la ictericia, la hipocondría y los ácidos en las primeras vias. — Dósis; de dos drac. á una onz. dos ó tres veces al dia.

TINTURA ACUOSA SALINA DE RUIBARBO.

Infusum rhei salinum, s. *boraxatum*. (b.* f.** he. po. wu. *ca. pid. sp.*)

R. Ruibarbo quebrantado, una onz.
Agua destilada, . . . nueve onz.
Acetato de potasa, . . una drac.

Despues de cuatro horas de infusion fíltrese. (*ca.*)

R. Vinagre, ... nueve onz.
Sub-carbonato de potasa, .. c. s.

para saturar el ácido. Póngase á digerir en la solucion por doce horas

Ruibarbo partido, . . . una onz.

Fíltrese. (*sp.*)

R. Ruibarbo, ... med. onz.
Tártaro tartarizado, . . dos drac.
Agua hirviendo, . . . med. lib.

Ténganse en digestion por veinte y cuatro horas y fíltrese (*pid.*)

wu. trae la misma fórmula, añadiendo un escrp. de cochinilla; — y he. deja la eleccion entre el tártaro tartarizado y el boratado.

R. Ruibarbo, ... onz. y med.
Borax en polvo, . . . dos drac.

Agua hirviendo, ... una lib.
Déjese en maceracion por doce horas y añádase á diez onz. de líquido colado
Agua de canela vinosa, dos onz.
Méz. (b.* f.** po.)
Dósis; una ó dos cuch. tres ó cuatro veces al dia.

COCIMIENTO APERITIVO. (br.)

R. Raiz de ruibarbo y
—— de rubia, a. . . tres drac.
Sub-carbonato de potasa,
dos drac.
Agua de fuente, . . . ocho lib.
Hiérvase por uua hora, cuélese y añádase
Cocimiento de gengibre, tres onz.

ELIXIR VISCERAL DE ROSENSTEIN.

Elixir viscerale Rosensteinii. (b.*)

R. Ruibarbo partido, . . ocho onz.
Sub-carbonato de potasa, tres onz.
Agua de canela,
cuarenta y ocho onz.
Ténganse en digestion por quince dias en un sitio fresco y en un frasco bien tapado, meneándolo con frecuencia, y añádase
Corteza fresca de naranja, dos onz.
Cardamomo menor y
Simiente de hinojo, a. med. onz.
Déjense en digestion por otros ocho dias meneándolo con frecuencia y esprímase. Echese sobre el residuo
Cocimiento de raiz de achicorias,
seis onz.
Agítese; cuélese por espresion; mézclese este líquido con el primero, y disuélvase en la mezcla
Azúcar, . . veinte y cuatro onz.
Es tónico y fortificante. — Dósis; de med. á una cuch.

JARABE DE RUIBARBO ALCALINO.

Syrupus rhei alcalisatus. (d. fe. fu. han. li. o. pr. r. w. *sw.*)

R. Tintura acuosa alcalina de ruibarbo, ... una lib.
Azúcar blanca, ... dos lib.
Cuézase hasta la consistencia de jarabe. (fu.)

li. prescribe diez onz. de tintura acuosa alcalina y diez y seis onz. de azúcar.

R. Ruibarbo, ... cuatro onz.
Sub-carbonato de potasa,
dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Hiérvase á un fuego lento; cuélese por espresion y añádase á veinte onz. de líquido
Azúcar blanca, ... tres lib.
Hágase jarabe. (d.)

R. Ruibarbo, ... tres onz.
Sub-carbonato de potasa, dos drac.
Agua hirviendo. . . . . dos lib.
Cuézase por dos horas y añádase á cada veinte onz. de líquido colado
Azúcar blanca, ... tres lib.
Hágase jarabe. (o.)

r. prescribe dos onz. de ruibarbo, drac. y med. de sal, diez y ocho onz. de agua y dos pt. de azúcar.

R. Ruibarbo, ... tres onz.
Canela, ... tres drac.
Sub-carbonato de potasa,
dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjense en digestion por doce horas;

cuélese y añádase á veinte onz. de líquido

Azúcar blanca, ... tres lib.

Hágase jarabe. (*sw.*)

han. y pr. prescriben seis drac. de canela.

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Sub-carbonato de potasa, una drac.
Zumo de achicorias hirviendo, tres lib.

Déjese en maceracion por doce horas; cuélese por espresion y añádase al líquido

Azúcar, ... dos lib.

Disuélvase. (fe.)

R. Ruibarbo y
Hojas de sen, a. . . onz. y med.
Canela, ... drac. y med.
Sal de tártaro, ... dos escrp.
Gengibre, ... med. drac.
Agua de achicorias, . . diez onz.
—— de rosas, . . . cuatro onz.

Déjense en digestion por tres dias en un sitio caliente; hágase dar un hervor; esprímase; clarifíquese con clara de huevo y añádase á nueve onz. de líquido

Azúcar blanca, . diez y seis onz.

Hágase jarabe. (w.)

POCION CON EL MANA Y EL RUIBARBO. (ff. *ra.*)

R. Ruibarbo, ... med. onz.
Agua, ... cuatro onz.

Hiérvase por algunos minutos y disuélvase despues en el líquido colado

Maná, ... dos onz.

POCION PURGANTE. (*pie.*)

R. Ruibarbo y
Sub-carbonato de potasa, a. . . . . una drac.
Cocimiento de parietaria, . c. s.

Hiérvase y disuélvase en una onz. de líquido

Maná, ... dos onz.

Cuélese y añádase

Jarabe de ruibarbo compuesto, una onz.

POCION PURGANTE Y TONICA. (*pie.*)

R. Mirobolanos cetrinos, dos drac.
Raspaduras de sándalo cetrino, una drac.
Ruibarbo quebrantado, med. drac.
Maná, ... dos onz.
Agua hirviendo, ... c. s.

Añádase al líquido colado

Confeccion de jacintos, una drac.

MISTURA CARMINATIVA. (*sm.*)

R. Tintura acuosa de ruibarbo, seis onz.
Licor anodino mineral, una drac.

Dósis; una cuch. tres ó cuatro veces al dia.

TINTURA APERITIVA (ham.)

R. Infusion acuosa de ruibarbo y
Licor de tierra foliada de tártaro, a. . . . . med. onz.
Vino antimonial de Huxham, una drac.

B. *Estraido por el vino.*

VINO DE RUIBARBO.

Tinctura rhei, s. *rhabarbari vinosa*, *Vinum rhei palmati aromaticum*, s. *compositum*, *Elixir rhei dulce*, s. *com-*

positum. (am. an. b. be. cd. fi. g. o. p. su. *c. ca. vm.*)

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Canela, ... una drac.
Vino blanco, ... lib. y med.

Déjese en maceracion por ocho dias y cuélese. (p.)

R. Ruibarbo, ... ocho pt.
Anís estrellado, ... una pt.
Vino de Málaga,
noventa y seis pt.

Déjense en digestion fria por ocho dias, cuélese esprimiendo ligeramente y fíltrese. (*vm.*)

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Cardamomo menor, . una drac.
Alcohol (15.°), ... dos onz.
Vino blanco de España, una lib.

Déjense en maceracion por ocho dias y cuélese. *(be.)*

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Cardamomo menor, . dos drac.
Vino de España, . . . una lib.

Déjense en digestion por cuatro dias y cuélese por espresion. (fi. su.)

R. Ruibarbo y
Alcohol (0,935), a. . . dos onz.
Canela blanca, ... una drac.
Vino blanco de España,
quince onz.

Déjense en digestion por ocho dias y fíltrese. (am. b. ed. *c. ca.*)

ams. trae la misma fórmula; pero prescribe alcohol de 0,931.

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Corteza de naranja mondada,
med. onz.
Cardamomo menor, . . dos drac.
Vino blanco, ... dos lib.
Alcohol, ... dos onz.

Cuélese despues de algunos dias de maceracion. (b.* o.)

R. Ruibarbo, ... una onz.
Cardamomo menor, . . dos drac.
Azafran, ... una drac.
Vino de España, . . ocho onz.

Déjense en digestion por seis dias, cuélese y échese sobre el residuo

Vino de España, . . cuatro onz.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, cuélese y mézclense los dos líquidos. (an.)

g. prescribe dos onz. de ruibarbo, med. onz. de cardamomo, dos drac. de azafran y dos lib. de vino de España.

Es escitante y ligero purgante, aconsejado con particularidad en la hipocondría, el histerismo, las escrófulas y la tabes. — Dósis; de una á dos cuch. para los adultos y de treinta á sesenta gotas para los niños.

VINO DE RUIBARBO AMARGO.

Vinum rhei, s. *rabarbari amarum*, *Elixir rhei amarum.* (d. fi. su. *vm.*)

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Raiz de genciana, . . seis drac.
Cardamomo menor, . med. onz.
Vino blanco, ... dos lib.

Déjense en digestion á un calor suave y fíltrese. (d.)

R. Ruibarbo, ... una onz.
Raiz de genciana, . . . dos drac.
Canela blanca, ... una drac.
Vino de España, . . . una lib.

Déjense en digestion por tres dias y cuélese por espresion. (fi. su.)

R. Canela, ... una pt.

Vino de Madera,
noventa y seis pt.

Déjense en infusion fria por dos dias y añádase

Ruibarbo, ... ocho pt.

Añádase pasados ocho dias

Raiz de genciana, ... una pt.

Al cabo de algunos dias, cuélese esprimiendo ligeramente y fíltrese. (*vm.*)

Escitante y tónico.—Los mismos usos y dósis que los precedentes.

TINTURA DE DAREL.

Tinctura rhei Darelli, s. *dulcis.* (b.* ba. br. han. hc. po. pr. s. su. *pie. vm.*)

R. Ruibarbo, ... ocho pt.
Corteza de naranja agria, dos pt.
Cardamomo menor, . . una pt.
Raiz de énula, ... cuatro pt.
Vino de Madera,
ciento veinte y ocho pt.

Déjense en maceracion fria por muchos dias; cuélese esprimiendo ligeramente y fíltrese. (*vm.*)

R. Ruibarbo partido, . . . dos onz.
Corteza de naranja mondada,
med. onz.
Cardamomo menor, . dos drac.
Vino de Málaga, . . . dos lib.

Déjense en digestion por cuatro dias á un calor suave; cuélese por espresion y añádase

Estracto de énula, . med. onz.
Azucar blanca, ... tres onz.

Consérvese. (ba. po. pr. s.)

R. Ruibarbo en polvo, . . dos onz.
Pasas de Corinto, . . . una onz.
Corteza de cidra y
Raiz de regaliz, a. . . med. onz.
Cardamomo menor, . . dos drac.
Vino de Oporto, ... dos lib.

Déjense en digestion por dos dias; cuélese por espresion y añádase al líquido

Estracto de énula, . . med. onz.
Azucar blanca, ... tres onz.

Consérvese. (b.* br. han. hc. *pie.*)

R. Ruibarbo, ... onz. y med.
Cardamomo menor, . med. onz.
Pasas sin granos, . . . tres onz.
Vino de España, . . . lib. y med.

Déjense en maceracion por cuatro dias en un sitio caliente; cuélese por espresion y añádase

Azucar blanca, . . . cuatro onz.
Estracto de énula, . . med. onz.
Almáciga, ... med. drac.
Sub-carbonato de potasa,
una drac.

Consérvese. (su.)

Las propiedades y usos de esta tintura son los mismos que los de la precedente. Se aconseja tambien contra las lombrices; pero entonces se reemplaza el vino por el buen hidromel, y despues de cuatro dias de digestion en lugar del estracto de énula, se diluyen en el líquido colado dos onz. de estracto de tanaceto.

C. *Estraido por el alcohol.*

TINTURA ALCOHÓLICA DE RUIBARBO.

Alcohol cum rheo. (a. ams. br.)

R. Ruibarbo escogido y partido,
una onz.
Alcohol, ... una lib.

Déjese en maceracion por un dia, y fíltrese. (br.)

ams. prescribe una parte de ruibar-

bo, ocho de alcohol (0,907) y ocho dias de digestion; — y a. dos onz. de ruibarbo y una lib. de alcohol. (0,910.)

Escitante y purgante; aconsejada en la diarrea, el cólico, las enfermedades atribuidas á la debilidad de los intestinos y en los infartos de las vísceras del bajo vientre. Se da asociado con un vehículo apropiado. En la química sirve para indicar la presencia de los álcalis que los hace pasar de amarillos á rojos.

TINTURA ALCOHOLICA AROMATICA DE RUIBARBO.

Tinctura rhei spirituosa, s. *rhabarbari*. (am. du. ed. fu. he. li. lo. p. *c. ca. pid. sæ. vm.*)

R. Ruibarbo partido, . . . una pt.
Aguardiente y
Agua de menta piperita,
a. . . . . seis pt.

Déjense en digestion fria por muchos dias; esprímase ligeramente y fíltrese. (*vm.*)

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Cardamomo menor, . med. onz.
Aguardiente, . dos lib. y med.

Cuélese despues de ocho dias de maceracion. (p.)

am. ed. *c. ca.* y *sæ.* prescriben tres onz. de ruibarbo; — y fu. y li. dos onz. de ruibarbo, med. onz. de cardamomo y doce onz. de aguardiente.

R. Ruibarbo partido, . . . dos onz.
Cardamomo menor, . med. onz.
Azafran, ... dos drac.
Alcohol (0,930.), . . . dos lib.

Déjese en maceracion por quince dias á un calor suave y fíltrese. (lo.)

du. no prescribe mas que ocho dias de digestion.

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Cardamomo menor, . med. onz.
Aguardiente de Francia, dos lib.

Déjese en digestion por tres dias á un calor suave, fíltrese y añádase al líquido

Azucar blanca, . . . cuatro onz.

Déjese en digestion hasta que se haya disuelto el azucar. (he. *pid.*)

Esta fórmula da la *Tinctura rhei spirituosa dulcis*, á la que se parece la preparacion siguiente que lo. y *c.* indican con el nombre de *Tinctura rhei composita.*

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Raiz de regaliz, . . . med. onz.
—— de gengibre y
Azafran, a. . . . . dos drac.
Alcohol (0,930), dos cuartillos.
Agua, ... doce onz.

Déjense en maceracion por quince dias á un calor suave y fíltrese.

Segun am. y *c.* se dejan en digestion por diez dias dos onz. de ruibarbo, una onz. de regaliz, otro tanto de anís, y dos onz. de azucar en cinco cuartillos de aguardiente.

Escitante que se ha aconsejado con particularidad como carminativa y para facilitar la digestion. — Dósis; de med. á una onz. en un vehículo apropiado.

TINTURA DE RUIBARBO AMARGA O COMPUESTA.

Tinctura rhei amara, s. *rhabarbari composita*, s. *rhei et genciancæ.* (am. br. ed. ham. han. w. *c. vm.*)

R. Ruibarbo partido, . . . dos onz.

Genciana, ... med. onz.
Alcohol (0,935.),
. . . . . dos lib. y med.

Fíltrese despues de ocho dias de digestion. (ám. ed. *c.*)

R. Tintura de ruibarbo, lib. y med.
——— de genciana compuesta,
. . . . . med. lib.

Méz. (*sp.*)

R. Ruibarbo, ... dos onz.
Genciana, ... una onz.
Corteza de naranja, . med. onz.
Alcohol, ... dos lib.

Déjense en digestion por cuarenta y ocho horas, y fíltrese. (ham.)

R. Ruibarbo, ... ocho pt.
Genciana, ... part. y med.
Serpentaria de virginia, una pt.
Aguardiente, cuarenta y ocho pt.

Déjense en infusion fria por muchos dias, cuélese por espresion y fíltrese. (*vm.*)

br. prescribe se deje en digestion por tres dias una onz. de ruibarbo, drac. y med. de genciana, una drac. de serpentaria y un escrp. de cochinilla en una lib. de aguardiente.

R. Ruibarbo, ... una onz.
Genciana, ... drac. y med.
Serpentaria de virginia,
una drac.
Aguardiente y
Vino blanco, a. . . . med. lib.

Digiérase y fíltrese. (han. w.)

R. Ruibarbo, ... una onz.
Raiz de genciana, . . tres drac.
Corteza de Winter, . una drac.
Aguardiente, . . . diez y seis onz.

Déjense en infusion fria por muchos dias; cuélese esprimiendo ligeramente y fíltrese. (*vm.*)

Escitante alabado en otro tiempo en las afecciones biliosas, las calenturas y la disenteria. — Dósis; de cincuenta á ochenta gotas.

RUS COTINO.

Cocconilea de Theofrasto, Zumaque fustéte; Rhus cotinus, L.

Perückensumach, Al.; fustet, F.; coccigria, In.

a. fe.

Arbol del mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; terebintinaceas, J.).

Se usa la corteza y las hojas.

La corteza (*Cortex cotini*) es lisa y blanquecina por fuera.

Las hojas son ovales invertidas, enteras y lisas por las dos caras. Su sabor es estíptico, balsámico y resinoso.

Es astringente y tónica.

RUSCO.

Brusco, Rusco, Gilbarbera; Ruscus aculcatus, L.

Stachlicher Mæusedorn, Al.; fragon, F.; bulchers broom, knee holly, In.

an. br. e. f. fe. ff. g. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Planta perenne que crece en los bosques de Europa (dioecia monadelfia, L.; esparagineas, J.).

Se usa la raiz (*radix Rusci*, s. *Brusci*, s. *Myrtacanthe*) que es larga, leñosa, blanca, compuesta de numerosas fibras, del grueso de un cañon de pluma. Su sabor es al principio un poco dulce y en seguida amargo.

Es diurética. — Forma parte de las cinco raices aperitivas mayores.

TISANA DIURETICA. (*pie.*)

R. Raiz de rusco, ... seis onz.
Agua, ... una lib.
Hiérvase y cuélese.

R. Raiz de rusco,
—— de fresa y
Raiz de esparraguera,
a. . . . . cinco drac.
Agua, ... dos lib. y med.
Redúzcase á dos lib., cuélese y añádase
Jarabe de hisopo y
—— de las cinco raices,
a. . . . . una onz.

S.

SABINA.

Juniperus Sabina, L.

Sadebaum, Sevenbaum, Al.; savine, In.; sabine, F.; sabina, I., Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbolillo del mediodia de Europa y del Levante (dioecia monadelphia, L.; coniferas, J.).

Se usan las hojas (*folia*, s. *herba Sabinæ*) que son ovales, opuestas, un poco agudas y convexas por el dorso.

Tienen un olor resinoso, aromático y muy penetrante; su sabor es muy amargo.

Escitante enérgico, irritante y emenagogo.

CONSERVA DE SABINA.

Conserva sabinæ. (han. po. s. *sw.*)

R. Hojas de sabina machacadas,
una pt.
Azucar blanca en polvo, dos pt.
Tritúrense juntos. (bo. s. *sw.*)
han. prescribe una parte de hojas y tres de azucar.

POLVOS EMENAGOGOS. (*e.*)

R. Sabina y
Gengibre, a. . . . . una drac.
Sulfato de potasa, . . dos drac.
Divídase en seis papeles. — Dósis; uno, dos veces al dia.

POLVOS VERMIFUGOS. (*e.*)

R. Sabina, ... doce gr.
Sen y
Espigelia, a. . . . . dos escrp,
Divídase en seis papeles. — Se toma uno por tres dias seguidos por la mañana y en seguida una bocanada de aceite de ricino, y se vuelve á principiar si es necesario.

BOLOS EMENAGOGOS. (*b. ca.*)

R. Polvos de sabina, . . una drac.
Jarabe de artemisa, ... c. s.
Estracto de aristoloquia,
——— de artemisa,
Polvos de azafran y
——— de castoreo, a. med. drac.
Háganse treinta y seis bolos. — Dó-

sis; uno, tres ó cuatro veces al dia en la amenorrea. *(ca.)*

R. Estracto de sabina, . cuatro gr.
Polvos de hojas de tejo, seis gr.
Miel despumada y
Polvos de regaliz, a. . . . c. s.
Háganse seis bolos. — Dósis; uno cada tres horas. *(b.)*

PILDORAS EMENAGOGAS. (b.*)

R. Estracto de sabina, . med. onz.
Polvos de yerba de sabina,
dos drac.
Aceite esencial de sabina, . c. s.
Háganse píldoras de dos gr. — Dósis; ocho por mañana y tarde.

R. Polvos de sabina y
Estracto de manzanilla,
a. . . . . drac. y med.
Oxido de hierro negro y
Estracto de acibar, a. quince gr.
Háganse píldoras de dos gr. — Dósis; seis cada vez. — En la clorosis.

ELECTUARIO ANTIARTRITICO. (ham.)

R. Polvos de sabina, . . una drac.
——— de cálamo aromático,
dos drac.
Miel despumada, . . . dos onz.

ESTRACTO ACUOSO DE SABINA.

Extractum sabinæ aquosum. (du. fe. pa. s. w.)

R. Sumidades de sabina, . una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.
Déjense en maceracion por cuatro dias en sitio caliente; hiérvase despues un poco; cuélese por espresion y evapórese el líquido colado hasta la consistencia de estracto. (pa. w.)

R. Sumidades de sabina, . una lib.
Agua pura, ... ocho lib.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion; cuélese por espresion y evapórese despues el líquido á un fuego manso, hasta la consistencia de masa de píldoras. (du.)

fe. prescribe que se hierva una parte de sabina en tres de agua, que se clarifique el cocimiento y que se evapore.

R. Sumidades de sabina, . una pt.
Agua comun, ... ocho pt.
Déjense en infusion por veinte y cuatro horas; hiérvase despues por un cuarto de hora y cuélese esprimiendo con fuerza; hágase hervir otra vez el resíduo con cuatro partes de agua; mézclense los dos líquidos; y despues de veinte y cuatro horas de reposo, evapórese hasta la consistencia conveniente. (s.)
Dósis; de diez gr. á med. drac. dos ó tres veces al dia.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE SABINA.

Extractum sabinæ alcoholicum. (wu.)

R. Sumidades de sabina y
Alcohol, a. . . . . una lib.
Agua comun, ... ocho lib.
Déjense en digestion por tres dias á una temperatura suave; cuélese por espresion; déjese reposar y decántese el líquido; estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese el residuo hasta la consistencia conveniente.

COCIMIENTO DE SABINA.

Decoctum sabinæ. (b.*)

R. Yerba de sabina, . . . una onz.
Agua hirviendo, ... una lib.

Hágase hervir hasta que no queden mas que seis onz. de líquido; cuélese entonces y añádase

Jarabe cualquiera, . . . una onz.

Dósis; dos cuch. cada dos horas.

INFUSION DE SABINA.

Infusum sabinæ. (*au.*)

R. Yerba de sabina, . . . una drac.
Agua hirviendo, . . . siete onz.

Déjese en infusion y cuélese. — Dósis; una cuch. cada dos horas. — Rau la ha alabado en las inflamaciones llamadas asténicas de la matriz y de la vegiga.

TINTURA ALCALINA DE SABINA.

Tinctura sabinæ kalina, s. *arthritica.* (b.* *au. sw. vm.*)

R. Hojas frescas de sabina, una onz.
Tintura alcalina, . . . seis onz.

Déjense en digestion por cuatro dias. (b.* *au. vm.*)

Se puede preparar esta tintura estemporáneamente, disolviendo dos drac. de aceite esencial de sabina en seis onz. de tintura alcalina.

sw. prescribe una onz. de sabina y ocho onz. de tintura alcalina.

TINTURA DE SABINA.

Tinctura, s. *Essentia sabinæ.* (ham.)

R. Hojas de sabina, ... una pt.
Alcohol, ... seis pt.

Déjense en digestion por muchos dias; cuélese por espresion y fíltrese.

Dósis; treinta got. muchas veces al dia.

POCION EMENAGOGA. (*e.*)

R. Tintura de sabina, . . . una onz.
——— de eléboro negro, med. onz.
——— de castorco, . dos drac.

Dósis; cuarenta got. tres veces al dia.

CERATO DE SABINA.

Ceratum, s. *Unguentum sabinæ.* (am. b.* ba. du. ed. lo. su. *c. sw. vm.*)

R. Hojas frescas de sabina, dos pt.
Cera amarilla, ... una pt.
Manteca de puerco, . cuatro pt.

Cuézanse las hojas en la manteca y añádase la cera. (b.* ba. du. ed. lo. su. *sw. vm.*)

am. y *c.* prescriben se mezclen seis pt. de cerato resinoso y una pt. de sabina en polvo.

Usado como epispástico.

ACEITE DE SABINA.

Oleum sabinæ æthereum, *Ætheroleum sabinæ.* (a. ams. an. br. ed. f. fe. fu. han. he. o. pa. po. pr. r. s. sa. wu. *c. pid. sw. vm.*)

R. Hojas de sabina, ... c. s. q.
Agua pura, ... c. s.

Destílese. (ams. ed. fe. r. *c.*)

fu. y sa. prescriben una pt. de sabina y tres de agua; — *sw.* una de sabina y cuatro de agua; — *vm.* una de sabina y seis de agua; — han. o. po. pr. y s. una de sabina y ocho de

agua; — a. una de sabina y doce de agua; — an. seis de sabina y veinte de agua; — y f. cinco de sabina y siete de agua.

R. Yerba de sabina,
veinte y cinco pt.
Agua, . . . sesenta y cuatro pt.
Sal comun, ... tres pt.
Destílese. (br. he. pa. *pid.*)

R. Yerba de sabina, ... c. s. q.
Agua destilada de sabina, . c. s.
Destílese. (wu.)
Dósis; ochenta got. en una pocion.

POCION EMENAGOGA. (*ca. ra.*)

R. Agua de artemisa, . . cinco onz.
Jarabe de corteza de naranja,
una onz.
Agua de flores de naranjo,
med. onz.
Aceite esencial de ruda y
———— de sabina,
a. . . . . seis got.
Para tomar á cuchtas.

AGUA DE SABINA.

Aqua sabinæ. (wu. *pid.*)

R. Yerba de sabina, . . . una pt.
Agua, ... ocho pt.
Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas y destílense ocho partes. (*pid.*)

wu. prescribe una pt. de sabina y seis de agua.

ESPIRITU DE SABINA.

Spiritus sabinæ. (han. *au.*)

R. Yerba de sabina, ... una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.
Agua pura, ... c. s.
Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y destílese.

LINIMENTO ESCITANTE. (*au.*)

R. Espíritu de sabina, . . seis onz.
Aceite esencial de sabina,
una drac.
En fricciones en los dolores artríticos.

SAGAPENO.

Goma seráfica; *Sagapenum*, *Gummi sagapenum*, s. *serapinum*.

Sagapengummi, Serapingummi, Al.; Sagapenum, F.; Sagapeno, Por.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. han. li. o. p. po. pr. s. w. wu. *a. be. br. c. g. m. sa. sp. z.*

Gomo-resina en masas granulosas ó en lágrimas pegajosas, de un amarillo rojizo al esterior y de un blanco rosado interiormente. Su olor es desagradable y análogo al de la asafétida; pero mas fuerte, y su sabor acre.

Esta sustancia proviene segun Wildenow del *Férula Pérsica*, Hope, planta bienal de Persia (pentandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Escitante muy poco usado.

SAGÚ.

Sagú ó Sahagú : Fecula sagu, L.

am. an. b. ba. f. fe. fu. he. li. p. r. w. *a. be. br. c. g. m. pid. sp.*

Sustancia amilácea, en granos pequeños redondos, irregulares, mas gruesos que cabezas de alfiler, muy duros y corneos, con particularidad en el centro, inodoros é insípidos.

Se prepara el sagú con la médula

del *Sagus Raphia*, Lmk., palmera arborea de las Molucas.

Analéptico, emoliente.

GELATINA DE SAGÚ.

R. Sagú en polvo, ... una drac.
Agua, ... ocho onz.

Hiérvase lentamente meneando sin cesar hasta la consistencia necesaria y añádase

Azucar blanca, ... c. s. para darle un sabor dulce agradable.

SALEP.

Salep, *Salab.*

Salibimisri, Al.; salep, F.

a. am. ams. an. b. ba. br. d. f. fi. ham. han. he. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. c. g. m. pid. sp.*

Sustancia amilácea, en pequeñas masas que varian desde el volúmen de un grano de café al de una almendra, de un color que se parece al de la paja, semitrasparente, de consistencia casi de cuerno, de olor espermático y de sabor dulce y mucilaginoso.

Se prepara en Persia con los tubérculos de diversos orquis desconocidos.

Analéptico.

POLVOS DE SALEP. (b.*)

R. Salep, ... onz. y med.
Sagú, ... una onz.
Goma tragacanto, . . una drac.

Se deslie por mañana y tarde una cuchta. en agua ó leche, para hacer una papilla á las personas tísicas ó afectadas de tos.

CONSERVA DE ORQUIS.

Conditum satyrii. (pa. sa. w.)

R. Raiz fresca de orquis, . . una lib.
Agua, ... ocho lib.

Déjense en maceracion por algunos dias, reblandézcase despues por la coccion, y clarifíquese en seguida en el cocimiento

Azúcar blanca, . . . lib. y med.

Cuézase la raiz en el jarabe despues de haber estado en infusion tres dias, y consérvese dentro ó séquese en la estufa. (sa.)

pa. y w. prescriben se ablande la raiz en agua por la coccion que se deje escurrir, y que se ponga en azúcar pluma.

GELATINA DE SALEP.

Gelatina, s. *mucilago radicis salep.* (an. han. p. pp. *sw. vm.*)

R. Salep en polvo, . . . una drac.
Agua, ... ocho onz.

Cuézase lo conveniente. (*sm.*)

R. Polvos de salep, . . . dos drac.
Agua hirviendo, ... seis onz.

Tritúrense juntos. (an.)

pp. prescribe dos drac. de salep y doce onz. de agua hirviendo.

R. Salep en polvo, ... una drac.
Agua, ... ocho onz.

Cuézase y añádase

Azúcar blanca, ... c. s. para edulcorarlo agradablemente. (p.)

vm. prescribe una drac. de salep, cuatro onz. y med. de agua, y onz. y med. de jarabe comun;—y han. dos drac. de salep, ocho onz. de agua y

onz. y media de jarabe de corteza de naranja.

R. Salep en polvo, ... dos drac.
Agua fria, ... c. s.

Háganse nueve onz. de cocimiento y añádase

Jarabe de adormideras,
onz. y med.
Agua de laurel-cerezo, . seis drac.
Méz. ex. (*sw.*)

COCIMIENTO DE SALEP.

Decoctum de radice salep, Infusum Orchidis. (li. wu. *au. sa.*)

R. Raiz de salep en polvo,
una drac.
Agua pura, . . . diez y seis onz.
Cuézase hasta que no quede mas que una lib. de líquido y cuélese. (wu.)

au. prescribe dos drac. de salep y doce onz. de agua.

R. Polvos de orquis, . . . una drac.
Empápese en agua fria hasta que tenga un cuadruplo de su volúmen, y añádase entonces
Agua hirviendo, . . . lib. y med.
Cuézase por media hora. (li.)

R. Salep en polvo, . . . dos drac.
Agua, ... c. s.

Redúzcase á dos lib. de líquido por la coccion, cuélese y añádase
Jarabe de adormideras y
——— de diacodon, a. . una onz.
Méz. ex. (*sa.*)

POCION DULCIFICANTE.

Mixtura demulcens. (ham. *sm.*)

R. Salep en polvo, ... dos escrp.
Agua caliente, ... diez onz.
Añádase á la solucion
Azúcar blanca, ... med. onz.
Disuélvase (ham.)

R. Salep, ... una drac.
Agua hirviendo, ... c. s.

Cuézase por un cuarto de hora y añádase á cada cuatro onz. de líquido colado

Láudano líquido de Sydenham,
quince got.
Jarabe de diacodon, . cuatro drac.
Méz. ex. (*sm.*)

POCION PECTORAL. (*sm.*)

R. Salep en polvo y
Azúcar de leche, a. . . . dos drac.
Jarabe de diacodon, . . una onz.
——— de altea, ... dos onz.
Méz. —Para tomar á cuch.

CHOCOLATE BLANCO. (*pie.*)

R. Cacao, ... cuatro onz.
Salep, ... seis onz.
Agua, ... ocho onz.
Cuézase á fuego lento por media hora y añádase
Azúcar blanca, . . . cuatro onz.
Harina, ... c. s.
Háganse pastillas de med. onz.

ELECTUARIO AFRODISIACO.

Electuarium diasatyrion. (pa. w. *bo. sp.*)

R. Canela, ... dos drac.
Vainilla, ... ocho drac.
Raiz de orquis, ... seis drac.
Marrubio, ... dos escrp.
Raiz de cardo corredor, confitada,
dos onz.
Conserva de énula, ... c. s.
Méz. ex. (*bo.*)

R. Raiz fresca de orquis, cuatro onz.

Azúcar pluma, ... doce onz.
Macháquense juntas, pásese por un cedazo de seda y tritúrese con
Nueces de Indias confitadas,
Gengibre confitado,
Piñones y
Alfónsigos, a. . . . . una onz.
Añádase en seguida
Polvos de clavos de especia,
——— de canela,
——— de escinco marino,
a. . . . . med. onz.
Caldo de gengibre confitado, c. s.
Hágase electuario. (w. *sp.*)

R. Raiz fresca de cardo corredor,
——————— de pastinaca,
——————— de orquis,
Nueces confitadas,
Piñones y
Alfónsigos, a. . . . . med. onz.
Simiente de anís,
——— de jaramago,
——— de fresno,
——— de ortigas,
Clavos de especia,
Canela y
Gengibre, a. . . . . cinco drac.
Escinco marino, dos drac. y med.
Almizcle, ... siete gr.
Miel despumada, ... tres lib.
Hágase electuario. (pa.)
Dósis; de cuatro á seis drac.

SALICARIA.

Sythrum Salicaria, L.

Brauner Weiderich, Al.; salicaire, F.; common willow herb, In.; salicaria, I.

a. an. b. ba. br. du. e. f. fe. fu. ham. li. s. w. wu. *b. c. m. sp. z.*

Planta bienal que se encuentra en toda Europa (dodecandria monogynia, L.; salicarias, J.).

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz (*radix Salicariæ*, s. *Lysimachiæ purpureæ*) es cilíndrica y amarilla.

La yerba se compone de un tallo cuadrado, rojizo, ramoso, guarnecido de hojas opuestas, sentadas, coriáceas, lanceoladas, enteras, lisas por encima y pubescentes por debajo. Es inodora y su sabor es mucilaginoso y amargo.

Se ha aconsejado en la diarrea y en la disenteria. — Dósis del polvo; de una drac. á cuatro escrp.

OPIATA ASTRINGENTE. (*bo.*)

R. Polvos de salicaria, . treinta gr.
——— de raiz de arnica, med. drac.
——— de alumbre, . . seis gr.
Conserva de cinorrodon, . . c. s.
para una dósis, que puede repetirse dos veces en veinte y cuatro horas, diluida en una tisana apropiada.

COCIMIENTO DE SALICARIA.

Decoctum salicariæ. (b.*)

R. Yerba de salicaria, . . una onz.
Agua, ... una lib.
Redúzcase á ocho onz. por la ebulicion y cuélese.

Aconsejado en la diarrea y la disenteria. — Dósis; una cuch. cada dos horas.

MISTURA ANTIDISENTERICA. (*ca.*)

R. Polvos de salicaria, drac. y med.
Agua de amapolas, . . . una lib.
Jarabe de altea, ... una onz.
Dósis; tres onz. y med. cada tres horas.

SALSOLA.

Se usan en medicina tres plantas de este nombre:

1.° *Sosa coman; Salsola soda*, L.

Salzkraut, Al.; soude, F.; soda, I.; solda, Por.

e. f. *m. z.*

Planta ánua que crece en las costas del Mediterráneo (pentandria digynia, L.; chenopodeas, J.).

Se usa la yerba (*herba Vitri*) que se compone de tallos ramosos, rojizos, guarnecidos de hojas sentadas, largas, estrechas, sin pinchos. Es inodora y su sabor alcalino y desagradable.

2.° *Soda espinosa; Salsola tragus*, L.

f. *m.*

Planta ánua del mediodia de Europa.

3.° *Kali; Salsola Kali*, L.

Planta ánua del mediodia de Europa.

Esta especie y la precedente pueden bien sostituir á la sosa comun.

SALVADO.

Furfur.

ba. pp. su. *m. sp.*

Fragmentos de la película que cubre los diversos granos cereales, particularmente el trigo y el centeno.

COCIMIENTO DE SALVADO.

Decoctum furfuris tritici. (b.*)

R. Salvado de trigo, . . cuatro onz.
Agua comun, ... doce lib.

Consúmase una cuarta parte por la ebulicion y cuélese cuando todo el salvado se haya precipitado al fondo de la vasija.

Dulcificante. — Se le puede añadir, ya cuarenta gotas de ácido sulfúrico dilatado en agua y una onza de jarabe comun, ó ya cuatro escrúpulos de cremor de tártaro y dos onzas de jarabe simple, lo que forma una tisana muy agradable.

LAVATIVA DULCIFICANTE. (*sm.*)

R. Salvado lavado, . . . med. puñ.
Agua, ... una azumbre.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion y añádase al líquido colado

Yemas de huevo frescas, n.° 3 ó 4.

SALVIA.

Las farmacopeas indican cuatro especies de este género.

1.° *Salvia comun; Salvia officinalis*, L.

Salbey, Al.; sage, In.; salvia, I.; sauge, F.; salva, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal del mediodia de Europa (driandria monogynia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba y las flores.

La yerba (*herba Salviæ minoris*) se compone de un tallo cuadrado simple, y de hojas opuestas, lanceoladas, ovales, enteras, dentadas, arrugadas y de un gris verdoso. Tiene un olor agradable, muy aromático y un poco alcanforado, y un sabor estíptico, aromático y amarescente.

Las flores son de un azul violeta, en espiga terminal. Se coje la planta antes que abran las flores.

Escitante, nervina, tónica, un poco astringente, resolutiva y detersiva.

2.° *Salvia hormin; Salvia horminum*, L.

Elles Schrarlachkraut, Al.; sauge hormin, F.; purpletopped sage, In.; orminio, I; ormino, Por.

br. e. g. wu. *be. sp.*

Planta ánua de Europa (diandria monogynia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba y la simiente.

La yerba (*herba Hormini*, s. *Gallitrichii*) se compone de hojas obtusas, dentadas, de olor desagradable y de sabor un poco amargo.

La simiente es lampiña, mucilaginosa y algo amarescente.

Escitante y tónica.

3.° *Salvia de los prados; Salvia pratensis*, L.

Wiesen salbey, Al.

f.

Planta bienal comun en Europa. (diandria monogynia, L.; labiadas, J.)

Se usan las hojas (*folia Hormini*) que son pecioladas, largas, acorazonadas, coriaceas, dentadas, arrugadas, lampiñas, de olor agradable y de sabor amargo y astringente.

4.° *Maro vulgar; Salvia sclarea*; L.

Zahmes scharlachkraut, Al; sauge sclaree, F.; commor clary, In.; schiarea, I.; esclarea, Por.

e. f. fe. w. *g. m.*

Planta perenne del mediodia de Europa (diandria monogynia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba (*herba Sclareæ*, s. *Gallitrichii*) que se compone de un tallo denso, cuadrado y muy ramoso, de ramos opuestos, y de hojas oblongas, cordiformes, arrugadas, puntiagudas, dentadas en forma de sierra, y opuestas. Su olor es fuerte y desagradable, y su sabor amargo y aromático.

CONSERVA DE SALVIA.

Conserva florum salviæ. (sa. w.)

R. Flores de salvia, ... una pt.
Azúcar en polvo, ... dos pt.
Tritúrense juntas. (w.)

sa. prescribe una parte de flores y tres de azúcar pluma.

ESPECIES AROMATICAS.

Especies vulnerarias; Species, s. *Herbæ aromaticæ.* (a. b.* ba. f. *vm.*)

R. Yerba de salvia,
——— de melisa,
——— de tomillo,
——— de menta piperita,
——— de hisopo y
Flores de espliego, a. . . part. ig.
Pártanse y méz.

R. Hojas de salvia,
——— de torongil,
Sumidades floridas de agenjos,
——— de menta piperita,
——— de serpól y
Flores de manzanilla ordinaria,
a. . . . . part. ig.
Pártanse y méz. (ba.)

R. Hojas de salvia,
——— de tomillo,
——— de serpól,
——— de hisopo,
——— de menta acuática,
——— de agenjos y

Hojas de orégano, a. . part. ig.
Pártanse y méz. (f.)

R. Yerba de hisopo,
——— de marrubio,
——— de orégano,
——— de ruda,
——— de salvia,
——— de agedrea,
——— de escordio y
——— de serpol, a. . . part. ig.
Pártanse y méz. (a.)

R. Cubebas y
Nuez moscada, a. . . . . una pt.
Canela,
Gengibre y
Clavo, a. . . . . dos pt.
Corteza de naranja, . cuatro pt.
Menta rizada,
Romero y
Salvia, a. . . . . ocho pt.
Pártanse y méz. (*vm.*)

ESTRACTO DE SALVIA.

Extractum salviæ. (a.)

R. Hojas de salvia, ... c. s. q.
Agua, ... c. s.
Estráiganse los principios de la yerba por muchas ebuliciones sucesivas, mézclense los líquidos, y despues de la decantacion evapórense hasta la consistencia de estracto.

INFUSION DE SALVIA.

Infusum salviæ. (dd. ff. pp. su. ww. *sa.*)

R. Yerba de salvia, . . . una drac.
Agua hirviendo, . . . doce onz.
Déjense en infusion por un cuarto de hora en vasija tapada, y cuélese por espresion. (dd.)

pp. y ww. prescriben onz. y med. de salvia y diez y ocho onz. de agua;—su. una onz. de salvia, y una lib. de agua;—y ham. una onz. de salvia y c. s. de agua hirviendo para obtener ocho onz. de líquido colado.

R. Yerba de salvia y
Regaliz raspado, a. . . una onz.
Agua hirviendo, ... c. s.
para obtener una lib. de líquido colado. (ff.)

R. Hojas de salvia, ... dos onz.
Flores de rosas rojas, . una onz.
Agua hirviendo, tres onz. y med.
Infúndase en frio y cuélese. (*sa.*)

Escilante, aromático, para beber á tazas.

INFUSION DE SALVIA ACIDULADA. (b.*)

R. Yerba de salvia, . . . med. onz.
Agua hirviendo, ... c. s.
para obtener, despues de media hora de digestion, seis onz. de líquido colado, y añádase á este
Acido sulfúrico dilatado en agua, una drac.
Méz. ex.
Dósis; med. taza cada dos horas.

GARGARISMO ESTIMULANTE. (*ca. sa.*)

R. Infusion de salvia, . . . dos lib.
Arrope de nueces, . . . dos onz.
Alumbre, ... una drac.
Méz. (*sa.*)

R. Infusion de salvia, . . . seis onz.
Tintura de quina y
Jarabe de moras, a. . med. onz.

Espíritu de coclearia, . una drac.
Méz. (*ca.*)

INFUSION VINOSA DE SALVIA.

Infusum salviæ vinosum. (b.*)

R. Yerba de salvia, . . . una onz.
Agua hirviendo, ... una lib.
Déjense en digestion por una hora, cuélese y añádase al líquido frio
Vino tinto, ... med. lib.
Dósis; med. taza cada dos horas.

COCIMIENTO AROMATICO.

Decoctum incitans aromaticum. (b.)

R. Hojas de salvia, . . . med. onz.
Agua, ... c. s.
para obtener dos lib. de cocimiento.
Añádase al líquido colado
Elixir ácido de Haller, una drac.
Para tomar poco á poco en el dia.

VINO AROMATICO. (f. ff.)

R. Especies aromáticas, cuatro onz.
Vino tinto, ... dos onz.
Déjense en maceracion por seis dias en vasija tapada, cuélese por espresion y filtrese. (f.)

R. Vino tinto, ... dos pt.
Tintura aromática. . . . una pt.
Méz. (ff.)
Usado al esterior en lociones ó fomentos.

VINO DE SALVIA.

Vinum salviæ. (wu.)

R. Hojas frescas de salvia,
onza y med.
Vino tinto, ... libra y med.
Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y cuélese.

FOMENTO ESCITANTE. (*ra.*)

R. Vino de salvia, ... una lib.
Alcohol alcanforado, . ocho onz.
Méz.

AGUA ROJA.

Agua vulneraria espirituosa, Agua vulneraria ó aromática compuesta; Aqua vulneraria spirituosa. (f. *vm.*)

R. Hojas frescas de salvia,
——— de romero,
——— de agedrea,
——— de orégano,
——— de mejorana,
——— de tomillo,
——— de serpol,
——— de hisopo,
——— de melisa,
——— de calaminta,
——— de albahaca,
——— de menta acuática,
——— de hinojo,
——— de angélica,
——— de agenjos,
——— de ruda,
Sumidades floridas de espliego y
——— de hipericon,
a. . . . . una onz.
Alcohol (10.°), ... dos lib.
Déjense en maceracion por ocho dias, cuélese por espresion y filtrese. (f.)

R. Hojas frescas de agenjos,
——— de angélica,
——— de albahaca,
——— de abrótano,
——— de hinojo,

Hojas frescas de hisopo,
——— de mejorana,
——— de melisa,
——— de menta acuática,
——— de orégano,
——— de ruda,
——— de romero,
——— de salvia,
——— de serpol,
——— de tomillo y
——— de espliego,
a. . . . . una pt.
Aguardiente, . treinta y dos pt.

Déjense en digestion fria por ocho dias, esprímase y fíltrese. *(vm.)*

VINAGRE DE SALVIA.

Acetum salviæ. (f. *vm.*)

R. Hojas frescas de salvia, . una pt.
Vinagre blanco, . diez y seis pt.

Déjense en maceracion por quince dias en vasija tapada meneándolo de cuando en cuando, cuélese y fíltrese. (f.)

vm. prescribe una parte de salvia y ocho dias de maceracion.

ACEITE DE SALVIA.

Oleum salviæ ætherum, Ætheroleum salviæ. (a. br. f. han. pa. sa. *br.*)

R. Yerba florida de salvia, . c. s. q.
Agua, ... c. s.

Destílese. *(br.)*

han. prescribe una parte de yerba y ocho de agua; —— a. una de yerba y doce de agua; —— y f. cinco de yerba y siete de agua.

R. Yerba florida de salvia,
veinte y cinco pt.
Agua, . . . setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.

Destílese al cabo de tres dias. (br. pa. sa.)

AGUA DE SALVIA.

Aqua salviæ. (a. ams. ba. f. han. li. o. pa. po. pr. s. sa. Wu. *sv. vm.*)

R. Yerba florida de salvia, una pt.
Agua, ... c. s.

Al cabo de veinte y cuatro horas destílense diez partes. (ams. han. o. po. pr. *sv.*)

f. y pa. prescriben una parte de yerba, cuatro de agua y que se destilen dos partes; —— li. y Wu. una de yerba y seis de agua; —— a. una de yerba, doce de agua y que se destilen cuatro partes; —— s. una de yerba y quince de agua; —— ba. una de yerba, diez y seis de agua, y que se destilen cuatro partes; —— sa. una parte de yerba, cuatro de agua, que se destílen dos partes, y se vuelvan á destilar sobre nueva yerba.

R. Yerba florida de salvia, diez pt.
Agua pura, . . ciento veinte pt.
Aguardiente, ... una pt.

Destílense treinta partes. *(vm.)*

AGUA DE SALVIA COMPUESTA. (f.)

R. Especies vulnerarias, . . dos pt.
Agua, ... veinte pt.

Destílense ocho partes.

ESPIRITU DE SALVIA.

Aqua salviæ spirituosa. (f. ff.)

R. Yerba florida de salvia, una lib.
Vino blanco, ... cuatro lib.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y destílese la mitad. (f.)

R. Yerba florida de salvia,
lib. y med.
Alcohol, ... ocho lib.
Destílense seis lib. (fe.)

AGUA VULNERARIA.

Alcohol polyaromático ó vulnerario, Agua vulneraria espirituosa, Agua de arcabuzazo; Aqua vulneraria, s. *traumatica*, s. *sclopetaria*, s. *vulneraria spirituosa*, s. *vinosa*, s. *sclopetaria aromatica*, s. *catapultarum*, *Alcohol salviæ vulnerarius.* (a. b.* be. br. e. f. han. he. li. o. pa. po. pr. s. w. *br. ca. pid. sp. vm.*)

R. Yerba de hisopo,
------ de menta rizada,
------ de salvia y
------ de romero, a. . dos onz.
Flores de romero y
------ de espliego, a. . una onz.
Aguardiente, ... diez lib.
Destílese hasta que el líquido salga turbio. (li. w.)

R. Yerba de agenjos,
----- de eneldo,
----- de salvia,
----- de tanacето,
----- de serpol,
----- de menta piperita y
Flores de espliego,
a. . . . . onza y med.
Agua de fuente, ... doce lib.
Alcohol, ... ocho lib.
Déjense en infusion por algunos dias y destílense ocho lib. *(pid.)*

R. Yerba de agenjos,
------ de ruda y
Yerba de salvia,
a. . . . . diez y ocho drac.
------ de hinojo,
------ de menta piperita y
Flores de espliego, a. onza y med.
Agua de fuente, . . . doce lib.
Alcohol, ... ocho lib.
Déjense en infusion por dos dias y destílense ocho lib. (he.)

R. Yerba fresca de agrimonia,
---------- de alquimila,
---------- de bellorita,
---------- de margarita mayor,
---------- de betónica,
---------- de buglosa,
---------- de hinojo,
---------- de hipericon,
---------- de llanten,
---------- de sanícula,
---------- de escrofularia y
---------- de verbena,
a. . . . . dos puñ.
---------- de aristoloquia,
---------- de artemisa,
---------- de vara de oso y
---------- de salvia,
a. . . . . cuatro puñ.
Vino generoso, . . cuarenta lib.
Déjense en digestion hasta que la masa principie á fermentar un poco, y destílese lentamente la mitad. (w.)

R. Raiz de consuelda mayor,
Yerba de consuelda mayor,
------ de artemisa y
------ de buglosa, a. cuatro puñ.
------ de betónica,
------ de ojo de buey,
------ de consuelda menor,
------ de escrofularia,
------ de llanten,
------ de agrimonia,

Yerba de verbena,
------ de agenjos y
------ de hinojo, a. . dos puñ.
------ de hipericon,
------ de aristoloquia,
------ de siempre viva,
------ de verónica,
------ de centaura menor,
------ de mil en rama,
------ de tabaco,
------ de menta y
------ de hisopo, a. . un puñ.
Vino blanco, ciento y cuarenta onz.
Déjese en infusion por tres dias y destílese. *(sp.)*

R. Raiz de consuelda mayor,
Yerba de consuelda mayor,
------ de consuelda menor,
------ de sanícula,
------ de betónica,
------ de escrofularia,
------ de llanten,
------ de agrimonia,
------ de hipericon,
------ de vinca pervinca,
------ de yedra terrestre.
------ de artemisa,
------ de verónica,
------ de verbena,
------ de siempre viva menor y
------ de mil en rama,
a. . . . . cuatro onz.
------ de salvia,
------ de angélica,
------ de tanaceto,
------ de agenjos,
------ de celidonia mayor,
------ de hinojo,
------ de clemátida,
------ de menta,
------ de hisopo y
------ de tabaco, a. . ocho onz.
Yerba de ruda,
------ de manzanilla,
------ de escordio,
------ de mejorana y
------ de romero, a. cuatro onz.
Sumidades floridas de espliego,
---------- de orégano y
---------- de calaminta,
a. . . . . seis onz.
Vino blanco, . . cincuenta lib.
Destílese la mitad. (w.)

pa. trae la misma fórmula, añadiendo ocho onz. de agenjo menor, otro tanto de agedrea, cuatro onz. de albahaca, y otro tanto de vara de oro.

R. Hojas de salvia, . . . ocho onz.
------ de romero,
------ de serpol y
------ de tomillo, a. . una onz.
Cardamomo mayor y
---------- menor, a. seis drac.
Macías,
Nuez moscada,
Clavos de especia,
Cedoaria,
Galanga y
Cálamo aromático, a. med. onz.
Vino blanco, ... ocho lib.
Alcohol, ... cuatro lib.
Despues de la suficiente digestion destílense las tres cuartas partes. (w.)

R. Flores de espliego,
Yerba fresca de hisopo,
---------- de melisa,
---------- de menta rizada,
---------- de orégano,
---------- de romero,
---------- de ruda,
---------- de salvia y
---------- de serpol,
a. . . . . una onz.

Alcohol (o,85o), . . diez onz.
Agua, ... doce lib.
Al cabo de veinte y cuatro horas, destílense diez lib. (a.)

R. Yerba fresca de salvia,
——— de agenjos,
——— de menta piperita,
——— de ruda,
——— de romero y
Flores de espliego, a. cuatro onz.
Alcohol, ... seis lib.
Agua comun, ... c. s.
Al cabo de veinte y cuatro horas destílense diez y ocho lib. (b.* han. o. po. pr.)

R. Hojas frescas de salvia,
——— de angélica,
——— de agenjos,
——— de agedrea,
——— de hinojo,
——— de menta,
——— de hisopo,
——— de melisa,
——— de albahaca,
——— de ruda,
——— de tomillo,
——— de mejorana,
——— de romero,
——— de orégano,
——— de calaminta,
——— de serpol y
Flores de espliego, a. cuatro onz.
Alcohol,
ciento veinte y ocho onz.
Destílese (*sp.*)

R. Yerba florida de agenjos,
——— de albahaca,
——— de yerba gatera,
——— de hisopo,
——— de mejorana,
——— de orégano,
Yerba florida de romero,
——— de ruda,
——— de salvia,
——— de tomillo y
Flores de espliego, a. . . dos pt.
Aguardiente, . noventa y seis pt.
Agua,
cuatrocientas cincuenta y seis pt.
Destílense ciento ochenta y cuatro partes. (*vm.*)

be. prescribe una parte de salvia, de agenjos, de yerba gatera, de melisa, de albahaca, de tomillo, de ruda, de mejorana, de romero, de orégano y de espliego; cuarenta y ocho de aguardiente; doscientas setenta y seis de agua, y que se destilen noventa y dos partes.

R. Sumidades de salvia,
——— de tanaceto,
——— de hinojo,
——— de tomillo,
——— de espliego,
——— de agenjos,
——— de menta acuática,
——— de hisopo,
——— de manzanilla romana,
——— de orégano,
——— de mejorana,
——— de calaminta y
Tallos y raiz de angélica,
a. . . . . dos onz.
Alcohol (22.°),
veinte y cuatro lib.
Déjese en maceracion lo suficiente, y destílese al B. M. veinte lib. (f. *ca.*)

R. Flores de espliego,
Yerba fresca de agenjos,
——— de salvia,
——— de mejorana,
——— de romero,

Yerba fresca de hisopo,
---------- de ruda,
---------- de melisa,
---------- de tomillo,
---------- de albahaca,
---------- de orégano y
---------- de hipericon,
a. . . . . una onz.
Alcohol (0,935), . cuatro lib.
Agua, . . . , ... una lib.
Al cabo de veinte y cuatro horas destílense tres lib. *(br.)*

R. Hojas de betónica,
—— de yedra terrestre,
—— de artemisa y
—— de mil en rama,
a. . . . . quince onz.
—— de salvia,
—— de angélica,
—— de tanaceto y
—— de agenjos, a. . diez onz.
—— de abrótano,
—— de hinojo,
—— de menta,
—— de hisopo y
—— de tabaco, a. . ocho onz.
—— de ruda,
—— de manzanilla,
—— de escordio,
—— de mejorana y
—— de romero, a. cuatro onz.
Sumidades floridas de espliego,
---------- de orégano y
---------- de calaminta,
a. , ... seis onz.
Vino generoso,
sesenta y siete onz.
Déjense por veinte y cuatro horas en maceracion y destílese la mitad. (br.)

R. Hojas de betónica,
Hojas de agrimonia y
—— de artemisa, a. . una lib.
—— de salvia,
—— de hipericon,
—— de tanaceto,
—— de agenjos y
—— de menta, a. . ocho onz.
—— de escordio,
—— de mejorana,
—— de romero y
—— de espliego, a. cuatro onz.
Vino blanco, ... treinta lib.
Destílese la mitad al B. M. (e.)

R. Yerba de salvia,
—— de agenjos,
—— de menta piperita,
—— de ruda,
—— de romero y
Flores de espliego, a. . una pt.
Agua, ... cincuenta pt.
Alcohol, ... veinte y dos pt.
Al cabo de dos dias destílense treinta y seis partes. (s.)

Esta agua, poco diferente de la de Colonia, y con particularidad de la de melisa, se usa al esterior como resolutivo y algunas veces al interior en el cólico ventoso.

ELIXIR DE VIDA DE MUGERES.

Elixir vitæ mulierum, *Aqua*, s. *Balsamum embryonum*, *Aqua aromatica*. (ams. b.* br. pa. pr. w. *sp.*)

R. Miga de pan de trigo recien sacada del horno, ... dos lib.
Flores de claveles y
------ de tilo, a. . . . una lib.
Nuez moscada, tres onz. y med.
Flores de espliego,
Yerba de salvia,
Simiente de alcaravea y

Simiente de hinojo, a. tres onz.
Clavos de especia,
Canela,
Gengibre,
Cubebas,
Granos del paraiso,
Cedoaria,
Yerba de menta rizada,
Raiz de peonía,
Simiente de peonía y
Musgo de encina, a. . . dos onz.
Macías, ... med. onz.
Galanga menor, . . . tres drac.
Azafran, ... dos drac.
Vino de Madera, ... dos lib.
Agua de borraja y
——— de buglosa, a. . cuatro lib.
——— de flores de lirio de los valles, . dos libras y ocho onz.
——— de fresas y
——— de rosas, a. diez y seis onz.

Déjese en digestion por tres dias y destílese la mitad del líquido á un fuego suave. (w.)

br. trae la misma fórmula; pero reemplaza el vino con una mezcla de cinco lib. de aguardiente y diez de agua, y prescribe se destilen seis lib.

R. Raiz de peonía,
——— de cedoaria y
——— de gengibre, a. . dos onz.
——— de galanga, . . seis drac.
Yerba de salvia,
——— de melisa,
——— de hinojo y
——— de menta, a. . tres onz.
Flores de claveles y
——— de tilo, a. . . . seis onz.
——— de espliego y
Nuez moscada, a. . . . tres onz.
Clavos de especia,
Canela,
Cubebas,
Granos del paraiso y
Macías, a. . . . , . . dos onz.
Alcohol, cuarenta y cuatro onz.
Agua de fuente,
doscientas cuarenta onz.

Déjese en infusion por algunos dias y destílense ciento noventa y dos onz. (*sp.*)

R. Nuez moscada,
Macías,
Clavos de especia,
Canela,
Cubebas,
Gengibre y
Cedoaria, a. . . . . med. onz.
Galanga menor, . . . dos drac.
Flores de espliego,
Yerba seca de menta y
——— de salvia, a. . . med. onz.
Simiente de cilantro y
——— de hinojo, a. dos drac.
Aguardiente, ... lib. y med.
Agua, ... siete lib. y med.

Déjense en maceracion por tres dias y destílense tres lib. y media. (ams.)

R. Yerba de salvia, . . . ocho onz.
——— de romero,
——— de menta piperita y
Flores de espliego, a. cuatro onz.
Simiente de hinojo y
Canela aclavillada, a. . dos onz.
Alcohol, ... cuatro lib.
Agua, ... veinte lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas y destílense doce lib. de líquido. (b.* pr.)

Escitante, reputado fortificante, cordial y carminativo. — Dósis; de med. á una onz. — Se usa tambien al

esterior, y en otro tiempo se embebia una corteza de pan caliente que se aplicaba con buen efecto, segun se dice, sobre el abdómen de las mugeres amenazadas de aborto. En el dia se sabe el valor que debe darse á estas aplicaciones estimulantes.

SANDALO.

Tres leños se designan con este nombre:

1.° *Sándalo rojo ; Lignum santali rubri.*

Rothes santelholz, Kallaturholz, Al.; santal rouge, F.; red saunders, In.; sandalo rubro, I.

an. b. br. du. e. ed. f. lo. su. w. *a. be. br. c. g. m. sp. z.*

Se presenta en pedazos mas ó menos gruesos, sin corteza, partidos á lo largo, de un color rojo hermoso, surcados de fibras, entre las que se descubren vestigios de zumo resinoso concreto. Tiene un olor aromático bastante marcado y un sabor un poco resinoso.

Le suministra el *Pterocarpus Santalinus*, L., arbol de las Indias orientales (diadelfia hexandria, L.; leguminosas, J).

Pelletier ha descubierto en él una materia colorante particular la *Santalina, Santalina.*

2.° *Sándalo blanco; Lignum santali albi.*

Weisses sandelholz, Al.; santal blanc, F.; white saunders, In.; sandalo blanco, I.

b. br. e. f. fe. w. wu. *a. be. br. c. g. m. sp.*

Se presenta en pedazos á lo largo, bastante pesados, cubiertos de una corteza gris negruzca, un poco áspera. Su color es blanco amarillento, su olor débilmente aromático, y no tiene sabor.

3.° *Sándalo cetrino ; Lignum santali citrini.*

Gelbes sandelholz, Al.; santal citrin, F.; yellow saunders, In.; sandalo citrino, I.

Este leño tiene un color amarillento y un grano mas fino que el precedente. Es mas quebradizo, mas ligero y ordinariamente sin corteza. Su olor es aromático muy manifiesto, y su sabor casi nulo.

El sándalo blanco y el cetrino provienen del *Santalum album*, L., árbol de las Indias orientales (tetrandia monogynia, L.; onograrias, J.).

Hermann considera el blanco como la albura, y el cetrino como el corazon del leño. Segun Merat, el primero es el leño jóven, y el otro el que ha llegado á su madurez.

El sándalo cetrino es escitante y diaforético, y el rojo un poco astringente.

COCIMIENTO DE LEÑO DE SANDALO CETRINO.

Decoctum ligni santali citrini. (b.*)

R. Raspaduras de leño de sándalo cetrino, ... med. onz.
Agua de fuente, ... dos lib.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion.
Para beber á vasos.

ACEITE DE LEÑO DE SANDALO CETRINO.

Oleum santali citrini æthereum, Ætheroleum santali citrini. (w.)

R. Raspaduras de leño de sándalo cetrino, ... seis lib.

Agua pura, . . treinta y seis lib.
Sal comun, ... una lib.

Déjense en maceracion por cuatro ó cinco dias, destílese y recójase el aceite que ocupe el fondo.

UNGUENTO SANDALINO.

Unguentum santalinum, Emplastrum santalinum, s. *incognitum*. (br. s. sa. w.)

R. Aceite de mirto, ... tres lib.
Cera blanca, ... nueve onz.
Pétalos secos de rosas rojas y
Leño de sándalo rojo, a. cuatro onz.
Alcanfor, ... med. onz.

Lícuese la cera en el aceite, añádanse los polvos de rosa, despues los del sándalo, y en fin el alcanfor disuelto en un poco de aceite.

R. Sándalo blanco,
——— cetrino y
——— rojo, a. . . . seis drac.
Flores frescas de amapola,
onz. y med.
——————— de rosas,
dos onz. y med.
Aceite rosado, ... una lib.
Vino blanco, ... cuatro onz.

Déjense en maceracion por dos dias, cuélese suavemente hasta que se consuma la humedad, cuélese por espresion y añádase

Bol arménico y
Cera blanca, a. . . . . tres onz.
Alcanfor, ... dos drac.
Mez. (w.)

R. Polvos de sándalo rojo, . seis pt.
——— de azafran, . . . una pt.
Incienso,
Almáciga,
Mirra y
Alumbre crudo,
a. . . . . un duodécimo de pt.

Lícuense juntos y añádase á la masa medio fria

Resina comun y
Cera amarilla, a. . diez y seis pt.
Mez. ex. (s.)

R. Cera y
Resina comun, a. . . cuatro onz.
Lícuense juntos y añádase
Leño de sándalo rojo, onz. y med.
Azafran, ... dos drac.
Incienso,
Almáciga,
Mirra y
Alumbre, a. . . . drac. y med.
Méz. (br. w.)

ESPECIES DE LOS TRES SANDALOS.

Species diatron santalon. (pa. w.)

R. Sándalo blanco,
——— cetrino y
——— rojo,
a. . . . dos drac. y dos escrp.
Flores de rosas, tres onz. y tres drac.
——— de violeta, . . med. onz.
Ruibarbo,
Simiente de verdolaga,
Marfil calcinado y
Zumo de regaliz, a. . . dos drac.
Almidon,
Goma arábiga y
——— tragacanto, a. cuatro escrp.
Puede añadirse
Alcanfor, ... un escrp.

Persuadidos á que los sándalos corregian el calor anormal del hígado, prescribian los antiguos estas especies en las calenturas lentas, la tericia y la hidropesía. — Dósis; de med. á una dracma.

SANDARACA.

Goma de enebro, Grasilla; Sandaraca Gummi, s. *Resina juniperi, Vernix sicca.*

Sandarach Wachholderharz, Al.; Sandaraque, F.; Gum juniper, I.

ams. b. be. br. d. e. f. fe fu. ham. han. o. pr. s. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Resina en pequeñas lágrimas secas, ó en pedazos trasparentes, de un amarillo claro ó cetrino que se enrojece un poco con el tiempo. Su quebradura es brillante y lisa, y su olor y sabor análogos á los de la resina comun.

Broussonnet pretende que fluye del *Thuya articulata*, Desf., árbol de la Barbaria (monoecia monadelfia, L.; coniferas, J.). Por mucho tiempo se ha atribuido al *Juniperus communis*, L., ó al J. *Lycia*, L., ó al J. *oxycedrus*, de los que el primero presenta algunas veces entre el leño y la corteza una resina diferente y verdosa, llamada *Sandaraca de Alemania; Sandaraca Germánica.*

SANGRE DE DRAGO.

Draconis sanguis, Gummi, s. *Resina sanguis draconis.*

Drachenblut, Al.; dragon's blood, In.; sang-dragon, F.; sangue didragone, I.

ams. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fu. han. o. po. pr. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.*

Sustancia de un color rojo subido como sangre, inodora, insípida, dura, friable, seca, fusible é inflamable al fuego, que exhala un olor balsámico cuando se quema. Se distinguen muchas especies.

1.º *En granos: Sanguis draconis in granis;* en pequeñas lágrimas separadas y trasparentes.

2.º *En lágrimas: Sanguis draconis in lacrymis;* en masas ovoides, del grueso de una avellana y dispuestas en forma de rosario.

3.º *En panes: Sanguis draconis in placentis;* en masas ó tortas aplastadas, de una pulgada de grueso y del peso de algunas onzas.

4.º *En tablas: Sanguis draconis in tabulis*; en planchas largas de tres ó cuatro pulgadas, sobre seis á ocho de ancho y mas de una de grueso.

Esta sustancia se estrae de los frutos del *Calamus Rotang*, L., árbol pequeño de las Indias orientales (hexandria monogynia, L.; palmeras, J.); y del tronco del *Pterocarpus draco*, L., árbol de la América meridional (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.); del *Pterocarpus santalinus*, L., árbol de las Indias orientales; del *Dracena draco*, L., de Canarias (hexandria monogynia, L., asparagineas, J.); del *Dalbergia monetaria*, árbol de Surinam (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.); y de diversos *Crotons.*

Astringente poco enérgico. — Dósis del polvo; de diez gr. á med. drac.

POLVOS ANTIHEMOPTISICOS. (*sm.*)

R. Sangre de drago, . . . dos drac.
Sub-carbonato de magnesia,
med. onz.

Divídase en doce papeles, de los que se prescribe uno cada dos ó tres horas en un poco de agua.

POLVOS ASTRINGENTES.

Pulvis adstringens, s. *contra casum.*
(pa. sa. *sp.*)

R. Tierra sellada,

Sangre de drago y
Momia de Egipto, a. . med. onz.
Esperma de ballena, . . dos drac.
Ruibarbo, ... una drac.
Háganse polvos. *(sp.)*

pa. prescribe dos drac. de cada una de las tres primeras sustancias y una de las otras dos.

R. Bayas de mirto,
Balaustias,
Bol arménico,
Almáciga,
Incienso y
Sangre de drago, a. . . . pt. ig.
Háganse polvos. (sa.)

Aconsejados en otro tiempo despues de las caidas. — Dósis; dos escrp.

TINTURA DE SANGRE DE DRAGO.

Tinctura sanguinis draconis. (sa.)

R. Sangre de drago en polvo, dos onz.
Alcohol, ... una lib.
Déjense en digestion por tres dias al B. A. tibio y fíltrese.
Dósis; de un escrp. á med. drac.

JULEPE ASTRINGENTE. (*pie.*)

R. Agua de llanten y
——— de rosas rojas, a. tres onz.
Coral rojo y
Sangre de drago, a. . med. drac.
Jarabe de rosas rojas y
——— de membrillos, a. seis drac.
Zumo de llanten, . . . dos onz.

SANGUIJUELA OFICINAL.

Hirudo officinalis, L.

Blutigel, Al.; Sangsues, F.; mignata, I.

am. ba. be. br. d. du. f. ff. fi. g. ham. he. o. pp. pr. s. su. w. *br. c. g. sp.*

Animal inverebrado, acuático, ensortijado (enterobranches hirudineas, Lat.) cuyo cuerpo es largo, negruzco, con líneas de diversos colores y con manchas amarillas por debajo.

SANGUINARIA MENOR.

Sanguinaria plateada; Paronychia argentea, Lmk.

Paronique, F.

e.

Planta ánua del mediodia de Francia (pentandria monogynia, L.; paronicheas, A. St-Hil).

Se usa la yerba florida *(herba Sanguinariæ minoris)* que se compone de un tallo ramoso con hojas ovales, puntiagudas, casi lampiñas, con estípulas mas cortas que las hojas; pero ensanchadas por la base, y de flores dispuestas en pequeñas cabezas terminales, rodeadas de bracteas grandes.

SANGUINARIA DEL CANADÁ.

Sanguinaria del Canadá; Sanguinaria canadensis, L.

Bloodrot, pueoon, In.; sanguinaire, F.

am. *c.*

Planta ánua de la América septentrional (polyandria monogynia, L.; papaveraceas, J.).

Se usa la raiz y las simientes.

La raiz es gruesa y guarnecida por todas partes de un grande número de fibras. Suministra un jugo rojo como

sangre. Su sabor es acre y un poco amargo.

Emética. — Dósis en polvo; de ócho á veinte granos. — Smith dice que su accion se parece á la de la digital purpúrea, y que disminuye igualmente la velocidad del pulso.

Las simientes se parecen, segun Barton, á las del estramonio en cuanto á su modo de obrar.

INFUSION DE SANGUINARIA DEL CANADA.

Infusum sanguinariæ Canadensis. (b.*)

R. Raiz de sanguinaria del Canadá, una drac.

Agua hirviendo, . . cuatro onz.

Déjese en infusion y cuélese.

Emético aconsejado por Tully. — Dósis; de dos drac. á med. onz. hasta que haya producido el efecto.

TINTURA DE SANGUINARIA DEL CANADÁ.

Tinctura sanguinariæ Canadensis. (am. b.* c.)

R. Raiz de sanguinaria del Canadá, dos onz.

Alcohol flojo, . . dos cuartillos.

Déjese en digestion por diez dias y filtrese.

Aconsejada al principio de la tisis pulmonal, en el hydrotorax, al principio del crup, &c. — Dósis; de diez á veinte got. y mas, aumentando gradualmente.

SANGUINARIA MAYOR.

Altamandria, Corregüela; Polygonum aviculare, L.

Vogelknæterich, Al.; knotgrass, In; br. e. f. w. *be. m. sp.*

Planta ánua comun en toda Europa (octandria trigynia, L.; polygonas, J.).

Se usa la yerba (*herba Centumnodiæ*, s. *Centinodiæ*, s. *Polygoni*, s. *Sanguinariæ*, s. *Sanguinalis*) que se compone de un tallo nudoso, ramoso, liso, con hojas alternas, lanceoladas, casi sentadas, enteras y lisas. Carece de olor y su sabor es un poco astringente y áspero.

SANGUISORBA.

Pimpinela de los prados; Sanguisorba officinalis, L.

Blutkraut, Blutwurzel, Al.; sanguisorbe, F.; great burnet, In.; pimpinella maggiore, In.; sanguisorba, Por.

br. f. w. *m.*

Planta bienal de Europa (tetrandria monogynia, L.; rosaceas, J.).

Se usa la raiz (*radix Sanguisorbæ*, s. *Pimpinellæ Italicæ*) que es ramosa, de un amarillo moreno negruzco por fuera, y de un blanco amarillento por dentro, inodora y estíptica.

En otro tiempo se la creia vulneraria.

SANICULA HEMBRA O DE MONTAÑA.

Sanícula de hojas largas; Astrantia major, L.

Schwarze Meisterwurz, Al.; great black masterwort, In.; astrance, F.

f. *sp.*

Planta bienal que crece en los Alpes y en los Pirineos (pentandria digynia, L.; ombeliferas, J.).

Se usa la raiz (*Radix Astrantiæ majoris*) que es articulada, fibrosa, ramosa, de un amarillo negruzco por fuera, blanca por dentro, dotada de un olor y sabor particulares.

Se confunde con frecuencia con la del eléboro negro; pero aunque es tambien acre, es mas débil su accion.

SANICULA O YERBA DE SAN LORENZO.

Sanícula de Europa; Sanicula Europœa, L.

Sanickel, Al.; sanicle, In.; sanicola, I.; sanicula, Por.; sanicle, F.

br. e. f. fe. w. *be. br. g. m sp.*

Planta bienal de Europa (pentandria digynia, L.; ombeliferas, J.).

Se usa la yerba (*herba Saniculæ*, s. *Diapensiæ*) que se compone de hojas radicales simples, muy pecioladas, redondas, de cinco lóbulos, aserradas y relucientes, de tallos lampiños y de hojas del tallo sentadas.

Carece de olor y su sabor es amargo, un poco astringente y salado.

Entra en ciertas especies pectorales.

SANTOLINA.

Santolina de hojas de ciprez, Abrótano hembra; Santolina Chamœcyparissias, L.

Gartencypressen, Al.; sweet scented lavender cotton, In.; santolina, I. Por.

f. fe. w. *be. br. m. sp.*

Planta de las montañas del mediodia de Europa (syngenesia polygamia igual, L.; synantereas, J.).

Se usa la yerba (*herba Santolinæ*, s. *Abrotani fœminei*, s. *Abrotani montani*) que se compone de hojas dispuestas en cuatro órdenes, dentadas, obtusas y siempre verdes. Tiene un olor penetrante y agradable, y un sabor aromático y amargo.

Escitante, nervino y antielmíntico.

SAPONARIA.

Saponaria officinalis, L.

Seifenkraut, Speichelseifenkraut, Al.; soapwort, I.; saponaire. F.; saponaria, I.; saboaira, Por.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en Europa (hexandria digynia, L.; cariofiladas, J.).

La raiz (*radix Saponariæ rubræ*) es delgada, dura, muy larga, del grueso de una pluma de escribir, nudosa, de un moreno rojizo por fuera, blanquecina por dentro, arrugada y casi inodora. Su sabor al principio algo dulce y mucilaginoso, se hace prontamente amargo, austero y un poco acre.

La yerba se compone de un tallo lampiño, fistuloso, cilíndrico, articulado, poco ramoso, guarnecido de hojas lampiñas y muy lisas, de un verde subido, casi sentadas, ovales, lanceoladas, muy enteras, con tres nervios,

estrechas por la base y poco agudas. Es del todo inodora y su sabor es mucilaginoso y amarescente.

La saponaria contiene resina, goma, y un principio mucilaginoso llamado *Saponina* por Bucholz.

Tónica y sudorífica, usada particularmente en las enfermedades cutáneas y venéreas.

ZUMO DE SAPONARIA.

Succus saponariæ. (he.)

R. Yerba ó raiz fresca de saponaria, c. s. q.

Macháquense en un mortero de piedra; esprímase con cuidado; déjese reposar el zumo y fíltrese. Dósis; de una á cuatro onz.

ESTRACTO DE SAPONARIA.

Extractum saponariæ. (a. an. g. han. s. *br. sw. vm.*)

R. Yerba de saponaria, . . diez lib.

Macháquese en un mortero de hierro, añadiendo seis lib. de agua; esprímase el zumo; hágasele dar un hervor y evapórese á un calor suave hasta la consistencia de jarabe espeso. *(sw.)*

R. Hojas frescas de saponaria, c. s. q.

Macháquense con un poco de agua y cuélese por una bayeta; déjese reposar, decántese, coagulese al fuego y cuélese de nuevo; evapórese hasta la consistencia de masa de píldoras; retírese del fuego; incorpórese la fécula que se dejó aparte y evapórese hasta el grado conveniente. (*vm.*)

R. Raiz fresca de saponaria, c. s. q.

Déjense en maceracion por algunas horas en agua; añádase en seguida mas agua; hiérvase un poco el líquido; clarifíquese con clara de huevo y evapórese hasta la consistencia de estracto. *(vm.)*

R. Yerba de saponaria, . . una pt.
Agua comun, ... ocho pt.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas; hiérvase despues por un cuarto de hora, y cuélese esprimiendo con fuerza; hágase hervir el resíduo con cuatro partes de agua; mézclense los dos líquidos, y despues de veinte y cuatro horas de reposo evapórense hasta la consistencia conveniente. (s.)

R. Hojas frescas de saponaria y
Agua fria, a. . . . . una pt.

Déjese en maceracion por doce horas y añádase despues

Agua hirviendo,
el doble del peso de la masa total.

Cuélese despues de frio; clarifíquese con clara de huevo; póngase al fuego; y cuando el líquido principie á espesarse, cuélese por un cedazo y evapórese despues lo conveniente, meneando sin cesar. *(vm.)*

R. Hojas frescas de saponaria, dos lib.
Agua comun, ... diez lib.

Hiérvase por un cuarto de hora; cuélese por espresion; déjese reposar; decántese el líquido y evapórese despues hasta la consistencia necesaria. (an. g.)

li. prescribe se cuezan dos lib. de raiz en ocho de agua, reducidas á cuatro, y que se evapore el cocimiento.

R. Raiz de saponaria, . . . una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.

Hiérvase ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hágase hervir otra vez el resíduo con cuatro partes de agua y cuélese del mismo modo; mézclense los dos líquidos; decántense despues del suficiente reposo y evapórense hasta la consistencia de estracto. (han.)

a. prescribe se estraigan los principios de la raiz por muchas ebuliciones sucesivas, y que se evaporen al B. M. los líquidos reunidos despues de la decantacion; — *br.* que se hierva por dos horas con seis partes de agua, y despues se cueza segunda vez con nueva agua, y que se evaporen los dos líquidos reunidos.

Dósis; de med. á dos drac.

COCIMIENTO DE SAPONARIA.

Decoctum saponariæ officinalis.

(b.* *sw. sy.*)

R. Raiz de saponaria, . . dos onz.
Agua de fuente, . . . cuatro lib.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion. (b.*)

R. Yerba de saponaria, . med. lib.
Agua, ... ocho lib.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion. (*sw. sy.*)

Aconsejado en las escrófulas, las enfermedades venéreas y las afecciones cutáneas. — Dósis; de dos á cuatro lib. cada dia.

ESPECIES RESOLUTIVAS. (fu. sa. *pid.*)

R. Raiz de diente de leon y
——— de saponaria, a. . dos onz.
Yerba de centaura menor y
Yerba de marrubio,
a. . . . . una onz.
Flores de tanaceto y
——— de manzanilla,
a. . . . . onza y med.
Pártanse y méz. (fu. *pid.*)

R. Raiz de diente de leon,
——— de saponaria y
——— de valeriana menor,
a. . . . . dos pt.
Yerba de centaura menor y
——— de marrubio blanco,
a. . . . . una pt.
Flores de manzanilla romana,
med. pt.
——————— ordinaria,
dos pt.
Simiente de lino, . . cuatro pt.
Pártanse y quebrántense. (sa.)

Para lavativas en las obstrucciones de las vísceras del bajo vientre.

SARCOCOLA.

Sarcocola, Gummi Sarcocollæ.

Sarkokolle, Al.; sarcocolle, F.

ams. br. e. f. fe. w. wu. *a. be. g. m. sp. z.*

En pequeños granos irregulares, angulosos, friables, de color variable de amarillo de paja al de grana subido, trasparentes, medio trasparentes y opacos, sin olor y de un sabor acre y caliente.

Fluye de todas las partes y particularmente de los cálices del *Penæa Sarcocola*, L.; arbolillo de Persia y de la Arabia (tetrandria monogynia, L.; acantaceas, J.).

Contiene, segun Pelletier, muy poco de goma y de materia gelatinosa,

con una sustancia particular, la *Sarcocolina.*

SASAFRAS.

Saxafras ó Xaxifras, Leño Sasafras; Laurus Sassafras, L.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. po pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Arbol de la América meridional (enneandria monogynia, L.; laurineas, J.).

El leño *(lignum Sassafras)* es ligero, de un tegido esponjoso, quebradizo, gris de hierro, inodoro ó de un olor muy débil.

La corteza es bastante gruesa, ligera, quebradiza, rojiza y de un moreno ferruginoso. Tiene un olor agradable y análogo al del hinojo, y un sabor aromático y un poco acre.

Escitante, diaforético y diurético, usado en la gota, el reumatismo y las enfermedades venéreas. — Dósis del polvo, de media á una drac.

ESTRACTO DE SASAFRAS.

Extractum ligni Sassafras. (w.)

R. Leño de sasafras raspado, una lib.
Alcohol, ... cinco á seis lib.

Déjese en digestion lo suficiente y cuélese por espresion; póngase en infusion y hiérvase despues el resíduo con tres lib. de agua; clarifíquese el cocimiento con clara de huevo; estráigase el alcohol por la destilacion, y evapórese hasta la consistencia de estracto.

Dósis; de un escrup. á una drac.

INFUSION DE SASAFRAS.

Infusum ligni Sassafras. (b.* ff.)

R. Raspaduras de leño de sasafras, media onz.
Agua hirviendo, ... una lib.

Déjese en infusion por seis horas y cuélese. (b.*)

ff. prescribe una onza de sasafras y c. s. de agua hirviendo para obtener med. lib. de líquido colado despues de cuatro horas de infusion.

AGUA DE CAL COMPUESTA.

Agua bendita, Agua bendita compuesta.
(br. du. p. *bo. pie. sp. vm.*)

R. Leño de sasafras, . . med. onz.
——— de guayaco. . . . med. lib.
Regaliz, ... una onz.
Cilantro, ... tres drac.
Agua de cal, ... tres azumb.

Déjense en digestion por dos dias y cuélese. (br. du. *sp.*)

R. Leño de sasafras, . . . dos onz.
Nuez moscada, ... tres drac.
Regaliz, ... una onz.
Agua de cal, ... tres lib.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y cuélese. (p.)

vm. prescribe dos onz. de sasafras, tres drac. de nuez moscada, una onza de regaliz, treinta y seis onz. de agua de cal y tres dias de infusion.

R. Sasafras, ... med. onz.
Regaliz, ... una onz.
Agua de cal, ... seis lib.

Déjense en infusion por dos dias y cuélese. *(pie.)*

R. Raiz de malvavisco y

Raiz de saponaria, a. . una onz.
---- de zarzaparrilla y
Leño de sasafras, a. . med. onz.
Agua de cal, ... cuatro lib.
Déjese en maceracion por dos dias y añádase
Jarabe de las cinco raices aperitivas, ... dos onz.
Méz. (*bo.*)

En las enfermedades escrofulosas. — Dósis; muchas tazas cada dia.

JARABE DE SASAFRAS.

Syrupus è corticibus ligni sassaras. (w.)

R. Corteza de leño de sasafras, tres onz.
Vino blanco, veinte y dos onz.
Infúndase y añádase al líquido colado
Azúcar, ... treinta y dos onz.

TINTURA DE LEÑO DE SASAFRAS.

Tinctura, s. *Essentia ligni sassafras.* (br. w. *sw.**)

R. Raspaduras de leño de sasafras, dos onz.
Aguardiente, ... doce onz.
Déjese en digestion por tres dias y filtrese. (*sw.**)

br. y w. prescriben onz. y med. de sasafras, ocho onz. de alcohol y ocho dias de digestion.

Escitante, reputado en otro tiempo por anticatarral y depurativo, considerado en el dia, con particularidad, como sudorífico y diurético, y muy usado en los reumatismos crónicos. — Dósis; una drac. cuatro veces al dia, en la infusion de sasafras.

TINTURA DE SASAFRAS COMPUESTA.

Essentia ligni sassafras composita. (w.)

R. Corteza de leño de sasafras, cuatro onz.
Hojas de salvia, ... dos onz.
Nuez moscada, ... una onz.
Canela, ... med. onz.
Anís estrellado, ... tres drac.
Alcohol, ... dos lib.
Déjense en digestion por tres dias, cuélese por espresion y filtrese.

Escitante, aconsejado en las afecciones catarrales, la gota, las enfermedades atribuidas á la presencia de gases, ciertas variedades de la sarna, &c. — Dósis; de cincuenta á ochenta gotas.

ACEITE DE SASAFRAS.

Oleum sassafras ligni æthereum, Ætheroleum sassafras ligni. (am. ams. du. ed. f. fe. fu. han. he. li. pa. sa. w. wu. *c. pid. sw.*)

R. Leño de sasafras, ... c. s. q.
Agua, ... c. s.
Destílese. (am. ams. du. ed. *c.*)

fu. wu. y *sw.* prescriben una parte de leño y cuatro de agua; — pa. una de leño y seis de agua; — y han. una de leño y ocho de agua.

R. Leño de sasafras, ... diez pt.
Agua, ... veinte pt.
Sal comun, ... una pt.
Al cabo de doce horas destílese y recójase el aceite que ocupe el fondo. (f.)

sa. prescribe tres partes de leño, cuatro de agua y una de sal; — he. w. y *pid.* seis de leño, treinta y seis de agua

y una de sal; —y fe. seis de leño, treinta de agua y tres de sal.

R. Leño de sasafras, . . . dos lib.
Alcohol, ... ocho onz.
Añádase al cabo de dos dias
Agua, ... doce lib.
Sal comun, ... una lib.
Destílese. (li.)
Dósis; de dos á ocho got.

OLEOSACARO DE SASAFRAS.

Oleo saccharum sassafras. (b.*)

R. Aceite esencial de sasafras, diez got.
Azúcar blanca, ... tres drac.
Tritúrense juntos.

AGUA DE SASAFRAS.

Aqua ligni sassafras. (f. sa.)

R. Leño de sasafras, . . . una pt.
Agua, ... ocho pt.
Al cabo de doce horas destílense cuatro partes. (f.)

sa. prescribe una parte de leño, seis de agua y un poco de sal.

Dósis; de una á cuatro onz.

AGUA DE SASAFRAS COMPUESTA.

Aqua ligni sassafras composita. (w.)

R. Leño de sasafras, . . . med. lib.
Canela, ... tres onz.
Vino generoso, ... diez lib.
Déjense en digestion por algunos dias y destílese libra y media.

SAUCE.

Las farmacopeas citan cinco especies de este género:

1.° *Sauce blanco, Sauce comun; Salix alba*, L.

Weide, Al.; saule blanc, F.; willow, In.; salice, I.; salguerro, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be br. de. du. f. fe. fu. r. s. w. wu. ww. *br. c. m. z.*

Arbol comun en toda Europa (dioecia diandria, L.; salicineas, J.).

Se usa la corteza de los ramos de tres ó cuatro años (*cortex Salicis albæ*) que es delgada, flexible y roja. Tiene un olor particular y un sabor muy astringente, amargo y balsámico.

2.° *Sauce frágil; Salix fragilis*, L.

Bruchweide, Al.

ba. br. d. du. fe. han. li. o. r. s. *c.*

Arbolillo que se encuentra en casi toda Europa.

Se usa la corteza de las ramas de uno á dos años (*cortex Salicis fragilis*) que tiene un olor un poco balsámico y un sabor muy amargo y astringente.

3.° *Salix capreæa*, L.

Soolweide, Al.

ed. f. fe. lo. *c.*

Arbolillo comun en toda Europa.

La corteza (*cortex Salicis caprœ*) es astringente.

4.° *Salix vitellina*, L.

Dotterweide, Al.

d. r.

Arbolillo aclimatado en Europa.

La corteza (*cortex Salicis vitellinæ*) es astringente.

5.° *Salix pentandra*, L.

Baumwollenweide, Al.

a. b. be. d. han. o po. pp. pr. r. s. su. *be. sp.*

Arbol bastante comun en Europa.

Se usa la corteza de las ramas de uno á dos años (*cortex Salicis pentandræ*, s. *laureæ*) que es delgada, flexible y morena por fuera. Su olor es balsámico y su sabor agradable, balsámico, un poco amargo y estíptico.

Estas cortezas contienen un alcaloide particular, llamado *Salicina* por Fontana que le ha descubierto. Han sido propuestas como tónicas y un poco astringentes, para reemplazar la quina en las calenturas intermitentes.

Dósis en polvo; de med. á una onz.

CATAPLASMA ANTISEPTICA. (fu.)

R. Corteza de sauce blanco en polvo y
Yerba de ruda, a. . . dos onz.
Aguardiente alcanforado, tres onz.
Vinagre, ... c. s.

UNGUENTO DE SAUCE.

Unguentum salicis. (hp.)

R. Zumo de hojas de sauce, dos onz.
Manteca de puerco, ... c. s.
Méz. á un calor suave.

Para la curacion de las úlceras sórdidas, escorbúticas y gangrenosas.

ESTRACTO ACUOSO DE SAUCE.

Extractum salicis aquosum. (a. ams. an. b. ba. fu. han. o. po. pr. s. *br.*)

R. Corteza de sauce, . . . una lib.
Agua fria, ... dos lib.

Déjese en maceracion por dos dias, mencándolo de cuando en cuando; cuélese, déjese reposar y decántese el líquido, evaporándolo despues hasta la consistencia de estracto. (po.)

R. Corteza de sauce, ... una pt.
Agua, ... doce pt.

Déjese en digestion por doce horas á un calor suave, hiérvase despues por una, cuélese y evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto. (ba.)

R. Corteza de sauce, ... una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.

Hágase hervir ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hiérvase todavía el residuo con cuatro partes de agua y cuélese del mismo modo; mézclense los dos líquidos, decántense despues del suficiente reposo y evapórense hasta la consistencia de estracto. (a. han. o. pr.)

s. y a. prescriben se estraigan los principios de la corteza por muchas ebuliciones sucesivas, y que despues de la decantacion se evaporen los líquidos reunidos al B. M.; — br. que se haga hervir por dos horas con seis partes de agua, despues por segunda vez con nueva agua, y que se evaporen los líquidos reunidos; — b. que se deje en digestion por veinte y cuatro horas, que se hierva despues por dos con diez partes de agua, y que se repita la operacion por el mismo tiempo con ocho partes de nueva agua; — y ams. que se le haga sufrir dos decocciones sucesivas, la una con veinte y la otra con quince partes de agua, reducidas cada vez á la mitad.

Dósis; de diez á veinte gr.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE SAUCE. (fu.)

R. Corteza de sauce, . . . una lib

Aguardiente, ... seis lib.

Déjese en digestion por algunos dias y esprímase; cuézase el resíduo con tres lib. de agua y cuélese por espresion; redúzcanse los dos líquidos, cada uno de por sí, á la consistencia de miel; reúnanse y evapórese la mezcla hasta el grado conveniente.

INFUSO-COCIMIENTO DE SAUCE DE BREMER. (b.*)

R. Corteza de sauce, . . cuatro onz.
Alcohol, ... ocho onz.
Agua, ... diez y seis onz.

Déjense en digestion en vasija tapada y cuélese; hiérvase en seguida el resíduo con

Agua comun, . . . treinta onz.

hasta que se consuma la mitad y mézclense los dos líquidos.

Febrífugo.—Se toma todo entre dos accesos de calentura.

COCIMIENTO DE CORTEZA DE SAUCE.

Decoctum corticis salicis laureæ. (b.* pp.)

R. Corteza de sauce partida menudamente, ... una onz.
Agua de fuente, diez y seis onz.

Redúzcase á ocho onz. por la ebulicion. (b.*)

pp. prescribe onz. y med. de corteza y quince de agua reducidas á nueve.

Tónico y febrífugo.—Para tomar á vasos.

INYECCION ANTISEPTICA. (fu. ham.)

R. Corteza de sauce, . . . dos onz.
Agua, ... una lib.

Redúzcase á dos terceras partes por la coccion, y añádase al líquido colado

Alcanfor disuelto en c. s. de alcohol, ... med. drac.
Miel despumada, . . . una onz.

SAUCO.

Sauco negro; Sambucus nigra, L.

Fliederhollunderbaum, Al; sureau noir, F.; elder, In.; sambuco, I.; sabuguiero, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pid. sp.*

Arbolillo de Europa (pentandria trigynia, L.; caprifoliaceas, J.).

Se usa la corteza, las hojas, las flores y los frutos.

La corteza media ó interior de las ramas (*cortex*, s. *alburnum Sambuci*) que se le despoja ordinariamente de su película delgada y cenicienta es verde. Su olor es fuerte y nauseabundo, y su sabor, primero dulzacho y luego acre y un poco amargo.

Las hojas son aladas con impar, de un verde subido, lampiñas, con ojuelas ovales, lanceoladas, dentadas en forma de sierra, su olor es desagradable y su sabor acre.

Las flores son blancas, pequeñas, de un olor fuerte y desagradable, y de un sabor mucilaginoso y amarescente.

Los frutos son bayas suculentas, ovales, negras, umbilicadas, trispermas, que contienen un zumo rojizo, acídulo é inodoro. Se las llama *grana Actes*, despues de la desecacion. La farmacopea americana las reemplaza por las del *Sambucus Canadensis*, Willd.

POLVOS CONTRA LA ERISIPELA.

Pulvis ad erysipelam. (pp.)

R. Flores de sauco y

Salvado de trigo, a. . . part. ig.
Méz.

ESPECIES SUDORIFICAS.

R. Flores de sauco,
——— de borraja,
——— de amapola y
Leño de sasafras, a. . . . part. ig.

ZUMO DE BAYAS DE SAUCO.

Succus sambuci. (f. sa.)

R. Bayas de sauco maduras, c. s. q.
Desháganse entre las manos, déjese fermentar la masa por tres ó cuatro dias, cuélese por espresion y consérvese el zumo en botellas con una capa de aceite.
Dósis; de med. á dos onz.

POLVOS DE SAUCO.

Tragea granorum actes. (w. *sp.*)

R. Zumo de bayas de sauco, c. s. q.
Harina de centeno, ... c. s.
Redúzcase á una masa y despues á pequeños panes; cuézanse estos al fuego hasta que esten bien secos; pulvericense entonces, imprégnense de nuevo zumo y séquense; repítase esta operacion tres veces seguidas, y en fin á cada onz. de la masa pulverizada añádase
Nuez moscada en polvo, una drac.
Méz. ex.
Acons:jados contra la disenteria.
Dósis; de una á dos drac.

JARABE DE SAUCO.

Syrupus sambuci. (a.)

R. Zumo recien esprimido de bayas de sauco, ... una lib.
Azúcar blanca, ... dos lib.
Hágasele dar un solo hervor.

ARROPE DE SAUCO.

Rob Sambuci, Succus Sambuci inspissatus. (a. am. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fe. fu. g. han. he. li. o. pa. po. pr. r. sa. w. wu. *br. c. sw. vm.*)

R. Bayas de sauco maduras, c. s. q.
Cuézanse en una vasija de estaño tapada, menéndolas continuamente por media hora, ó hasta que se rebienten; cuélese el líquido por un cedazo y esprímase el resíduo con fuerza; mézclense los dos líquidos, añádanse cuatro lib. de azúcar á cada quince de la mezcla, y evapórese despues hasta la consistencia de miel, despumándolo bien. (be.)

b. prescribe cuatro lib. de azúcar por diez de zumo;—an. una lib. de azúcar por cinco de zumo;—d. una lib. de azúcar por cuatro de zumo;—ba. una lib. de azúcar y diez y seis de zumo;—y fe. dos lib. de azúcar y cuatro de zumo.

R. Bayas de sauco maduras, c. s. q.
Desháganse entre las manos, esprímase el zumo y cuélese por una bayeta; añádase una lib. de azúcar blanca á una azumbre de este zumo, y evapórese despues á un fuego vivo hasta la consistencia de miel. (*vm.*)

pa. prescribe una parte de azúcar y dos de zumo;—— am. ed. y *c.* una de azúcar y cinco de zumo;—— fu. una de azúcar y cuatro de zumo;—— br. he. r. w. y *sw.* una de azúcar y seis de zumo;—— a. una de azúcar y nueve de

zumo; --- y o. po. pr. y s. una de azucar y diez y seis de zumo.

R. Zumo esprimido de bayas de sauco, ... c. s. q.

Hágase depurar por el reposo y evapórese lo conveniente á un fuego moderado. (du. f. g. ti. sa. *br.*)

Diaforético. --- Dósis; de onz. y med. á dos onz.

ESTRACTO DE FLORES DE SAUCO.

Extractum florum sambuci. (sa.)

R. Flores frescas de sauco, ocho lib.

Déjense en maceracion por tres dias en un alambique; estráiganse despues como unas dos onz. de agua por la destilacion al B. M.; échese entonces sobre el residuo el triple de agua, y despues de seis horas de digestion redúzcase á la tercera parte por la ebulicion; esprímanse las flores, clarifíquese y cuélese el líquido, evapórese hasta la consistencia de electuario, y añádase á este el agua destilada cuando no esté mas que tibio.

MISTURA ANTIASMATICA. (*sm.*)

R. Arrope de sauco,
Pulpa de ciruelas y
Jarabe de amapolas, a. dos onz.
Nitro, ... una drac.

Dósis; una cuch. tres ó cuatro veces al dia.

MIEL DE FLORES DE SAUCO.

Mel sambuci. (w.)

R. Flores frescas de sauco, una lib.
Miel despumada, . . . dos lib.
Agua de flores de sauco, seis onz.

Déjense en maceracion por algunos dias, hiérvanse despues á un fuego suave, cuélese por espresion y evapórese hasta el otro tiempo en los gargarismos emolientes y resolutivos.

MIEL DE BAYAS DE SAUCO.

Mel fructuum sambuci. (e.)

R. Zumo de bayas de sauco maduras, una lib.
Miel, ... dos lib.
Agua, ... c. s.

Cuézase hasta la consistencia de jarabe espeso y cuélese.

Dósis; de med. á una onz.

VINAGRE DE SAUCO.

Acetum sambuci, s. *Sambucinum.* (ams. br. f. p. pa. sa. su. w. wu. *pid. sw.*)

R. Flores de sauco, ... una pt.
Vinagre, ... doce pt.

Déjese en maceracion por cuatro dias, clarifíquese con leche y cuélese. (su.)

f. prescribe una parte de sauco, diez y seis de vinagre y quince dias de maceracion; --- br. pa. w. y *sw.* una parte de sauco y seis de vinagre; --- sa. y *pid.* una de sauco, cuatro de vinagre y seis dias de maceracion; --- wu. una de sauco, nueve de vinagre y tres semanas de maceracion; --- y ams. una parte de sauco, ocho de vinagre y cuatro dias de maceracion.

R. Flores de sauco secas, . una lib.
Vinagre comun, ... seis lib.

Déjese en maceracion por seis dias, hiérvase despues y añádase al líquido colado

Alcohol, ... med. lib.
Sudorífico y detersivo.

Se administra en agua de azúcar caliente para promover los sudores. Se usa tambien en forma de gargarismo en la angina mezclado con agua y miel.

OJIMIEL DE SAUCO.

Oxymel sambuci. (wu.)

R. Vinagre de sauco, . . . una pt.
Miel blanca, ... dos pt.

Cuézase suavemente hasta la consistencia de jarabe.

COCIMIENTO DE CORTEZA DE SAUCO.

Decoctum corticis sambuci. (b.*)

R. Corteza de sauco, . . . tres puñ.
Agua de fuente y
Leche, a. . . . . una lib.

Redúzcase á una lib. de líquido por la ebulicion y cuélese.

Aconsejado por Boerhaave en las hidropesías.

Dósis; la mitad por la mañana y la otra por la tarde.

INFUSION DE FLORES DE SAUCO.

Infusio florum sambuci nigri. (an. d. f. ff. ham. *fp. ra.*)

R. Flores de sauco, . . . una drac.
Agua hirviendo, ... una lib.

Déjense en digestion por un cuarto de hora y cuélese por espresion. (dd. *fp. ra.*)

ham. y ff. prescriben una onz. de flores y c. s. de agua hirviendo para obtener ocho onz. de líquido colado; — y an. una onz. de flores, una lib. de agua, y la digestion por una hora á un calor aumentado gradualmente hasta la ebulicion.

R. Flores de sauco, . . . dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.

Déjense en infusion por un cuarto de hora, cuélese y añádase al líquido
Jarabe de culantrillo, . una onz.
Méz. ex. (f.)

Diaforético usado en las afecciones reumáticas y los exantemas agudos.

Se administra la infusion caliente y en abundancia, despues de edulcorada con miel, ojimiel ó jarabe tartárico.

AGUA SULFUROSA COMPUESTA. (*ca.*)

R. Infusion de flores de sauco y
Agua de Baréges, a. . . una lib.

Para beber en veinte y cuatro horas en los catarros crónicos, la tabes, las escrófulas y los herpes.

GARGARISMO DETERSIVO. (fu. *sa.*)

R. Flores de sauco, . . . una onz.
Agua hirviendo, . . . una lib.
Infúndase, cuélese y añádase
Nitro, ... med. onz.
Esencia de pimpinela, tres drac.
Ojimiel simple, ... dos onz.
Méz. ex. (fu.)

R. Flores de sauco y
——— de gordolobo, a. un puñ.
Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener med. lib. de líquido colado. Añádase á este
Nitro, ... med. drac.
Sal polycresta, ... una drac.
Arrope de sauco y

Jarabe de moras, a. . . una onz.
Méz. ex. *(sa.)*

FOMENTO RESOLUTIVO. (*ra. sp.*)

R. Infusion de flores de sauco,
una lib.
Aguardiente alcanforado,
ocho onz.
Méz. ex. *(ra.)*

R. Flores de sauco, . . . un puñ.
Agua, ... diez y seis onz.
Déjense en infusion por doce horas y añádase al líquido colado
Aguardiente alcanforado, una onz.
Acetato de plomo, . . una drac.
Méz. *(sp.)*

R. Flores de meliloto y
——— de sauco, a. . . dos drac.
Hojas de menta y
——— de salvia, a. . . una drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Añádase al líquido colado
Aguardiente, ... tres onz.
Méz. *(ra.)*

ACEITE DE SAUCO.

Oleum sambuci. (e. *sa.*)

R. Flores de sauco, . . . pt. y med.
Aceite comun, ... tres pt.
Póngase en digestion por tres dias al B. M., déjese enfriar, esprímase y repítase la operacion con nuevas flores. (sa.)

e. prescribe una parte de flores y tres de aceite.

UNGUENTO DE SAUCO.

Unguentum sambuci, s. *sambucinum.* (du. e. lo. *c. sp.*)

R. Flores frescas de sauco, tres pt.
Manteca de puerco, . cuatro pt.
Sebo de carnero, ... dos pt.
Cuézanse las flores con la manteca, esprímase y añádase el sebo. (du.)

lo. y *c.* prescriben se cuezan juntas partes iguales de flores y de manteca; — y *c.* que se cuezan cuatro partes de flores con tres de sebo y una de aceite comun.

R. Sebo de carnero, ... tres pt.
Aceite comun, ... una pt.
Lícuense juntos y hágase digerir en la mezcla
Flores de sauco, . . . cuatro pt.
Cuélese al cabo de algun tiempo. *(sp.)*

R. Corteza de sauco, dos lib. y med.
Flores de sauco, . . . med. lib.
Manteca de puerco, . nueve lib.
Déjense en maceracion por ocho dias y cuézase hasta que se consuma la humedad. (e.)

AGUA DE SAUCO.

Aqua florum sambuci. (a. ams. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fu. ha. he. li. o. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *br. pid.*)

R. Flores de sauco, ... tres pt.
Agua, ... c. s.
Destílense seis partes. (su.)

a. prescribe seis partes de flores, c. s. de agua y que se destilen ocho partes; — f. y sa. una parte de flores, cuatro de agua, y que se destilen dos partes; — ba. una parte de flores, diez y seis de agua, y que se destilen cuatro partes; — pa. una parte de flores, tres de agua, y que se destile parte y med.; — ams. b. be. d. han. o. y po. una parte de flores, c. s. de agua, y

que se destilen diez partes; — he. r. s. y *pid.* una parte de flores, ocho de agua, y que se destilen cuatro partes; — wu. y *br.* una parte de flores y seis de agua; — pr. una parte de flores, quince de agua, y que se destilen seis partes; — y fe. tres partes de flores, seis de agua, y que se destilen seis partes.

R. Flores de sauco, ... tres pt.
Agua, ... doce pt.

Pónganse las flores en un saco, suspendido en medio de un alambique y que no toque al agua, y destílense seis partes. (fu. li.)

R. Flores frescas de sauco,
diez y seis pt.
Agua, ... cuarenta pt.

Déjense en maceracion por dos dias, y cuando se manifieste un principio de fermentacion destílense veinte partes. Añádase al producto

Alcohol, ... una onz.

Méz. ex. (e.)

R. Bayas de sauco machacadas,
c. s. q.

Déjense fermentar en un tonel hasta que adquieran un olor vinoso; destílese á fuego manso, y rectifíquese el producto si es necesario. (br. w.)

JULEPE DE SAUCO.

Julapium sambucinum. (w.)

R. Agua de sauco, . . veinte onz.
Azúcar blanca, . dos lib. y med.

Hágase dar un hervor y cuélese.

ESPIRITU DE SAUCO.

Spiritus sambuci. (br. pa. w.)

R. Flores de sauco, ... una pt.
Aguardiente, ... cuatro pt.

Déjese en maceracion por tres dias, y destílese la mitad.

SAUCO MENOR Ó YEZGO.

Yezgo; Sambucus Ebulus, L.

Zwerghollunder, Atlich, Al.; hieble, F.; dwarf elder, I.; ebbio, I.; chebd, Por.

a. ba. br. e. f. fe. g. p. s. w. wu. *bc. br. m. pid. sa. sp. z.*

Arbolillo de Europa (pentandria trigynia, L.; caprifoliaceas, J.).

Se usa la corteza de la raiz, las hojas, los frutos y la simiente.

La corteza interior de la raiz (*radix Ebuli*, s. *Sambuci humilis*, s. *agrestis*, s. *chameactus*) es blanca, de un sabor amargo y nauseoso. La raiz es larga y del grueso de un dedo. Pasa por emética é hidragoga. — Se prescriben dos onz. infundidas en agua, y se puede tambien dar una onz. del zumo esprimido.

Las hojas son ovales, lanceoladas, agudas, dentadas, lisas y brillantes por encima, y de un color verde subido. Su olor es fuerte y desagradable. En otro tiempo se aplicaban al esterior en los casos de edema y de erisipela.

Los frutos (*baccæ*, s. *grana Actes*) son unas bayas negras, trispermas, de un sabor suave, amargo y nauseabundo. Se consideran como resolutivas, sudoríficas y diuréticas.

Maceradas las simientes en agua y sometidas á la prensa suministran aceite.

ZUMO DE BAYAS DE YEZGO.

Succus ebuli. (f. sa.)

R. Bayas de yezgo maduras, c. s. q.

Deshágansе entre las manos, déjese fermentar la masa por tres ó cuatro dias, cuélese por espresion, y consérvese el zumo en botellas con una capa de aceite.

ARROPE DE PULPA DE YEZGO.

Rob, s. *Pulpa Ebuli.* (a. ba. br. fu. pa. sa. w. *vm.*)

R. Bayas de yezgo frescas y maduras, una pt.

Agua, ... c. s.

para que no se quemen; cuézanse hasta que se rebienten, esprímase el zumo y evapórese despues hasta la consistencia de pulpa, añadiéndole una décimasesta parte de azucar. (ba.)

a. prescribe una parte de azucar y nueve de zumo; — *vm.* una de azucar y diez de zumo; — y br. fu. pa. y w. una de azucar y seis de zumo.

R. Zumo de bayas de yezgo, . c. s. q.

Cuélese y evapórese al B. M. hasta la consistencia de electuario. (sa.)

Diurético, laxante. — Dósis; dos onz. — Rara vez se prescribe solo y casi siempre como escipiente.

AGUA DE YEZGO.

Aqua ebuli. (w.)

R. Bayas quebrantadas, . . c. s. q. Pónganse en un tonel, déjense fermentar, y cuando hayan adquirido un olor vinoso destílese á un calor suave y rectifíquese si se quiere el producto.

SAXIFRAGA GRANULOSA.

Saxifraga blanca; *Saxifraga granulata*, L.

Weisser Steinbrech, Hundsrebe, Al; Saxifrage, F.; common saxifrage, In.; saxifraga branca, Por.

br. e. f. w. *be. m. sp.*

Planta bienal estendida por toda Europa (hexandria digynia L.; saxifragias J.).

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz (*radix Saxifragæ albæ*) se compone de pequeños granos redondos de la magnitud de la simiente de cilantro, unidos por fibrillas y cubiertos de una película roja, que se designaba en otro tiempo con el nombre impropio de *Semen Saxifragæ albæ.* Su sabor es un poco estíptico y amargo, que se disipa por la desecacion. La yerba se compone de un tallo ramoso y de hojas uniformes y lobadas. Su sabor es acre y un poco ácido, del que no le queda casi nada cuando está seca.

SEBESTO.

Cordia Mixa, L.

br. fr. p. w. *a. be. g. m. sp.*

Arbol de Egipto (pentandria monogynia, L.; borragineas, J.).

Se usan los frutos (*fructus Mixæ*, s. *Sebestenæ*) que son drupas lampiñas, ovales, negras, de la figura y magnitud de una ciruela pequeña; contienen una pulpa rojiza, inodora, suculenta, de sabor dulce y mucilaginoso, que encierra un hueso surcado profundamente.

SEDO.

Sedum Rhodiola, Cand.

Rosenwurzel, Rhodisenwurzel, Al; orpin, F.; rosewort, I.; rodiola, I.

br. f. w. *be. m. sp.*

Planta de las montañas altas de Europa (dioecia octandria, L.; crasuleas, Cand.).

Se usa la raiz (*radix Rhodiæ*, s. *Rosariæ*) que es ramosa, blanca, carnosa y tuberculosa, particularmente en la parte superior. Tiene un olor de rosa muy agradable, y el sabor es un poco acre y estíptico.

Ligero astringente.

SEN.

Senna, Al. In.; Séné, F.; sena, I.; Senne, Por.

a. am. ams. an. b. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp z.*

Se usan en medicina con el nombre de sen hojas y frutos.

A. *Hojas.* Las hojas de sen del comercio son una mezcla de las de tres plantas diferentes:

1.° *Casia de hojas obtusas; Cassia obovata*, Coll. Arbusto de la Siria y del Egipto (decandria monogynia, L.; leguminosas, J.).

Esta planta da el *Sen de Say, de la Tebaida, el de hojas obtusas, de pobres, de Alepo, de Berberia, de España y de Italia*, que se compone de hojuelas ovales, estrechadas por la base, terminadas en una punta cortada por su vértice, oblicuas por la base, es decir, teniendo una mitad mayor que la otra, y presentando un lado medio con nervios laterales manifiestos.

2.° *Casia lanceolada; Cassia lanceolata*, Forsk. Sub-arbusto de la Nubia y del Senchas, que da el sen de *Nubia, de Bicharia, de hojas agudas, de Alejandría, de Oriente, de Egipto, de Palta*; el que se compone de hojuelas pubescentes por debajo, lanceoladas y agudas.

3.° *Argel ó Arguel; Cynanchum Arghel*, Del. Planta del alto Egipto (pentandria monogynia, L.; apocineas, J.); el único que se halla en la farmacopea francesa. Las hojas son ovales, lanceoladas, enteras, coriaceas, blanquecinas, casi sentadas, de doce á catorce líneas de largo y regulares por la base, es decir, que sus dos mitades posteriores son iguales. Presentan un lado medio saliente por debajo, sin nervios laterales.

Se encuentra tambien en el sen del comercio restos de peciolos ó de ramos, algunos folículos ó frutos, fragmentos de hojas, de flores &c., materias estrañas y principalmente hojas de espantalobos. Su olor es nauseabundo, persistente, particular y muy repugnante, y su sabor un poco amargo.

B. *Frutos*, llamados *Folículos*; *Follicula Sennæ*; son unas vaynas ovales, oblongas, comprimidas, encorvadas en arco, amarillentas y privadas de sus cuatro ó seis granos cordiformes.

El sen contiene, segun Lassaigne y Feneulle, clorofila, un aceite graso poco abundante, albumina, un principio colorante amarillo, ácido málico, sales de base de potasa y de cal, y en fin, una materia particular á quien debe segun parece sus propiedades y la que ha recibido el nombre de *Catartina*.

No se debe asociar á los ácidos fuertes, á los sub-carbonatos alcalinos, al agua de cal, al nitrato de plata, al acetato de plomo, al tártaro estibiado, ni á la infusion de quina amarilla.

Es un purgante bastante enérgico cuya accion sobre las vias digestivas da casi siempre lugar á náuseas y cólicos. Se administra muy rara vez en polvo, y entonces á la dósis de un escrup. á una drac.

§ I. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL SEN EN SUSTANCIA.

ESPECIES PURGANTES. (*hp.*)

R. Hojas de sen, ... una drac.
Sulfato de sosa, ... una onz.
Hágase hervir con tres tazas de agua, y se toma med. taza del cocimiento de hora en hora.

POLVOS PECTORALES. (b.*)

R. Hojas de sen,
Simiente de anís y
Raiz de regaliz, a. . . . med. onz.
Azucar cande, . dos onz. y med.
Alabados por Fritze. — Dósis; una cuchta. cuatro veces al dia.

POLVOS DE REGALIZ COMPUESTOS.

Pulvis liquiritiæ compositus, s. *pectoralis*, s. *sennæ cum sulphure.* (ff. han. po. pp. pr. *au.*)

R. Hojas de sen, ... med. onz.
Flores de azufre y
Simiente de anís, a. . . una onz.
Raiz de regaliz, dos onz. y med.
Méz (ff. pp. *au.*)

R. Hojas de sen y
Raiz de regaliz, a. . . . dos onz.
Simiente de hinojo y
Flores de azufre, a. . . . una onz.
Azucar blanca, ... med. lib.
Méz. (han. po. pr.)
au. prescribe drac. y med. de sen, otro tanto de azufre, una drac. de hinojo, otra de regaliz y otro tanto de azucar de leche.

Dósis; una cuchta. de tres en tres horas.

POLVOS ANTIICTERICOS.

Pulvis guajaci cum senna. (au.)

R. Hojas de sen y
Resina de guayaco, a. . . part. ig.
Dósis; dos cuch. dos ó tres veces al dia. — Se dice han producido muy buen efecto en la ictericia.

POLVOS LAXANTES.

Pulvis laxans, s. *leniticzy tartarisatus*, s. *sennæ compositus.* (o. w. *sav. vm.*)

R. Polvos de hojas de sen,
——— de anís,
——— de azucar blanca y
——— de cremor tártaro,
a. . . . . una onz.
Méz. ex. (o.)

R. Hojas de sen y
Cremor de tártaro, a. . una onz.
Canela,
Anís é
Hinojo, a. . . . . dos drac.
Pulverícense. (*sav.*)
w. prescribe solamente med. drac. mas de anís y de hinojo.

R. Hojas de sen, . . . diez y seis pt.
Cremor de tártaro, . . cuatro pt.
Hinojo, ... dos pt.
Canela y
Almáciga, a. . . . . una pt.
Méz. (*vm.*)
Dósis; una drac. por mañana y tarde.

POLVOS ANTIARTRITICOS PURGANTES.

Polvos gregorienses; Pulvis antiartriticus purgativus, s. *sennæ compositus, Pulvis diasennæ.* (f. ff. lo. sa. su. w. *c. vm.*)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Escamonea, ... una onz.
Cremor de tártaro, . cuatro onz.
Pulverícese cada sustancia aparte y mézclense los polvos (fi. su.).

R. Hojas de sen y
Cremor de tártaro, a. . . dos pt.
Escamonea, ... med. onz.
Gengibre, ... dos drac.
Pulverícese la escamonea aparte y las otras sustancias juntas; mézclense los polvos (lo. *c.*).

vm. prescribe ocho partes de sen, ocho de cremor de tártaro, dos de escamonea y una de gengibre.

R. Hojas de sen,
Canela,
Cremor de tártaro y
Goma arábiga, a. . . cuatro pt.
Leño de guayaco,
Zarzaparrilla y
Escamonea, a. . . . . dos pt.
Háganse polvos muy finos. (ff.)

f. trae la misma fórmula y añade solamente dos partes de china.

R. Hojas de sen, . . . onza y med.
Cremor de tártaro y
Mechoacan, a. . . . . med. onz.
Ruibarbo, ... dos drac.
Pulverícense. (sa.)

R. Sen, ... dos escrp.
Cremor de tártaro,
veinte y cinco gr.
Gengibre,
Jalapa y
Enebro, a. . . . . quince gr.
Azucar, ... media onz.
Pulverícense. (w.)

TÉ DE SALUD.

Polvos de larga vida. (bo. ca.)

R. Hojas de sen y
Raspaduras de leño de abedul,
a. . . . . una lib.
Simiente de anís y
——— de verdolaga,
a. . . . . dos lib.
Leño de sándalo blanco y
——— rojo,
a. . . . . med. lib.
Pulverícense.

Dósis; una cuchta. para seis tazas de agua hirviendo, que se edulcoran con azucar, y se toma por la mañana en ayunas. — Es laxante suave.

SAQUILLO PURGANTE.

Nodulus purgans. (sa.)

R. Yerba de trebol acuático y
——— de fumaria, a. . un puñ.
Raiz de pimpinela blanca,
—— de genciana y
Cascarilla, a. . . . . med. onz.
Corteza de naranja de Curazao,
seis drac.
Simiente de zanahorias y
——— de eneldo, a. dos drac.
Ruibarbo, ... med. onz.
Hojas de sen, ... seis drac.
Sal catártica amarga, . dos onz.

BOLO PURGANTE. (*sp.*)

R. Polvos laxantes,
veinte y cuatro gr.

Miel, ... c. s.
Hágase un bolo.

PILDORAS TONICAS Y PURGANTES.
(*pie.*)

R. Hojas de sen y
Raiz de las dos escrofularias,
a. . . . . una onz.
Hermodátiles,
Raiz de angélica y
Turbit vegetal, a. . . dos drac.
Escamonea, . . . cuatro escrp.
Jarabe de rosas blancas, . . c. s.
para hacer masa de píldoras, de las que se da hasta dos drac., añadiendo si es necesario veinte gr. de mercurio dulce.

PASAS PURGANTES.

Passulæ laxativæ, Confectio passulata.
(d. pa. sa. w. *sp. vm.*)

R. Hojas de sen, . . . cuatro onz.
Agua comun, ... cuatro lib.
Azucar blanca y
Pasas de Corinto, a. . una lib.
Aceite esencial de cidra,
veinte got.

Hágase digerir el sen en el agua hirviendo y cuézanse las pasas en el líquido colado; cuélese la pulpa por un cedazo de seda; redúzcase á un fuego suave á la consistencia de electuario, con azucar cocida á la pluma, y cuando esté frio añádasele el aceite triturado con un poco de azucar. (sa.)

Añadiendo una drac. de jalapa en polvo á med. onz. de este electuario, se obtiene la *Confectio passulata cathartica.* (sa.)

R. Canela, ... tres drac.
Hojas de sen, ... dos onz.
Pasas de Corinto y
Azucar, a. . . . . una lib.

Hágase macerar el sen en cuatro onz. de agua; despues del tiempo suficiente añádanse ocho onz. de líquido, y despues de haber remojado bien las pasas con el azucar hágase un jarabe espeso; añádanse estas al jarabe todavía caliente y menéese hasta que se enfrie.

sw. sp. prescriben cuatro onz. de sen, diez onz. de agua, dos drac. de canela, drac. y med. de gengibre blanco, doce onz. de azucar y otro tanto de pasas de Corinto; — y pa. ocho onz. de sen, med. onz. de hinojo, dos drac. de canela, c. s. de agua para obtener lib. y med. de líquido colado, lib. y med. de azucar pluma y otro tanto de pasas de Corinto mondadas.

R. Hojas de sen, . . . cuatro onz.
Agua comun, ... diez onz.

Hágase hervir, añadiéndole á lo último

Canela, ... tres drac.

Cuélese por espresion y hiérvase el líquido con

Azucar blanca, ... una lib.

Cuélese el jarabe y añádasele

Pasas de Corinto, . . . una lib.

Consérvese. (d.)

Se prepara del mismo modo la *Confectio de prunis*, s. *diaprunum* (sa. w. *sp.*) sustituyendo á las pasas de Corinto las ciruelas de Damasco, cocidas en agua hasta que se ablanden bien.

ELECTUARIO LENITIVO.

Electuario de sen ó de sen y de pulpa de frutos compuesto, Mermelada de

tamarindos; *Electuarium sennæ*, s. *e senna*, s. *sennæ cum pulpis*, s. *sennæ compósitum*, *Electuarium aperiens*, s. *Catholicum commune*, s. *diaprunum*, s. *eccoproticum*, s. *lenitivum*, *Confectio sennæ*. (a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fi. fu. g. han. li. lo. o. p. pa. po. pp. pr. s. sa. su. w. ww. *c. sp. vm.*)

1.º *Sin cremor de tártaro.*

R. Raiz de polipodio de encina, cuatro onz.
Hojas de sen mondadas, dos onz.
——— de mercurial, . tres puñ.
Agua comun, ... ocho onz.

Déjese en maceracion el sen por seis horas en dos lib. de agua hirviendo y cuélese; infúndase el polipodio en lo restante del agua y redúzcase á la mitad por la ebulicion; añádanse entonces las hojas de la mercurial despues de una corta ebulicion; esprímase y cuélese, y hágase cocer en el líquido

Ciruelas sin hueso, . . seis onz.

Cuélese la pulpa por un cedazo de seda; entonces

R. De esta pulpa,
Pulpa de tamarindos,
——— de cañafístola y
Conserva de violetas, a. seis onz.
Azucar blanca licuada en la tintura de sen, y cocida hasta jarabe espeso, ... dos lib.

Cuézanse las pulpas y el jarabe á un fuego muy suave, meneándolo sin cesar para quitar la humedad superflua; añádase la conserva, y despues á cada lib. del electuario frio

Polvos de sen, . . onza y med.

Méz. ex. (sa.)

R. Raiz de polipodio de encina, dos onz.
——— de regaliz, ... med. onz.
Yerba de culantrillo de Montpeller y
——— de mercurial, a. una onz.
Flores de violeta, . . med. onz.
Cebada mondada y
Pasas de Corinto, a. . dos onz.
Azofaifas y
Sebestos, a. . . . . una onz.
Agua de fuente, dos lib. y med.

Redúzcase á una lib. de líquido por la ebulicion y disuélvase en el líquido colado

Pulpa de casia,
——— de ciruelas,
——— de tamarindos y
Azucar blanca, a. . . seis onz.

Cuézase hasta la consistencia de electuario y añádase todavía

Polvos de hojas de sen, tres onz. y med.
Conserva de violetas, . seis onz.

Méz. ex. (br. *sp.*)

R. Pasas sin granos, . . . dos onz.
Culantrillo negro,
Flores de violetas y
Cebada mondada, a. . . un puñ.
Azofaifas y
Sebestos, a. . . . . n.º 20.
Regaliz, ... med. onz.
Ciruelas sin hueso y
Tamarindos, a. . . . seis drac.
Hojas de sen y
Polipodio de encina, a. dos onz.
Mercurial, ... puñ. y med.
Agua, ... c. s.

Cuézanse juntos y redúzcase el líquido á la tercera parte; cuélese y disuélvase en el líquido

Azucar blanca, ... seis onz.
Cuézase hasta la consistencia conveniente y añádase
Pulpa de casia,
—— de ciruelas,
—— de tamarindos y
Conserva de violetas, a. seis onz.
Polvos de hojas de sen,
tres onz. y med.
Méz. ex. (pa.)

R. Cebada entera,
Raiz de polipodio,
Pasas de Corinto y
Tamarindos, a. . . . . dos onz.
Ciruelas de Damasco,
Azofaifas y
Hojas frescas de escolopendra,
a. . . . . onza y med.
Regaliz raspado y quebrantado,
una onz.
Hojas de mercurial, cuatro onz.

Hágase hervir la cebada hasta que se rebiente, despues el polipodio quebrantado y en fin las otras sustancias en c. s. de agua; háganse igualmente hervir aparte
Hojas de sen, ... dos onz.
Mézclense los dos líquidos y háganse hervir hasta que no queden mas que cinco lib. de líquido. Añádase entonces
Azucar blanca, . dos lib. y med.
Dilúyase en el jarabe cocido hasta la consistencia conveniente
Estracto de cañafístola y
Pulpa de tamarindos,
a. . . . . nueve onz.
Despues de hecha la mezcla añádanse
Polvos de hojas de sen,
cinco onz.
Polvos de hinojo machacado y
—— de anís quebrantado,
a. . . . . dos drac.
Méz. con una espátula de madera. (f.)

R. Regaliz, ... una onz.
Raiz de polipodio y
Sen mondado, a. . . . dos onz.
Zumo depurado de mercurial,
ocho onz.
Infúndase; cuélese esprimiendo ligeramente y dilúyase en el líquido
Pasas de Corinto machacadas,
cuatro onz.
Disuélvase en seguida en la masa
Azucar morena, . cuarenta onz.

Cuélese el jarabe muy caliente por una bayeta; concéntrese hasta la consistencia de arrope y añádase
Pulpa de ciruelas, . cuatro onz.
—— de cañafístola y
—— de tamarindos, a. siete onz.
Evapórese hasta la consistencia de electuario y añádase á lo último cuando se haya disminuido el calor
Simiente de anís y
——— de hinojo, a. . dos drac.
Pulverícense y tritúrense con un poco de una de las pulpas. (*em.*)

R. Raiz de polipodio quebrantada,
seis onz.
Agua, ... diez lib.
Hágase hervir y añádase á lo último
Hojas de malva, ... una onz.
Disuélvase en el líquido colado
Miel, ... nueve lib.
Hágase un jarabe espeso y añádase
Pulpa de ciruelas, . lib. y med.
Polvos de sen, ... una lib.

Polvos de anis, ... dos onz.
Méz. (e.)

R. Higos, ... seis onz.
Raiz de regaliz, ... dos onz.
Agua, ... cuatro lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion, cuélese por espresion y añádase al líquido

Azúcar blanca, . diez y seis onz.

Dilúyase en el jarabe

Pulpa de tamarindos y
—— de ciruelas, a. . cinco onz.
Polvos de hojas de sen,
cuatro onz. y med.
—— de anís, ... med. onz.
Méz. ex. (han. o. po. pr.)

R. Hojas de sen, ... ocho onz.
Cilantro, ... cuatro onz.
Regaliz, ... tres onz.
Higos secos, ... una lib.
Pulpa de tamarindos,
—— de cañafístola y
—— de ciruelas, a. . med. lib.
Azúcar blanca, . dos lib. y med.

Tritúrese el sen con el cilantro y pásense por tamiz diez onzas de polvos; cuézase lo demas con los higos y el regaliz en cuatro lib. de agua, hasta reducirlas á dos; cuélese por espresion, evapórese una cuarta parte del líquido, añádase el azúcar y dilúyanse en el jarabe las pulpas y despues los polvos. (am. b. be. ed. g. lo.)

R. Pulpa de ciruelas, . . . una lib.
——— de tamarindos, . dos onz.
Jarabe comun, . . tres cuartillos.

Cuézase hasta la consistencia de miel y añádase

Polvos de hojas de sen, cuatro onz.

y despues de frio

Aceite esencial de alcaravea, dos drac.
Méz. ex. (du.)

R. Pulpa de ciruelas y
——— de tamarindos, a. una onz.
Polvos de hojas de sen, dos drac.
——— de hinojo, . . . med. onz.
Méz. triturando (li.).

R. Pulpa de ciruelas, . . . una lib.
——— de cañafístola y
—— de tamarindos,
a. . . . . dos onz. y med.
Polvos de hojas de sen,
cuatro onz.
——— de cilantro, . . med. onz.
Jarabe comun, ... una lib.
Méz. (ams.)

R. Pulpa de tamarindos, . una lib.
Polvos de hojas de sen,
cuatro onz.
——— de cilantro, . . med. onz.
Méz. ex. (f.** fi. su.)

R. Pulpa de ciruelas, . . . dos lib.
Polvos de hojas de sen, ocho onz.
——— de cilantro, . cuatro onz.
Jarabe de rosas solutivo, . . c. s.
Méz. (p. w.)

R. Arrope de sauco, . . . una onz.
Polvos de hojas de sen, dos drac.
—— de anís, ... med. drac.
Méz. (fu.)

2.º Con cremor de tártaro.

R. Pulpa de tamarindos, . ocho pt.
Jarabe de ruibarbo, . . . seis pt.

Dilúyanse juntos y añádase

Polvos de hojas de sen,
——— de cremor de tártaro,
a. . . . . una pt.
Méz. (s.)

R. Pulpa de ciruelas, . onz. y med.
Hojas de sen en polvo y
Cremor de tártaro, a. drac. y med.

Jarabe comun, ... c. s.
Méz. (b.*)

ba. prescribe ocho partes de pulpa de tamarindos, una de sen, una de cremor de tártaro y cuatro de jarabe comun;—y d. doce de pulpa de tamarindos, seis de sen, tres de cremor de tártaro y veinte y cuatro de jarabe de maná.

R. Pulpa de ciruelas,
veinte y cuatro pt.
Hojas de sen en polvo, . tres pt.
Cremor de tártaro, . . . una pt.
Miel pura, ... doce pt.
Méz. (pp. ww.)

sp. prescribe diez y ocho partes de pulpa de tamarindos, otro tanto de pulpa de ciruelas, doce de arrope de sauco, seis de sen, cuatro de cremor de tártaro y c. s. de miel.

Todas estas preparaciones son mas ó menos purgantes. Se usan con mas frecuencia en lavativas que de otro modo, y en todos los casos la dósis varía en razon de la cantidad de sen que contienen. Se pueden agregar estas últimas fórmulas á las de los dos electuarios siguientes, que no se diferencian del lenitivo mas que en el nombre, porque la presencia del maná no debe considerarse como una diferencia real.

ELECTUARIO DIATARTAREO.
(b.*)

R. Sen mondado y
Tártaro blanco pasado por tamiz,
a. . . . . onz. y med.
Maná escogido y
Azucar blanca, ... una onz.
Gengibre,
Anis,
Canela y
Galanga, a. . . . . una drac.
Jarabe de rosas solutivo,
cinco onz.

Dósis; una onz. antes de comer, tomando en seguida cuatro onz. de caldo.

Puede prepararse tambien de la manera siguiente:

R. Sen escogido, ... seis onz.
Gengibre y
Galanga, a. . . . . tres drac.
Infusion de rosas blancas,
tres lib.

Déjense en infusion al B. M. tibio por veinte y cuatro horas en vasija tapada, hiérvase despues, cuélese, clarifíquese y añádase al líquido

Azucar blanca, ... ocho onz.
Cremor de tártaro, . . med. onz.
Aceite esencial de anis,
med. escrp.

Méz.—Dósis; de med. á dos onz.

MERMELADA DE TAMARINDOS.

Conditum tamarindinaceum. (*sw.**)

R. Hojas de sen, ... tres drac.
Cremor de tártaro, drac. y med.
Maná y
Pulpa de tamarindos,
a. . . . . onz. y med.
Jarabe comun, ... c. s.

Aconsejada en las hemorroides y hematemesis. — Dósis; tres cuchtas. dos, tres ó cuatro veces al dia.

Pueden añadirse dos drac. de azufre, y entonces la mermelada no se diferencia del electuario siguiente.

ELECTUARIO ANTIHEMORROIDAL.

(*vm.*)

R. Hojas de sen,
Flores de azufre y
Cremor de tártaro, a. . una pt.
Maná, ... seis pt.
Pulpa de tamarindos, . ocho pt.
Jarabe de sen, ... c. s.

Tritúrese el maná, primero con un poco de jarabe y despues con una parte de la pulpa; añádanse los polvos mezclados por trituracion, y despues lo restante de la pulpa con c. s. de jarabe.

Se parece esta preparacion al *Electuario lenitivo sulfurado, Electuarium lenitivum cum sulphure* (*sp.*), obtenido añadiendo una onz. de flores de azufre á la fórmula que *sp.* trae del electuario lenitivo, y que ha sido preconizado contra la sarna á la dósis de med. onz. repetida muchas veces al dia.

ELECTUARIO MUNDIFICANTE.

Electuarium mundificans. (li.)

R. Polvos de raiz de romaza,
tres onz.
———— de ruibarbo,
med. onz.
——— de sasafras, . . dos onz.
——— de hojas de sen,
seis drac.
——— de resina de guayaco y
Flores de azufre lavadas,
a. . . . . una onz.
Miel despumada, ... tres lib.
Dósis; de med. á una onz.

ELECTUARIO DE SEN Y DE CARBON.

Electuarium è senna cum carbone. (*au.*)

R. Electuario de sen, . cuatro onz.
Sub-carbonato de sosa y
Carbon, a. . . . . dos drac.
Dósis; de med. á dos onz. dos ó tres veces al dia.

ELECTUARIO PURGANTE. (*b.*)

R. Confeccion de sen y
———— de cañafístola,
a . . . . . dos onz.
Cremor de tártaro, . . tres drac.
Jarabe de rosas, ... c. s.
Dósis; el volúmen de una nuez moscada de hora en hora en el estreñimiento de las mugeres embarazadas.

R. Pulpa de tamarindos, . una onz.
Hojas de sen, ... una drac.
Cremor de tártaro, . . una onz.
Miel despumada, ... c. s.
Para tomar en dos veces.

ELECTUARIO CATOLICO.

Catolicon doble, Electuario de ruibarbo compuesto; Electuarium catholicum, s. *catholicum duplicatum*, s. *de rhabarbaro*, s. *diacatholicon.* (f. pa. r. w. wu. *br. ca. pid. sp. vm.*)

R Raiz de polipodio, . . . seis onz.
Agua de fuente,
cuarenta y ocho pt.
Cuézase hasta que disminuya el líquido una cuarta parte y disuélvase en el líquido colado
Pulpa de cañafístola y
——— de tamarindos,
a. . . . . cuatro onz.
Azucar, ... cuatro lib.

Cuézase á un fuego manso hasta la consistencia de miel y añádase entonces poco á poco

Polvos de raiz de polipodio y
———— de ruibarbo,
a. . . . . dos. onz.
———— de regaliz, dos drac.
——— de hojas de sen,
cuatro onz.
——— de flores de violeta y
——— de simiente de anis,
a. . . . . dos onz.

Méz. (w.)

R. Raiz de polipodio, . . ocho onz.
Agua de fuente,
noventa y seis onz.

Redúzcase á la mitad por la coccion y emulsiónese el líquido colado con

Las cuatro simientes frias mayores,
a. . . . . una onz.
Simiente de violetas, . . dos onz.

Cuélese y disuélvase en el líquido

Azucar blanca, ... cuatro lib.

Añádase poco á poco al jarabe hecho por decoccion

Pulpa de cañafístola,
——— de tamarindos,
Polvos de ruibarbo y
——— de hojas de sen, a.
cuatro onz.
——— de anís, ... dos onz.
——— de regaliz, . . . una onz.

Méz. *(sp.)*

pa. prescribe se cueza med. lib. de polipodio en ocho de agua, que se reduzcan á la mitad, que se disuelvan cuatro lib. de azúcar en el líquido colado, que se diluyan en el jarabe cocido cuatro onz. de pulpa de cañafístola y otro tanto de la de tamarindos, y en fin que se añada á la masa una mezcla pulverizada de cuatro onz. de sen, dos de ruibarbo, dos de violetas, dos de anís, dos de polipodio y media de cada una de las cuatro simientes frias mayores.

R. Raiz de polipodio quebrantada,
med. lib.
——— de achicorias, . . dos onz.
——— de regaliz, . . . nna onz.
Hojas de agrimonia y
——— de escolopendra, a. tres onz.
Agua, ... seis lib.

Redúzcase á una tercera parte á fuego moderado, y añádase

Simiente de hinojo, . . seis drac.

Cuélese por espresion y hágase hervir el líquido con

Azúcar blanca, . . . cuatro lib.

hasta la consistencia de jarabe espeso. Retírese del fuego y añádase

Pulpa de cañafístola,
——— de tamarindos,
Polvos de ruibarbo y
——— de sen, a. . . cuatro onz.
——— de simiente de violetas,
dos onz.
——— de regaliz raspado y
——— de las cuatro simientes frias,
a. . . . . una onz.
——— de simiente de hinojo,
med. onz.

Méz. ex. (f. *ca.*)

R. Raiz de polipodio, . . . seis onz.
Yerba de malvas,
——— de mercurial,
——— de parietaria y
——— de violeta, a. . . dos puñ.
Agua de fuente,
ciento cuarenta y cuatro onz.

Consúmase la tercera parte por la coccion y disuélvase en el líquido colado

Miel, ... noventa y seis onz.

Cuézase hasta la consistencia de jarabe, y añádase á este

Pulpa de ciruelas , . . . dos lib.
Polvos de polipodio y
——— de ruibarbo, a. cuatro onz.
——— de regaliz , . . med. onz.
——— de sen , ... ocho onz.
——— de flores de violetas, cuatro onz.
——— de hinojo y
——— de las cuatro simientes frias mayores , a. . . . . una onz.
——— de anís, . . . cuatro onz.
Méz. ex. *(sp.)*

R. Polvos de ruibarbo y
——— de sen , a. . . dos drac.
——— de hinojo, . . tres drac.
——— de regaliz, . . med. onz.
Tritúrense con un poco de jarabe y añádase
Pulpa de cañafístola y
——— de tamarindos , a. dos onz.
Jarabe de polipodio , ... c. s.
Méz. *(vm.)*

br. prescribe se incorpore una mezcla pulverizada de una onza de ruibarbo , otra de jalapa , otra de anís , otra de hinojo y dos de sen , en dos onzas de pulpa de cañafístola , otro tanto de la de tamarindos y treinta y seis onz. de jarabe de polipodio.

R. Hojas de sen , ... una onz.
Ruibarbo , ... med. onz.
Simiente de anís , . . dos drac.
Pulpa de tamarindos y
Arrope de sauco , a. . cuatro onz.
Méz. (r.)

R. Polvos de sen, ... dos onz.
——— de ruibarbo y
——— de cremor tártaro , a. med. onz.
Polvos de anís , ... tres drac.
Pulpa de tamarindos , onz. y med.
Miel despumada , ... una lib.
Méz. ex. (wu.)

La fórmula de *pid.* es la misma, con la sola diferencia de que no contiene cremor de tártaro ; — w. y *pid.* dan á esta preparacion el nombre de *Electuario lenitivo* , que no se diferencia del verdadero electuario lenitivo mas que porque contiene ruibarbo. Es purgante como aquel á la dósis de med. á una onz. Se prescribe tambien en lavativas.

§. II. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL SEN, SIN EL VEHICULO EMPLEADO PARA ESTRAERLE.

ESTRACTO ACUOSO DE SEN.

Extractum sennæ. (c. f. sa. w. *vm.*)

R. Hojas de sen mondadas, med. lib.
Agua de fuente , . . . tres lib.
Déjense en digestion por veinte y cuatro horas en un sitio caliente, cuélese por espresion y evapórese á un fuego muy suave. (sa. w.)

f. prescribe dos maceraciones sucesivas, en frio, de una lib. de sen en cuatro de agua, y la evaporacion al B. M. de los dos líquidos reunidos; — y e. la maceracion por tres dias, y despues una ligera ebulicion de una lib. de sen en diez y med. de agua y la evaporacion lenta del infuso-cocimiento, depurado por el reposo.

R. Hojas de sen mondadas y partidas , ... c. s. q.

Sumérjanse en agua fria y déjense en maceracion por doce horas; añádase en seguida de agua caliente, el doble de la fria; cuélese despues de frio sin esprimir; échese sobre el residuo la mitad de la misma cantidad de agua caliente, déjese enfriar y cuélese; clarifíquese con clara de huevo, y evapórese sin hacerle hervir, hasta la consistencia de estracto. *(vm.)*

SAL ESENCIAL DE SEN. (f.)

R. Hojas de sen, ... dos lib.
Agua fria, ... doce lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas meneándolo de cuando en cuando y cuélese; hágase macerar tambien el residuo en ocho lib. de agua y cuélese; mézclense los dos líquidos y evapórense al B. M. hasta la consistencia de jarabe; échense dos líneas de este último en platos, y evapórense al B. M. ó al fuego hasta la sequedad y recójanse las escamas ó costras que se forman.

ESTRACTO ALCOHÓLICO DE SEN. (WU.)

R. Hojas de sen y
Alcohol, a. . . . . una lib.
Agua comun, ... ocho lib.

Déjense en digestion por tres dias á una temperatura suave, cuélese por espresion, déjese reposar y decántese el líquido; estráigase el alcohol por la destilacion, y evapórese el residuo hasta la consistencia conveniente.

ESTRACTO SOLUTIVO.

Extractum solutivum. (br.)

R. Hojas de sen y
Ruibarbo, a. . . . . tres onz.
Canela y
Anís, a. . . . . una drac.
Tártaro tartarizado, drac. y med.
Agua de fuente, ... una lib.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas al B. M. á un calor suave, cuélese esprimiendo ligeramente y evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto.

§. III. PREPARACIONES QUE CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DEL SEN, CON EL VEHICULO EMPLEADO PARA SU ESTRACCION.

A. *Estraido por la cerbeza.*

CERBEZA PURGANTE. (*ca. vm.*)

R. Cerbeza, ... diez azumb.
Sen, ... dos onz.
Sumidades de centaura menor y
——— de agenjos, a.
onz. y med.
Aloes sucotrino, ... dos drac.

Déjense en digestion lo suficiente. *(ca.)*

R. Cerbeza,
veinte y dos azumb. y med.
Polipodio de encina, . . una lib.
Rapóntico,
Sen mondado y
Pasas, a. . . . . med. lib.
Hojas de coclearia y
——— de salvia, a. . . . seis onz.
Ruibarbo y
Rábanos silvestres, a. . tres onz.
Naranjas partidas, ... n.º 4.

Infúndanse y cuélese. *(ca.)*

R. Ruibarbo, ... tres pt.
Cilantro, ... una pt.

Rapóntico y
Sen, a. . . . . cuatro pt.
Polipodio, ... ocho pt.
Cerbeza fuerte,
doscientas cincuenta y seis pt.

Déjense en maceracion por muchos dias y cuélese sin esprimir. (*vm.*)

CERBEZA ANTIICTERICA. (*vm.*)

R. Curcuma y
Ruibarbo, a. . . . . med. onz.
Corteza de naranja y
Hojas de sen, a. . . . seis drac.
Simiente de zanahorias,
una onz.
Hojas de agenjos,
—— de marrubio y
Flores de centaura menor,
a. . . . . med. puñ.
Cerbeza fuerte,
setenta y cuatro onz.

Déjense en maceracion por algunos dias en siete octavas partes de la cerbeza y cuélese por una manga; lávese el resíduo con el resto de la cerbeza; cuélese tambien y reúnanse los dos líquidos.

B. *Estraido por el vino.*

VINO DE SEN.

Vinum, s. *Elixir sennæ.* (su.)

R. Hojas de sen, ... cuatro onz.
Cilantro é
Hinojo, a. . . . . dos drac.
Vino de España, dos lib. y med.

Déjense en digestion por tres dias y añádase

Pasas sin granos, . . . tres onz.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas y cuélese por espresion.

VINO PURGANTE Y TONICO. (*pie.*)

R. Hojas de sen mondadas, una onz.
Ruibarbo, ... seis drac.
Clavos de especia y
Azafran, a. . . . . una drac.
Vino de España, . una azumb.

Déjense en infusion fria por cinco ó seis dias, meneándolo con frecuencia, y déjese sobre el poso.

Aconsejado en las enfermedades atribuidas á la debilidad del estómago. — Dósis; de dos á cuatro cuch. por la mañana en ayunas.

VINO ANTIICTÉRICO. (*sw.* vm.*)

R. Hojas de sen y
Corteza de naranja, a. . tres pt.
Ruibarbo y
Curcuma, a. . . . . dos pt.
Sumidades de centaura menor,
Hojas de agenjos y
—— de marrubio, a. . una pt.
Vino del Rin,
doscientas cincuenta y seis pt.

Déjense en infusion fria por ocho dias; cuélese esprimiendo ligeramente y fíltrese.

Tónico algo purgante. — Dósis; de dos á cuatro onz. tres veces al dia. — Este vino y el precedente son muy semejantes.

VINO AMARGO Y DIURÉTICO.

Vino aperitivo y purgante; Vino purgante. (bo. ca. pie.)

R. Hojas de sen mondadas, una onz.
Agarico blanco, . . drac. y med.
Cremor de tártaro, . . tres drac.
Raiz de escila,

Raiz de énula y
Yerba de marrubio, a. tres onz.
Raiz de lirio de Florencia,
seis onz.
Gengibre, ... dos escrp.
Vino, ... tres lib.

Infúndase, cuélese y añádase al líquido

Tintura de genciana, . tres drac.

Méz. *(ca.)*

R. Hojas de sen, . . . onza y med.
Agarico blanco, . . . dos drac.
Corteza de sauco y
——— de yezgo, a. . una onz.
Raiz de escila,
—— de énula y
—— de lirio de Florencia,
a. . . . . med. onz.
Yerba de marrubio, . un puñ.
Gengibre, ... una drac.
Vino, ... cuatro lib.

Déjense en maceracion lo suficiente y cuélese. *(pie.)*

R. Hojas de sen,
Agarico blanco,
Raiz de jalapa,
—— de eléboro negro y
—— de lirio de Florencia,
a. . . . . dos drac.
—— de énula y
—— de escila,
a. . . . . dos onzas y med.
Corteza de Winter,
——— de sauco y
——— de yezgo, a. . una onz.
Vino blanco, ... cuatro lib.

Déjense en infusion fria y cuélese. *(ca.)*

bo. prescribe dos onz. de lirio, otro tanto de sen, una onz. de énula, otro tanto de escila, lo mismo de sauco, igual cantidad de yezgo, dos drac. de jalapa, otro tanto de eléboro, lo mismo de agarico, seis lib. de vino blanco, y un cuarto de hora de ebulicion seguida de doce horas de infusion.

Dósis; una ó dos onz. por mañana y tarde.

C. *Estraido por el alcohol.*

TINTURA DE SEN. (*hp.*)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Alcohol, ... una lib.

Déjense en digestion por tres dias y cuelese.

ELIXIR DE SALUD.

Tintura catártica, Tintura de sen compuesta ó aromática; Tinctura sennæ, s. sennæ composita, s. aromatica, Elixir salutis. (am. ams. b.* d. dd. ed. g. han. lo. p. pa. s. su. w. *c. ca. sw. vm.*)

R. Hojas de sen, ... seis pt.
Cardamomo menor, . . una pt.
Aguardiente, cuarenta y ocho pt.

Déjense en infusion fria por ocho dias; cuélese por espresion y fíltrese. *(vm.)*

R. Hojas de sen, ... una lib.
Simiente de alcaravea,
onza y med.
Cardamomo menor, . med. onz.
Alcohol (0,930), cuatro azumb.

Déjense en digestion por cuatro dias y cuélese. (b.* du.)

vm. prescribe onz. y med. de sen, drac. y med. de alcaravea, med. drac. de cardamomo y diez y seis onz. de aguardiente; — y g. tres onz. de sen,

tres drac. de anís, una drac. de cardamomo y dos lib. de aguardiente.

R. Hojas de sen, . . . cuatro onz.
Simiente de alcaravea, tres drac.
Cardomomo menor, . una drac.
Pasas de Corinto sin granos, cuatro onz.
Aguardiente, . . dos lib. y med.
Macérese y fíltrese. (han.)

sw. prescribe lib. y med. de sen, seis drac. de alcaravea, dos drac. de cardamomo, ocho onz. de pasas, y cuatro lib. de alcohol (0,930); — lo. tres onz. de sen, tres drac. de alcaravea, una drac. de cardamomo, cuatro onz. de pasas, y una azumbre de alcohol (0,930); — y su. las mismas proporciones en los ingredientes y treinta y dos onz. de alcohol dilatado en agua.

R. Estracto de regaliz, . med. onz.
Agua hirviendo, . . cinco onz.
Disuélvase y añádase al líquido
Hojas de sen, . . . onz. y med.
Anís, ... dos drac.
Alcohol, ... cinco onz.
Déjese en digestion por dos dias á un calor suave meneándolo con frecuencia y cuélese. (*sw.*)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Resina de jalapa, . . . una onz.
Cilantro, ... med. onz.
Alcohol (0,935), tres lib. y med.
Déjense en digestion por tres dias, fíltrese y añádase al líquido
Azucar blanca, . . . cuatro onz.
Disuélvase. (b.* ed.)

p. prescribe dos onz. de sen, una de jalapa, dos drac. de anís estrellado, tres lib. y med. de aguardiente, ocho dias de maceracion y cuatro onz. de azucar disueltas en el líquido colado; — am. b.* y *c.* tres onz. de sen, una onz. de ruibarbo, med. onz. de cilantro, otro tanto de alcaravea, dos drac. de cardamomo, cinco cuartillos de alcohol (0,930), y cuatro onz. de azucar; — *vm.* cuatro partes de sen, dos de jalapa, una de cilantro, setenta y dos de aguardiente y ocho de azucar; — y d. dos onz. de sen, med. de jalapa, tres lib. de alcohol, nada de cilantro, y cuatro onz. de azucar blanca.

R. Hojas de sen, ... ocho pt.
Ruibarbo, ... cuatro pt.
Cilantro y
Corteza de naranja, a. . . una pt.
Aguardiente, . ciento y doce pt.
Déjense en infusion fria por ocho dias, esprímase y fíltrese. (*vm.*)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Pasas de Corinto, . . . med. lib.
Raiz de énula,
Cilantro y
Anís, a. . . . . una onz.
Aguardiente, ... tres lib.
Déjense en maceracion por ocho dias meneándolo de cuando en cuando y cuélese. (ams.)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Raiz de énula,
—— de regaliz,
—— de ruibarbo,
Simiente de anís,
———— de alcaravea y
———— de cilantro, a. . una onz.
Pasas de Corinto sin granos, cuatro onz.
Sub-carbonato de potasa, dos drac.

Agua hirviendo, ... una lib.
Déjense en digestion y despues de frio añádase
Alcohol, ... dos lib.
Déjese todavía en digestion por ocho dias y cuélese por espresion. (b.* w. *sw.*)

s. prescribe se deje en infusion tres partes de sen, una de raiz de énula, otra de regaliz, otra de ruibarbo, otra de anís, otra de alcaravea, otra de cilantro y un cuarto de parte de sub-carbonato de potasa en doce partes de agua hirviendo; que se añadan despues de fria veinte y cuatro partes de alcohol concentrado, que se dejen en digestion por seis dias á un calor suave, que se cuele por espresion y que se filtre.

R. Hojas de sen, ... cuatro onz.
Raiz de énula y
—— de ruibarbo, a. . . dos onz.
Sub-carbonato de potasa,
drac. y med.
Agua hirviendo, ... tres lib.
Déjense en digestion por tres horas en vasija tapada y despues

R. Leño de guayaco
Anís
Alcaravea y
Cilantro, a. . . . . dos onz.
Aguardiente, ... tres onz.
Déjense en infusion fria por tres dias, cuélese por espresion y mézclese el líquido colado con el precedente. (pa.)

ca. prescribe dos onz. de sen, una de guayaco, seis drac. de énula, otro tanto de anís, lo mismo de alcaravea, igual cantidad de cilantro y de regaliz, cuatro onz. de pasas y tres lib. de aguardiente.

Todas estas preparaciones son mas ó menos purgantes en razon de la cantidad de sen que contienen. — La dósis varía mucho; en general es de dos drac. á una onz.

POCION LAXANTE ACEITOSA.

Haustus oleosus laxans. (vm.)

R. Tintura de sen y
Aceite de almendras dulces,
a. . . . . una onz.
Méz.

TINTURA DE SEN AMARGA.

Tinctura sennæ amara. (sw.)

R. Hojas de sen, ... cuatro pt.
Raiz de genciana y
Corteza de naranja, a. . una pt.
Aguardiente, setenta y cuatro pt.
Déjense en infusion fria por muchos dias, meneándolo con frecuencia, esprímase despues un poco y fíltrese.

GOTAS CORDIALES DE VARNER
(am. b.* *c. pa.*)

R. Hojas de sen, ... dos drac.
Cilantro é
Hinojo, a. . . . . una drac.
Cochinilla,
Azafran y
Regaliz, a. . . . . med. drac.
Pasas de Corinto sin granos,
med. lib.
Aguardiente, . . . una azumb.
Déjense en infusion por seis dias, meneándolo con frecuencia y cuelese; échese med. azumbre de aguardiente sobre el residuo, cuélese despues del tiempo suficiente y mézclense los dos líquidos. *(c.)*

am. omite el ruibarbo;—b.* y *pa.* traen otra fórmula: una onz. de ruibarbo, med. de sen, una drac. de azafran, cuatro de regaliz, una libra de pasas, azumbre y med. de aguardiente y ocho dias de digestion.

Escitante y cordial célebre entre los ingleses.—Dósis; cuatro ó cinco cuch. en una tisana cualquiera, repitiendola cada media hora. Cox trae esta preparacion con el nombre de *Tintura de sen aromática*, que incluye tambien en la farmacopea americana. Su fórmula apenas se diferencia de algunas de las que sirven para preparar el Elixir de salud.

TINTURA DE DAFFY.

Elixir de Daffy; Tinctura, s. *Elixir Daffy.* (b.* *ca. sw.*)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Ruibarbo, ... una onz.
Hinojo
Enebro y
Guayaco, a. . . . . med. onz.
Azúcar blanca, . . . cuatro onz.
Aguardiente, ... dos lib.

Déjense en digestion por ocho dias mencándolo con frecuencia y cuélese. (b.*)

sw. trae la misma fórmula y prescribe solamente cinco onz. de aguardiente. La de *ca.* es del todo diferente, como sigue:

R. Hojas de sen, ... una onz.
Raiz de jalapa
Cilantro y
Cremor de tártaro, a. med. onz.
Azúcar, ... seis onz.
Aguardiente, . . tres cuartillos.

Déjese en digestion y filtrese.

Este es tambien el Elixir de salud con otro nombre.—Dósis; una á tres onz.

ELIXIR POLYCRESTO PURGANTE.

Elixir polychrestum purgativum. (br.)

R. Hojas de sen mondadas, una onz.
Ruibarbo, ... med. onz.
Corteza de cidra y
Sub-carbonato de potasa,
a. . . . . dos drac.
Alcohol, ... diez onz.

Déjese en digestion lo suficiente, cuélese por espresion y añádase al líquido

Resina de jalapa, . . . diez drac.
Espíritu de coclearia, . seis onz.

Otra variedad del Elixir de salud.

ELIXIR DE RAULIN. (*ca.*)

R. Folículos de sen,
Ruibarbo,
Sumidades de agenjo mayor,
———— de camedrios,
Raiz de genciana y
Corteza de naranja amarga,
a. . . . . dos onz.
Cascarilla y
Acibar sucotrino, a. . . una drac.
Aguardiente (15.°), . cuatro lib.

Déjese en infusion fria por ocho á quince dias y filtrese.

Purgante aconsejado en las afecciones escrofulosas. — Dósis; una cuch. antes de comer.

D. *Estraido por el vinagre.*

VINAGRE LAXANTE. (*pie.*)

R. Hojas de sen, ... una onz.

Cremor de tártaro, . . med. onz.
Corteza de cidra,
Anís y
Canela, a. . . . . med. drac.
Vinagre, ... un cuartillo.

Déjese en infusion por cuarenta y ocho horas.

Purgante aconsejado con particularidad en las hemorragias internas del canal intestinal, para evacuar la sangre.

E. *Estraido por el suero.*

SUERO DE WEISS. (*bo. ca. pie. ra.*)

R. Folículos de sen y
Sal de Epsom, a. . . . med. drac.
Sumidades floridas de hipericon,
———— de galio amarillo,
a. . . . . un escrp.
Flores de sauco, ... c. s.

Déjense en infusion por doce horas en un sitio caliente, y cuélese. (*pie.*)

bo. y *ca.* prescriben un escrp. de galio amarillo, otro tanto de flores de sauco, lo mismo de flores de hipericon, otro tanto de flores de tilo, una drac. de sulfato de sosa, otra de folículos de sen, una lib. de suero hirviendo y que se filtre al cabo de media ó una hora de infusion; — y *ra.* un escrp. de sumidades de hipericon, otro tanto de flores de sauco, una drac. de sen, otro tanto de galio amarillo, lo mismo de sal de Epsom, una lib. de suero y doce horas de infusion.

La fórmula auténtica segun Zanetti es la siguiente:

R. Raiz de aristoloquia larga,
—— de helecho macho y
—— de caléndula, a. cuatro onz.
Hojas de betónica,
—— de vincapervinca,
Hojas de verbena,
Flores de serpól,
—— de tilo,
—— de galio,
—— de primavera,
—— de laureola,
—— de hipericon,
Musgo de encina,
Raiz de romaza y
—— de escrofularia, a. dos onz.

Cada una de estas sustancias cogidas en la sazon conveniente, mondadas, secadas con cuidado y quebrantadas, se mezclan exactamente, y se les añade

Polvos de hojas de sen mondadas, seis onz. y med.

La dósis es de dos drac. con una de sulfato de magnesia, que se deja en infusion por la noche hasta la mañana en dos vasos de suero clarificado; se cuela antes de tomarlo, bebiendo los dos vasos con una hora de intervalo, y en el intermedio una infusion de culantrillo.

Esta preparacion ha sido celebrada como un antilacteo eficaz. Debe continuarse su uso por veinte y aun treinta dias, prescribiendose un medicamento ordinario hácia el décimo ó décimoquinto dia, que es necesario reiterar hácia el fin de la curacion.

F. *Estraido por el agua.*

INFUSION DE SEN.

Infusum sennæ, s. *sennæ simplex.* (am. b.* du. ed. fi. lo. p. su. *br. c. ra.*)

R. Hojas de sen mondadas, seis drac.
Agua hirviendo, . . . med. lib.

Déjese en maceracion por una hora y cuélese. (b.* fi. su.)

dd. y *ra.* prescriben una onz. de hojas y doce de agua.

R. Hojas de sen, . . . onz. y med.
Anís estrellado en polvo,
una drac.
Agua hirviendo, diez y seis onz.

Déjense en digestion por una hora en vasija tapada y cuélese despues de frio. (p.)

am. lo. y *c.* prescriben onz. y med. de sen, una drac. de gengibre y med. azumbre de agua;— ed. seis drac. de sen, un escrp. de gengibre y nueve onz. de agua; – y am. añade dos drac. de cremor de tártaro.

R. Hojas de sen, ... tres drac.
Cardamomo menor, . med. drac.
Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener seis onz. de líquido colado. Déjense en digestion por una hora y cuélese despues de frio. (du.)

Laxante, usado en los casos de constipacion rebelde, ó cuando se quiere determinar una irritacion derivativa sobre el canal intestinal.

JARABE DE SEN.

Syrupus sennæ, s. *cassiæ sennæ.* (b. be. du. ed. fe. *lo. c. vm.*)

R. Hojas de sen mondadas, ocho onz.
Agua hirviendo, . . . cuatro lib.

Déjense en maceracion por dos horas, cuélese por espresion y añádase al líquido depurado por el reposo

Azucar blanca, ... tres lib.

Hágase jarabe á fuego lento. (b. be.)

du. prescribe med. onz. de sen, una lib. de agua caliente, doce horas de maceracion, una lib. de azucar y otro tanto de maná.

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Agua hirviendo, . . . lib. y med.

Déjense en maceracion por cuatro horas en vasija tapada, cuélese y añádase

Melote, ... ocho onz.

Cuézase á fuego lento hasta la consistencia de melote. (ed.)

R. Hojas de sen y
Agua fria, a. . . . . una pt.

Déjense en maceracion por tres horas y añádase

Agua hirviendo, ... tres pt.

Despues de frio cuélese esprimiendo un poco y añádase

Azucar blanca, ... cuatro pt.

Evapórese y despúmese. (*vm.*)

R. Hojas de sen, ... med. onz.
Agua hirviendo, . dos cuartillos.

Déjense en maceracion por doce horas y añádase

Maná y
Azucar, a. . . . . una lib.

Hágase jarabe. (*c.*)

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Hinojo machacado, . . una onz.
Agua hirviendo, . dos cuartillos.

Déjense en maceracion por una hora á un calor suave, cuélese y añádase

Maná, ... tres onz.
Azucar, ... una lib.

Cuézase lo conveniente. (lo.)

fe. prescribe cuatro onz. de sen, dos drac. de hinojo, dos lib. de agua hirviendo, seis onz. de maná y dos lib. de azucar.

INFUSION DE SEN CON ZUMO DE LIMON.

Infusum sennæ citratum. (g. su.)

R. Hojas de sen, ... seis drac.

Agua hirviendo, ... med. lib.
Déjense en maceracion por una hora, cuélese y añádase al líquido
Zumo de limon, . . . med. onz.
Méz. (su.)

R. Hojas de sen, ... onz. y med.
Corteza fresca de cidra y
Zumo de limon, a. . . . una onz.
Agua hirviendo, ... una lib.
Déjense en digestion y cuélese despues de frio. (g.)

COCIMIENTO DE CIRUELAS CON SEN.

Decoctum prunorum cum senna. (b.*)

R. Hojas de sen, ... una onz.
Ciruelas, ... med. lib.
Agua, ... dos lib.
Déjense en digestion sobre rescoldo por una noche, y cuélese.
Laxante suave, recomendado por Lieutaud.

JARABE DE MANZANAS COMPUESTO.

Jarabe solutivo; *Syrupus de pomis compositus*, s. *solutivus.* (f. sa.)

R. Zumo de manzanas fermentado, cuatro lib.
Hojas de sen mondadas, cuatro onz. y med.
Déjense en digestion por una noche, cuélese por espresion y añádase
Azucar blanca, ... tres lib.
Clarifíquese y cuézase hasta la consistencia de jarabe. (sa.)

R. Hojas de sen mondadas, med. lib.
Simiente de hinojo, . . una onz.
Clavos de especia, . . una drac.
Zumo depurado de manzanas, cuatro lib.
——————— de borraja y
Zumo depurado de buglosa, a. . . . . tres lib.
Déjense en infusion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues un poco, cuélese y esprímase; hágase hervir segunda vez el residuo en
Agua comun, ... cuatro lib.
Evapórese hasta la mitad, cuélese por espresion, mézclense los dos líquidos y disuélvase
Azucar blanca, ... cuatro lib.
Cuézase hasta la consistencia de jarabe y échese este todavia caliente sobre un saquito que contenga
Simiente de hinojo y
Clavos de especia, a. drac. y med.
Déjense en digestion por seis horas. (f.)

COCIMIENTO ANTIHEMORROIDAL. (*vm.*)

R. Hojas de sen, ... una onz.
Agua, ... dos onz.
Déjense en infusion por una hora y añádase
Agua, ... diez y seis onz.
Caliéntese un poco, cuélese y añádase al líquido
Pasas de Corinto y
Azucar morena, a. . . . dos onz.
Anís, ... una drac.
Déjese enfriar, cuélese y añádase al líquido depurado por el reposo
Ruibarbo y
Cremor de tártaro, a. una drac.

JARABE DE SEN COMPUESTO.

Syrupus sennæ compositus, s. *rhei cum senna.* (am. c. *sw. vm.*)

R. Hojas de sen mondadas, dos onz.
Ruibarbo, ... med. onz.
Cilantro, ... dos drac.

Agua hirviendo, . . catorce onz.
Déjense en infusion en vasija tapada, cuélese despues de frio y añádase al líquido
Maná, ... cuatro onz.
Azucar, ... veinte onz.
Despúmese y cuélese por un cedazo de seda. (*sw.*)

R. Ruibarbo y
Sen, a. . . . . onz. y med.
Cardamomo, ... tres drac.
Agua hirviendo, . dos cuartillos.
Déjense en digestion por veinte y cuatro horas, redúzcase á la mitad por la ebulicion y añádase
Azucar, ... una lib.
Hágase jarabe (am. *c.*)

R. Jarabe de sen, ... cuatro pt.
——— de ruibarbo, . . dos pt.
——— de canela, ... una pt.
Méz. (*vm.*)

INFUSION DE SEN CON TAMARINDOS.

Infusum sennæ et tamarindi, s. *compositum*, s. *tamarindatum.* (am. du. ed. su. *c.*)

R. Hojas de sen, ... una drac.
Tamarindos, ... una onz.
Cilantro, ... una drac.
Azucar, ... med. onz.
Agua hirviendo, . . . ocho onz.
Déjense en maceracion por cuatro horas meneándolo de cuando en cuando. (am. du. ed. *c.*)

R. Hojas de sen, ... seis drac.
Agua, ... med. lib.
Déjense en maceracion por una hora, cuélese y añádase al líquido
Pulpa de tamarindos, med. onz.
Disuélvase. (su.)

AGUA LAXANTE.

Infusion de sen laxante ó purgante, pocion laxante de Viena, Tisana real; Aqua, s. *Potio laxativa*, s. *Viennensis, Infusum laxativum simplex*, s. *Viennense, Infusum sennæ compositum sine aromatibus*, s. *foliorum cassiæ sennæ compositum, Decoctum laxativum Viennense*, *Infusum sennæ tartarisatum*, s. *cum manna*, *Ptisana laxativa*, s. *passulata.* (a. am. an. ba. br. d. dd. f. fe. ff. fu. g. ham. han. li. p. pa. pp. pr. s. sa. *bo. c. ca. e. fp. sa. sp. sw. vm.*)

1.º *Sin ninguna sal.*

R. Hojas de sen, ... una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.
Déjense en infusion por media hora y disuélvase despues en el agua
Maná, ... una pt.

ham. prescribe se hierva dos veces tres partes de sen en treinta y seis de agua, y que se añadan á los dos líquidos colados ocho partes de maná; — y s. que se deje en infusion una parte de sen en ocho de agua y que se añada parte y med. de maná.

R. Hojas de sen, ... tres drac.
Maná, ... dos onz.
Cidras, ... n.º 1.
Agua tibia, ... ocho onz.
Déjense en infusion por doce horas y cuélese. (fe.)

R. Hojas de sen, ... seis drac.
Cardamomo menor, . . dos drac.
Agua hirviendo, . med. azumbre.
Déjense en infusion por med. hora y cuélese. (e.)

R. Hojas de sen , . , . . seis drac.
Maná , ... una onz.
Ruibarbo y
Cardamomo menor , a. dos drac.
Agua hirviendo , . med. azumbre.
Déjese en infusion por una hora. (*c.*)

R. Hojas de sen , . . . onz. y med.
Cilantro , ... dos drac.
Agua comun , . . diez y seis onz.
Déjense en digestion por una hora, aumentando poco á poco el fuego hasta la ebulicion, cuélese y disuélvase en catorce onz. de líquido
Maná , ... cuatro onz.
Cuélese, déjese reposar y decántese con cuidado. (an.)

R. Hojas de sen , ... dos drac.
Pasas de Corinto , . . med. onz.
Corteza de naranja , . dos escrp.
Agua hirviendo , ... seis onz.
Hágasele dar un hervor ; déjese despues en digestion por diez minutos y cuélese esprimiendo suavemente. (fu.)

R. Sen , ... dos onz.
Maná , ... cinco onz.
Agua hirviendo, veinte y ocho onz.
Déjense en digestion por seis horas á un calor suave, cuélese y añádase al líquido
Eter sulfúrico , ... dos drac.
Méz. ex. (li.)

2.° *Con cremor de tártaro.*

R. Hojas de sen , ... dos onz.
Cremor de tártaro , . . med. onz.
Agua hirviendo , ... dos lib.
Déjense en maceracion por seis horas y cuélese esprimiendo ligeramente. (sa.)

R. Hojas de sen , ... seis drac.
Cremor de tártaro , . . una drac.
Agua hirviendo , ... seis onz.
Déjense en infusion por un cuarto de hora , cuélese por espresion y disuélvase en el líquido
Maná escogido , ... una onz.
Déjese reposar y decántese. (a.)

R. Hojas de sen , ... tres drac.
Cremor de tártaro , . . una drac.
Anís estrellado , . . . med. drac.
Agua hirviendo , . . . seis onz.
Déjense en digestion por una hora, cuélese y añádase al líquido
Maná , ... dos onz.
Disuélvase á un fuego suave, déjese reposar y decántese. (p.)

fe. prescribe tres drac. de sen, una de cremor de tártaro , un escrp. de anís estrellado, seis onz. de agua y una onz. de maná; — y am. y *c.* onz. y med. de sen, dos drac. de cremor tártaro , una drac. de gengibre y dos cuartillos de agua hirviendo.

R. Hojas de sen , ... tres drac.
Cremor de tártaro , . . una drac.
Pasas de Corinto , . . . tres drac.
Gengibre blanco , . . . un escrp.
Agua hirviendo , . . . cuatro onz.
Déjense en digestion por veinte y cuatro horas, cuélese por espresion y disuélvase en el líquido
Maná , ... una onz.
Clarifíquese con clara de huevo. (w.)

R. Hojas de sen , ... tres onz.
Pasas de Corinto , . . onz. y med.
Cilantro , ... dos drac.
Cremor de tártaro , . . med. onz.
Agua hirviendo , dos lib. y med.
Déjense en maceracion por una hora; cuélese y añádase al líquido
Maná escogido , . . . ocho onz.

Cuélese la solucion. (han.)

pa. w. *ca. sp.* y *vm.* traen la misma fórmula; pero añaden tres drac. de raiz de polipodio, cuya adicion forma la verdadera fórmula de la tisana laxante de Viena, tan celebrada en otro tiempo.

3.º *Con tartrato de potasa.*

R. Hojas de sen, . . . onza y med.
Gengibre y
Corteza de cidra, a. . una drac.
Agua comun, ... doce onz.
Alcohol flojo, . . . cuatro onz.

Déjense en maceracion por ocho dias meneándolo de cuando en cuando; cuélese y añádase á cada dósis de tres onz. una de maná ó drac. y med. de tartrato de potasa, ó una drac. de electuario de escamonea. *(sa.)*

R. Hojas de sen, tres á cuatro onz.
Cardamomo menor, . una drac.
Tartrato de potasa, . seis drac.
Agua hirviendo, . . . seis onz.

Déjense en digestion por dos horas y añádase al líquido

Jarabe comun, . . . una onz.

Méz. ex. *(sw.)*

R. Hojas de sen, . . . onza y med.
Pasas de Corinto, . . seis drac,
Cilantro, ... dos drac.
Tartrato de potasa, . cinco drac.
Agua hirviendo, . . . dos lib.

Déjense en digestion por algunas horas; hiérvase ligeramente; cuélese por espresion y á catorce onz. de líquido colado añádase

Maná, ... cinco onz.

Cuélese. (d. su.)

br. prescribe onz. y med. de sen, otro tanto de pasas, med. onz. de cilantro, otro tanto de tártaro soluble, y cuatro onz. de maná.

R. Hojas de sen, ... seis drac.
Corteza fresca de cidra y
Tartrato de potasa, a. tres drac.
Zumo de cidra, . . . med. onz.
Agua hirviendo, . . . ocho onz.

Cuélese despues de frio y añádase al líquido

Maná escogido, . . . diez drac.

Cuélese otra vez la solucion y añádase

Eter sulfúrico, . . . ocho got.

Méz. ex. (wu.)

4.º *Con tartrato de sosa.*

R. Hojas de sen, ... med. onz.
Agua hirviendo, . . cuatro onz.

Cuélese por espresion al cabo de una hora y disuélvase en el líquido

Tartrato de sosa, . . dos drac.
Maná, ... seis drac.

Cuélese. (pr.)

5.º *Con sulfato de sosa.*

R. Hojas de sen, ... dos drac.
Agua hirviendo, . . cuatro onz.

Cuélese por espresion al cabo de una hora y disuélvase en el líquido

Sulfato de sosa, . . . seis drac.
Miel, ... med. onz.

Cuélese. (pp. wu.)

R. Hojas de sen y
Sulfato de sosa, a. . cuatro drac.
Anís, ... una drac.
Infusion caliente de achicorias, dos cuartill.

Déjense en infusion por doce horas y cuélese. (*fp.*)

R. Hojas de sen y

Sulfato de sosa, a. , . med. onz.
Anís y
Cilantro, a. . . . . una drac.
Hojas partidas de perifollo y
——————— de pimpinela,
a. . . . . med. onz.
Agua fria, ... dos lib.
Limon partido, ... n.° 1.

Déjese en maceracion por veinte horas meneándolo de cuando en cuando; cuélese esprimiendo ligeramente y fíltrese. (f.)

R. Tamarindos, ... dos onz.
Hojas de sen y
Sulfato de sosa, a. . cuatro drac.
Anís,
Cilantro,
Perifollo y
Pimpinela, a. . . . . un puñ.
Agua hirviendo, . dos cuartillos.

Déjense en infusion por media hora y cuélese. *(bo. ca.)*

R. Hojas de sen, ... quince pt.
——— de achicoria silvestre, diez pt.
Sulfato de sosa, diez ó veinte pt.
Agua hirviendo, ... c. s.

Déjense en infusion por algunas horas; cuélese por espresion y añádase

Agua aromática de cidra,
treinta pt.

Méz. ex. (ff.)

R. Infusion de hojas de sen,
ocho onz.
Sulfato de sosa ó de magnesia,
tres drac.
Miel cruda, ... dos drac.

Lícuense. (dd.)

6.° *Con sulfato de magnesia.*

R. Pasas de Corinto, . . . dos onz.
Hojas de sen, ... med. onz.
Agua, ... c. s.

para obtener una lib. de cocimiento ó de infusion, y añádase al líquido colado

Sal catártica amarga, med. onz.

Disuélvase. (g.)

Todas estas infusiones son laxantes ó purgantes, segun los casos ó el modo de administrarlas. — La dósis varía segun la fórmula observada para su preparacion. Sin embargo, en general es de tres á seis onz. Las fórmulas que siguen podrian colocarse aquí tambien; pero hemos creido deber reunirlas bajo otro título, para no prolongar demasiado este artículo.

POCION PURGANTE.

Potio purgans, s. *laxans.* (f. ff. he. li. wu. *au. bo. hp. pie. ra. sa. sm. sw.*)

1.° *Sin ninguna sal.*

R. Hojas de sen, ... med. onz.
Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener med. lib. de líquido colado. Déjese en infusion por un cuarto de hora y añádase

Tintura de naranja y
Jarabe de cerezas, a. med. onz.

Méz. ex. (he.)

R. Hojas de sen, ... seis drac.
Agua fria, ... c. s.

para rociar las hojas. Añádase al cabo de dos horas

Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener seis onz. de líquido colado por espresion; cuélese frio y añádase

Jarabe comun, ... una onz.

Tintura de corteza de naranja, med. onz.

Méz. *(sw.*)*

R. Infusion de sen, . . . tres onz.
Agua de pimienta de la Jamaica, med. onz.
Jarabe de espino serval, una onz.

Méz. *(sa.)*

R. Maná, ... dos onz. y med.
Folículos de sen, . . . dos drac.
Tamarindos, ... med. onz.
Flores de melocoton, . un puñ.
Agua de fuente, . . . un vaso.

Infúndanse. *(pie.)*

R. Hojas de sen, ... una drac.
Ruibarbo, ... med. drac.
Flores de melocoton, med. puñ.
Cocimiento de polipodio, ocho onz.

Hiérvase ligeramente; cuélese por espresion y añádase al líquido

Maná, ... dos onz.

Cuélese la solucion. *(pie.)*

R. Maná, ... dos onz. y med.
Folículos de sen, . . . dos drac.
Tamarindos, , ... seis drac.
Flores de albérchigo, . un puñ.
Corteza de naranja amarga, med. drac.
Café moka, ... dos drac.
Agua, ... c. s.

Hágase una infusion. *(pie.)*

2.° *Con tartrato de potasa.*

R. Hojas de sen, ... med. onz.
Hinojo, ... una drac.
Agua, ... c. s.

para obtener dos onz. y med. de infusion y añádase al líquido

Maná, ... una onz.
Cremor de tártaro, . una drac.

Disuélvase. *(au.)*

R. Sen mondado,
Ruibarbo y
Cremor de tártaro, a. una drac.
Agua, ... c. s.

Hiérvase hasta que solo queden cuatro onz. de líquido y añádase

Maná, ... onza y med.
Infusion de flores de melocoton, una onz.

Méz. ex. *(pie.)*

R. Corteza de naranja seca y
Hojas de sen, a. . . una drac.
Cremor de tártaro, . . dos drac.
Sal de Seignette, . . . seis drac.
Agua comun. . . . . ocho onz.

Déjense en digestion por una hora á un calor suave y añádase

Pulpa de tamarindos, . dos onz.

Cuélese por espresion. *(sa.)*

R. Sen y
Tartrato de potasa y de sosa, a. . . . . dos drac.
Maná, ... dos onz.
Agua, ... cuatro onz.

Déjense en infusion y añádase al líquido, segun las circunstancias, una drac. de quina, una onz. de jarabe de flores de melocoton, ú ocho granos de jalapa en polvo. *(sa.)*

R. Ruibarbo, ... una drac.
Hojas de sen, ... dos drac.
Sal de Seignette, . . med. onz.
Agua, ... c. s.

para obtener seis onz. de cocimiento, y añádase al líquido colado

Maná, ... dos onz.

Disuélvase. *(au.)*

R. Hojas de sen, ... seis drac.

Corteza fresca de cidra y
Tartrato neutro de potasa,
a. . . . . tres drac.
Zumo de cidra, . . . med. onz.
Ruibarbo, ... dos drac.
Agua hirviendo, . . . ocho onz.
Déjese en infusion; cuélese despues de frio y añádase al líquido
Maná, ... diez drac.
Cuélese la solucion y añádase
Eter sulfúrico, ... ocho got.
Méz. ex. (wu.)

3.° *Con sulfato de magnesia.*

R. Hojas de sen y
Sulfato de magnesia, a. dos drac.
Tamarindos, ... med. onz.
Maná, ... dos onz.
Agua, ... c. s.
para hacer un vaso de infusion. *(bo.)*

R. Hojas de sen, ... dos drac.
Agua hirviendo, ... tres onz.
Déjense en maceracion por una hora, y añádase al líquido colado
Sulfato de magnesia, . tres drac.
Tintura de sen, . . . med. onz.
Méz. ex. *(sw.)*

R. Sen, ... tres drac.
Sulfato de magnesia, . med. onz.
Maná, ... dos onz. y med.
Zumo de limon, . . . una drac.
Agua, ... ocho onz.
Hágase una infusion. *(ra.)*

R. Sen mondado, ... dos drac.
Sal de Epsom, ... tres drac.
Agua, ... un vaso.
Déjense en infusion por media hora sobre rescoldo, y añádase á lo último
Maná, ... dos onz. y med.
Esencia de cidra, ... c. s.
Méz. *(pie.)*

R. Sen mondado, ... dos drac.
Ruibarbo, ... una drac.
Sal de Epsom, ... tres drac.
Flores de melocoton, . . dos puñ.
Maná, ... dos onz.
Agua, ... c. s.
Hágase una infusion. *(pic.)*

4.° *Con sulfato de sosa.*

R. Hojas de sen, ... dos drac.
Sulfato de sosa, . . . med. onz.
Jarabe de espino serval, una onz.
Agua, ... cuatro onz.
Hágase una infusion. (ff. *ra.*)

R. Sen mondado, ... dos drac.
Sulfato de sosa, dos drac. y med.
Maná, ... dos onz.
Infusion de achicorias, seis onz.
Hágase una infusion. *(ra.)*

R. Hojas de sen, ... dos drac.
Agua, ... cuatro onz.
Hágase hervir un poco y añádase al líquido colado
Sulfato de sosa, . . . una onz.
Jarabe de grosellas, . . dos onz.
Méz. (li.)

hp. prescribe dos drac. de sen, cuatro onz. de agua hirviendo, un cuarto de hora de infusion, med. onz. de sulfato de sosa y otro tanto de maná.

R. Sen mondado y
Sulfato de sosa, a. . . . dos drac.
Agua hirviendo, ... un vaso.
Añádase al líquido colado
Maná en lágrimas, . . dos onz.
Jarabe de achicorias compuesto, una onz.
y despues de frio
Esencia de anís, . . . tres got.

Méz. *(sm.)*

R. Hojas de sen, ... dos onz.
Sulfato de sosa, . . . dos drac.
Agua, ... cuatro onz.
Polvos de jalapa, . . . un escrup.
Hágase una infusion y añádanse los polvos al líquido colado. *(ra.)*

R. Sen mondado, ... dos drac.
Sub-carbonato de sosa cristalizado, med. drac.
Agua destilada, ... seis onz.
Déjense en infusion fria por doce horas, cuélese y añádase
Acido sulfúrico,
veinte á veinte y cuatro got.
Añádase despues de la efervescencia
Jarabe de achicorias compuesto, cuatro onz.
Jalapa en polvo, triturada con el doble de azúcar,
de med. á un escrup.
Agua de canela, ... c. s.
Mez. *(pie.)*

R. Hojas de sen y
Sulfato de sosa, a. . . dos drac.
Ruibarbo, ... med. drac.
Maná, ... onz. y med.
Agua, ... c. s.
Hágase una infusion ó un cocimiento. (f.)

La infusion se hace dejando las sustancias indicadas por ocho horas en cinco onz. de agua hirviendo, ó por doce en la misma cantidad de agua fria; el cocimiento, haciendo hervir el ruibarbo y el sen en c. s. de agua para obtener cinco onz. de líquido colado, en las que se disuelve en seguida la sal y el maná. Puede clarificarse el cocimiento haciendole hervir por dos minutos con una clara de huevo batida, añadiendo al líquido dos drac. de zumo de limon cuando principie á entrar en ebulicion, y filtrandole despues de retirado del fuego.

R. Hojas de sen, ... tres drac.
Ruibarbo, ... una drac.
Ipecacuana, ... diez gr.
Agua, ... c. s.
Hágase hervir y añádase
Maná y
Sulfato de sosa, a. . . dos drac.
Cuélese el líquido. *(pie.)*

LAVATIVA LAXANTE.

Lavativa purgante. (ff. *fp. ra.*)

R. Sen, ... dos onz.
Agua, ... una lib.
Hiérvase y cuélese. *(ra.)*

Puede añadirse med. onz de sulfato de sosa y tres ó cuatro onz. de miel comun; — y *fp.* prescribe cuatro drac. de sen, una lib. de agua y dos onz. de miel de mercurial.

R. Sen, ... cuatro drac.
Sulfato de sosa, . . . seis drac.
Agua, ... c. s.
Hágase un cocimiento. (ff.)

Se añade, si se quiere, dos ó tres granos de tártaro estibiado.

POCION PURGANTE Y VERMIFUGA.

(*pie. sm.*)

R. Sen mondado, ... dos drac.
Café tostado en polvo,
dos puñtos.
Leche y
Agua, a. . . . . c. s.
Hiérvase y cuélese. *(pie.)*

R. Sen mondado, dos á cuatro drac.
Coralina, ... una drac.
Cidra partida en pedazos, n.º 1.

Maná, ... dos onz.
Agua hirviendo, . . . un vaso.
Déjense en infusion por doce horas y cuélese. *(sm.)*

R. Sen mondado, . dos á tres drac.
Semen contra, ... un puño.
Sub-carbonato de potasa, una drac.
Agua de fuente, ... una lib.
Déjense en infusion por doce horas sobre cenizas calientes y añádase
Maná, ... dos onz.
Tártaro estibiado, ... dos gr.
Cuélese. *(pie.)*

POCION PURGANTE ALCANFORADA. (dd.)

R. Infusion laxante (fórmula de dd.) dos onz.
Mistura alcanforada ácida, seis onz.
Méz.

JULEPE DIATARTARUM. (b.*)

R. Sen mondado, ... seis onz.
Gengibre y
Galanga, a. . . . . tres drac.
Infusion de rosas blancas, tres lib.
Déjense en infusion al B. M. tibio por veinte y cuatro horas en vasija tapada, hiérvase despues un poco, cuélese, clarifíquese y añádase
Azúcar blanca, ... ocho onz.
Cremor de tártaro, . med. onz.
Aceite de anís, . . . med. escrup.
Dósis; de med. á dos onz.

JARABE VERMIFUGO Y PURGANTE. (*ca.*)

R. Sen mondado, ... med. lib.
Semen contra,
Coralina y
Ruibarbo, a. . . . . cuatro onz.
Corteza de naranja, . . una onz.
Canela, . . . , ... dos onz.
Azúcar, ... veinte y seis lib.
Dósis; de una onz. á onz. y med.

POCION PURGANTE Y FEBRIFUGA. (*bo.*)

R. Quina,
Folículos de sen y
Cremor de tártaro, a. . dos drac.
Maná, ... dos onz. y med.
Flores de manzanilla, . un puño.
Agua, ... un vaso.
Disuélvase en la infusion
Tártaro estibiado, . . un grano.

APOCEMA PURGANTE. (f. *ca.*)

R. Hojas verdes de achicoria,
———— de buglosa y
———— de borraja,
a. . . . . una onz.
Sulfato de sosa, . . . med. onz.
Hojas de sen mondadas, dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjense en infusion por una hora, cuélese y añádase al líquido
Jarabe de sen, ... una onz.
Méz. ex. (f.)

R. Hojas de achicoria,
—— de diente de leon y
—— de parietaria, a. . una onz.
Hojas de sen, ... tres drac.
Sulfato de sosa. . . . med. onz.
Pimpinela,
Perifollo y
Cilantro, a. . . . . un puño.
Agua, ... dos lib.
Hiérvase por un cuarto de hora, cuélese y añádase

Jarabe de achicorias, . . dos onz.
Méz. ex. (*ca.*)

Para tomar á vasos por la mañana hasta que produzca el efecto.

COCIMIENTO PECTORAL SOLUTIVO. (*vm.*)

R. Simiente de anís, . . med. drac.
Raiz de regaliz y
Hojas de hisopo, a. . . una drac.
—— de sen, ... tres drac.
Agua, ... seis onz.

Déjense en infusion caliente, cuélese esprimiendo un poco y añádase

Jarabe de altea, ... una onz.

COCIMIENTO ANTICAQUECTICO. (*sw. sy.*)

R. Raiz y hojas frescas de achicoria silvestre,
———— de acedera,
———— de fresa,
———— de cardo estrellado,
———— de violetas y
Flores de nenufar blanco,
a. . . . . una onz.
Pétalos de rosas rojas, . . dos onz.
Raiz de parietaria, . . med. onz.
Agua, ... doce lib.

Redúzcase á ocho lib. por la ebulicion y añádase al líquido hirviendo

Hojas de sen, ... cuatro onz.
Anís y
Nitro, a. . . . . med. onz.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas y cuélese.

Incisivo y depurante, que se ha recomendado en la disuria, la iscuria, los tumores frios, las enfermedades venéreas pertinaces, las escrófulas y las enfermedades crónicas de la piel. Dósis; ocho onz. en ayunas por cuatro dias; y despues cada dos dias por tres semanas. Si el enfermo es robusto se puede subir la dósis á diez y aun doce onzas.

SEN DE AMERICA.

Casia de Maryland; Cassia Marylandica, L.

American sennæ, I.; Séné d'Amerique, F.

am. *e.*

Planta de los Estados-Unidos (decandria monogynia, L.; leguminosas, J.).

Cada una de las hojas se compone de ocho pares de hojuelas ovales y obtusas. Tienen una accion purgante.

INFUSION DE SEN DE MARYLAND.

Infusum cassiæ Marilandicæ. (b.*)

R. Sen de Maryland, . . una onz.
Agua, . . , . . . un cuartillo.

Déjense en digestion á un calor suave por med. hora. —Esta dósis es para un adulto.

SEN FALSO O ESPANTA LOBOS.

Sen falso; Colutea arborescens, L.

Blasenstrauch, Al; baguenaudier, F.; bladder senna, I.; vesiscaria, I.

f. g. *g.*

Arbolillo de la Europa templada y meridional (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.).

Se usan las hojas que son aladas con impar, y compuestas de nueve á once hojuelas redondas, un poco ensan-

chadas por el vértice, verdes y lampiñas por encima y de verde gay por debajo.

Gozan de una propiedad un poco purgante. Se encuentran algunas veces mezcladas con el sen de Alejandría.

SERVAL.

Sorbus domestica, L.

Spierlingsbaum, Eschresleinbaum, Al.; f. w. be. br.

Arbol de Europa (icosandria monogynia, L.; rosaceas, J.).

Se usan los frutos llamados (*fructus sorbi*) que es una manzana piriforme, que encierra tres simientes cartilaginosas y oblongas. Son de un sabor al principio áspero, que despues se disminuye; aunque siempre conservan algo de astringencia.

SERVAL DE CAZADORES.

Serval de cazadores silvestre; *Sorbus aucuparia*, L.

Vogelbeerbaum, Al; mountain ash, In.; sorbier, F.; sorbo selbatico, I.; serbeira braba, Por.

br. fe. fu. li. su. *be. sp.*

Arbol que crece en toda la Europa (icosandria trigynia, L.; rosaceas, J.).

Se usan los frutos (*baccæ*, s. *poma Sorbi aucupariæ*) que son pequeñas bayas redondas, de un rojo vivo, blandas, umbilicadas por encima y que encierran tres simientes cartilaginosas.

Su sabor es astringente, ácido y desagradable.

El ácido sórbico que suministran, no es mas que ácido málico segun Labillardiere y Braconnot.

Es astringente, diurético, hidragogo y antiescorbútico.

ARROPE DE SERVAL.

Roob sorbi aucupariæ. (fu. li.)

R. Bayas de serval de cazadores, ocho lib.

Echese encima c. s. de agua para cubrirlas un dedo, y póngase la vasija á un fuego manso para que cueza por media hora; cuélese esprimiendo con fuerza, añádase una lib. de azúcar al líquido, y evapórese lentamente hasta la consistencia necesaria.

Refrigerante y diurético. —Dósis; de med. á una onz.

SERPOL.

Tomillo silvestre; *Thimus Serpyllum*, L.

Quendel Feldkummel, Al; mother of Thyme, In; serpolet, F.; sermolino, serpillo, I.; serpao, Por.

Planta comun en toda Europa (didynamia gymnospermia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba florida (*herba et flores Serpylli*) que se compone de un tallo ramoso, un poco velludo, guarnecido de hojas pequeñas casi sentadas, pestañosas por los bordes, ovales ó lanceoladas, que contienen pequeños grupos de flores muy cortas, axiliares, cuya reunion forma espigas muy cortas y con frecuencia una especie de cabeza terminal. Su olor es agradable y su sabor amargo y balsámico.

ACEITE DE SERPOL.

Oleum Serpylli æthereum, *Ætheroleum Serpylli.* (a. ba. br. han. pa. s.)

R. Yerba florida de serpol, una pt.
Agua pura, ... ocho pt.
Destílese. (han. s.)

ba prescribe una parte de serpol y nueve de agua; -- y a. una de serpol y doce de agua.

R. Yerba florida de serpol,
veinte y cinco pt.
Agua, ... setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.
Déjense en maceracion por tres dias y destílese. (br. pa.)

AGUA DE SERPOL.

Aqua Serpylli. (sa.)

R. Yerba florida de serpol, una pt.
Agua, ... cuatro pt.
Destílese la mitad, y repítase la destilacion con el producto y nueva yerba.

ESPIRITU DE SERPOL.

Spiritus Serpylli. (a. br. d. fu. han. he. li. pa. po. pr. s. sa. w. wu. *pid. sw.*)

R. Yerba florida de serpol, una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.
Al cabo de tres dias destílese la mitad. (br. han. he. pa. po. pr. s. w. *pid.*)

li. prescribe una parte de yerba, seis de alcohol, y que se destile la mitad; — d. y fu. una parte de yerba, seis de alcohol, que se destilen dos tercios y que se vuelva á destilar con nueva yerba; — wu. lib. y med. de yerba, seis de alcohol y que se vuelva á destilar el producto con tres onz. de yerba; – y sa. una parte de yerba, cuatro de alcohol, y que se destile segunda vez sobre nueva yerba.

R. Yerba fresca de serpol, una pt.
Alcohol (0910),
cuatro part. y med.
Agua, ... seis pt.
Al cabo de veinte y cuatro horas destílense cuatro partes (0,913). (a.)

vm. prescribe una parte de serpol, cuatro de aguardiente, doce de agua y que se destilen tres partes y media; – y *sw.* doce partes de yerba, seis de alcohol, dos de agua y que se destilen seis partes; que se eche el producto sobre doce partes de yerba fresca con dos de agua, y que se destilen seis partes.

AGUA BENDITA.

Aqua benedicta Serpylli, s. *serpylli composita.* (sa. w. *sp.*)

R. Yerba florida de serpol,
cuatro puñ.
Flores de manzanilla,
Sumidades de agedrea,
———— de tomillo, a. un puñ.
Vino, ... seis lib.
Déjense en maceracion por tres dias, destílese la mitad, y infúndase en el producto
Cálamo aromático,
Casia leñosa,
Canela y
Macías, a. . . . . med. onz.
Destílese hasta la sequedad al cabo de veinte y cuatro horas. (sa.)

R. Yerba florida de serpol, dos lib.
———— de agedrea,

Yerba florida de tomillo y
Flor de manzanilla, a. . . dos onz.
Canela, ... tres onz.
Macías, ... med onz.
Vino blanco, . . diez y ocho lib.

Déjense en digestion por dos dias y destílense suavemente ocho lib. (w)

R. Raiz de cedoaria y
—— de galanga, a. . una drac.
—— de peonía, . onz. y med.
Yerba de serpol, ... seis puñ.
—— de hinojo, . . . cuatro puñ.
—— de verbena,
—— de torongil,
Flores de tilo,
—— de lirio de los valles,
—— de espliego y
—— de romero, . . a. dos puñ.
Cubebas, ... una drac.
Canela, ... med. drac.
Macías y
Nuez moscada, a. . . . dos drac.
Musgo de encina, . . onz. y med.
Vino generoso,
ciento noventa y dos onz.

Destílese. (*sp.*)

Cefálica, cardiaca, estomacal, carminativa y emenagoga. — Dósis; de med. á una onz.

SESAMO.

Sesamo Oriental; Sesamum Orientale, L.

am. e. f. w. *a. c. m. sp.*

Planta anua de la Siria y del Egipto (didynamia angiospermia, L.; bignoneas, J.).

Se usa la simiente llamada *Sesamo*, *Sesamum*, *Sesam*, Al.; *Sesamum*, In.; *Sesame*, F. Es oval, amarilla, oleaginosa y de un sabor dulce y agradable.

SESELI.

Las farmacopeas citan tres plantas de este nombre:

1.º *Seseli de Creta; Tordylium officinale*, L.

br. e. w. *be. m. sp. z.*

Planta perenne del mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Se usa la raiz y la simiente.

La raiz (*radix Tordylii*, s. *Seseli Cretici*, s. *montani*) es larga, delgada, fibrosa y blanca.

La simiente es larga, casi aplastada, áspera al tacto, señalada con tres líneas prominentes y guarnecidas de un reborde blanco.

Su olor es aromático y su sabor análogo, pero débil.

Escitante.

2.º *Seseli de Marsella*, *Seseli tortuosum*, L.

Bilschel blœttriger sesall, Al.; comino de Marsella, Por.

br. e. f. w. *g. m.*

Planta perenne ó bienal del mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Se usa la simiente (*semen seseleos Massiliensis*) que es larga, estriada, verdosa, de olor aromático y de sabor acre y aromático.

3.º *Seseli de los prados*, *Saxifraga de los Ingleses*; *Paucedamun Silaus*, L.

Silau, Mattensteinbrech, Al.; meadow solphurwort, In.; seseli des pres, F.

f.

Planta bienal del mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Se usa la raiz y la simiente.

La raiz (*radix Seseleos pratensis*, s. *Saxifragæ Anglicæ*) es gruesa, espesa, aborquillada y provista de una porcion de pelos por fuera.

La simiente es aplastada de un lado, convexa del otro, con cinco estrias. Su olor y sabor son acres y aromáticos.

SIEMPREVIVA MENOR.

Siempreviva quemante, Pimienta de muralla; Sedum acre, L.

Kantzentræublein, Al.; vermiculaire, F.; wallpepper, In.; sedo aere, erva pignuela, I.; vermicularia, Por.

ams. an. b. ba. be. br. e. f. fe. g. s. su. w. *be. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en toda Europa (decandria pentagynia, L.; crasuleas, J.).

La yerba (*herba Sedi minoris*, s. *Illecebri vermicularis*) se compone de un tallo lampiño, guarnecido de hojas esparcidas, ovales, un poco triangulares, cortas, suculentas, de un verde claro y muy aproximadas las unas á las otras. Carecen de olor, y su sabor es acre, picante y de pimienta, que lo pierde por la desecacion.

Escitante, emético y purgante al interior; rubefaciente al esterior.

CERBEZA ANTIESCORBUTICA.

R. Siempreviva menor, ocho puñ.
Cerbeza, ... ocho lib.

Redúzcase á la mitad por la coccion.

Dósis; tres á cuatro onz. por la mañana en ayunas.

SIEMPREVIVA DE LOS TEJADOS.

Las farmacopeas indican dos plantas de este nombre:

1.ª *Siempreviva mayor; Sempervivum tectorum*, L.

Grosses Huslauch, Hauswurzkraut, Al.; joubarbe, F.; geat common housleek, In.; siempreviyo, I.; sempreviva, Por.

ams. an. b. be. br. e. f. fe. fu. g. ham. li. o. r. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Planta que crece en toda Europa (dodecandria dodecagynia, L.; crassuleas, J.).

Se usa la yerba (*herba Semperoivi*, s. *Sedi majoris*) que se compone de una roseta de hojas tiernas, carnosas, ovales, agudas, verdes, lampiñas por las dos caras y pestañosas por los bordes.

Tienen un olor que apenas se percibe, y un sabor acuoso, fresco, áspero, estíptico y como salado.

Dósis del zumo; dos onz.

2.ª *Siempreviva de las viñas; Yerba de los carpinteros; Sedum Telephium*, L.

Fette Henne, Wundkraut, Al.; joubarbe des vignes, F.; orpine, In.; teleohio bastardo, Por.

an. br. e. f. fe. w. *be. g. m. sp.*

Planta bienal de Europa (hexandria pentagynia, L.; crassuleas, J.)

Se usa la raiz y las hojas.

La raiz *(radix Crassulæ*, s. *Crassulæ majoris*, s. *Fabariæ*, s. *Telephii vulgaris*, s. *Illecebræ majoris)* es tuberculosa, gruesa, carnosa y blanquecina.

Las hojas son sentadas, ovales, de un verde pálido, alguna vez rojizas, un poco carnosas y suculentas, dentadas por los bordes, de un sabor mucoso, salado y acídulo.

Se la cree vulneraria.

JARABE DE SIEMPREVIVA.

Syrupus sedi majoris, s. *sempervivi.*

(w.)

R. Zumo de siempreviva, reducido á la mitad por la evaporacion, diez onz.
Azucar blanca, . diez y seis onz.
Hágase dar un hervor y cuélese.
Refrigerante, temperante.

POMADA DULCIFICANTE. (*ca. sm.*)

R. Zumo de siempreviva mayor y
Aceite comun, a. . . . part. ig.
Bátanse juntos. *(sm.)*

ca. prescribe tres onz. de zumo, otro tanto de manteca y cuatro onz. de aceite de almendras dulces.

Escelente para calmar las irritaciones de la piel, y segun se dice tambien los dolores ocasionados por las úlceras cancerosas.

SILENE.

Se usan en medicina las dos especies siguientes de este género:

1.ª *Silene Otites; Silene Otites*, Cand.

Feldlichender, tauben kropf, Al.; silene, F.; field campion, In.

br. w.

Planta perenne de Europa (decandria trigynia, L.; cariofillas, J.).

Se usa la yerba *(herba Viscaginis)* que se compone de un tallo simple, viscoso, guarnecido de pocas hojas, de las que las inferiores son espatuladas, y las superiores lanceoladas ó lineares. Su sabor es astringente y un poco amargo.

2.ª *Silene de Virginia; Silene Virginica*, L.

Catchfly, In.

c.

Planta bienal de la Virginia (decandria trigynia, L.; cariofillas, J.).

Se usa la raiz que es considerada como antielmíntica.

SIMARUBA.

Simaruba amarga, Aubl.

Simarubarinde, Ruhrrinde, Al.; Simaruba, I. For.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Arbol de la América meridional (decandria monogynia, L.; simarubeas, Cand.).

Se usa la corteza *(Cortex Simarubæ)* en pedazos largos, arrollados en sí mismos, delgados, flexibles, tenaces, fibrosos, como berrugosos al este-

rior, de un amarillo pálido por fuera, de un gris amarillento por dentro é inodoras. Su sabor es amargo.

Se coge casi siempre de la raiz y rara vez de los tallos.

Contiene, segun Morin, cuasina, una materia resinosa, un aceite volátil, alumina, ácido málico, un poco de ácido gálico y diversas sales.

Tónico, usado en las calenturas intermitentes y en los flujos mucosos de toda especie.

Dósis del polvo; de un escrp. á med. drac.

COCIMIENTO DE SIMARUBA.

Decoctum Simarubæ, s. *corticis Simarubæ.* (b.* ff. fu. *g. sa. sæ.*)

R. Corteza de simaruba, med. onz.
Agua, ... c. s.
para obtener dos lib. de líquido colado despues de la ebulicion. Hágase hervir por una hora. (ff.)

b.* prescribe de dos drac. á med. onz. de corteza, y dos lib. de agua reducidas á seis onz.; — *sa.* dos drac. á una onz. de raiz, y lib. y med. de agua reducida á una lib.; — *sa.* dos drac. de raiz y dos lib. de agua, reducidas á la mitad; — g. dos drac. de raiz y diez y seis onz. de agua reducidas á doce; — y fu. med. onz. de corteza y una lib. de agua reducida á ocho onz.

Dósis; una onz. cada dos ó tres horas, ó cuatro onz. tres veces al dia.

INFUSION DE SIMARUBA.

Infusum simarubæ. (b.* lo. *c.*)

R. Corteza de simaruba, med. drac.
Agua hirviendo, . . un cuartillo.
Déjese en maceracion por dos horas en vasija medio tapada y cuéles e
Amarga y aromática.

POCION ASTRINGENTE.

Haustus adstringens. (*b.*)

R. Corteza de simaruba, med. onz.
Agua, ... c. s.
para obtener ocho onz. de cocimiento; añádase al líquido colado
Emulsion gomosa, . . . dos onz.
Tintura tebáica, . . veinte got.
Para tomar poco á poco en la diarrea llamada atónica.

R. Corteza de simaruba, med. onz.
Agua, ... c. s.
para obtener ocho onz. de cocimiento. Añádase al líquido colado
Tintura tebáica, . . . un escrp.
Alcohol, ... una onz.
Agua de canela, . . . med. onz.
Para tomar como la precedente y en los mismos casos.

SIMIENTE DE ALEJANDRIA.

Semen contra, Santónico, Simiente de Cedoaria, de Santónico; Santonici, s. *Cinæ semen.*

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. c. g. m. pid. sp. z.*

El semen contra del comercio, *semen Cinæ*, s. *Cynæ*, s. *Sinæ*, s. *Santonici*, s. *contra vermes*, s. *lumbricorum*, s. *sanctum*, s. *Zedoariæ*, s. *Sementina*; *Zittwersaame*, *Wurmsaame*, Al.; *seme*

santo, I.; *semen contra*, F.; en el que se distinguen el de Alepo, del Oriente ó de Indias, y el de Barbaria, se compone de una tercera parte de granitos lineares, estriados, obtusos por sus dos estremidades y de calor amarillo verdoso; de otra tercera parte de sumidades pequeñas incompletamente desarrolladas, marchitas, obtusas por la estremidad mas gruesa, compuestas de tuberculitos del mismo color que los granos; y en fin de otra tercera parte de cuerpos estraños, restos de las ramas de la planta ó de otros vegetales &c. Tiene un olor aromático muy fuerte y algo anisado, y el sabor amargo y acre.

Generalmente se cree que procede de la *Artemisia Judaica*, L.; planta de Arabia y de Judea (syngenesia polygamia superflua, L.; synanthereas, Cass.). y de la *Artemisia contra*, L.; planta de la Persia.

Saunders la atribuye á una especie de *Chenopodium*.

Es antielmíntica.—Dósis; de veinte gr. á dos drac.

INFUSION DE SANTONICO.

Infusum seminis santonici. (b.* *au. b.*)

R. Santónico, ... dos drac.
Agua comun ó vino, . tres onz.
Infúndase y cuélese.—Dósis; una cuch. tres veces al dia. (b.*)

R. Raiz de valeriana y
Santónico, a. . . . . med. onz.
Agua hirviendo, . . nueve onz.
Déjese en infusion y añádase al líquido colado
Agua de menta piperita,
dos onz.
Estracto de corteza esterior de nueces y
Tintura amoniacal de valeriana,
a. . . . . tres drac.
Dósis; una cuch. cada hora. (*au.*)

R. Santónico, ... med. onz.
Agua de hinojo y
—— de menta piperita,
a. . . . . cuatro onz.
Alcanfor disuelto en eter sulfúrico,
una drac.
Dósis; una cuch. de hora en hora. (*au.*)

R. Santónico, ... dos drac.
Ruibarbo, ... una drac.
Agua hirviendo, ... c. s.
Déjense en infusion por un cuarto de hora y cuélese. (*b.*)

POCION ANTIELMINTICA.

Potio anthelmintica parum laxans. (*b.*)

R. Ruibarbo, ... una drac.
Santónico, ... dos drac.
Agua hirviendo, ... c. s.
para obtener seis onz. de infusion. Añádase al líquido colado
Jarabe de achicorias compuesto,
una onz.
Para tomar en dos veces.

COCIMIENTO DE SANTÓNICO.

R. Santónico, ... med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Hagánse hervir un poco.

COCIMIENTO VERMIFUGO.

Decoctum amarum anthelminticum. (*b.*)

R. Santónico y
Raiz de genciana, a. . dos drac.
Sumidades de agenjos, . un puñ.
Agua, ... c. s.
para obtener despues de media hora de ebulicion una lib. de líquido colado.

POLVOS VERMIFUGOS.

Pulvis vermifugus, s. *anthelminticus*, s. *contra vermes*. (br. fe. g. li. ww. *au. sa.*)

R. Santónico y
Hojas de llanten, a. . onz. y med.
Jabon de jalapa, . . . med. onz.
Azúcar blanca, ... una onz.
Háganse polvos. (li.)

R. Santónico, ... med. onz.
Hojas de sen, ... una drac.
Cilantro y
Cuerno de ciervo calcinado, a. . . . . med. drac.
Háganse polvos. (br.)

R. Semen contra, ... med. onz.
Tártaro tartarizado, . . tres drac.
Azúcar blanca, ... dos drac.
Háganse polvos. (sa.)

R. Santónico y
Raiz de jalapa, a. . med. escrp.
Etíope antimonial, . . . seis gr.
Háganse polvos. (ww.)

R. Santónico, ... un escrp.
Sal amoniaco, . . . med. escrp.
Sulfato de hierro, ... dos gr.
Háganse polvos. (ww.)

R. Santónico y
Flores de tanaceto, a. . tres drac.
Sulfato de hierro, . . una drac.
Háganse polvos. (g.)

R. Santónico,
Raiz de valeriana y
—— de jalapa, a. . med. escrp.
Pulvericense. (fe.)

R. Santónico, . . . diez á veinte gr.
Oxido de zinc, . uno á tres gr.
Háganse polvos. (*au.*)

R. Santónico y
Estracto de tanaceto, a. . seis gr.
Limaduras de hierro, . cuatro gr.
Aceite de valeriana, . . una got.
Háganse polvos. (*au.*)

R. Santónico, ... med. onz.
Estracto de quina y
Sulfato de hierro, a. . un escrup.
Háganse polvos. (*au.*)

BOLO ANTIELMINTICO. (ff.)

R. Santónico, ... diez gr.
Mercurio dulce, ... dos gr.
Miel despumada, ... c. s.
Hágase un bolo.

PILDORAS ANTIELMINTICAS. (b.*au.)

R. Estracto de tanaceto y
Santónico, a. . . . . seis gr.
Sulfato de hierro, . . cuatro gr.
Resina de jalapa triturada con almendras dulces, ... seis gr.
Aceite esencial de tanaceto, una got.
Háganse once píldoras. — Para una sola dósis en un adulto. Se dan tres á cinco en los niños.

CONFECCION VERMIFUGA.

Confectio seminis cinæ. (li. pa. s. w. wu. *pid.*)

R. Santónico, ... c. s. q.
Pongase sobre el fuego en un pe-

rol de cobre, y cuando esté muy caliente échese encima á cuch.

Azúcar cocida hasta la consistencia conveniente, ... c. s.

para cubrir las simientes de una costra espesa.

PASTILLAS ANTIELMINTICAS.

Tabellæ contra vermes, s. *de semine santonico*, *Morsuli contra vermes*, s. *anthelmintici*, *Trochisci anthelmintici*, *Tragemata de semine santonico.* (he. pa. sa. w. wu. *pid. sp.*)

R. Serpentaria de virginia y
Santónico, a. . . . . seis drac.
Jalapa y
Ruibarbo, a. . . . . una onz.
Azúcar clarificada, . . tres lib.
Pulverícense y háganse pastillas. (sa.)

R. Santónico . . . . . una onz.
Mirra escogida, . . . med. onz.
Azúcar blanca, ... una lib.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse pastillas. (sa.)

R. Santónico y
Coralina, a. . . . . med. onz.
Etíope mineral, . . . tres drac.
Canela, ... dos drac.
Resina de jalapa, . . dos escrup.
Azúcar pluma, ... siete onz.
Háganse pastillas. (pa. sa. w. *sp.*)

R. Santónico, ... onz. y med.
Sulfato de hierro, . . med. onz.
Azúcar blanca, ... ocho onz.
Pulverícense y con diez gr. de estos polvos y
Mucílago de goma tragacanto, c. s.
Háganse treinta trociscos. (he. *pid.*)

ELECTUARIO ANTIELMINTICO.

(li. *au.*)

R. Santónico y
Valeriana, a. . . . drac. y med.
Jalapa en polvo, . . una drac.
Ogimiel escilítico y
Jarabe comun, a. . . . una onz.
Méz. ex. — Dósis; de una á tres drac. (li.)

R. Santónico, ...
Jalapa, ...
Valeriana y . . . . . .
Sulfato de sosa, a. . . una drac.
Ogimiel escilítico, . . cuatro onz.
Dósis; una cuch. cada dos ó tres horas. (*au.*)

LOOC ANTIELMINTICO. (he.)

R. Polvos de santónico
——— de raiz de valeriana y
——— de jalapa, a. . una drac.
Miel escilítica, ... c. s.
para hacer un magma espeso.

POCION VERMIFUGA.

Mistura antielmintica, *Julepe antielmíntico.* (*pie. sw.*)

R. Sulfato de potasa, . . dos drac.
Ruibarbo, ... drac. y med.
Santónico, ... una drac.
Ogimiel escilítico, . . med. onz.
Agua pura, . . dos onz. y med.
Méz. (*sw.*)

R. Cocimiento fuerte de santónico, dos onz.
Agua de menta y
——— de flores de naranjo,
a. . . . . una onz.
Tintura de quina, . . . dos onz.

Jarabe de vinagre, ... c. s.
Méz. *(pie.)*

R. Agua de verdolaga,
—— de achicoria, a. . tres onz.
Jarabe de limon, . once escrup.
Confeccion de jacintos y
Santónico, a. . . . . med. drac.
Agua de azahar, . . . med. onz.
Méz. *(pie.)*

R. Jarabe de agenjos,
——— de buglosa, a. . una onz.
——— de limon, . . med. onz.
Santónico,
Cuerno de ciervo calcinado y
Confeccion alkermes,
a. . . . . un escrup.
Agua de grama y
—— de agenjos, a. . . . . c. s.
Méz. ex. *(pie.)*

R. Agua de lechuga y
Cocimiento de grama, a. tres onz.
Confeccion de jacintos y
Santónico, a. . . . . med. drac.
Jarabe de limon, . . . seis drac.
Aceite de almendras dulces,
una onz.
Méz. (*pie.*)

Se toman todas estas pociones en una sola dósis.

SIO.

Sio de las boticas; Sium Ammi, L.

Cretischer ammey Mohrenkümmel, Al.; ammi, F.; small honewort, In.

br. e. f. fe. w. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Planta ánua del mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Se usa la simiente (*semen Ammios veri*, s. *Cretici*, s. *Fœniculi Lusitanici*) que es pequeña, oval, estraida profundamente, de color leonado, de olor agradable y de sabor aromático y amargo.

Escitante y carminativa.

SIO NINSI.

Ninsi de la China; Sium Ninsi, L.

Ninsing, Ninsingmerk, Al.; ninsi, F.

br. f. w. *g. m. sp.*

Planta bienal que crece en las montañas de la China (pentandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Se usa la raiz (*radix Ninsi*, s. *Ninsing*, s. *Ninsini*) que es fusiforme, ensortijada, blanquecina, cornea y semitrasparente, ó de un moreno amarillento ú opaco, segun que ha sido ó no emblanquecida por el agua hirviendo y privada de su epidermis. Su grueso varía desde el de una pluma á un dedo pequeño. Su olor es fuerte y desagradable, y el sabor primero algo dulce y despues un poco amargo.

Los chinos atribuyen virtudes casi milagrosas á esta raiz, que como la de Chinsange son bien limitadas y figuraria mejor en las cocinas con las salsas, que en la oficina de los farmacéuticos.

SISON AMOMO.

Amomo vulgar, Amomo falso; Sison amomum, L.

Deuthsches Amomum, Al.; amome, F.; field honewort, In.

f w. wu. *sp. z.*

Planta perenne de Europa (pen-

tandria digynia, L.; ombelliferas, J.).

Se usa la simiente *(semen Sisonis Amomi)* que es pequeña, de color gris, suave, de un olor y sabor aromáticos.

Escitante, considerada como diurética.

SODIO.

Metal que no se usa en medicina, pero del cual se emplean los compuestos siguientes:

PROTÓXIDO DE SODIO.

Sosa cáustica; Soda caustica, s. *pura.*

1.° EN ESTADO LIQUIDO.

Legia de jaboneros; Lixivium causticum, s. *sodæ.*

f.* fe. ff. p. s. *sw. vm.*

R. Sub-carbonato de sosa, . dos pt.
Cal viva, ... una pt.

Hágase hervir con c. s. de agua, cuélese la legía, y evapórese hasta que un vaso de la capacidad de ocho drac. de agua comun pueda contener once drac. de aquella, y que estando fria señale 36.° del areometro.

§. II. EN ESTADO SÓLIDO.

an. fe. *br. vm.*

R. Legía de sosa cáustica, . c. s. q.

Evapórese hasta que corra como el aceite, y que una gota vertida sobre un cuerpo frio se solidifique; échese entonces sobre una piedra llana de mármol ó sobre una lingotiera.

La sosa cáustica puede servir para los mismos usos que la potasa.

JABON DE CERA. *(vm.)*

R. Cera amarilla, ... tres pt.
Lícuese y añádase
Sosa cáustica líquida, . . dos pt.

Póngase al fuego y continúese meneándola hasta que la masa se haya hecho capaz de disolverse en el agua sin descomponerse.

PROTOXISULFURO DE SODIO.

Sulfuro de protoxido de sodio, Sulfuro de sosa; Natrum sulphuratum. (am. fe. *br. c. sw. vm.*)

R. Flores de azufre y
Sub-carbonato de sosa, a. part. ig.

Lícuense juntos á un fuego aumentado por grados, échese sobre una mesa de mármol, y divídase en pedazos pequeños despues de frio. (am. fe. *br. c.*)

sw. prescribe una parte de azufre y dos de álcali.

R. Azufre en cilindros, . . tres pt.
Sosa cáustica, siete part. y med.

Mézclense y lícuense al B. A. en un matraz. *(vm.)*

Esta es la que Van-Mons llama *Sulfuro simple de sosa.* En cuanto á la preparacion que él llama *Sobre-sulfuro de sosa* indica la fórmula siguiente para obtenerle:

R. Azufre en cilindros,
. . tres pt. y un cuarto.
Sosa cáustica fundida, cuatro pt.

Lícuese en un matraz de vidrio al B. A. calentado por grados.

Las propiedades del protoxisulfuro

de sodio son las mismas que las del protoxisulfuro de potasio. El práctico debia, segun Idt y Chevallier, tanto por espíritu nacional como por razon, usar siempre un sulfuro de sosa; porque la sosa es un producto perteneciente á nuestro suelo; y porque variando poco el carbonato de sosa en su grado de pureza, se puede obtener siempre un sulfuro idéntico en su composicion, que no puede variar de doce á veinte y cinco por ciento como el sulfuro de potasa preparado con la potasa del comercio. Sin embargo se usa muy poco el sulfuro de sosa.

AGUA ANTIPSORICA.
(*vm.*)

R. Sulfuro de sosa, . . . , una drac.
Sal amoniaco, dos escrp. y med.
Disuélvase cada sal en seis onz. de agua, fíltrense y mézclense las soluciones.

LOCION CONTRA LA TIÑA. (*bo. ca.*)

R. Sulfuro de sosa, . . . tres onz.
Jabon medicinal, . drac. y med.
Agua de cal, . siete onz. y med.
Alcohol, ... dos drac.
Se rodea la cabeza con un lienzo empapado de este líquido cada dos dias.

JABON SULFURADO DE SOSA. (*vm.*)

R. Jabon de médula, . . . una pt.
Sulfuro de sosa, ... dos pt.
Alcohol, ... seis pt.
Disuélvanse y cuélese la solucion.

UNGUENTO ANTIPSORICO. (*sw.*)

R. Sulfuro de sosa, . . . tres drac.
Manteca de puerco, onz. y med.
Méz. por trituracion.

LINIMENTO SULFURO-JABONOSO. (*vm.*)

R. Aceite de almendras dulces y
Polvos de azufre, a. part. y med.
——— de sulfuro de sosa,
cuatro pt. y med.
Manteca de puerco,
seis part. y med.
Tritúrense los polvos con la manteca y añádase poco á poco el aceite.
En fricciones contra la sarna.

PROTOXICLORURO DE SODIO.

Cloruro de protoxido de sodio, *Cloruro de sosa*; *Aqua de Javelle.* (f.* f.** *ma.*)

R. Sub-carbonato de sosa, cinco lib.
Agua destilada, . . . veinte lib.
Echese el líquido cuando marque 12.º R. en un frasco, del que no debe llenar mas que las tres cuartas partes, y hágase pasar una corriente de cloro, que se desprenda de una mezcla de una lib. de sal marina, lib. y med. de ácido sulfúrico, y nueve onz. de agua.

El cloruro es bastante fuerte cuando decolore diez y ocho partes de sulfato de añil.

Se usa dilatado en diez á quince partes de agua para las curas de la gangrena de hospital, las úlceras venéreas degeneradas, las llagas gangrenosas, que las hace cicatrizar rápidamente, y los cánceres ulcerados, cuya fetidez destruye al mismo tiempo que calma los dolores. Alibert le ha usado con ventaja en lociones en los herpes

corrosivos. Ha curado por su medio una tiña favosa, y le ha usado con suceso en la angina membranosa en forma de gargarismo. Se da tambien interiormente á la dósis de veinte y cinco ó treinta gotas en dos cuartillos de tisana.

CLORURO DE SODIO.

Cuadricloruro de sodio B., *Muriato de sosa*, *Hidroclorato de protoxido de sodio*, *Protohidroclorato de sodio*, *Hidroclorato de sosa*, *Sal comun ó de grabela*, *Sal gemma ó marina*, *Sosa muriatada* H.; *Chloruretum sodii*, *Hydrochlorinas natricus*, *Muria*, *Murias sodæ*, *Natrum muriaticum*, *Sal communis*, s. *marinus*, s. *culinaris*.

Kuchensalz, Al.; salt, In.; sal, Por.; sale, I.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g ham. han. he. li. lo. o. p po. pp. pr. r. s. su. wu. ww. *a. g. pa. pid. sp.*

Los usos domésticos de este compuesto son demasiado numerosos y generalmente conocidos para que sea necesario ponerlos aquí. Se usa poco en medicina. Sin embargo se añade con frecuencia al agua de los pediluvios para hacerlos mas escitantes. Alguna vez tambien se ha querido aprovecharse de su accion estimulante manifiesta, administrándola ya interiormente en las enfermedadas atribuidas sin razon ó con ella á la debilidad, ya esteriormente en diversas afecciones cutáneas, con particularidad la tiña y la sarna.

SAQUILLO RESOLUTIVO. (*sm.*)

R. Sal comun y
— gemma, a. . . . . una onz.
Sal amoniaco, . . . cuatro drac.
Méz.

POLVOS VERMIFUGOS. (*e*).

R. Sal comun, ... tres drac.
Cochinilla, ... quince gr.
Divídase en seis papeles. — Dósis; uno todas las mañanas.

Estos polvos son aconsejados por Rush.

LAVATIVA VERMIFUGA.

Clysma ad ascarides. (*sw.*)

R. Vino tinto, ... seis onz.
Sal comun, ... c. s.
ó cuanta el vino pueda disolver.

ENEMA PURGANTE.

Clysma purgans. (*b. e. ra.*)

R. Sal comun, ... una onz.
Tisana emoliente, . . . dos lib.
Disuélvase. (*ra.*)

R. Cocimiento de cebada, cuatro onz.
Sal comun, ... med. onz.
Aceite comun, . . . cuatro onz.
Méz. (*b.*)

R. Sal comun, ... med. onz.
Aceite de ricino y
Jarabe comun, . . a. dos onz.
Cocimiento de simiente de leño, med. azumb.
Méz. (*e.*)

ENEMA ANTIESPASMODICO.

Clysma antispasmodico-resolvens. (*b.*)

R. Sal comun, ... cuatro drac.
Aceite de lino, . . . cuatro onz.
Infusion de manzanilla, tres onz.

MISTURA ESCITANTE.

Solutio, s. *Mixtura citro-muriatica.* (*bo. ca. pie. sw.*)

R. Zumo de limon , . . . c. s. q.
Sal comun , ... c. s.
ó la que el zumo pueda disolver.

Broussonnet la recomienda en las calenturas llamadas adinámicas. — Dósis; una cuch. de hora en hora.

POMADA DE SAL MARINA. (*sm.*)

R. Sal comun , ... onz. y med.
Cerato de Galeno , . . . tres onz.
Ungüento rosado , . . . una onz.

Se frota por mañana y tarde las superficies afectadas de la tiña.

AGUA DE MAR ARTIFICIAL.

Agua marina. (b.* g. *au. br. sw.*)

R. Sal comun , ... med. onz.
— catártica amarga y
Jarabe de espino serval ,
a. . . . . una drac.
Agua , ... dos lib.

Méz. (g.)

R. Sal comun , ... diez onz.
Muriato de magnesia , diez drac.
——— de cal , ... dos onz.
Sulfato de sosa y
——— de magnesia, a. seis drac.
Agua , ... cincuenta lib.

Disuélvase. (b.* *sw.*)

br. trae la misma fórmula , pero omite el muriato de cal; — *au.* prescribe una azumbre de agua , veinte y cuatro granos de sal comun, cuatro de sulfato de magnesia, quince de sulfato de cal, otros quince de carbonato de magnesia , otro tanto de carbonato calcáreo y una corriente de gas ácido carbónico por el líquido.

Esta agua ha sido alabada como un escelente fundente.

AGUA DE SELTER. (su.)

R. Sal comun , ... cien gr.
Sub-carbonato de sosa,
veinte y cuatro gr.
——————— de magnesia,
veinte y nueve gr.
——————— de cal,
diez y siete gr.
Agua , . . . ochenta y dos onz.

Satúrese de ácido carbónico.

AGUA DE PYRMONT. (su.)

R. Sal comun , ... med. escrp.
Sulfato de magnesia,
treinta y cinco gr.
——— de cal , treinta y seis gr.
Sub-carbonato de cal , quince gr.
Limaduras de hierro , . . una onz.
Agua , ... ochenta y dos onz.

Satúrese de ácido carbónico.

AGUA DE SELTZ. (f. *vm.*)

R. Sal comun , . . . veinte y dos gr.
Sub-carbonato de sosa , cuatro gr.
——————— de magnesia,
dos gr.
Agua cargada de cinco veces su volúmen de ácido carbónico,
veinte onz. y med.

Disuélvanse (f.)

R. Agua , ... tres lib.

Póngase en una botella é introdúzcase en el fondo de esta con el auxilio de un tubo

Acido hidroclórico fumante,
sesenta gr.
Añádase en seguida uno despues del otro
Sub-carbonato de cal, . . seis gr.
———— de magnesia,
diez gr.
Carbonato neutro de sosa,
cincuenta y cuatro gr.
Tápese bien la botella. (*vm.*)

AGUA DE BALARUC. (f.)

R. Sal comun, ... drac. y med.
Muriato de cal, . diez y ocho gr.
———— de magnesia,
cincuenta y seis gr.
Sub-carbonato de magnesia, un gr.
Agua que contenga dos veces su volúmen de gas ácido carbonico,
veinte onz. y med.

AGUA DE BOURBONNE-LES-BAINS. (f.)

R. Sal comun, ... una drac.
Muriato de cal, ... diez gr.
Agua cargada de dos veces su volúmen de gas ácido carbonico,
veinte onz. y med.

SUB-PROTO-CARBONATO DE SODIO.

Sub-carbonato de protoxido de sodio, Sub-carbonato de sosa, Sosa gredosa, aireada ó efervescente, Mefito de sosa, Greda de sosa, Alcali fijo mineral; Soda, Natron, Natrum, Alcali minerale, Carbonas sodæ, Sub-carbonas sodæ, Hypercarbonas sodæ, Natrum carbonicum, Sub-carbonas natricum, Carbonas sodæ alcalinus, s. *incompletus, Hypocarbonas sodæ.*

1.° Como se encuentra en el comercio.

Sosa, Barrilla; Soda, Barilla, Carbonas natricum, s. *sodæ impurum.*

a. am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. s. su. w. wu. ww. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

Se distinguen en el comercio cuatro especies de sosa.

A. La *Sosa natural* en agujas finas ó eflorescencias pulverulentas y nevosas. Es bastante abundante en Egipto, en el desierto de Thaiat, al oeste del Delta y en los llanos de la alta Hungría.

B. La que proviene de la incineracion de un grande número de plantas marinas, con particularidad de las atripliceas y fucaceas, como la *Salsola, Chlenopodium, Atriplex, Fucus.* En masas sólidas, compactas, medio fundidas con la dureza de piedra, de color gris azulado y de sabor salado y de legía. Contiene sub-carbonato de sosa, en cantidad muy variable, sulfato de sosa, sal marina, sub-carbonato de cal, alumina, sílice, hierro y tambien alguna vez sulfato de potasa, cloruro y aun iodoro de potasio.

C. La que proviene de la descomposicion de la sal marina por medio del litargirio.

D. La que resulta de la calcinacion del sulfato de sosa con el carbon y la greda. Esta se compone de sosa cáustica, de sub-carbonato de cal, de sulfuro de cal con esceso de base y de carbon.

2.° Purificacion de la sosa del comercio.

R. Sosa del comercio, ... c. s. q.

Háganse polvos gruesos, disuélvase en agua, evapórese la legia hasta que señale 28 ó 30.° en el areometro, y déjese cristalizar.

Este procedimiento es el mismo en todas las farmacopeas.

El sub-carbonato de sosa se usa en las escrófulas, las hidropesías llamadas pasivas, los infartos de las vísceras del bajo vientre, el mal de piedra y en los cálculos urinarios, cuya base forma el ácido urico. — Dósis; de diez á veinte granos.

BOLOS ESTOMACALES.

Boli stomachici. (*sw.**)

R. Sub-carbonato de sosa,
med. escrup.
Polvos aromáticos, . cuatro escrup.
Jarabe de quina, ... c. s.
Háganse tres bolos.

PILDORAS LITONTRIPTICAS.

Pillulæ sub-carbonatis sodæ. (am. b.* ed. *au. c. e.*)

R. Sub-carbonato de sosa seco,
cuatro pt.
Jabon duro, ... tres pt.
Jarabe simple, ... c. s.
Háganse píldoras de dos gr. — Dósis; diez á lo menos cada dos horas.

am. *c.* y *e.* prescriben una drac. de sub-carbonato y media de jabon para hacer cuarenta píldoras.

PILDORAS ABSORVENTES. (*e.*)

R. Sub-carbonato de sosa,
Ruibarbo y
Estracto de genciana,
a. . . . . un escrp.
Mercurio dulce, ... tres gr.
Háganse veinte píldoras. — Dósis; dos á la vez en la dispepsia.

POMADA ALCALINA. (*ra.*)

R. Sub-carbonato de sosa,
dos drac.
Láudano de Sydenham,
una drac.
Manteca de puerco, . . una onz.
Méz.-Cullelier la usaba en diferentes afecciones cutáneas muy dolorosas.

R. Sub-carbonato de sosa y
Sulfuro de potasa, a. tres drac.
Manteca de puerco, . . tres onz.
Alibert frotaba con ella la cabeza á los tiñosos todos los dias, despues de haber hecho caer las costras con el auxilio de las cataplasmas emolientes.

AGUA ANTINEFRITICA.

Aqua nephritica. (b.* fu. ham. li.)

R. Sub-carbonato de sosa, dos drac.
Agua de cal, ... dos lib.
Dósis; dos ó tres cuch.

POCION ABSORVENTE.

Mixtura antacida. (*e. sw.*)

R. Sub-carbonato de sosa y
Azucar blanca, a. . . dos drac.
Yemas de huevo, ... n.° 2.
Miel blanca, ... dos drac.
Méz. (*sw.**)

R. Sub-carbonato de sosa,
cuatro escrp.

Infusion de genciana y
Agua de canela, a. . . tres onz.
Tintura de cardamomo,
med. onz.

Dósis; una cuch. cada dos ó tres horas. *(e.)*

R. Sub-carbonato de sosa,
una drac.
Azucar blanca, ... med. onz.
Mucílago de goma arábiga,
dos onz.
Agua, ... treinta onz.
Alcohol de pimienta de la Jamaica,
dos onz.

Dósis; dos onz. tres ó cuatro veces al dia. *(sw.)*

R. Sub-carbonato de sosa, dos escrp.
Ruibarbo, ... dos drac.
Jarabe comun, ... una onz.
Agua de menta rizada, ocho onz.

Dósis; dos cuch. tres veces al dia. *(sw.*)*

POCION DIGESTIVA.

Infusum amarum cum natro. (au.)

R. Raiz de genciana, . . dos drac.
Naranjas verdes, . drac. y med.
Cardamomo menor, . med. drac.
Sub-carbonato de sosa,
una drac.
Agua hirviendo, . . . seis onz.

Déjense en infusion por seis horas y cuélese. — Dosis; una cuch. tres veces al dia.

POCION ANTIESCROFULOSA. *(ra.)*

R. Sub-carbonato de sosa,
med. drac.
Tintura de genciana, med. onz.

Peschier ha usado, desde 1816, contra la papera una solucion mas ó menos cargada de sub-carbonato de sosa; por egemplo, dos á cuatro drac. de la sal en ocho onz. de agua, de la que da dos veces al dia una cuch. en medio vaso de vino ó de agua de azucar aromatizada. Hufeland prescribe cuatro cuch. cada dia de una solucion de dos drac. de sub-carbonato en seis onz. de agua de melisa y med. onz. de agua de canela.

TISANA CONTRA EL MAL DE PIEDRA.
(sm.)

R. Simiente de lino quebrantada,
Culantrillo de Montpeller y
Glacial, a. . . . . un puño.
Agua, ... med. azumb.

Hiérvase por un cuarto de hora y añádase al líquido colado

Sub-carbonato de sosa, un escrp.

Para beber en el dia.

SOLUCION BALSÁMICA ALCALIZADA.

Solutio balsamica alkalisata. (sw.)

R. Sub-carbonato de sosa,
Azucar y
Mirra, a. . . . . onza y med.
Bálsamo del Perú, . . med. onz.
——— del Canadá, diez drac.
Agua, ... lib. y med.

Se mezcla una onz. de esta solucion con dos cuartillos de agua, y se hace tomar med. lib. de la mezcla tres ó cuatro veces al dia.

INYECCION LITONTRIPTICA. *(bo.)*

R. Sub-carbonato de sosa,
una drac.
Jabon, ... dos onz.

Agua comun, ... doce onz.

Aconsejada para disolver los cálculos urinarios formados por el ácido úrico.

POCION LITONTRIPTICA. (*e.*)

R. Sub-carbonato de sosa, una drac.
Infusion de quasia, . cuatro onz.
Tintura de colombo, . una onz.

Dósis; una cuch. cuatro veces al dia.

POCION ESPECTORANTE. (*e.*)

R. Sub-carbonato de sosa, doce gr.
Vino de ipecacuana, veinte got.
Tintura tebáica, . . cuatro got.
Agua, ... una onz.

Dósis; una cuchta. cada dos ó tres horas en la coqueluche.

AGUA ESTOMACAL.

Infusum quassiæ cum natro. (au.)

R. Leño de quasia, . drac. y med.
Sub-carbonato de sosa,
dos drac. y med.
Agua hirviendo, . . . una lib.

Déjese en infusion por una hora y cuélese. — Dósis; de dos á cuatro cuch. cada dia en la dispepsia.

PROTO-CARBONATO DE SODIO.

Carbonato de protoxido de sodio, Carbonato neutro de sosa, Carbonato de sosa, Bicarbonato de sosa; Carbonas sodæ, s. *natricum.*

1.° *En estado sólido.*

b. ba. be. ed. fi. lo. su.

R. Sub-carbonato de sosa purificado,
. . . . . una pt.
Agua caliente, ... dos pt.

Hágase pasar una corriente de gas ácido carbónico para la solucion filtrada y fria, y consérvense los cristales que en seguida se formen espontáneamente. (am. b. ba. be. ed. fi. su. *c.*)

R. Sub-carbonato de sosa, una lib.
Agua, ... med. azumb.
Añádase á la solucion
Sub-carbonato de amoniaco,
tres onz.

Aplíquese por tres horas á la mezcla un calor de 80.° C. hasta que todo el amoniaco se haya disipado, y déjese cristalizar. (am. lo. *c.*)

2.° *En estado líquido.*

Aqua supercarbonatis sodæ, s. *carbonatis sodæ accidula.* (b.* ed. fi. han. po. r. su. *sw. vm.*)

R. Sub-carbonato de sosa,
dos onz.
Agua, ... diez lib.

Hágase pasar á la solucion el gas ácido carbónico que se desprenda de una mezcla de tres onz. de greda, otras tres de ácido sulfúrico y tres lib. de agua.

Esta sal, que se usa mucho en el dia, no se diferencia casi de la que precede bajo el punto de vista terapéutico.

AGUA ALCALINA GASEOSA.

Aquæ sodæ. (am. *c. ra.*)

R. Sub-carbonato de sosa, tres drac.
Agua, ... cuatro azumb.

Cárguese la solucion de diez veces su volúmen de gas ácido carbónico. (am. *c.*)

R. Sub-carbonato de sosa,
diez y ocho gr.
Acido hidroclórico, . med. drac.
Agua, ... doce onz.
Consérvese en una botella bien tapada. (*ra.*)

POCION FEBRIFUGA. (*bo.*)

R. Agua destilada, . . . ocho onz.
Acido carbónico, ... c. s. para duplicar el volúmen del agua. Añádase á la solucion
Sub-carbonato de sosa,
med. drac.
Alcanfor, ... veinte gr.
Jarabe de adormideras,
seis drac.
Se hace tomar la mitad cuatro horas antes del acceso, y lo restante al momento de la invasion. Se debe continuar su uso por siete ú ocho dias.

PASTILLAS DIGESTIVAS. (f.* f.** *ma.*)

R. Bicarbonato de sosa,
doscientas cincuenta pt.
Azucar blanca,
cuatro mil setecientas cincuenta pt.
Aceite esencial de menta, ocho pt.
Mucílago de goma tragacanto,
c. s.
Háganse pastillas de diez y ocho granos. — Dósis; dos ó tres antes y despues de la comida en los calculosos y gotosos.

SUB-PROTO-BORATO DE SODIO.

Sub-borato de protóxido de sodio, *Sub-borato de sosa*, *Borato sobresaturado de sosa*, *Borato de sosa con esceso de base*, *Sosa boratada* H., *Borato de sosa* B., *Borax*, *Borax bruto*, *Tinchal*, *Tinkar*; *Boras sodæ alcalescens*, s. *alcalinum*, s. *alcalinus*, *Boras supersodicus*, *Borax*, *Borax Venetus*, *Hypoboras sodæ*, *Subboras natricum*, s. *sodæ*.

Naturliches Sedativsalz, Al.; atinkal, In.; borace, I.; tincal, Por.

a. am. ams. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. ww. *a. g. pa. sp.*

En prismas exaedros mas ó menos aplastados y bastante bien terminados por pirámides decaedros ya sin color, ya amarillentos ó verdosos, cubiertos siempre de una capa terrosa, grasa al tacto, que tienen olor de jabon, de quebradura vidriosa, eflorescentes y con un sabor un poco alcalino.

ESPECIES DIABORACEAS. (w.)

R. Borax de Venecia, . . med. onz.
Casia leñosa y
Azafran de Oriente, a. una drac.
Raspaduras de leño de sabina y
Sucino blanco pp., a. med. drac.
Hueso de corazon de ciervo,
Musgo de encina y
Hojas de alelí amarillo,
a. . . . . un escrp.
Pulverícense. — Minsich las recomendaba para facilitar el parto. — Dósis; de un escrp. á med. drac.

POLVOS AD PARTUM PROMOVENDUM. (pa. w.)

R. Borax, ... med. onz.
Castoreo y
Azafran, a. . . . . drac. y med.
Aceite de canela, . . ocho got.
—— de sucino, . . . seis got.
Méz. y pulverícense. (w.)

R. Casia leñosa y
Canela, a. . . . . dos drac.
Borax y
Sucino blanco pp., a. una drac.
Azafran, ... med. drac.
Aceite de canela, . . . tres got.
Méz. y pulverícense. (pa.)

Se les atribuia en otro tiempo los mismos usos que á los polvos precedentes. — Dósis; de un escrp. á med. drac.

MIXTURA AD PARTUM. (*sw.*)

R. Borax, ... dos drac.
Agua de manzanilla romana, cuatro onz.
Jarabe de corteza de naranja, med. onz.
Sucinato de amoniaco líquido, dos drac.
Láudano de Sydenham, med. drac.
Dósis; dos cuch. cada media hora.

POCION ASTRINGENTE.

Infusum salep cum adstringentibus. (*au.*)

R. Salep, ... una drac.
Agua hirviendo, . . . diez onz.
Añádase al líquido colado
Estracto de quina y
——— de leño campeche, a. . . . . una drac.
Borax, ... med. drac.
Jarabe de altea, . . . una onz.

Para tomar á cuch. en la diarrea crónica, pero particularmente en las áftas llamadas asténicas y malignas.

R. Salep, ... dos drac.
Simiente de lino, . . . med. onz.
Agua hirviendo, . . . diez onz.

Cuélese despues de la suficiente estraccion y añádase al líquido
Borax, ... med. drac.
Estracto de leño campeche y
——— de quina, a. una drac.
Jarabe de altea, . . . una onz.

Para tomar á cuch. en los mismos casos que la precedente.

COLUTORIO BORATADO.

Miel boratada: Collutorium adstringens; Linimentum de borate, s. *ad aphthas, Mel boracis*, s. *boraxatum*, s. *subboratis sodæ; Linctus de borace*, s. *ad aphthas.* (dd. ed. ff. ham. lo. su. *au. c. pie. sa. sw. sy. vm.*)

R. Borax, ... una drac.
Aceite de almendras dulces, una onz.
Yemas de huevo, ... n.º 1.
Méz. por trituracion. (*sa. sw.*)

R. Borax, ... una pt.
Miel despumada, . . . ocho pt.
Méz. (ed. ham. lo. *c.*)

ff. prescribe una parte de borax y diez de miel; — *pie.* y *vm.* una de borax y doce de miel; — y *au.* partes ig. de borax y de miel.

R. Borax, ... una ó dos drac.
Miel despumada. . . . . una onz.
Estracto de corteza verde de nuez, una ó dos drac.
Méz. por trituracion. (*sw.*)

R. Borax, ... una drac.
Jarabe de moras, una á tres onz.
Méz. (*au.*)

R. Borax, ... una ó dos drac.
Mucílago de simiente de membrillos y

Jarabe de moras, a. . . una onz.
Méz. (*sw. sy.*)

R. Borax, ... drac. y med.
Agua de fuente y
Miel, a. . . . . una onz.
Méz. triturando. (dd. su.)

GARGARISMO BORATADO.

Gargarisma eborace, s. *ad aphthas*, s. *boraxatum*, *Mixtura boraxata*, *Liquor ad aphthas.* (dd. g. ham. *au. b. ca. e. pie. ra. sa. sw. sy.*)

R. Borax, ... dos drac.
Mucílago de simiente de membrillo, ... med. lib.
Miel rosada, ... una onz.
Méz. (g. *sa.*)

sw. prescribe se cueza una onz. de simiente de membrillo en diez y seis de agua, que se reduzcan á doce y se añada al líquido colado tres drac. de borax y onz. y med. de miel rosada.

R. Borax, ... seis drac.
Infusion de salvia, . . . diez onz.
Miel despumada, ... dos onz.
Méz. (ham.)

dd. prescribe dos drac. de borax, ocho onz. de infusion de salvia y una de miel; — y *b.* un escrp. de borax, una lib. de cocimiento de salvia y una onz. de aguardiente.

R. Borax, ... dos drac.
Agua y
Tintura de mirra, a. . . una onz.
Miel rosada, ... dos onz.
Méz. (*ca. sw.*)

au. y *sy.* prescriben una onz. de borax, una lib. de agua, dos onz. de tintura de mirra y otro tanto de miel; — y *e.* una drac. de borax, cuatro onz. de agua, med. onz. de tintura de mirra y una onz. de miel.

R. Borax, ... dos drac.
Cocimiento de cebada, lib. y med.
Jarabe de goma, ... una onz.
Méz. (*ra.*)

R. Borax, ... dos drac.
Infusion de rosas, . . . diez onz.
Jarabe de moras, . . . med. onz.
Méz. (*b.*)

R. Borax, ... tres drac.
Cocimiento de quina, . doce onz.
Miel, ... onz. y med.
Méz. (*ra.*)

R. Borax, ... dos á tres drac.
Miel, ... una onz.
Estracto de nuez, . . . med. onz.
Alcohol, ... una á dos onz.
Agua hirviendo, ... una lib.
Méz. (*sw.*)

R. Borax y
Sulfato de cobre, a. . . ocho gr.
Tintura de cochinilla, una drac.
Agua, ... una onz.
Espíritu de coclearia, . dos onz.
Jarabe de frambuesas, . . . c. s.
Méz. (*pie.*)

COLIRIO BORATADO.

Collirium boracicum. (*au.*)

R. Borax, ... med. drac.
Azucar, ... una drac.
Agua de rosas, ... dos onz.

AGUA COSMETICA. (*au.*)

R. Salvado de almendras, dos onz.
Agua de rosas y
—— de azahar, a. . . ocho onz.
Hágase emulsion y añádase

Tintura de benjui, . . dos drac.
Borax, ... una drac.

SUB-PROTO-FOSFATO DE SODIO.

Sub-fosfato de protoxido de sodio, Sub-fosfato de sosa, Sal admirable perlada; Phosphas sodæ, s. *natricum*, *Soda phosphorata*, *Natrum phosphoricum*, s. *oxiphosphorides*, *Alcali minerali phosphoratum.* (am. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fe. fi. han. o. po. pr. s. su. *br. c. sw. vm.*)

R. Acido fosfórico, ... una pt.
Agua, ... ocho pt.
Echese poco á poco en la mezcla
Solucion de sub-carbonato de sosa, c. s.
ó hasta que quede un ligero esceso de álcali; filtrese el líquido, evapórese, déjese cristalizar y consérvense los cristales en un sitio muy seco. (an. b. d. han. o. po. pr. s. *br. sw.*)

R. Sobresulfato de cal, . . . c. s. q.
Sub-carbonato de sosa, . . . c. s.
para saturar todo el ácido; decántese el líquido claro, evapórese hasta que señale 25.° del areómetro, y déjese cristalizar. (am. b. ba. be. du. ed. f. fe. fi. su. *c. vm.*)

Purgante suave. — Dósis; de med. á onz. y med. en caldo de carne.

POCION LAXANTE.

Mixtura natri phosphorici. (*au.*)

R. Fosfato de sosa y
Jarabe de altea, a. . . med. onz.
Agua, ... cuatro onz.
Para tomar en varias veces, de hora en hora.

FOSFATO DE SOSA Y DE AMONIACO.

(ba.)

R. Sub-fosfato de sosa, . . seis pt.
Lícuese á un fuego suave en
Agua destilada caliente, dos pt.
teniendo en disolucion
Sal amoniaco, ... una pt.
Déjese la solucion en un sitio fresco por veinte y cuatro horas, retírese despues y séquense los cristales que se hayan formado.

SOBRE-PROTO-SULFATO DE SODIO.

Sobresulfato de protoxido de sodio, Sulfato ácido ó acídulo de sosa; Sulphas sodæ acidulus. (*sw.* vm.*)

R. Acido sulfúrico y
Agua, a. . . . . cuatro onz.
Añádase á la mezcla
Sub-carbonato de sosa, ocho onz.
Fíltrese y cristalícese.
Purgante. — Dósis; de dos drac. hasta seis.

PROTO-SULFATO DE SODIO.

Sulfato de protóxido de sodio, Sulfato de sosa, Hydrosulfato de sosa (B.), *Sosa sulfatada* (H.), *Sosa Vitriolada* (C.), *Sal admirable de Glaubero, Vitriolo de sosa; Alcali minerali Sulphuricum*, s. *Vitriolatum*, *Natrum Sulphuricum*, *Sal Catharticum*, s. *mirabile Glauberi*, *Soda Vitriolata*, *Sulphas natricus*, s. *sodæ.*

1.° Como se encuentra en el comercio. (a. am. ams. an. b. ba. be. dd. du. e. ed. f. fi. fu. ham. li. lo. o. pp. s. su. ww. *c. g. pa.*)

Se presenta en prismas largos de

seis lados terminados por un vértice diedro, trasparentes, blancos, eflorescentes, de un sabor primero fresco y despues amargo.

2.° Preparado. (a. ams. an. b. be. br. d. du. ed. f. fe. g. han. he. lo. o. p. pr. r. sa. w. *br. pid. sp. sw. vm.*)

R. Residuo de la destilacion del ácido hidroclórico, ... c. s. q.

Disuélvase en tres veces su peso de agua, satúrese el líquido con subcarbonato de sosa, y déjese cristalizar despues de filtrado. (a. ams. b. br. d. du. ed. fe. g. han. he. lo. o. p. pr. r. sa. w. *br. pid. sp. sw. vm.*)

R. Sub-carbonato de sosa, c. s. q.

Disuélvase en agua y échese en el líquido

Acido sulfúrico, ... c. s. para saturar el álcali; evapórese la solucion, y déjese cristalizar. (ams. an. b. be. f. fe.)

Purgante poco irritante á la dósis de una onz. á onz. y med.; y diurético á la de tres á cinco escrp. — Se usa tambien como aperitivo.

POCION PURGANTE.

(b.* ff. ham. pp. *au. ra. sa.*)

R. Sulfato de sosa, . diez y seis pt.
Agua, ... quinientas pt.
Disuélvase. (ff.)

R. Sulfato de sosa, ... una onz.
Agua, ... ocho onz.
Miel pura, ... med. onz.
Disuélvase. (pp.)

R. Sulfato de sosa, . . . med. onz.
Nitro, ... una drac.
Zumo de limon, . . onz. y med.
Jarabe de frambuesas, . dos onz.
Méz. (*sa.*)

R. Sulfato de sosa, ... una onz.
Azucar, ... med. onz.
Zumo de limon, . . . onz. y med.
Cocimiento de corteza verde de nuez, ... med. azumb.
Para tomar á vasos de hora en hora. (*au.*)

R. Sal de Glaubero, ... una onz.
Agua de menta piperita é
Infusion de ruibarbo, a. tres onz.
Ogimiel escilítico, . . . una onz.
Méz. (ham.)

R. Sen, ... tres drac.
Sulfato de sosa, ... dos drac.
Maná, ... una onz.
Agua hirviendo, . . cuatro onz.
Infúndanse y cuélese. (*ra.*)

R. Pulpa de tamarindos, onz. y med.
Agua, ... c. s. para obtener cuatro onz. de cocimiento. Añádase al líquido colado
Sulfato de sosa, . . . med. onz.
Jarabe de rosas solutivo, seis drac.
Méz. (*sa.*)

R. Sulfato de sosa, . . onz. y med.
Maná, ... una onz.
Agua, ... seis onz.
Para tomar á cuch. (*au.*)

R. Sulfato de sosa, . . . dos drac.
——— de magnesia, . una onz.
Infusion de corteza de naranja, ocho onz.
Vino tinto, una pequeña cantid.
Méz. (b.*)

ENEMA PURGANTE. (li. *ra. sa. sy.*)

R. Sulfato de sosa, ... una onz.
Aceite de simiente de lino, dos onz.

Cocimiento de cebada, seis onz.
Méz. (*sy.*)

R. Especies emolientes, . dos onz.
Hojas de sen, ... med. onz.
Sulfato de sosa, ... dos drac.
Agua hirviendo, ... una lib.
Infúndanse y cuélese. (*ra.*)

ra. prescribe tambien dos drac. de sen, med. onz. de sulfato y dos lib. de cocimiento emoliente, ó med. onz. de sen, otro tanto de sulfato, y una lib. de agua; — y li. ocho onz. de cocimiento emoliente, tres onz. de ogimiel y una onz. de sulfato de sosa.

R. Yerba de ruda,
Flores de manzanilla y
—— de sauco, a. . . med. onz.
Agua, ... una lib.
Consúmase la tercera parte por la ebulicion, y añádase al líquido colado
Sal de Glaubero, . . . tres drac.
Ogimiel simple y
Aceite de manzanilla, a. una onz.
Méz. (*sa.*)

APOCEMA DEPURATIVO Y TÓNICO. (*pie.*)

R. Raiz de romaza, . . . una onz.
—— de fresa, ... med. onz.
—— de énula, . . . una drac.
Hojas de achicoria,
—— de perifollo y
—— de berros, a. . . un puñ.
Sulfato de sosa, ... una drac.
Jarabe de achicorias compuesto, una onz.
Para tomar todas las mañanas.

CALDO DEPURATIVO. (*pie.*)

R. Caldo de pollo, . . . med. azumb.
Raiz de romaza, ... dos onz.
Hágase hervir por med. cuarto de hora, y añádase á lo último
Hojas de berros,
—— de torongil y
—— de primavera, a. un puñ.
Cuélese y añádase
Sulfato de sosa, ... dos onz.

APOCEMA LAXANTE. (f. *ca.*)

R. Hojas verdes de achicoria,
———— de buglosa y
———— de borraja, a. una onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjense en infusion por un cuarto de hora, cuélese y añádase al líquido
Sulfato de sosa, ... tres drac.
Jarabe de violetas, . . . una onz.
Méz. ex. (f.)

LOCION ESCITANTE.

Lotio ad tineam. (*sw.*)

R. Sulfato de sosa, ... seis onz.
Jabon blanco, ... tres drac.
Agua de cal, . diez y ocho onz.
Aguardiente, ... seis drac.

SOLUCION SALINA GELATINOSA. (*ca.*)

R. Agua, ... una lib.
Sub-carbonato de sosa y
Cola de Flandes, a. . . una onz.
Sulfato de sosa y
Sal comun, a. . . . . med. onz.
Petroleo, ... veinte got.

POLVOS CATARTICO-DIURETICOS.

Pulvis cathartico-diuretica. (*sw.**)

R. Tártaro estibiado y

Opio, a. . . . . un gr.
Sulfato de sosa, ... dos onz.
Goma arábiga y
Raiz de regaliz, a. . . dos drac.
Para tomar tres ó cuatro veces al dia en un vaso de agua.

SAL DE GUINDRE. (b.* *ca.*)

R. Sulfato de sosa, ... una onz.
Nitro, ... doce gr.
Tártaro estibiado, . . . med. gr.
Purgante. — Se disuelve en med. azumbre de tisana ó de caldo de vegetales y se toma por la mañana.

AGUA FUNDENTE. (*ca.*)

R. Sulfato de sosa, . una á dos onz.
Nitro, ... diez gr.
Tártaro estibiado, . . . med. gr.
Agua, ... dos lib.

AGUA PURGANTE EMETIZADA.

Agua mineral. (ff. *ra.*)

R. Sulfato de sosa, . . . tres drac.
Tártaro estibiado, . . . tres gr.
Agua caliente, ... diez onz.

POCION CATARTICA. (*ca.*)

R. Sulfato de sosa y
Maná en lágrimas, . a. med. onz.
Tártaro estibiado, ... dos gr.
Agua, ... cuatro onz.
Ogimiel escilítico, . . . una onz.
Dósis; una cuch. cada dos horas.

SULFATO DE SOSA Y DE MAGNESIA.

Sulphas sodæ et magnesiæ, Sal Astracanensis artificialis. (*sw.**)

R. Sobre-sulfato de sosa, . c. s. q.
Agua tibia, ... c. s.
para disolver la sal; satúrese con la magnesia calcinada, fíltrese y cristalícese.

Laxante ó diurético, segun la dósis. — Se prescribe de med. á dos drac. muchas veces al dia, hasta una ó dos onz. cada vez.

PROTO-SULFATO DE SODIO.

Sulfito de sosa. (*vm.*)

R. Sub-carbonato de sosa, . una pt.
Agua, ... cuatro pt.
Disuélvase; satúrese de gas ácido sulfuroso, caliéntese en seguida al B. M. tibio y déjese en reposo para que se cristalice.

PROTO-HIPOSULFITO DE SODIO.

Hyposulfito de sosa, Sulfito sulfurado de sosa. (f. *vm.*)

R. Sub-carbonato de sosa, ocho pt.
Agua, ... diez y seis pt.
Añádase á la solucion
Azufre sublimado, . . . una pt.
Hágase pasar al líquido una corriente de gas ácido sulfuroso, fíltrese despues de saturado, evapórese y déjese cristalizar. (f.)

vm. prescribe se haga pasar una corriente de gas ácido hydrosulfúrico á

una solucion de sulfito de sosa, ó una corriente de gas ácido sulfuroso á la del hydrosulfato de sosa.

PROTO-NITRATO DE SODIO.

Nitrato de protoxido de sodio, *Nitrato de sosa*, *Nitro cúbico*, *Nitro romboidal; Nitras sodæ*, s. *natricum*, s. *cubicum.* (b.*)

R. Sub-carbonato de sosa, c. s. q.
Acido nítrico debilitado, . . c. s.
para saturar el álcali; cristalícese la solucion.

Se ha recomendado esta sal en la disenteria.

SOLUCION DE NITRATO DE SOSA.

Solutio nitratis sodæ. (b.*)

R. Nitrato de sosa, . . . med. onz.
Goma arábiga, ... diez gr.
Agua, ... ocho onz.
Dósis; una cuch. de hora en hora.

HIDRO-SULFATO DE SOSA. (*vm.*)

R. Sosa cáustica calcinada, una pt.
Agua, ... seis pt.
Disuélvase; hágase pasar una corriente de gas ácido hydrosulfúrico al líquido, y consérvese así hasta que se haya aclarado por el reposo.

BAÑO SULFUROSO. (*ca.*)

R. Hydrosulfato de sosa, diez onz.
Solucion salina gelatinosa,
cuatro onz.
Mézclese con el agua del baño en el momento que el enfermo vaya á entrar.

PROTO-ACETATO DE SODIO.

Acetato de protoxido de sodio, *Acetato de sosa*, *Acetito de sosa*, *Sal acetosa mineral*, *Tierra foliada mineral; Acetas sodæ*, s. *natricum*, *Alcali minerali acetatum*, *Natrum aceticum*, *Soda acetata*, s. *acetosa*, *Terra foliata mineralis*, s. *tartari crystallisabilis.* (a. ams. b. ba. be. d. f. han. he. li. o. po. pr. r. s. *sw. vm.*)

R. Sub-carbonato de sosa, . c. s. q.
Vinagre destilado, ... c. s.
para saturar el álcali; cuélese el líquido y evapórese hasta la película y déjese enfriar para que se cristalice.

Diurético ó catártico segun la dósis, que es de dos drac. á cuatro.

PILDORAS ANTILÁCTEAS. (*bo.*)

R. Acetato de sosa, . . cinco drac.
Alcanfor y
Nitro, a. . . . . dos drac.
Arrope de sauco, ... c. s.
Háganse ciento y veinte píldoras. — Dósis; dos por la mañana y dos por la tarde.

POLVOS DIURÉTICOS. (*au.*)

R. Acetato de sosa y
Oleosácaro de enebro,
a. . . . . tres drac.
Escila, ... seis gr.
Cálamo aromático, . med. drac.
Opio, ... tres gr.
Divídanse en seis papeles. — Dósis; tres cada dia con una infusion de enebro.

PILDORAS LAXANTES.

Pillulæ è rheo cum natro acetico. (*au.*)

R. Ruibarbo, ...
Acetato de sosa y
Hiel de buey espesada,
a. . . . . una drac.
Goma arábiga, . . . med. drac.
Háganse píldoras de dos gr. — Dósis; de diez á quince dos veces al dia.

PROTO-MECONATO DE SODIO.

Meconato de protóxido de sodio, Meconato de sosa. (fe.)

R. Acetato de sosa, . . . una onz.
Tintura alcohólica de opio,
cuatro onz.

Déjense en digestion por algunos dias; filtrese para separar los cristales que se hayan formado, y purifíquense estos por medio del alcohol hirviendo, que no disuelve el meconato de sosa.

Se ha propuesto esta sal como un remedio cierto contra la ténia; pero se debe usar con mucha circunspeccion, porque es un veneno violento á la dósis de medio grano.

PROTO-OLEO-MARGARATO DE SODIO.

Véase Proto-oleo-margarato de sodio.

SOFIA DE LOS CIRUJANOS.

Agenjo serifio, Asnacho, Arnacho, Serifio de Alemania, Sisimbrio Sofia, Sofia; Sisimbrium Sophia, L.

Sophienkraut, Al.; Sagesse des chirurgiens, F.; flixweed sisimbrum, In.; talitro, I.; herba sophiæ, Por.

f. w. *be. m. sp.*

Planta ánua comun en toda Europa (tetradynamia siliquosa, L.; cruciferas, J.).

Se usa la yerba y la simiente.

La yerba (*herba Sophiæ chirurgorum*) se compone de un tallo redondo, ramoso, un poco velludo, y de hojas alternas, descompuestas y lampiñas.

La simiente es muy pequeña, oval, lisa y de un moreno rojizo. Tiene como la yerba un sabor acre y quemante.

Escitante y antiescorbútica.

SOLDANELA.

Calystegia Soldanella, Rœm y Sch.

Meerkohl, Seekohl, Al.; soldanelle, F.; seabindweed, In.; soldanella, I. Por.

br. f. w. *be. m. sp.*

Planta bienal que crece en Europa en las playas del mar (pentandria monogynia, L.; convolvulaceas, J.).

Se usa la yerba (*Herba Soldanellæ*, s. *Brasicæ marinæ*) que se compone de un tallo ramoso guarnecido de hojas redondas ó reniformes, ensanchadas en forma de corazon por la base, lampiñas y sostenidas por peciolos bastante largos.

Purgante. — Dósis; de un escrup. á drac. y media.

SOMBRERERA.

Sombrerera comun, oficinal, Tusilago mayor; Tusilago petosites, L.

Pestilenzburzel, Pestwurzmæ un lein, Al.; petasite, F.; butterbur, In.; petasite, I.

ba. br. e. f. li. w. *be. br. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en los lugares húmedos del norte de Europa (singenesia polygamia superflua, L.; synanthereas, Cass.)

Se usa la raiz (*radix Petasitidis*, s. *Petasitidis majoris*, s. *vulgaris*, s. *rubentis*) que es ramosa, fibrosa, del grueso de un dedo, morena por fuera y amarilla ó roja por dentro. Tiene un olor fuerte y desagradable y un sabor amargo y repugnante.

SUCINO.

Ambar amarillo, Karabé; Succinum, Ambra flava.

Agtstein, Bernstein, Al.; succin, F.; yellow amber, In.; ambragi alla, succino, I.; alumbre, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *a. c. g. pid. sp.*

Cuerpo sólido de un amarillo mas ó menos subido, blanco, rojo, alguna vez de un moreno rojo casi negro, diafano, trasparente ú opaco, de quebradura escamosa y brillante, susceptible de pulimento, poco duro, frágil, que exhala un ligero olor, que se hace eléctrico cuando se calienta y se quema con una llama amarilla y verdosa, exhalando un humo espeso y un olor fuerte y penetrante que no es desagradable.

POLVOS FUMIGATORIOS.

Pulvis fumalis, s. *ad suffiandum*, s. *pro suffimigio.* (br. li. pp.)

R. Incienso y
Sucino, a. . . . . part. ig.
Háganse polvos gruesos. (pp.)

R. Enebro,
Almáciga y
Sucino, a. . . . . cuatro onz.
Cascarilla, ... una onz.
Háganse polvos gruesos. (li.)

R. Sucino, ... veinte onz.
Incienso, ... diez onz.
Almáciga, ... cuatro onz.
Láudano,
Benjui,
Estoraque,
Leño de Rodas y
Sándalo cetrino, a. . . dos onz.
Pétalos de rosas rojas, cuatro onz.
Flores de espliego, . . tres onz.
Enebro, ... doce onz.
Háganse polvos gruesos. (br.)

TINTURA ETEREA DE SUCINO.

Tinctura succini ætherea, s. *balsamica.* (b.* s. su. w. wu. *sw. vm.*)

R. Sucino amarillo, . . . dos onz.
Eter sulfúrico, ... dos lib.
Déjense en digestion por cuatro dias al B. A. á un calor suave y cuélese. (wu.)

R. Sucino en polvo un poco tostado, dos onz.
Alcohol, . . . siete onz. y med.
Déjense en digestion por algunos dias en vasija tapada, filtrese y añádase

Eter sulfúrico, dos partes y med.
Consérvese. (b.*)

R. Sucino en polvo, un poco tostado, una onz.
Licor anodino mineral, cinco onz.
Déjense en digestion por cuatro dias en vasija tapada y cuélese. *(sw.)*

R. Sucino quebrantado, . . una pt.
Licor anodino mineral, . tres pt.
Déjense en maceracion fria por ocho dias, meneándolo con frecuencia, y filtrese. (s. *vm.*)

su. prescribe una onz. de sucino y cuatro de licor; — w. una onz. de sucino y tres y med. de licor; — y fu. una parte de sucino y seis de licor.

Escitante, reputada por antiespasmódica, nervina, anticatarral y uterina.—Dósis; de quince á treinta gotas con azúcar ó en un vaso de agua.

TINTURA ALCOHOLICA DE SUCINO.

Tinctura, s. *Essentia succini*, s. *alcoholica*, *Alcohol cum succino.* (ams. an. be. br. f. g. han. li. o. pa. po. pr. s. w. *vm.*

R. Sucino blanco pulverizado, una onz.
Alcohol 38.°, ... seis onz.
Déjense en digestion por tres dias á un calor suave; decántese y échese sobre el residuo
Alcohol (38.°), ... dos onz.
Déjense en digestion por dos dias; cuélese, mézclense los dos líquidos y filtrese todo. (an.)

R. Azúcar blanca, ... una pt.
Alcohol (32.°), ... ocho pt.
Déjense en digestion fria por dos dias, cuélese por espresion y filtrese. (be.)

ams. prescribe una parte de sucino, ocho de alcohol (0,835) y ocho dias de digestion á un calor suave; — w. onz. y med. de sucino, seis onz. de alcohol concentrado y algunos dias de digestion fria; — pa. una onz. de sucino, ocho de alcohol concentrado y algunos dias de digestion á un calor suave; — li. y br. una onz. de sucino, una lib. de alcohol y ocho dias de digestion á un calor moderado; — f. una de sucino, diez y seis de alcohol (26.°) y seis dias de digestion seguidos de otros seis de reposo; — y g. una onz. de sucino, diez de alcohol y ocho dias de digestion.

R. Sucino pulverizado y un poco tostado en una paila de hierro, una pt.
Alcohol concentrado, . cuatro pt.
Déjense en digestion por algunos dias á un calor suave en vasija tapada, meneándolo de cuando en cuando y filtrese. (br. han. o. po. pr. s. *vm.*)

Ligero escitante, reputado por anticatarral, balsámico, nervino y vulnerario. — Dósis; de cuarenta á sesenta gotas.

JULEPE SUCINADO.

Julapium succinatum. (g.)

R. Tintura de sucino, . . dos drac.
Azucar, ... una onz.
Agua, ... seis onz.
Méz.

TINTURA DE SUCINO ALCALIZADA.

Tinctura, s. *Essentia succini alcalisata.* (br. sa. w. *sp.*)

R. Sucino en polvo, . . . dos onz.

Sub-carbonato de potasa líquido, med. onz.

Hágase una pasta, séquese y échese encima

Alcohol, ... ocho onz.

ó c. s. para cubrirle tres ó cuatro dedos. Déjese algunos dias en digestion sobre arena tibia y filtrese. (br. sa.)

R. Sucino, ... cuatro onz.

Sub-carbonato de potasa, seis onz.

Tritúrense juntos y añádase

Alcohol, ... diez y seis onz.

Déjense en maceracion por algunos dias y destílense unas ocho onz. de líquido; evapórese el resto hasta la sequedad; échese sobre el residuo el espíritu obtenido primero, y despues de la suficiente digestion filtrese el líquido. (w.)

R. Polvos de sucino y

Sub-carbonato de potasa,

a. . . . . doce onz.

Alcohol concentrado,

veinte y cuatro onz.

Destílese el espíritu y déjese en digestion por ocho dias al B. M. con unos polvos compuestos de

Sucino, ... ocho onz.

Aceite de tártaro por delicuo, c. s. para reducirlo á una pasta, que se hace secar en seguida. Filtrese. *(sp.)*

Escitante, reputada por nervina, anticatarral y resolutiva. — Dósis; de veinte á cuarenta gotas.

RESINA DE SUCINO.

Resina succini. (li.)

R. Sucino, ... dos lib.

Alcohol, ... cuatro lib.

Déjense en digestion por tres dias al B. A., decántese y trátese el residuo del mismo modo con nuevo alcohol, hasta que este no tome color; reúnanse y destílense las tinturas, lávese y séquese suavemente la resina.

ACEITE DE SUCINO.

Oleum succini æthereum, Ætheroleum, s. *Pyroleum succini* (am. ams. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. sa. w. wu. *br. c. pid. sw. vm.)*

R. Sucino quebrantado, . . c. s. q.

Introdúzcase en una retorta de barro enlodada, que se comunique por una alargadera con un grande recipiente tubulado; destílese aumentando el fuego por grados hasta que no pase nada, y sepárese el aceite por medio de un embudo.

No se usa este aceite hasta despues de purificado, y para ello hay muchos procedimientos:

R. Aceite empireumático de sucino, c. s. q.

Llénese la mitad de una retorta y destílese, haciéndole hervir ligeramente hasta que el aceite pase mas colorado. (ba. f.* po. *br. vm.*)

lo. prescribe dos rectificaciones sucesivas; — po. tres; — y g. y wu. cuatro.

R. Aceite de sucino, ... una pt.

Cenizas de leños, ... dos pt.

Destílese suavemente. (br. fe. he. li. pa. w.)

R. Aceite de sucino y

Carbon de leños, a. . . . part. ig.

Destílese en una retorta de vidrio. (fi. fu. su.)

R. Aceite de sucino y

Carbon de leños, a. . . una pt.
Agua, ... seis pt.
Destílese suavemente. (o.)

sa. prescribe greda pura ó cuerno de ciervo calcinado.

R. Aceite de sucino . . . . . una pt.
Agua, ... seis pt.
Destílense cuatro partes y sepárese el aceite del agua. (am. b. be. d. du. ed. han. pr. s. *c. sw.*)

R. Aceite de sucino, . . . una lib.
Agua, ... seis lib.
Destílense suavemente cuatro onz. y cambiese el recipiente.

e. prescribe se repita la destilacion del aceite con doce partes de agua hasta que salga perfectamente claro.

Estimulante, antiespasmódico, nervino, resolutivo, diaforético, diurético y emenagogo. — Dósis; de cinco á quince gotas. — Es poco usado.

OLEOSACARO DE SUCINO.

Oleo-saccharum succini. (pa. w.)

R. Azucar blanca, ... una onz.
Aceite de sucino, diez y seis got.
Méz. triturando.

BALSAMO DE SUCINO.

Balsamum succini. (w.)

R. Aceite de sucino, . . . una drac.
——— de nuez moscada,
dos drac. y med.

Méz. — Usado al esterior en el histerismo y cefalalgia.

ALMIZCLE ARTIFICIAL.

Moschus artificialis, *Resina succini balsámica*, *Oleum succini oxidatum*, *Succinium oxigenatum.* (am. b.* li. o. su. *br. e. vm.*)

R. Aceite de sucino, ... dos pt.
Acido nítrico, ... seis pt.
Déjese en reaccion por veinte y cuatro horas, y lávese con agua fria. (b.* li.)

am. y *e.* prescriben una parte de aceite y dos de ácido; — o. dos de aceite y cinco de ácido; — *vm.* una de aceite y tres de ácido; — y su. y *br.* una de aceite y cuatro de ácido.

Escitante, recomendado como suplente del verdadero almizcle.

TINTURA DE ALMIZCLE ARTIFICIAL.

Tinctura moschi artificialis, s. *resinæ succini*, s. *succini balsamica.* (b.* li. su. *vm.*)

R. Almizcle artificial, . . . una pt.
Alcohol concentrado, . . ocho pt.
Disuélvase á un calor suave. (b.* li.)

su. prescribe una parte de almizcle y ocho de alcohol; — y *vm.* una de almizcle y diez y seis de alcohol.

Escitante, aconsejado en la epilepsia. — Dósis; cuarenta gotas.

TINTURA FETIDA DE SUCINO. (fe.)

R. Aceite de sucino rectificado,
dos drac.
Sub-carbonato de potasa y
Jabon medicinal, a. . . una drac.
Alcohol, ... cuatro onz.
Al cabo de algunos dias filtrese.

Echando algunas gotas de este líquido en amoniaco se obtiene una especie de *Agua de Luce.*

POCION ESPECTORANTE. (*e.*)

R. Aceite de sucino, . . ochenta got.

Goma arábiga y
Azucar, a. . . . . med. onz.
Tintura de bálsamo de Tolú,
dos drac.
Agua, ... cuatro onz.

Dósis; una cuch. cada dos ó tres horas en la tos espasmódica.

LICOR ANODINO SUCINADO.

Liquor succinicus anodynus. (sw.)

R. Espíritu oleoso de sucino rectificado, ... lib. y med.
Acido sulfúrico concentrado,
med. lib.

Destílese una lib. en una retorta de vidrio. —Alabado por los alemanes en la epilepsia. —Dósis; de veinte á treinta got. en jarabe de agenjos ó de menta.

SUERO.

Nombre vulgar de la parte serosa de la leche.

SUERO EN POLVO. (b.* br.)

R. Azúcar de leche, . . . dos drac.
——— blanca, . . . una onz.
Goma arábiga, . . . med. drac.

Méz. —Lícuese si es necesario en agua.

SUERO DULCE DE HOFFMANN.

Serum lactis dulce Hoffmanni. (br.)

R. Leche de vacas, ... c. s. q.

Evapórese hasta la sequedad, en un perol de cobre bien estañado, á un fuego manso, mencando sin cesar, quítese la parte acitosa que sobrenada ordinariamente, añádase despues tanta agua hirviendo como leche se haya empleado, hiérvase un poco á fuego manso y fíltrese.

SUERO DULCE.

Serum lactis dulce, s. *sincerum.* (b.* e. f. fe. fu. he. li. p. su.)

R. Leche hirviendo, . . . una lib.
Cuajo deluido en agua, una drac.

Hiérvase, cuélese y añádase tres claras de huevo batidas, hágase dar al todo un hervor y cuélese por un lienzo. (b.* fe. fu. he.)

R. Leche de vacas, . . . dos mil pt.
Cuajo diluido en un poco de agua,
dos part. y med.

Póngase todo sobre rescoldo; cuando la leche principie á cuajarse aumént ese el fuego por grados, sin que llegue á hervir, para que la parte caseosa se reuna mas y mas; múdese el suero á otra vasija, póngase á escurrir el coágulo sobre un zarzo de mimbres y recójase el líquido que fluya para reunirle con el otro. (f. li. p. su.)

e. remplaza el cuajo por las flores de alcachofa.

SUERO CALIBEADO.

Serum lactis chalybeatum. (br.)

R. Suero, ... c. s. q.

Apáguese en él muchas veces un hierro encendido y fíltrese en seguida.

SUERO VINOSO.

Serum lactis vinosum. (br. fu. he. li. p. *au. br. e. sa. sm. sw.*)

R. Leche de vacas, . una azumbre.
Vino blanco un poco ácido,
ocho onz.

Hágansé hérvir juntos, cuélese despues de la coagulacion y clarifíquese. (br. fu. he. *sm.*)

li. prescribe tres partes de leche y una de vino; —y *e.* un cuartillo de leche y una ó dos onz. de vino blanco.

R. Leche de vacas y
Agua, a. . . . . dos lib.
Vino del Rhin, . . onz. y med.

Hiérvase, cuélese y clarifíquese despues de la coagulacion. (*sw.*)

R. Suero, ... cuatro onz.
Vino blanco, ... ocho onz.

Háganse hervir un poco, cuélese y clarifíquese con clara de huevo. (*sa.*)

p. y *sm.* prescriben ocho onz. de leche y dos lib. de vino; —y *au.* tres lib. de suero y una de vino.

SUERO ACIDO.

Serum lactis acidum, s. *tartarisatum*. (b.* br. c. f. ff. fu. han. he. li. p. *su. ra. sp. vm.*)

R. Leche de vacas, . . una azumbre.
Cremor tártaro, . . cuatro escrp.

Hágase hervir la leche, y en seguida échese la sal, sepárese del fuego, menéese con una espátula en todas direcciones y muy lentamente el líquido, déjese reposar y despues de frio cuélese por una franela; bátase una clara de huevo en el líquido colado, vuélvase á poner al fuego, y al primer hervor échese sobre el residuo que quedó aparte. (b.* br. ff. he. *sp. sm.*)

li. prescribe diez y ocho partes de leche y una de cremor tártaro; —y fu. treinta y seis de leche y una de cremor tártaro.

Se puede tambien emplear en lugar del cremor tártaro un poco de vinagre ó de zumo de limon. (han. he. *ra.*)

R. Suero, ... cuatro lib.
Claras de huevo . . . . . n.° 3.
Cremor de tártaro,
veinte y cuatro gr.

Bátanse las claras de huevo con un poco de suero, añádase lo restante de este y hágase hervir; cuando principie la ebulicion échese poco á poco el cremor de tártaro meneando el líquido, cuélese en seguida y fíltrese. (e. f. pa. *su.*)

SUERO AVINAGRADO.

Serum lactis acetosum. (*sa. sw.*)

R. Leche de vacas y
Agua de fuente, a. . . . dos lib.
Hiérvase y añádase
Vinagre, ... onz. y med.

Despues que se forme el coágulo, cuélese.

SUERO COMPUESTO.

Serum lactis compositum. (br.)

R. Suero ácido, . . dos lib. y med.
Zumo reciente de cidra, una onz.
Conserva vitriolada de rosas,
seis drac.

Méz.

SWIETENIA FARM.

Se usan en medicina dos especies de este género de plántas:

1.° *Caoba*, *Caobana*, *Leño de Acajú*; *Swietenia Mahagoni*, L. (d. *br. g. m.*)

Arbol grande de la América meridional (decándria monogynia, L.; meliaceas, J.)

Se usa la corteza del tronco y de

las ramas, *cortex ligni Mahagoni*) que son pedazos cuasi planos, de un pie de largo, ásperos y de color gris moreno. La de las ramas son pedazos arrollados, del largo de una mano ó menos, de color gris, blanquecino y claro por fuera y de un rojo moreno obscuro al interior, inodoras y dotadas de un sabor muy astringente y un poco amargo.

2.º *Swetenia febrifuga*, Roxb.

d. du. *c. g.*

Arbol de la costa de Coromandel.

Se usa la corteza (*cortex Soymidæ*) que se presenta en pedazos de diferentes dimensiones, de uno á dos pies de largo, sobre una á ocho pulgadas de ancho, y de un grueso mediano. Está cubierta de un epidermis delgado, áspero, de color gris ceniciento y con puntos; es de color de fuego, quebradiza, compacta y susceptible de pulimento. Tiene un olor agradable, un poco aromático, y un sabor amargo astringente y algo balsámico.

Es febrífuga. —Dósis del polvo; un escrúpulo.

TABACO.

En medicina se usan dos especies de este género de plantas:

1.º *Tabaco, Tabaco oficinal, macho, Nicociana; Nicotiana Tabacum*, L.

Toback, Al.; Tabacco, In.; Tabac ordinaire, F.; Tabaco, I. Por.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed f. fe. ff fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po pp pr r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa pid. sp. z.*

Planta ánua originaria de la América meridional (pentandria monogynia, L.; solanos, J.).

Se usan las hojas (*herba Tabaci*, s. *Nicotianæ*) que son muy grandes, sentadas, algo decurrentes por la base, ovales, lanceoladas, agudas, muy enteras y casi lampiñas; que son verdes cuando estan frescas, y adquieren un color leonado cuando se secan. Su olor es fuerte y desagradable, y el sabor acre, nauseabundo y narcótico.

Segun Vauquelin contienen un principio cristalino particular, la *Nicotianina* ó *Nicotica*, *Nicotianinum*, que Hermbstaedt ha llegado á obtener puro ó aislado.

2.º *Tabaco rústico; Nicotiana rústica*, L.

f.

Planta ánua originaria de América.

Se usan las hojas (*folia Nicotianæ rusticæ*, s. *minoris*) que son ovales, enteras, obtusas y algo acorazonadas.

Tambien contienen nicotianina.

El tabaco es un irritante violento y aun venenoso á grande dósis; que produce vómitos, deyecciones albinas sanguinolentas, y accidentes nerviosos, como vértigos y somnolencia, la aceleracion del pulso, la diaforesis, diuresis, &c.

Sin hacer mencion del uso que generalmente se hace de él como errino y masticatorio, se ha administrado en los catarros crónicos é hidropesías. Aplicado en lavativas es útil para destruir las ascárides vermiculares, y para producir en los intestinos grue-

sos una irritacion saludable, particularmente en la asfixia y apoplegía. Tambien es útil al esterior contra la tiña y la sarna. — Dósis en polvo; de medio grano á cinco.

POLVOS ESTORNUTATORIOS.

Pulvis sternutatorios. (he. *pid.*)

R. Hojas de tabaco,
——— de mejorana y
Flores de espliego, a. . una onz.
Háganse polvos muy finos.

POLVOS CEFÁLICOS. (*bo.*)

R. Tabaco rapé, ... med. onz.
Polvos de mejorana,
——— de lirio de los valles y
——— de maro, a. . med. drac.
——— de castaña de Indias,
una drac.
Méz.

PÍLDORAS DE TABACO. (su. *au. vm*)

R. Estracto de tabaco, . una drac.
——— de regaliz, . . una onz.
Vinagre escilítico, ... c. s.
para hacer ciento y ochenta píldoras.

vm. sostituye la raiz al estracto de regaliz, prescribiéndola en igual cantidad que el estracto de tabaco.

R. Estracto de tabaco, . . una pt.
——— de regaliz y
Zumo de regaliz, a. . . tres pt.
Polvos de regaliz, ... dos pt.
Hágase masa para píldoras. (*vm.*)

R. Polvos de hojas de tabaco de Virginia y
Conserva de rosas, a. una drac.
Mucílago de goma arábiga, c. s.
para hacer sesenta píldoras. — Dósis; de una á tres, dos ó tres veces al dia.

Estas píldoras pasan por diuréticas y útiles en la hidropesía.

ESTRACTO DE TABACO.

Extractum tabaci, s. *nicotianæ.* (fi. fu. s. su. wu. *vm.*)

R. Hojas frescas de tabaco, c. s. q. Macháquense en un mortero de piedra; esprímase el zumo y evapórese en seguida al B. M. hasta la consistencia necesaria. (wu.)

R. Hojas frescas de tabaco, c. s. q. Macháquense en un mortero; esprímase el zumo, y evapórese este sin quitar la espuma hasta que sea suficiente añadir una cuarta parte de hojas secas de tabaco para darle la consistencia de estracto. (fi.)

R. Hojas de tabaco y
Agua fria, ... una pt.
Despues de doce horas de maceracion añádase
Agua hirviendo,
doble peso de la masa total.
Cuélese despues de frio; clarifíquese con clara de huevo; póngase al fuego, y cuando el líquido empiece á espesarse cuélese por un cedazo y evapórese lo necesario meneando continuamente. (s. *vm.*)

R. Hojas frescas de tabaco, una pt.
Agua comun, ... dos pt.
Hiérvase un poco á fuego manso, y cuélese por espresion; hiérvase todavía el resíduo con otra agua y cuélese del mismo modo; reúnanse los dos líquidos y evapórense. (su.)

fu. prescribe que se hierva una lib. de tabaco en ocho de agua y que se esprima; que se ponga despues en maceracion el resíduo en agua fria; que se esprima tambien, y que despues de reunidos los líquidos se dejen evaporar.

Dósis; de tres á seis gr.

ESTRACTO DE TABACO MITIGADO.

(br. han. li. w. *vm.*)

R. Hojas de tabaco, . . . c. s. q.

Príveselas de todo su principio acre mediante infusiones repetidas en agua fria; échese sobre el resíduo el duplo de su peso de agua hirviendo; esprímase despues de frio; clarifíquese con clara de huevo y evapórese hasta la consistencia de estracto. *(vm.)*

br. li. y w. prescriben que se ponga en infusion y que se cueza despues una lib. de hojas privadas de su acritud en diez lib. de agua hasta que se consuma la mitad.

Es escitante, aconsejado en el asma.

COCIMIENTO DE TABACO.

Decoctum tabaci, s. *nicotianæ*. *(sw.)*

R. Hojas secas de tabaco,
dos á cuatro drac.
Agua hirviendo, ... una lib.

Hiérvase por algunos minutos; déjese despues en digestion por una hora y cuélese.

Para enemas en el ileo, el estreñimiento pertinaz, y las lombrices ascárides. — Aconsejado tambien por Justamond en lociones en la tiña, usándole con precaucion para que no produzca náuseas y vómitos.

AGUA ANTIPSÓRICA. (fe.)

R. Hojas secas de tabaco, . dos lib.
Agua, ... quince lib.

Hiérvase por una hora y añádase

Sub-carbonato de sosa,
cuatro onz.

Cuélese despues de veinte y cuatro horas. — Dósis; cuatro onz. para cada friccion.

INFUSION DE TABACO.

Infusum tabaci, s. *nicotianæ tabaci.*

(am. b.* lo. *c.*)

R. Hojas de tabaco, . . una drac.
Agua hirviendo, . dos cuartillos.

Déjese en maceracion por una hora en una vasija medio tapada y cuélese. (am. lo. *c.*)

R. Hojas de tabaco, . . . dos drac.
Agua hirviendo, . . cuatro onz.

Déjese en infusion al B. M. por cuatro horas; cuélese por espresion y añádase

Alcohol, ... una onz.

Méz. ex. (b.*)

Es escitante, alabada en el asma é hidrotorax. — Dósis; de veinte á cuarenta got.

Fowler prescribia una infusion que se prepara poniendo en digestion al B. M. por una hora una onza de tabaco de Virginia en una lib. de agua hirviendo y despues de colado por espresion, añadiendo dos onz. de alcohol por catorce de líquido colado. Recomendaba este líquido en el asma y la disuria, á la dósis de sesenta á cien got. para los adultos. — Marryat acon-

seja contra la tiña otra preparacion compuesta de dos onz. de tabaco puestas en infusion en diez y seis de agua de fuente, y añadiendo al líquido despues de colado una drac. de potasa líquida. Con esta agua se fomentan las úlceras despues de cortado el pelo, untando al mismo tiempo la cabeza por mañana y tarde con un ungüento compuesto con una onz. de ungüento amarillo, y una á dos drac. de mercurio dulce.

JARABE DE TABACO.

Syrupus de nicotiana. (b.* br. fu. li. w. *bo. pie. sp.*)

R. Zumo de hojas de tabaco, dos lib.
Hidromel simple, . . lib. y med.
Ogimiel simple, . . cuatro onz.

Déjese en digestion por dos ó tres dias al B. M. ó en un sitio templado; decántese el líquido claro, déjese en reposo por veinte y cuatro horas, y añádase

Azucar blanca, ... tres lib.

Hágase jarabe. (w.)

br. trae el mismo procedimiento, pero prescribe que se haga un cocimiento con seis onz. de tabaco en seis lib. de agua de fuente hasta quedar reducidas á dos.

sp. y b.* prescriben cuarenta y ocho onz. de zumo de tabaco, cuatro de ogimiel, doce de hidromel y cuarenta y ocho de azucar; — y *be.* y *pie.* tres onz. de zumo, cuatro de ogimiel, una de hidromel y dos de azucar.

R. Hojas secas de tabaco, med. onz.
Agua, ... seis onz.

Hágase hervir por una hora, arrójese el líquido y añádase al residuo

Raiz de regaliz, . . . una onz.
Agua hirviendo, . . . doce onz.

Cuézase hasta que se consuma la cuarta parte, cuélese por espresion y añádase al líquido

Miel despumada, . . . ocho onz.

Cuézase hasta que adquiera la consistencia de jarabe. (fu. li.)

ENEMA IRRITANTE. (b.* ff. *e. ra.*)

R. Hojas de tabaco, . . . una drac.
Agua hirviendo, ... c. s.

para obtener ocho onzas de líquido. (b.* *e.*)

R. Hojas de tabaco. . . . . una onz.
Agua, ... dos lib.

Hiérvase ligeramente, y añádase al líquido despues de colado

Tártaro estibiado, . . . doce gr.

Disuélvase. (ff. *ra.*)

FOMENTO ESCITANTE.

Lotio nicotianæ. (au. ra.)

R. Hojas de tabaco, . . . dos onz.
Agua, ... una lib.

Hiérvase y cuélese. — Marryat y Niemann alaban este líquido en la tiña, usado en lociones.

GOTAS DIURÉTICAS.

Guttulæ diureticæ. (ham.)

R. Hojas de tabaco, . . . una drac.
Agua hirviendo, ... c. s.

para una onza de infusion; cuélese y añádase al líquido

Agua de canela vinosa, med. onz.

CATAPLASMA EMÉTICA. (*e.*)

R. Hojas de tabaco, . . . una onz.

Agua, ... c. s.
para hacer una cataplasma, que se aplica á la region del estómago cuando no se pueden administrar vomitivos por la boca.

VINO DE TABACO.

Vinum tabaci, s. *nicotianæ*, s. *nicotianæ tabaci.* (am. b.* ed. p. *au. c. sw. vm.*)

R. Hojas de tabaco, . . . una pt.
Vino blanco de España, doce pt.
Déjese en maceracion por ocho dias y filtrese. (am. b.* ed. p. *au. c. sw.*)

vm. prescribe dos drac. de tabaco y treinta onzas de vino.

Es escitante enérgico, aconsejado en las hidropesías. — Dósis; de cinco á treinta got. en vehículo conveniente.

TINTURA DE TABACO. (*au. hp.*)

R. Hojas de tabaco, ... dos onz.
Alcohol, ... una lib.
Cuélese despues de tres dias de infusion. (*hp.*)

au. prescribe una onz. de tabaco de Virginia y una lib. de aguardiente.

Es un diurético útil en la hidropesía. — Dósis; de cincuenta á noventa gotas tres veces al dia.

POCION DIURÉTICA. (*au.*)

R. Ogimiel colchico,
——— escilítico,
Eter nítrico y
Tintura de tabaco, a. . . pt. ig.
Dósis; una cuchta. cuatro veces al dia en la hidropesía.

VINAGRE DE TABACO.

Acetum nicotianæ. (wu.)

R. Hojas secas de tabaco, una onz.
Clavos de especia, ... n.º 6.
Vinagre, ... una lib.
Déjese en digestion por cuatro dias á un calor suave y cuélese.

OGIMIEL DE TABACO.

Oxymel tabaci. (wu.)

R. Vinagre de tabaco, . . una pt.
Miel blanca, ... dos pt.
Cuézase á fuego manso hasta la consistencia de jarabe.

ACEITE DE TABACO.

Oleum nicotianæ. (f. w.)

R. Hojas frescas de tabaco, una lib.
Aceite comun, . diez y seis onz.
Cuézase hasta que se consuma la humedad, y esprímase. (w.)

f. prescribe que se deje en digestion por veinte y cuatro horas sobre ceniza caliente una lib. de tabaco en dos de aceite comun, y que se esprima; que se repita segunda vez la operacion con nuevas hojas, que se cueza ligeramente y que se esprima.

Es escitante alabado en la sarna, sabañones, paralísis y tumores indolentes.

LINIMENTO DE TABACO.

Linimentum tabaci. (am. *c.*)

R. Hojas de tabaco, . . . una onz.

Manteca de puerco, . . una lib.
Cuézase hasta que se deshagan las hojas, y cuélese por espresion.

UNGUENTO DE TABACO.

Ungüento antiescrofuloso. (br. sa. w. wu. *au. pie. sp. vm.*)

R. Hojas de tabaco, . . . tres lib.
Zumo de tabaco , . . nueve onz.
Manteca de puerco , . lib. y med.
Despues de doce horas de maceracion cuézase lentamente hasta que se consuma la humedad, cuélese por espresion y añádase
Resina comun , ... tres onz.
Cera amarilla, . . . onz. y med.
Polvos de aristoloquia redonda, tres onz.
Méz. (br. sa. w. wu. *pie. sp.*)

au. prescribe tres onz. de zumo de tabaco, otro tanto de cera amarilla, onz. y med. de resina, una de trementina y c. s. de aceite de mirra.

Aceite empireumático de tabaco, una pt.
Colofonia, ... dos pt.
Fécula verde de tabaco, cuatro pt.
Manteca de puerco, . . doce pt.
Disuélvase á fuego manso la fécula en la manteca; añádase la colofonia y al tiempo de enfriarse incorpórese con el aceite. (*vm.*)

R. Fécula verde de tabaco, una pt.
Manteca de cerdo , . . cinco pt.
Disuélvase. (*vm.*)
Aconsejado en las escrófulas, la sarna, la tiña y las úlceras atónicas.

UNGUENTO DEPURATIVO.

Unguentum mundificans Poterii. (*sp.*)

R. Hojas de tabaco , . . . seis puñ.
Manteca de vacas, veinte y cuatro onz.
Trementina , ... cuatro onz.
Déjese al sol por ocho dias, esprímase despues, cuélese y añádase al líquido
Polvos de goma amoniaco y
—— de gálbano , a. . dos onz.
Antimonio crudo y
Cinabrio , a. . . . . tres drac.
Incienso y
Mirra, a. . . . . dos drac.
Aconsejado para la curacion de las úlceras fistulosas.

CERATO DE TABACO.

Ceratum tabacinum. (b.*)

R. Jugo de tabaco y
Cera amarilla , a. . . . tres onz.
Resina comun , . . onz. y med.
Aceite de mirra, ... c. s.
Recomendado por Cronsbruch en los herpes sin inflamacion ni dolor.

EMPLASTO DE TABACO.

Emplastrum de nicotiana. (*sp.*)

R. Hojas de tabaco, . . cuatro onz.
Aceite comun , ... doce onz.
Vino tinto , ... cinco onz.
Cuézase hasta que se consuma la humedad, esprímase y añádase
Cera amarilla y
Colofonia, a. . . . . doce onz.

Despues de licuadas, añádase todavía

Polvos de tacamaca,
——— de elemi,
——— de mirra y
——— de aloes , . . . una onz.
Aceite esencial de tabaco, dos onz.

Triller dice que este emplasto aplicado al vientre produce evacuaciones alvinas.

POMADA ANTIPSORICA. (fe.)

R. Polvos de azufre y
——— de tabaco, a. . . dos onz.
——— de cleboro blanco , una onz.
——— de maro y
——— de adelfa, a. . med. onz.
——— de sal comun, cinco drac.
Ungüento rosado , . . . una lib.
Méz. ex.

TACAMACA.

Dos resinas corresponden á este artículo :

1.° *Tacamaca ; Tacamahaca.*

Hackundtack , Al. ; tacamahaca , F.

ams. an. b. br. d. e. f. fe. ff. fu. han. he. o. pr. r. s. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Se presenta en masas irregulares, que parecen formadas por pedazos aglutinados, amarillentas , verdosas, semitrasparentes interiormente, y formando hondas de zonas blanquecinas, agrisadas y farináceas al esterior, algo friables, de olor aromático parecido al de tremeutina, y de sabor poco manifiesto, que se hace acre despues de algun tiempo.

Ademas de esta especie ; llamada *Tacamaca comun ó en suerte ; Tacamahaca communis*, s. *in sortis*, se conoce otra denominada *Tacamaca sublime; Tacamahaca sublimis*, s. *in testa*, que se presenta en lágrimas ó pequeños granos de color gris blanquecino esteriormente y amarillento ó rojizo por dentro.

Esta resina fluye de las incisiones hechas en la corteza del *Fagara octandra*, L. (octandria monogynia , L.; terebintaceas , J.) árbol de la América meridional, y segun dicen, tambien del Madagascar. Se ha atribuido falsamente al *Populus balsamifera*, L., árbol del norte de los dos continentes (dioecia octandria, L.; amentaceas, J.) que da una resina olorosa llamada *Bálsamo focot* ó *Tacamaca de la América septentrional*, á no ser que esta última sustancia sea producida como creen algunos autores por el *Calophyllum inophyllum* , L., árbol de las Indias orientales (polyandria monogynia, L.; guttiferas , J.).

2.° *Tacamaca de la isla de Borbon , Bálsamo verde , Bálsamo de María, de Calaba; Balsamum Mariæ* , s. *viride* , s. *Calaba*, *Oleum Mariæ.*

Mariembalsim, Al. ; cast indian balsam, In.; tacamahaca de l'isle de Bourbon , F.

e.

Es una masa blanda, glutinosa, de color verde obscuro, de olor muy fuerte , como de ungüento , y que se solidifica lentamente al aire.

Esta resina fluye por las incisiones hechas en el tronco y ramas del *Calophyllum Calaba*, Jacq., árbol de las

Antillas (polyandria monogynia, L.; guttíferas, J.).

Es escitante y resolutiva.

ACEITE DE TACAMACA.

Oleum tacamahacæ. (w.)

R. Tacamaca, ... una pt.
Arena blanca lavada, part. y med.

Destílese al B. A. en una retorta de vidrio, sepárese el aceite del licor ácido que pasa con él, y rectifíquese.

EMPLASTO ESTOMACAL.

Emplastrum stomachicum, s. *de tacamahaca*, s. *tacamahacicum*, s. *de crusta panis.* (br. fu. pa. s. sa. w. *au. sp.*)

R. Tacamaca, ... tres onz.
Carana, ... seis drac.
Bálsamo del Perú y
Trementina, a. . . . onz. y med.

Lícuense á fuego manso. (sa.)

R. Cera amarilla, ... ocho onz.
Trementina, ... una onz.

Lícuense y añádase á la mezcla medio fria

Polvos de tacamaca, . cuatro onz.
—— de bálsamo del Perú y
Aceite esencial de menta rizada, a. dos drac.
———— de clavo, una drac.

Méz. ex. (s. w. *sp.*)

fu. prescribe lib. y med. de cera, med. lib. de trementina, tres onz. de tacamaca, otro tanto de nuez moscada, med. onz. de bálsamo del Perú y dos drac. de aceite de menta rizada; — y *vm.* sesenta y cuatro partes de cera, ocho de trementina, treinta y dos de tacamaca, una de aceite de clavo, dos de aceite de nuez moscada y dos de bálsamo del Perú.

R. Gálbano,
Tacamaca,
Cera amarilla,
Asafétida,
Cominos y
Trementina, a. . . . . pt. ig.

Hágase emplasto. (*au.*)

R. Tacamaca, ... una onz.
Almáciga y
Estoraque calamita, a. med. onz.
Macias,
Nuez moscada y
Clavo de especia, a. . . una drac.
Bálsamo del Perú, . . dos drac.
Aceite esencial de alcaravea y
———— de menta, a. veinte got.
Cera amarilla, . . . cuatro onz.
Trementina, ... dos onz.

Hágase emplasto. (br.)

R. Corteza de pan tostada, dos onz.
Tacamaca, ... una onz.
Almáciga,
Clavo de especia,
Nuez moscada y
Aceite de yerba buena,
a. . . . . med. onz.
Cera amarilla, ... seis onz.
Trementina,
Aceite de almáciga y
—— de membrillo, a. una onz.

Hágase emplasto. (pa. w. *sp.*)

Este emplasto se aplica al epigastrio para contener el vómito y la diarrea, como igualmente para espeler los gases y corregir las enfermedades que se creen depender de la debilidad del estómago.

TALICTRO.

Thalictrum flavum, L.

Wiesenraute, Al.; common meadow rue, In.; pigamon, F.

br. f. g. *br. m. sp.*

Planta bienal comun en todos los prados de Europa (polyandria polygynia, L.; renonculaceas, J.).

Se usa la raiz (*radix Thalictri flavi*, s. *magni*, s. *Rhabarbari pauperum*) que cuando está fresca es de un color pardo claro y mas obscuro despues de seca, amarilla por dentro, y llena de un zumo que al principio es dulzaino y despues amargo y acre. Tiñe de amarillo los escrementos, la saliva y la orina.

Es purgante. — Dósis; de una á dos onzas.

TAMARINDO.

Tamarindus indica, L.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed f. fe fi. fu ham. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp.* z.

Arbol hermoso de las Indias Orientales (triandria monogynia, L.; leguminosas J.).

Se usan los frutos llamados *Tamarindos* (*Tamarindi*, *Fructus tamarindorum*) que son unas baynas largas, un poco comprimidas, de tres á cinco pulgadas de largo, de color gris obscuro, llenas de una pulpa espesa, que contiene muchas simientes bastante grandes, relucientes, angulosas y comprimidas. Esta pulpa tiene la consistencia blanda y glutinosa, y es de un moreno que tira á negro, su olor es vinoso, y su sabor agradable que con el tiempo se vuelve nauseoso.

Contiene, segun Vauquelin, almidon, azúcar, gelatina (ácido pectico) goma, ácido cítrico, sobre-proto-tartrato de potasio, ácido tartarico y ácido málico.

PULPA DE TAMARINDOS.

Pulpa tamarindorum. (ams. an. b. ba. be. br. d. f. fi. fu. han. he. o. p. pa. po. pr. s. su. w. wu. *pid. sp. sw. vm.*)

R. Tamarindos, ... c. s. q.

Triturense con agua hasta reducirlos á una masa homogénea, frótese esta sobre el reverso de un cedazo de cerda con una espátula de madera, quítese la pulpa que pase con otra espátula de plata y consérvese en un bote tapado con carton. (an. b. be. *vm.*)

ams. y f. prescriben la trituracion con agua hirviendo; — y p. que se reblandezcan antes por la ebulicion en agua.

R. Tamarindos, ... c. s. q.

Triturense con un poco de agua hirviendo, cuélese por un cedazo de seda, evapórese hasta la consistencia de miel, añádase una sesta parte de azúcar y continúese la evaporacion hasta la consistencia de pulpa. (han. o. po. pr. s. *sw.*)

br. he. pa. w. y *pid.* prescriben dos partes de pulpa y una de azúcar; — d. r. y wu. tres de pulpa y una de azúcar; — *sp.* cuatro de pulpa y una de azúcar; — y fi. veinte y cuatro de pulpa y una de azúcar.

R. Tamarindos machacados, . c. s. q.
Agua, ... c. s.

Háganse hervir por algun tiempo, cuélese por una manga, añádase á cada lib. de líquido colado med. onz. de limaduras de hierro, déjese en reposo por veinte y cuatro horas, decántese la parte clara, métase en ella una plancha de hierro pulimentada, y si no se deposita alguna partícula de cobre en la superficie de esta lámina evapórese el líquido hasta la consistencia de miel; añádase entonces tres onz. de azúcar blanca á cada lib. de cocimiento y evapórese despues hasta la consistencia de pulpa. (fu. li.)

Laxante, refrigerante, antiséptica y antialcalina. — Dósis; de dos drac. á dos onz.

CONSERVA DE TAMARINDOS.

Conserva tamarindorum. (p.)

R. Pulpa de tamarindos, . una pt.
Azúcar blanca en polvo, . dos pt.
Méz. ex.

INFUSION DE TAMARINDOS.

Infusum tamarindorum. (ca.)

R. Tamarindos, . . una á dos onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.

Déjense en infusion por diez minutos y cuélese sin esprimir.

BEBIDA LAXANTE. (*ca.*)

R. Tamarindos, ... dos onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.

Dilúyase y añádase al líquido colado
Miel despumada, . . . una onz.

INFUSION DE TAMARINDOS COMPUESTA.

Infusum tamarindorum compositum. (br. p.)

R. Pulpa de tamarindos y
Maná, a. . . . . una onz.
Corteza de naranja, . . . dos drac.
Agua hirviendo, . . . ocho onz.

Déjense en digestion hasta la disolucion de la pulpa y el maná, y cuélese. (p.)

R. Tamarindos sin simientes, med. lib.
Oleosacaro de cidra, . . una onz.
Zumo de limon, . . . med. onz.
Cremor de tártaro, . . dos drac.
Agua hirviendo, . . . ocho lib.

Infúndase y cuélese. (br.)

Es laxante.

COCIMIENTO DE TAMARINDOS.

Decoctum tamarindorum. (an. b.* f. fu. *vm.*)

R. Tamarindos, ... dos onz.
Agua comun, ... tres lib.

Hiérvase por un cuarto de hora y cuélese. *(ra.)*

R. Tamarindos, . . una ó dos onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.

Háganse hervir por espacio de media hora, cuélese sin esprimir y añádase

Jarabe de culantrillo, . una onz.
Méz ex. (f.)

b.* prescribe dos onz. de tamarindos, cuatro lib. de agua reducidas á tres, y onz. y med. de jarabe de frambuesas.

R. Tamarindos, ... una onz.
Pasas de Corinto, . . . dos onz.
Agua, ... c. s.

para obtener diez y seis onz. de líquido colado; hágasele dar algunos hervores y cuélese sin esprimir. (*om.*)

an. prescribe dos onz. de tamarindos, cuatro onz. de pasas y dos lib. y med. de agua para obtener dos lib. de líquido colado.

R. Pulpa de tamarindos, . dos onz.
Agua, ... cuatro lib.
Cuézase hasta que se consuma una cuarta parte y añádase
Nitro, ... tres drac.
Arrope de grosellas, . onz. y med.
Méz. ex. (fu.)
Para tomar á vasos.

COCIMIENTO DE TAMARINDOS COMPUESTO.

Decoctum tamarindi compositum. (wu. *sw.**)

R. Tamarindos y
Pasas de Corinto, a. . . tres onz.
Agua hirviendo, ... c. s.
para obtener por la ebulicion tres lib. de líquido colado. Añádase á este
Tártaro estibiado, . . . med. gr.
Jarabe de moras, . . onz y med.
Méz. (*sw.**)

R. Tamarindos, ... seis onz.
Cremor de tártaro, . . tres drac.
Agua de fuente, ... c. s.
para obtener despues de la ebulicion una libra de líquido colado. Añádase á este
Hojas de sen y
Ruibarbo, a. . . . drac. y med.
Déjese en digestion por cuatro horas y disuélvase despues en el líquido
Maná escogido, ... diez drac.
Cuélese y añádase
Eter sulfúrico, ... seis got.
Méz. ex. (wu.)
Dósis; de dos á cuatro onz. cada hora.

SUERO TAMARINDADO.

Serum lactis tamarindatum, s. *temperans.* (han. *au. b. sw.*)

R. Leche de vacas, ... dos lib.
Tamarindos, ... dos onz.
Hiervanse juntos y cuélese despues el suero. (han. *sw.*)

li. y *au.* prescriben se hiervan cuatro partes de suero con una de tamarindos y que se cuele; — y *b.* onz. y med. de pulpa de tamarindos y c. s. de leche para obtener dos lib. de líquido colado.

Acídulo agradable, refrigerante y un poco laxante.

SUERO ANTIESCORBUTICO. (pa. *bo.*)

R. Acedera y
Betónica, a. . . . . un puñ.
Claveles, ... med. puñ.
Tamarindos, ... onz. y med.
Suero clarificado, . . . tres lib.
Déjense en infusion por una hora á un calor suave y añádase al líquido colado
Jarabe de limon y
——— de violetas, a. onz. y med.
Méz. (*bo.*)

R. Tamarindos, ... med. onz.
Acederas, ... puñ. y med.
Betónica y
Perifollo, a. . . . . med. puñ.
Suero, ... tres lib.
Déjense en infusion por una hora

á un calor suave sin dejarle hervir, cuélese por espresion y añádase

Jarabe de zumo de limon,
——— de frambuesas y
——— de violetas, a. una onz.

Méz. (pa.)

Dósis; una onz. de med. en med. hora.

POCION LAXANTE.

Tisana purgante, *Tisana laxante*, *Pocion purgante*; *Potio*, s. *Mixtura laxans.* (fu. ham. *b. pie. sm.*)

R. Tamarindos, ... tres onz.
Agua, ... doce onz.

Redúzcase á diez onz. por la coccion y añádase al líquido colado

Maná, ... dos onz.

Cuélese. (ham.)

R. Pulpa de tamarindos, . una onz.
Agua, ... c. s.

para obtener ocho onz. de cocimiento. Añádase al líquido colado

Cremor de tártaro, . . . una onz.

Para tomar en dos veces. (*b.*)

R. Pulpa de tamarindos, onz. y med.
Sulfato de sosa, ... una onz.
Agua hirviendo, . . . nueve onz.

Añádase á la solucion

Jarabe de maná, ... una onz.

Méz. ex. (fu.)

R. Pulpa de tamarindos y
Maná, a. . . . . dos onz.
Nitro, ... dos drac.
Agua, ... dos lib.

Cuélese la solucion. (fu.)

R. Tamarindos, ... una onz.
Sándalo cetrino, . . . una drac.
Maná; . . . . . dos onz. y med.
Agua. . . . . nueve onz.

Añádase al líquido colado

Tintura acuosa de ipecacuana, una onz.

Méz. (*pie.*)

R. Cremor de tártaro, . . seis drac.
Sal prunela, ... dos drac.
Tamarindos, ... cuatro onz.
Agua, ... med. azumb.

Cuézase por espacio de media hora y añádase al líquido colado

Jarabe de violetas, . . . dos onz.

Méz. ex. (*sm.*)

R. Tártaro soluble, ... dos drac.
Sen mondado, ... tres drac.
Tamarindos, ... una onz.
Regaliz, ... dos drac.
Limon con la corteza, . . n.º ½
Perifollo, ... un puñ.
Escamonea de Montpeller, siete gr.
Agua hirviendo, . dos cuartillos.

Déjese en infusion por doce horas y cuélese por espresion. (*pie.*)

Para tomar á vasos.

ELECTUARIO LAXANTE.

Electuarium laxativum, s. *tamarindorum.* (pa. *w. sw. sy. om.*)

R. Pulpa de tamarindos, cuatro onz.
——— de pasas,
——— de ciruelas y
Hojas de sen, a. . . onz. y med.
Cremor de tártaro, . . seis drac.
Canela é
Hinojo, a. . . . . dos drac.
Aceite esencial de nuez moscada, diez got.
Jarabe solutivo, ... c. s.

Hágase electuario. (w.)

R. Hojas de sen, ... seis onz.

Hinojo, ... dos drac.
Vino blanco y
Agua, a. . . . . dos lib.

Redúzcase á la mitad por la coccion, esprímase y añádase

Pulpa de ciruelas,
—— de pasas,
—— de tamarindos, a. med. lib.
Cremor de tártaro, . . una onz.
Hojas de sen, ... tres onz.
Aceite esencial de anís y
———— de nuez moscada,
a. . . . . med. drac.
Méz. ex. (pa.)

R. Cremor de tártaro, . . una drac.
Sen, ... tres drac.
Maná, ... tres onz. y med.
Pulpa de cañafistola y
—— de tamarindos,
a. . . . . onz. y med.
Jarabe de violetas, ... c. s.
Méz. (*om.*)

R. Pulpa de tamarindos, . tres onz.
Hojas de sen, . . . drac. y med.
Nitro y
Azufre, a. . . . . tres drac.
Jarabe de corteza de naranja, c. s.
Méz. (*sw.*)

sy. trae la misma fórmula, pero suprime el sen.

Dósis; de med. á una onz.

TAMARISCO.

Se usan en medicina dos especies de este género de plantas.

1.ª *Tamarisco de Alemania*; *Tamarix Germanica*, L.

Deutscher Tamarisken, Al.
ams. fe. w. wu. *sp.*

Arbol de Alemania (pentandria trigynia, L.; portulaceas, J.).

Se usa la corteza y las hojas.

La corteza (*cortex Tamarisci*, s. *Tamaricis*) del tronco y particularmente de la raiz, es gris ó de un gris moreno por fuera, amarilla y rojiza por el interior, desigual y resquebrajada. Su olor es agradable y balsámico, y su sabor muy astringente y un poco amargo.

Las hojas son sentadas, lineales, lanceoladas y recargadas.

2.ª *Tamarisco de Francia*; *Tamarix Gallica*, L.

French Tamarisk, Al.; Taray, In.; Tamarisco, I.; Tamarqueira, Por.
an. b. br. e. f. fe. *be. br. g. m.*

Arbusto del mediodia de Europa.

Se usa igualmente la corteza y las hojas.

La corteza (*cortex Tamarisci*, s. *Tamarisci Gallici*) es delgada, enrollada, morena por fuera y de un amarillo claro por dentro. Su sabor es amargo y un poco astringente.

Las hojas son lanceoladas, muy pequeñas, puntiagudas, abrazadoras y recargadas.

Es tónico poco usado, y colocado en otro tiempo entre los aperitivos.

TAMO COMUN.

Raiz virgen, *Nueza negra*; *Tamus communis*, L.

Iungferwurzel, Al.; sceau de notre-dame, F.; commontamus, I.
fe. f. g.

Planta bienal del mediodia de Europa (dioecia hexandria, L.; alismaceas, J.

Se usa la raiz, (*radix Tami*, s. *Bryoniæ nigræ*) que es redonda, tuberculosa, negra por fuera y blanca por dentro. Tiene un sabor acre y algo desagradable.

Se considera como un diurético.

TANACETO.

Lombriguera, Yerba lombriguera; Tanacetum vulgare, L.

Rheinfarn, Al.; tansay, In.; tanaisie, F.; tanasia, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal de Europa (syngenesia polygamia superflua, L.; synanthereas, Cass.).

Se usan la yerba, las flores y las simientes.

La yerba (*herba Tanaceti*, s. *Athanasiæ*) se compone de un tallo estriado, cilíndrico, ramoso, y de hojas anchas, alternas, pecioladas, planas, de las cuales las inferiores son dos veces aladas, y las hojuelas con tres hendiduras, casi sentadas, estrechas, lineares, agudas y algo escurridas. Su sabor es aromático, caliente y amargo.

Las flores son calátides radiadas, de color amarillo brillante, y de sabor balsámico y amargo.

Las simientes son pequeñas, prolongadas, algo encorvadas, profundamente surcadas, con un reborde pequeño en la estremidad superior, que es mas ancha que la inferior, y de sabor amargo y alcanforado.

El olor es fuerte y balsámico; y el de las flores desagradable, alcanforado y aromático.

Es escitante, diaforético y vermífugo. — La dósis en polvo es de veinte á cuarenta gr.

CONSERVA DE TANACETO.

Conserva tanaceti, Confectio florum tanaceti sicca. (fu. sa. *vm.*)

R. Hojas de tanaceto machacadas, una pt.
Azucar blanca, ... dos pt.
Tritúrense juntos y lícuense al B. M. (*vm.*)

sa. prescribe part. ig. de flores y de azucar.

R. Flores de tanaceto sin cálices, una pt.
Échense en una vasija de cobre á un fuego suave, y añádase poco á poco.
Azucar pluma, . , . . . dos pt.

Menéese hasta que la masa esté bien seca, y repítase lo mismo hasta que las flores esten enteramente cubiertas de azucar. (fu.)

POLVOS DE TANACETO COMPUESTO.

Pulvis tanaceti compositus. (su.)

R. Sumidades de tanaceto,
Semen contra,
Goma guta,
Nuez vómica y
Sulfato de hierro, a. . una drac.

Pulverícese cada sustancia aparte y méz. los polvos.

ESPECIES NERVINAS.

Species nervinæ pro cucuphis. (hc. *pid.*)

R. Yerba de menta piperita,
——— de ruda,
——— de serpol,
——— de mejorana,
——— de tomillo,
——— de salvia,
——— de sabina,
——— de torongil y
Enebro, a. . . . . dos onz.
Flores de rosas rojas y
——— de espliego, a. . tres onz.
——— de tanaceto, . cuatro onz.
Bayas de laurel, ... dos onz.
Cardamomo menor, . . una onz.
Anís y
Alcaravea, a. . . . onza y med.
Macías, ... med. onz.
Pártanse y quebrántense.

ESTRACTO ACUOSO DE TANACETO.

Extractum tanaceti aquosum. (br. fu. li. s. sa. w. *vm.*)

R. Yerba de tanaceto, . . una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.
Déjense en digestion por cuatro dias en un sitio caliente; hiérvase despues un poco; cuélese por espresion, y evapórese el líquido colado hasta la consistencia de estracto. (br. fu. w.)

li. prescribe que se hierva una lib. de yerba con ocho de agua por una hora, y que se esprima; que se eche un poco de agua sobre el resíduo y que se esprima otra vez; que se mezclen los dos líquidos y que se evaporen.

R. Yerba de tanaceto, . . una pt.
Agua comun, ... ocho pt.
Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas; hiérvase despues por un cuarto de hora y cuélese esprimiendo con fuerza; hágase hervir todavía el residuo con cuatro partes de agua; mézclense los dos líquidos, y despues de veinte y cuatro horas de reposo evapórese hasta la consistencia conveniente. (s.)

R. Yerba de tanaceto machacada, ocho lib.
Déjese en maceracion por tres dias en un alambique; destílense despues cerca de dos onz. de agua; échese el triple de agua sobre el resíduo, y redúzcase á un tercio por la coccion; cuélese y clarifíquese el líquido; evapórese hasta la consistencia de electuario, y añádase á este el agua destilada cuando no esté mas que tibio. (sa.)

fe. prescribe que se cueza una lib. de yerba en tres de agua; que se clarifique el líquido colado con clara de huevo y que se evapore lo conveniente.

R. Hojas de tanaceto, . . . c. s. q.
Macháquense y dilúyanse con un poco de agua triturando por mucho tiempo; coagúlese y póngase la fécula aparte; póngase entonces en infusion á un calor suave el zumo claro con el resíduo; cuélese por espresion; clarifíquese; evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto; añádase la fécula y caliéntese de nuevo hasta que la masa haya adquirido la consistencia necesaria. (*vm.*)

Dósis; de seis á veinte gr.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE TANACETO.

Extractum tanaceti alcoholicum. (wu.)

R. Sumidades de tanaceto y
Alcohol, a. . . . . una lib.
Agua comun, ... ocho lib.
Déjense en digestion por tres dias á un calor suave; cuélese por espresion; déjese reposar y decántese el líquido; estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese el resíduo hasta la consistencia convenicnte.

LINIMENTO VERMIFUGO. (*vm.*)

R. Fécula verde y fresca de tanaceto, una pt.
Manteca de puerco, parte y med.
Lícuense á un calor suave; lávese en agua caliente; decántese y despues sepárese completamente el agua, repitiendo sucesivamente varias veces la licuacion y la decantacion.

INFUSION DE TANACETO.

Infusum tanaceti. (b.*)

R. Yerba de tanaceto, . med. onz.
Agua hirviendo, . . . diez onz.
Déjense en infusion y cuélese.
Diaforética. — Dósis; una taza cada dos horas. — La infusion hecha con leche y aplicada en lavativas es útil para espeler las ascárides.

LAVATIVA VERMIFUGA.

Enema ad ascarides. (*sw.*)

R. Yerba de tanaceto, . med. onz.
Agua, ... ocho onz.
Cuézase y redúzcase á seis onz. de líquido colado.

TINTURA DE TANACETO.

Tinctura tanaceti. (fu.)

R. Sumidades de tanaceto, . una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.
Déjese en digestion por tres dias á un calor suave y cuélese por espresion.
Dósis; de treinta á sesenta got.

ESENCIA VERMIFUGA.

Esentia contra vermes. (br. *vm.*)

R. Yerba de tanaceto,
——— de agenjos,
——— de centaura menor y
Raiz de genciana, a. . . med. onz.
Flores de tanaceto,
Semen contra y
Mirra escogida, a. . . . dos drac.
Espíritu de menta, . . una lib.
Digiérase, esprímase y fíltrese. (br.)

R. Hojas frescas de tanaceto, una pt.
Raiz fresca de énula,
Ruibarbo y
Santolina, a. . . . . tres pt.
Vino de Madera, ... dos pt.
Aguardiente, ... veinte pt.
Déjense en infusion fria por ocho dias, cuélese por espresion y fíltrese. (*vm.*)

ACEITE ESENCIAL DE TANACETO.

Oleum tanaceti œthereum, Ætheroleum tanaceti. (a. ams. an. b. be. br. d. f. fe. fi. fu. han. he. li. o. r. s. su. wu. *br. pid. sw.*)

R. Yerba florida de tanaceto, c. s. q.

Agua, ... c. s.
Destílese. (am. b. be. fe. fi. r. su. *br.*)

fu. y li. prescriben una parte de yerba y tres de agua; — *sw.* una de yerba y cuatro de agua; — d. una de yerba y seis de agua; — han. o. y s. una de yerba y ocho de agua; — a. una de yerba y doce de agua; — f. cinco de yerba y siete de agua; — y an. tres de yerba y diez de agua.

R. Yerba de tanaceto,
veinte y cinco pt.
Agua, ... setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.
Déjense en maceracion por tres dias y destílese. (br. he. *pid.*)

R. Yerba de tanaceto, . . . c. s. q.
Agua destilada de tanaceto, c. s.
Destílese. (wu.)

AGUA DE TANACETO.

Aqua tanaceti. (a. wu. *pid.*)

R. Yerba florida de tanaceto,
una pt.
Agua, ... seis pt.
Destílese y sepárese el aceite del agua. (wu.)

a. prescribe una de yerba, doce de agua, y que se destilen cuatro partes; — y *pid.* una parte de yerba, ocho de agua y destilar cuatro partes.

TAPIOCA.

Sagú blanco; Fécula Tapioka, Panis cassaviensis.

am. e. fe. *c. g.*

Sustancia amilácea, granulosa, blanca ó agrisada, que se presenta en pedazos angulosos, irregulares, de diferente magnitud, algo farinosos por la superficie; pero trasparentes y semitrasparentes.

Es el poso lavado y seco del zumo esprimido de la raiz del *Janipha Manihot*, K., árbol de las provincias cálidas de América (monoecia decandria, L.; euforbiaceas, J.).

TAPSIA.

Thapsia Asclepium, L.

Narrow leav'd carrot, In.; thapsie, F.

e.

Planta bienal del Mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; ombeliferas, J.).

Se usa la raiz y las simientes, que son escitantes y pasan por resolutivas.

ACEITE ANTIREUMATICO.

Oleum thapsiæ antirrheumaticum. (c.)

R. Raiz de tapsia,
Hojas de romero y
Vino tinto, a. . . . . una lib.
Aceite comun, ... cuatro lib.
Méz., y despues de cuatro dias de digestion cuézase hasta que se consuma el vino y cuélese.

TARAXACON.

Diente de leon; Taraxacum, Dens leonis, Desf.

Læwenzahn, Al.; dandelion, In.; pissenlit, F.; dente di leone, I.; dente de leao, Por.

a. ams. an b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham han. he. li. lo. o. p. po pp. pr. r. s. su. w. wu *b. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Planta bienal que se cria en toda

Europa (singenesia polygamia igual, L.; synanthereas, Cass.).

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz (*radix Taraxaci*, s. *Dentis leonis*) es cilíndica, larga, del grueso de un dedo, algunas veces ramosa, vellosa, de color pardo negruzco por fuera y blanca por dentro. No tiene olor, y el sabor es amargo y algo salado. Despues de seca pierde el amargor.

La yerba se compone de una roseta de hojas largas, dentadas, lisas, de color verde claro, inodoras y de sabor amargo.

ZUMO DE TARAXACON.

Succus taraxaci. (he. sa. wu.)

R. Yerba y raices frescas de taraxacon, ... c. s. q.

Macháquense en un mortero de piedra, déjese reposar el zumo y fíltrese. (he.)

wu. prescribe se añada una drac. de alcohol á cada lib. de zumo; — y sa. que se clarifique al B. M.

Dósis; de dos á cuatro onz.

COCIMIENTO DE TARAXACON.

Decoctum taraxaci, s. *leontodinis taraxaci.* (an. b.*)

R. Raiz de taraxacon, . . dos onz.
Agua, ... dos lib.

Consúmase cerca de la mitad por la ebulicion, y decántese el líquido despues de reposado. (an.)

b.* prescribe onz. y med. de raiz, tres lib. de agua y que se consuma la tercera parte.

Es diurético é incisivo. — Dósis una lib. cada dia.

COCIMIENTO DE TARAXACON COMPUESTO.

Decoctum taraxaci compositum, s. *resolvens.* (b.* dd. *sw.*)

R. Raiz de taraxacon, . cuatro onz.
Yerba de trebol acuático, med. onz.
Agua, . . . cuarenta y ocho onz.

Redúzcase á la mitad por la coccion, esprímase con fuerza y añádase al líquido frio

Sal amoniaco depurada, dos drac.
ó Sal de Sedlitz, . . . una onz.
Eter sulfúrico, ... dos drac.

Méz. (dd.)

sw. prescribe lib. y med. de yerba y de raiz de taraxacon, otro tanto de grama, seis lib. de agua reducidas á tres, y que se añada al líquido colado med. lib. de ogimiel, seis drac. de sulfato de potasa y veinte y cinco gotas de éter sulfúrico alcoholizado; — b.* dos onz. y med. de grama, lo mismo de raiz de taraxacon, otro tanto de raiz de achicoria, c. s. de agua para obtener una lib. de líquido colado, y que se añadan á este de una á tres onz. de jarabe de las cinco raices aperitivas, dos drac. de sulfato de potasa, y veinte y cinco got. de licor anodino mineral.

Recomendado por Stoll en las cuartanas rebeldes, en la pastosidad de las vísceras abdominales, la ictericia y los cálculos biliarios. — Dósis; med. lib. cuatro ó seis veces al dia.

COCIMIENTO APERITIVO.

Decoctum resolvens. (fu. han. *sm. vm.*)

R. Raiz de taraxacon y
—— de grama, a. . . . dos onz.
Agua, ... tres lib.

Redúzcase á dos lib. por la ebulicion, cuélese y añádase al líquido

Sulfato de potasa, . . med. onz.
Ogimiel, ... dos onz.

Méz. (*sm. vm.*)

R. Raiz de taraxacon, . cuatro onz.
Agua, ... dos lib.

Redúzcase á la mitad y añádase al líquido colado

Cremor de tártaro, . . una onz.
Borax, ... tres drac.
Miel glizirrizada, . . . dos onz.

Disuélvase. (ham.)

R. Raiz de taraxacon, . . . dos onz.
Agua, ... una lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion y añádase al líquido colado

Estracto de celidonia mayor, dos drac.
Tártaro estibiado, ... dos gr.

Disuélvase. (ham.)

R. Raiz de taraxacon, . cuatro onz.
Cremor de tártaro y
Borax, a. . . . . med. onz.
Agua, ... tres lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion y añádase

Miel despumada, . . . dos onz.

Méz. ex. (fu.)

ESTRACTO DE TARAXACON.

Extractum, s. *Mellago taraxaci*, s. *leontodinis taraxaci.* (a. ams. b. ba. be. br. d. du. e. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. wu. *br. c. pid. sw. vm.*)

R. Yerba fresca de taraxacon, c. s. q.

Macháquese en mortero de piedra, rociándolo con un poco de agua, esprímase el zumo y evapórese en seguida al B. M. meneándolo á lo último sin cesar con una espátula. (br. e. g. p.)

d. y *sw.* prescriben se machaquen dos lib. de raiz y de yerba, añadiendo seis lib. de agua, que se esprima el zumo, y que se evapore hasta la consistencia de jarabe espeso despues de darle un solo hervor.

R. Raiz de taraxacon y
Yerba de taraxacon, a. . ocho lib.

Macháquese en un mortero de piedra, esprímase el zumo, cuézase el residuo con doble cantidad de agua, esprímase, reúnanse los dos líquidos, y despues de doce horas de reposo evapórese hasta la consistencia de jarabe. (li.)

R. Yerba y raiz de taraxacon, una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.

Hiérvase ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hiérvase otra vez el residuo con cuatro partes de agua y cuélese del mismo modo; méz. los dos líquidos, decántense despues del suficiente reposo y evápórese á un fuego suave hasta la consistencia de estracto. (han.)

su. prescribe se cueza un poco de raiz con doble cantidad de agua, que se haga hervir despues con nueva agua y que se evaporen los líquidos reunidos al B. M.;—fi. y fu. el mismo procedimiento, pero que se tomen la primera vez seis partes de agua y que se haga hervir por un cuarto de ho-

ra; — y *br.* que se prolongue la primera ebulicion á dos horas.

R. Raiz y yerba fresca de taraxacon, una lib.
Agua pura, ... diez lib.

Cuézase por espacio de dos horas, cuélese por espresion, déjese reposar el líquido, cuélese por una manga y evapórese hasta que la masa no se pegue á los dedos. (ams.)

r. prescribe que se cueza una parte de raiz y de yerba en dos ó tres de agua, que se filtre el líquido y que se evapore lo conveniente; — du. he. y *pid.* que se cueza una parte de yerba y de raiz en tres de agua, que se cuele por espresion y se evapore el líquido á un fuego manso; — a. que se cuezan pt. ig. de raiz y de yerba en c. s. de agua, y que se evapore el cocimiento decantado hasta la consistencia de estracto líquido; — o. po. pr. y s. que se machaquen doce lib. de raiz añadiendo poco á poco seis de agua, que se esprima el zumo, que se le haga dar un hervor, que se cuele por una manga y que se evapore hasta la consistencia de miel; — e. que se hierva la raiz en c. s. de agua y que se evapore suavemente el cocimiento decantado meneándolo sin cesar; — wu. que se prolongue la ebulicion por una hora y que se evapore hasta la consistencia de miel espesa; — an. que se hierva por un cuarto de hora dos lib. de raiz y de yerba en diez de agua y que se evapore el cocimiento decantado; — lo. y c. que se hierva una lib. de raiz en cuatro azumbres de agua, reducidas á dos despues de veinte y cuatro horas de maceracion, y que se evapore el líquido colado; — ba. que se hierva una parte de raiz y de yerba con seis de agua por un cuarto de hora, y que se evapore el líquido colado; — y fe. que se hierva una lib. de raiz con tres de agua, que se clarifique el cocimiento con clara de huevo y que se evapore.

R. Yerba y raices frescas de taraxacon, dos lib.
Agua hirviendo, ... diez lib.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues por una, decántese despues de frio y esprímase la yerba; reúnanse los dos líquidos, y despues de depurados por el reposo evapórense hasta la consistencia conveniente. (b. be.)

R. Raiz seca de taraxacon, . c. s. q.

Pónganse á macerar en agua fria y á digerir en dos veces diferentes en agua caliente, clarifíquense los líquidos reunidos con clara de huevo, y evapórense hasta la consistencia de estracto. (*om.*)

Es un ligero escitante ó tónico que se ha alabado mucho en las obstrucciones del bajo vientre y en las hidropesías. Se administra el estracto líquido ó de consistencia de jarabe, á la dósis de una cuch. muchas veces al dia.

PILDORAS FUNDENTES. (*sm.*)

R. Estracto de taraxacon y
Jabon blanco, a. . . . . una onz.
Licor de tierra foliada de tártaro, c. s.

Háganse píldoras de cuatro granos.

Dósis; de cuatro á seis dos veces al dia.

ELIXIR APERITIVO.

R. Estracto de taraxacon, . tres drac.
——— de celedonia mayor, dos drac.
Agua de menta rizada, ocho onz.
Disuélvase. (ham.)

fu. prescribe seis drac. de estracto de taraxacon, dos del de celedonia mayor, seis onz. de agua destilada y dos de agua de menta piperita.

Para tomar á cucharadas.

TARMICA.

Tarmica comun; Achillea Ptarmica, L.

Deutscher Bertram, wilde Bertram wurzel, Al.; common suenzebort, In.; ptarmica, Por.; erba da esternuare, I.

br. d. f. g. han. li. po. pr. r. s. w. wu. *be. g. m. sp.*

Planta comun en toda Europa (singenesia polygamia superflua, L.; synantherea, Cass.).

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz *(radix Ptarmicæ)* es larga, cilíndrica, un poco articulada, del grueso de una pluma, guarnecida de barbillas en sus nudos, de un amarillo agrisado por fuera y blanquecino por dentro, de un olor apenas sensible, y de un sabor primero débil y en seguida acre.

La yerba se compone de hojas lanceoladas, puntiagudas, dentadas finamente y lisas. Su sabor es acre y quemante.

Escitante, aconsejado en la odontalgia. Los rusos le usan contra la hematuria y la menorragia.

TE.

Thea viridis, L.

Thee, tea, In.; te, I. Por.

br. e. f. fe. w. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Arbol de la China (polyandria monogynia, L.; aurantiaceas, J.).

Se usan las hojas, que son medianamente pecioladas, verdes, algo lustrosas, duras, lampiñas, evales, lanceoladas ó elípticas, aserradas por su parte superior, enteras por la base, secas y arrolladas ya solamente en direccion de su longitud, ya tambien sobre sí mismas. Algunas veces presentan, despues de partidas en pedazos, masas pequeñas, oblongas ó redondeadas, verdosas, arrugadas, de olor aromático muy suave, y de un sabor amargo un poco estíptico.

En el comercio se encuentran muchas especies de te, de las cuales se conocen las principales con los nombres de *Te Heyswen*, *schuland*, *perlado*, *saot-chaon* ó *buoy* y *pekao*.

Estos dos últimos que son menos estimados pertenecen al *Thea Bohea*, L., que se considera como una simple variedad del *viridis*.

Es escitante y diaforético. — Dósis; de una á dos drac. para media azumbre de agua.

TE DE ESPAÑA.

Te de Mégico; Chenopodium ambrosioides, L.

Mexicanisches traubenkraut, Al.; Mexican goosefeot, In.; Thedu Mexique, F.; The del Messico, I.

a. an. ba. be. e. f. fe. han. o. po. pr. s. w. *g. m. sp.*

Planta ánua de Mégico, aclimatada en diferentes puntos de Europa (pentandria monogynia, L.; chenopodios, J.).

Se usa la yerba florida (*herba Chenopodii ambrosiaci*, s. *Botryor Mexicanæ*) que se compone de un tallo con hojas lanceoladas, dentadas y con ramas simples, axilares por la parte inferior, y con pequeños ramos hojosos de flores, tambien axilares por la inferior. Su olor es aromático, penetrante y muy agradable, y el sabor caliente, aromático y amargo, aunque no desagradable.

Es un escitante que se ha usado en los catarros crónicos.

TINTURA ALCOHOLICA DE TE DE ESPAÑA.

Tinctura botryos, s. *chenopodii ambrosioides. (han. sw.)*

R. Yerba seca de te de Mégico, tres onz.
Alcohol (18.°), ... una lib.
Déjese en digestion por quince dias, meneando con frecuencia, y cuélese. (*sw.*)

han. prescribe una parte de yerba y seis de alcohol.

Es escitante, aconsejada en la paralísis y en la astenia llamada nerviosa. — Dósis; de una drac. á media onza, ó treinta got. varias veces al dia.

TINTURA ETEREA DE TE DE MEGICO.

Tinctura chenopodii ætherea. (han. o. *vm.*)

R. Yerba seca de te de Mégico, dos onz.
Licor anodino mineral, ocho onz.
Déjese en digestion fria por tres dias en vasija tapada, meneando de cuando en cuando. (han. *vm.*)

R. Te de Mégico y
Licor anodino mineral, ---
a. . . . . una onz.
Alcohol concentrado, . . tres onz.
Déjese en digestion por cuatro dias á una temperatura baja en sitio fresco, meneándolo frecuentemente, y fíltrese en seguida. (o.)

Es escitante, considerada como nervina. — Dósis; veinte got. cada tres horas.

INFUSION DE TE DE MEGICO.

Infusum chenopodii ambrosioides. (*au.*)

R. Te de Mégico, dos á cuatro drac.
Agua hirviendo, ... c. s. para obtener diez onz. de infusion. Cuélese y añádase al líquido
Agua de menta piperita, una onz.
Dósis; una taza por mañana y tarde, ó dos cuch. cada dos horas.

JARABE DE TE DE MEGICO.

Syrupus chenopodii, s. *atriplicis Mexicanæ.* (w.)

R. Yerba de te de Mégico, cuatro puñ.
——— de erisimo y
——— de ortigas, . . . dos puñ.
——— de tusílago, . . un puñ.
Zumo de rábanos, . . med. lib.
Déjese en infusion, esprímase despues y añádase al líquido azúcar blanca, dos lib.

Es pectoral y diurético, alabado en el asma y en la nefritis. — La dósis es de med. onz. á seis drac.

POCION ANTIESPASMODICA. (*b.*)

R. Te de Mégico, ... tres drac.
Flores de arnica, . . . dos drac.
Jarabe de narcotina y
——— de corteza de naranja,
a. . . . . una onz.

Para tomar poco á poco durante el dia.

TE DEL PARAGUAY.

Psoralea glandulosa, L.

Drusige Psorbalea, Al.; stiped flower'd psoralea, In.; the du Paraguay, F.

e.

Planta del Perú y del Brasil (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.).

Se usa la yerba (*herba Culen*) que se compone de hojas empañadas y de hojuelas lanceoladas.

Es estomacal y antielmíntico.

TILO.

Tilo de Europa, de Holanda; *Tilia Europœa*, L.

Linde, Al.; limetree, In.; tilleul, F.; tiglio, I.

ams. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. o. po. s. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Arbol que se cria en toda Europa (polyandria monogynia, L.; tiliaceas, J.).

Se usan las flores (*flores Tiliæ*) que son amarillentas, de olor muy agradable, que se disipa en gran parte por la desecacion, y de sabor suave y mucilaginoso.

Es un antiespasmódico, ligeramente diaforético, sobre todo cuando el vehículo acuoso es muy abundante y bien caliente.

CONSERVA DE TILO.

Conserva florum tiliæ. (sa.)

R. Flores de tilo, ... una pt.
Azucar pluma, ... tres pt.
Consérvese.

INFUSION DE TILO. (f. ff. *fp. ra.*)

R. Hojas de tilo, ... dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Infúndase y cuélese. (ff. *ra.*)

R. Infusion de flores de tilo,
dos lib.
Agua de flores de naranjo,
dos onz.
Méz. (*ra.*)

R. Flores de tilo, ... dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Póngase en infusion por un cuarto de hora, cuélese y añádase al líquido
Jarabe de altea, . . . una onz.
Méz. ex. (f.)

fp. prescribe dos drac. de tilo, otras dos de regaliz, y dos cuartillos de agua hirviendo.

Es ligeramente antiespasmódica.

La primera infusion se acídula por lo regular con ogimiel ó jarabe tartárico, y se endulza con jarabe de goma y aun algunas veces con el de diacodion. La segunda se ha recomendado por Chaussier en las afecciones nerviosas con espasmo histérico. Muchas veces se añaden dos drac. del licor de Hoffmann. Una y otra deben tomarse calientes.

AGUA DE TILO.

Aqua tiliæ. (f. fu. g. o. pa. s. sa. wu. *sw.*)

R. Flores de tilo, ... dos pt.
Agua, , ... c. s.
Destílense veinte partes. (*sw.*)

pa. prescribe una parte de flores y tres de agua, para destilar part. y med.; — f. y sa. una pt. de flores, cuatro de agua, y que se destile la mitad; — wu. una pt. de flores y seis de agua; — s. una parte de flores, veinte de agua, y que se destilen dos terceras partes; — o. una parte de flores y treinta de agua para destilar veinte partes; — y g. cuatro partes de flores y c. s. de agua para destilar seis partes.

R. Flores de tilo, ... tres pt.
Agua, ... doce pt.
Métanse las flores en un saco suspendido en un alambique sin que llegue á tocar al agua, y sin que esta llegue á hervir destílense seis partes.

Dósis; de dos á cuatro onz.

TIZON.

Secale cornutum.

Spurred, horned rye, In.; ergot, F.

am. c.

Se da este nombre á una especie de espolon que se desarrolla en las espigas de algunos cereales, con particularidad en las del centeno. El tizon por lo regular se halla encorvado y prolongado, rara vez redondo, y presenta casi siempre tres ángulos obtusos y líneas longitudinales: es de color de violeta con diversos matices; su sustancia es de un color blanco sucio y sólida; la fractura igual y con ruido; el olor desagradable cuando está fresco y cuando se halla reunido en gran cantidad, y su sabor es ligeramente mordicante y nauseoso. Tiene de largo una pulgada ó pulgada y media, y dos á tres líneas de grueso.

Segun Decandolle es una especie de escrescencia, *Sclerotium flavus;* y segun otra opinion mas probable una degeneracion morbosa del ovario de las gramineas, en las cuales se observa, cuya alteracion está producida, segun Martin Field, por la picadura de un insecto del género *musca*, que sin depositar allí sus huevos deja un licor negruzco.

Contiene, segun Vauquelin, una materia colorante amarilla, otra violada, un aceite blanco, un ácido libre, que al parecer es el fosfórico, amoniaco libre, y una materia azootizada.

Es un irritante que produce accidentes de consideracion, como el tétanos, la gangrena de los miembros y la muerte. A dósis pequeñas parece que escita las contracciones de la matriz; por cuya razon se ha aconsejado en los partos laboriosos por efecto de la inercia de esta víscera, y para contener los flujos ó hermorragias causadas por la falta de tono. — Dósis; de diez á treinta gr. en seis onz. de vehículo.

INFUSION DE CENTENO ATIZONADO.

Infusum secalis cornuti. (b.*)

R. Centeno atizonado, . med. drac.

Agua hirviendo, . . cuatro onz.
Déjese en infusion y cuélese.

Se da la tercera parte, y se repite la dósis á las veinte y cuatro horas si lo exige el caso.

COCIMIENTO DE CENTENO ATIZONADO.

Decoctum secalis cornuti. (b.* *au.*)

R. Centeno atizonado, . . una onz.
Agua de fuente, . tres cuartillos.

Hiérvase hasta que se consuma la tercera parte. — Muchos prácticos le prefieren á la infusion. — Dósis; una cuch. cada cuarto de hora.

POCION OCYTICA. (*pie.*)

R. Centeno atizonado en polvo, una drac.
Jarabe simple, ... tres onz.
Láudano líquido, . . veinte got.
Esencia de bergamota, . . c. s.

TLASPIOS.

Entre las especies de este género de plantas que se usan en medicina, citaremos las siguientes:

1.° *Tlaspios campestre; Thlaspi, campestre*, L.

f.

Planta perenne comun en toda Europa (tetradynamia siliculosa, L.; cruciferas, J.).

Se usa la simiente (*semen Thlaspeos*) que es redondeada, aplastada, de color pardo obscuro, y de sabor acre y quemante.

2.° *Tlaspios ó Telaspios; Thlaspi arvense*, L.

Bauernsenf, Al.; penny cress, In.; Tlaspi des chams, F.

br. f. w. *be. br. m. sp. z.*

Se usa la simiente (*semen Thlaspeos*) que es muy pequeña, redondeada, algo aplastada, de olor fuerte como el de ajos, y de sabor algo acre y amargo.

TOBA.

Cardo tomentoso, Espina blanca; Onopordon Acanthium, L.

Breite Wegdistel, Al.; common cotton, In.; Chardon aux anes, F.

br. f. he. r. w. *m. pid. sp.*

Planta perenne comun en toda Europa (syngenesia poligamia igual, L.; synantereas, Cass.).

Se usa la yerba (*herba Cardui tomentosi, s. Acanthi vulgaris*, s. *Spinæ albæ*) que se compone de hojas sentadas, ovales, largas, dentadas y espinosas. Es amarga y sin olor.

El zumo se dice que es útil en el cancer de la cara, aplicando hilas empapadas en él.

ESTRACTO DE TOBA, O CARDO TOMENTOSO.

Extractum cardui tomentosi. (fu. li.)

R. Yerba de toba, ... c. s. q.

Macháquese en un mortero de madera ó de piedra, échese la pulpa en un saco de lienzo, esprímase y déjese evaporar el zumo al B. M. hasta la consistencia de estracto.

Dósis; de diez á veinte gr.

TOMATERA.

Solanum Lycopersicum, L.

Liebesapfel Goldapfel, Al.; lovapple, In.; tomate, F.; pomo d'amore, I.; tomate, Por.

f.

Planta anua de América meridional cultivada en Europa (pentandria monogynia, L.; solanos, J.).

Se usan los frutos (*Mala lycopersica*) que son unas bayas redondas, divididas en diversos lóbulos, carnosas, jugosas, lisas, lustrosas, amarillentas ó encarnadas, que contienen una multitud de granos en medio de una pulpa acídula.

TOMILLO.

Entre las especies de este género de plantas que se citan en las farmacopeas se distinguen las cuatro siguientes:

1.º *Tomillo de los Alpes*; *Thimus Alpinus*, L.

Alpenthimian, Alpenquendel, Al.; alpine thyme, In.; thym des Alpes, F.

br.

Planta bienal que se cria en los Alpes (didynamia gymnospermia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba florida (*herba clinopodii montani*) que se compone de un tallo redondeado y ramoso, con hojas pecioladas, redondeadas, obtusas ó poco aserradas, y cóncavas. Su olor y sabor son aromáticos muy agradables.

2.º *Mejorana silvestre*; *Thymus mastichina*, L.

Mastids thymian, Al.; mastis thymo, In.; thym cilie, F.

e.

Planta de España é Italia.

Se usa la yerba florida (*herba Mastichinæ Gallorum*, s. *Mari vulgaris*) que consta de un tallo cilíndrico, con hojas algo pecioladas, ovales, muy ligeramente aserradas, y lisas por ambos lados con verticilos de flores blancas. Tiene un sabor y olor agradables.

3.º *Tomillo*, *Tomillo comun*, *oficinal*, *salsero*; *Thymus vulgaris*, L.

Gemeiner Thymian, Al.; garden thyme, In.; Thym comun, F.; timo, I.; Tomillo, Por.

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. g. han. he. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta de Europa meridional.

Se usa la yerba florida (*herba et flores Thymi vulgaris*, s. *hortensis*) que se compone de un tallo cilíndrico, ligeramente ramoso, muy velludo, con hojitas opuestas, sentadas, algo dobladas por los bordes, estrechas, casi obtusas, algo vellosas por debajo, y que tienen en el vértice de los ramos flores purpurinas reunidas en forma de espiga con bracteas. Su olor es agradable, fuerte y aromático, y el sabor caliente y aromático.

4.º *Tomillo andaluz*, *de cabezuelas*, *de los antiguos*, *verdadero*; *Satureja capitata*, L.

Thym de Crete, F.

br. e. f. w. *b. sp.*

Planta del mediodia y del oriente de Europa.

Se usa la yerba florida (*herba et spi-*

cæ Thymi cretici) que se compone de un tallo delgado con hojitas estrechas, opuestas, puntiagudas y pestañosas; y de flores blancas en forma de espiga terminal. Su olor es fuerte y agradable, y el sabor caliente y aromático.

Todas estas plantas son escitantes.

INFUSION DE TOMILLO. (ff.)

R. Sumidades de tomillo y
Regaliz raspado, a. . . . dos drac.
Agua hirviendo, ... c. s.
para una lib. de líquido despues de colado.

ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO.

Oleum Thymi æthereum, Ætheroleum Thymi. (ba. br. d. f. han. pa. s. sa.)

R. Yerba fresca de tomillo, cinco pt.
Agua, ... siete pt.
Destílese. (f.)

d. prescribe una parte de flores y seis de agua; — han. y s. una de flores y ocho de agua; — y ba. una de flores y nueve de agua.

R. Yerba fresca de tomillo,
veinte y cinco pt.
Agua, ... setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.
Despues de tres dias de infusion destílese. — Dósis; de dos á cuatro got.

AGUA DE TOMILLO.

Aqua Thymi. (f. wu.)

R. Yerba florida de tomillo, cinco pt.
Agua, ... veinte pt.
Destílense diez partes. (f.)

wu. prescribe una part. de yerba y seis de agua. — Dósis; de dos á cuatro onz.

ALCOHOL DE TOMILLO.

Spiritus, s. *Alcohol Thymi.* (*br.*)

R. Yerba fresca de tomillo,
una lib. y dos onz.
Aguardiente, ... ocho lib.
Destílense las tres cuartas partes.
Dósis; de med. á una drac.

ESPIRITU AROMATICO.

Spiritus aromaticus. (li.)

R. Yerba de tomillo, . . . tres onz.
——— de maro, ... una onz.
Raiz de cedoaria y
Alcaravea, a. . . . . dos onz.
Alcohol, ... ocho onz.
Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas; añádase
Agua, ... ocho lib.
y destílense lentamente ocho lib.

TORMENTILA.

Tormentila derecha, oficinal, Siete en rama; Tormentila erecta, L.

Tormentillwurz, Blutkraut, Al.; tormentil, In.; tormentille, F.; tormentila, I. Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. sp. z.*

Planta bienal de Europa (icosandria poligynia, L.; rosaceas, J.).

Se usa la raiz (*radix Tormentillæ sylvestris*, s. *Heptaphylli*, s. *Septifolii*) que es nudosa, del grueso de un dedo, oblonga, con muchas raicillas, de un color rojo pardo por fuera, y rojo pálido ó pardo amarillento y algunas veces con manchas por dentro, é inodora. Tiene un sabor astringente y algo amargo.

Es astringente. — La dósis en polvo es de med. á una drac.

POLVOS ASTRINGENTES.

Pulvis tormentillæ compositus. (g.)

R. Tierra sellada, ... seis onz.
Canela, ... cuatro onz.
Tormentila y
Goma arábiga, a. . . . tres onz.
Pimienta larga, . . . med. onz.

Si es necesario se añade una cuadragésima octava parte de opio.

ESTRACTO DE TORMENTILA.

Extractum tormentillæ. (a. ams. an. b. ba. br. e. li. p. s. sa. w. wu.)

R. Raiz de tormentila, . . una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.

Déjese en digestion por cuatro dias en un sitio caliente, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion, y evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto. (br. pa. w.)

sa. prescribe que se consuma la tercera parte del líquido por la ebulicion antes de colarle y evaporarle.

R. Raiz de tormentila, . . . una pt.
Agua comun, ... ocho pt.

Pónganse en maceracion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues por un cuarto de hora y cuélese esprimiendo con fuerza; póngase á hervir tambien el residuo con cuatro pt. de agua, mézclense los dos líquidos, y despues de reposados evapórense hasta la consistencia necesaria. (an. li.)

b. prescribe veinte y cuatro horas de digestion y dos de ebulicion con diez partes de agua, y que despues se vuelva á hervir con otras ocho partes de agua; — ams. que se cueza primero en veinte partes de agua y despues en quince, dejando que se consuma la mitad cada vez; — y e. que se pongan en digestion por veinte y cuatro horas en sitio caliente dos lib. de tormentila en veinte de agua, que se cuezan despues por dos horas, que se cuele el líquido, que se vuelva á hervir el residuo en nueva cantidad de agua hasta que queden ocho lib., y que despues de unidos los líquidos se evaporen.

R. Raiz de tormentila, . . . c. s. q.
Agua, ... c. s.

Hiérvase sucesivamente la raiz con diferentes aguas, mézclense los líquidos, y despues de decantados déjense evaporar hasta la consistencia de estracto. (a.)

wu. prescribe una ebulicion solamente prolongada por espacio de doce horas; — y ba. que se hierva una parte de raiz, primero en ocho partes de agua y despues en cuatro, habiéndolo dejado en maceracion antes por veinte y cuatro horas.

Dósis; de un escrup. á med. drac.

PILDORAS ASTRINGENTES. (*ca.*)

R. Estracto de tormentila,
una drac.
Macias, ... dos drac.
Goma arabiga, ... med. onz.
Trementina cocida, ... c. s.

Háganse pildoras de cuatro gr. — Aconsejadas por Quarin al fin de la gonorrea. — Dósis; de cinco á seis por mañana y tarde.

AGUA DE TORMENTILA.

Aqua tormentillæ. (pa.)

R. Raiz de tormentila, . . una pt.
Agua, ... dos pt.
Destílese parte y media.

ESENCIA TRAUMATICA.

Esentia traumatica. (w. *sp.*)

R. Raiz de tormentila y
Yerba de sanicula, a. . med. onz.
—— de rocío del sol,
Flores de hipericon y
—— de rosas rojas,
a. . . . . dos drac.
Sangre de drago,
Momia de Egipto,
Catecú y
Mirra, a. . . . . tres drac.
Sándalo rojo, ... dos drac.
Nuez moscada, ... una drac.
Alcohol, ... diez y seis onz.

Déjese en digestion por tres dias á un calor suave, esprímase y fíltrese. (w.)

R. Raiz de tormentila, . med. onz.
Flores de rosas rojas y
—— de hipericon, a. dos drac.
Leño de sándalo rojo,
Momia de Egipto y
Sangre de drago, a. . . una onz.
Catecú y
Mirra, a. . . . . med. onz.
Nuez moscada, ... una drac.
Alcohol, ... veinte onz.

Póngase en digestion por suficiente tiempo y filtrese. (*sp.*)

Astringente, recomendado para contener las hemorragias internas y la diarrea; — Dósis; de cincuenta á sesenta gotas.

TINTURA DE TORMENTILA.

Tinctura tormentillæ. (be.)

R. Raiz de tormentila, . . una pt.
Alcohol (15.°), ... ocho pt.

Déjese en maceracion fria por seis dias, cuélese despues por espresion y filtrese.

Es astringente.

COCIMIENTO DE TORMENTILA.

Decoctum radicis tormentillæ. (*b.**)

R. Raiz de tormentila, . med. onz.
Agua de fuente, . . lib. y med.

Hiérvase y cuélese.

Astringente. — Dósis; dos cuch. cada dos horas.

COCIMIENTO ASTRINGENTE.

Decoctum adstringens. (sa. *sw. vm.*)

R. Raiz de tormentila,
Corteza de encina y
—— de granada, a. . dos drac.
Agua y
Leche, a. . . . . una lib.

Hiérvase por un cuarto de hora, añádiendo á lo último

Canela, ... dos drac.

Cuélese despues de frio. (*sw. sm.*)

R. Raiz de tormentila,
Flores secas de granada y
Corteza de granada, a. med. onz.
Quina, ... una onz.
Agua de fuente, ... c. s.

para obtener despues de la ebulicion dos lib. de líquido colado. (*sa.*)

Aconsejado en la diarrea y la blenorrea. — Dósis; dos onz. tres ó cuatro veces al dia. — Suprimiendo la canela puede usarse tambien este cocimiento en lavativa ó inyeccion.

TISANA ASTRINGENTE. (*ca. pie. sp.*)

R. Raiz de tormentila, . seis drac.
Agua de fuente, ... doce lib.
Hiérvase por media hora, añadiendo á lo último
Raiz de consuelda mayor, seis drac.
—— de regaliz, . . . med. onz.
Cuélese. (*sp.*)

pie. prescribe tres onz. de tormentila, treinta y cuatro lib. de agua, tres onz. de consuelda y dos onz. de regaliz.

R. Raiz de tormentila y
—— de grama, a. . . med. onz.
Corteza de granada,
Agracejo y
Zumaque, a. . . . . dos drac.
Raspaduras de c. c. . . tres drac.
Agua, ... seis cuartillos.
Hiérvase hasta que se consuma la tercera parte, y añádase al líquido despues de colado
Miel, ... dos onz.
Cuélese. (*pie.*)

R. Agua hirviendo, ... dos lib.
Pétalos secos de rosas rojas, med. onz.
Raiz de tormentila y
—— de bistorta, a. . una onz.
Hiérvanse las raices, infúndanse los pétalos, cuélese el líquido y añádase
Jarabe de granada, . onz. y med.
—— de goma, . . . una onz.
Acido sulfúrico debilitado, veinte got.
Méz. (*ca.*)

GARGARISMO ASTRINGENTE. (*sa.*)

R. Raiz de tormentila, . . dos onz.
Agua, ... c. s.
para una lib. de cocimiento. Despues de media hora de hervor añádase
Miel rosada, ... onz. y med.
Acido sulfuroso, ... diez got.

TORNASOL.

Lacmus, Lacca cœrulea, Lacca musica, Tornasolis cœrulea.

Blanes Lack, Lackmus, Al.; litmus, In.; Tournesol, F.

Materia colorante, de la que se distinguen dos especies en el comercio:

1.º *Tornasol en panes ó en piedra.* (a. bc. br. du. g. *m. sp.*) que se presenta en pequeños paralilipipedos rectos, de color azul, que se preparan con muchas especies de líquenes pulverizados, mezclados con cenizas quemadas y con cal, y fermentados con orina humana.

2.º *Tornasol en trapos, Becetta, Nezetta* (br. w. *be. g. m. sp.*) que son trapos viejos empapados del jugo de las sumidades del *Croton tinctorium*, L., planta del mediodia de Europa (monoecia monadelfia, L.; euforbiaceas, J.) secados en seguida y espuestos al vapor que se desprende de una mezcla de orina y de cal viva hasta que hayan adquirido un color azul violado.

TORONGIL.

Dos plantas de este nombre, pertenecientes á dos géneros diferentes, se usan en medicina:

1.° *Melisa, Melisa oficinal, Torongil, Torongina, Torongil cidrado de limon; Melissa officinalis*, L.

Melisse, Melissenkraut, citronenkraut, Al.; comon balm, In.; melisse, F.; herba cidreira, Por.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. ww. *a. be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal del mediodia de Europa (didynamia gymnospermia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba *(herba Melissæ citrinæ*, s. *Citratæ*, s. *hortensis*, s. *Cedronellæ)* que se compone de un tallo tetrágono, ramoso, casi lampiño, guarnecido de hojas pecioladas, ovales, un poco ensanchadas por la base, y dentadas por los bordes. Su olor es agradable, análogo al de la cidra, y su sabor aromático y un poco acre.

2.° *Melisa de Moldavia, de Canarias; Dracocephalum Moldavicum*, L.

Turkische Melisse, Al.; moldaviam mint, In.

br. f. li. w. *b. m. sp.*

Planta anua de la Moldavia y de la Siberia (didynamia gimnospermia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba *(herba Melissæ turcicæ*, s. *Cedronellæ)* que se compone de un tallo cuadrangular, lampiño, ramoso, guarnecido de hojas ovales, lanceoladas, casi lampiñas y dentadas. Su olor es aromático penetrante, y bastante agradable.

Estas dos plantas son estimulantes y clasificadas entre los espasmódicos.

ESPECIES AROMATICAS.

Species pro Thea. (hp.)

R. Yerba de torongil, . . . una onz.
Hinojo, ... tres drac.
Regaliz, ... dos drac.
Pártanse y mézclense.

CONSERVA DE MELISA. (r.)

R. Hojas frescas de torongil machacadas, ... una pt.
Azucar blanca, ... dos pt.
Méz. ex. y consérvese en un sitio fresco.

CATAPLASMA AROMATICA. (ff. *br.*)

R. Yerba de torongil, . . . seis onz.
Flores de manzanilla, . tres onz.
Bayas de enebro, . . cuatro onz.
Cuézanse en
Aguardiente, ... c. s.
hasta la consistencia de pasta blanda. *(br.)*

ff. prescribe se cuezan cien partes de harina de cebada y otro tanto de la de centeno en ciento de vino tinto, y que se añada á lo último un tercio de polvos aromáticos.

ESTRACTO DE TORONGIL. (fe. sa.)

R. Yerba de torongil, . . . una pt.
Agua, ... tres pt.
Hiérvase, cuélese por espresion, clarifíquese el líquido con clara de huebo, y evapórese lo conveniente. (fe.)

R. Yerba fresca y machacada de torongil, ... ocho lib.
Déjese en digestion por tres dias en

un alambique, estráiganse despues cerca de dos onz. de agua por la destilacion al B. M., échese triple cantidad de agua sobre el residuo, redúzcase á dos tercios por la coccion, clarifíquese y cuélese el líquido, evapórese hasta la consistencia de electuario, y añádase á este el agua destilada cuando no esté mas que tibio. (sa.)

INFUSION DE TORONGIL. (ff. *ra.*)

R. Hojas de torongil, . . med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjese en infusion y cuélese. *(ra.)*

R. Yerba seca de torongil y
Regaliz raspado, a.
dos drac. y med.
Agua hirviendo, ... c. s. para obtener dos lib. de líquido colado. (ff.)

Aromática y ligero escitante, que se aconseja en los cólicos reputados como independientes de toda flegmasia, y en la dispepsia atribuida á la astenia del estómago.

TISANA CARMINATIVA. (*ca.*)

R. Hojas de torongil, . . dos drac.
Anís,
Hinojo y
Cilantro, a. . . . . med. drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjese en infusion por un cuarto de hora, cuélese y añádase
Azucar blanca, ... c. s.

JARABE DE TORONGIL.

Syrupus melissæ. (w.)

R. Hojas secas de torongil,
cuatro onz.
Agua destilada de torongil,
una lib.
Déjense en digestion por dos dias en vasija tapada, esprímase y añádase
Azucar blanca, . diez y seis onz.
Hágase dar un hervor.

ESENCIA DE TORONGIL COMPUESTA. (*vm.*)

R. Hojas de torongil, ... dos pt.
—— de ruda,
—— de poleo y
Corteza fresca de cidra, a.
pt. y med.
Canela, ... una pt.
Espíritu de torongil,
veinte y cuatro pt.
Déjense en infusion por algunos dias, cuélese por espresion y filtrese.

TINTURA DE TORONGIL.

Tinctura melissæ. (an. *vm.*)

R. Yerba de melisa, ... una pt.
Alcohol (20.°), ... ocho pt.
Déjese en infusion por tres dias y filtrese. — Escitante.

ACEITE DE TORONGIL.

Oleum melissæ æthereum, Ætheroleum melissæ. (br. fe. han. pa. r. w. wu. *pid. sw.*)

R. Yerba fresca de torongil, c. s. q.
Agua, ... c. s.
Destílese y consérvese el aceite (fe. r.)

sw. prescribe una parte de yerba y

cuatro de agua; — y han. una de yerba y ocho de agua.

R. Yerba fresca de torongil,
veinte y cinco pt.
Agua, ... setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.
Destílese. (br. pa. w. *pid.*)

R. Yerba fresca de torongil, c. s. q.
Agua destilada de melisa, . c. s.
Destílese. (wu.)

AGUA DE TORONGIL.

(a. ams. an. ba. br. d. f. fe. fu. g. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. w. ww. *br. pid. vm.*)

R. Yerba fresca de torongil, una pt.
Agua, ... c. s.
Déjense en infusion por veinte y cuatro horas y destílense diez partes. (ams. o. po. pr.)

d. y f.** prescriben una pt. de yerba, cantidad suficiente de agua, y que se destilen veinte partes; — han. una parte de yerba, c. s. de agua y que se destilen tres partes; — g. una parte de yerba, c. s. de agua, y que se destilen seis partes; — f. y pa. una parte de yerba, cuatro de agua, y que se destilen dos partes; — an. una parte de yerba, cinco de agua, y que se destilen cuatro partes; — wu. y *br.* una parte de yerba, seis de agua, y que se destilen dos tercios; — he. y *pid.* una parte de yerba, ocho de agua, y que se destile la mitad; — a. una parte de yerba, doce de agua, y que se destilen cuatro partes; — s. una parte de yerba, quince de agua, y que se destilen los dos tercios; — y ba. una parte de yerba, diez y seis de agua, y que se destile la cuarta parte.

R. Yerba fresca de torongil, una pt.
Agua, ... cuatro pt.
Destílese la mitad, y vuélvase á destilar el producto con nueva yerba. (sa.)

R. Yerba fresca de torongil, tres pt.
Suspéndase en un saco de lienzo en medio de una retorta que contenga
Agua, ... doce pt.
de modo que no toque al líquido, y destílense seis partes. (fu. li.)

R. Yerba fresca de melisa, . una pt.
Vino blanco, ... cuatro pt.
Destílese la mitad. (br. w.)

vm. prescribe diez partes de yerba florida, med. parte de aguardiente, cien partes de agua, y que se destilen cuarenta.

AGUA DE TORONGIL ESPIRITUOSA.
(li.)

R. Agua destilada de torongil, dos pt.
Esencia de torongil, . . una pt.
Méz.

AGUA DE TORONGIL ANTIHISTERICA.
(w.)

R. Hojas frescas de torongil, una lib.
Bayas de laurel y
Simiente de cominos, a. una onz.
Mirra, ... med. onz.
Castoreo, ... dos drac.
Vino blanco generoso, doce lib.
Déjese en digestion lo suficiente y destílese la mitad.

ESPIRITU DE TORONGIL.

(an. br. f. fu. li. p. pa. r. s. sa. w. wu. *pid. vm.*)

R. Yerba de torongil, . . . una pt.

Alcohol (20.°) . . . . . dos pt.
Agua, ... c. s.
Destílese un espíritu que señale 28.° (an.)

vm. prescribe una parte de yerba, tres de alcohol y seis de agua, destilando dos partes y media.

R. Yerba de torongil, . . . una pt.
Agua de torongil, ... dos pt.
Alcohol, ... ocho pt.
Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas y destílense seis partes. (r.)

f. prescribe doce partes de yerba, otro tanto de agua destilada de torongil, treinta y seis de alcohol de (22.°) y que se destilen treinta partes.

R. Yerba de torongil, part. y med.
Aguardiente, ... diez pt.
Al cabo de doce horas destílese la mitad. (p.)

br. pa. sa. w. y *pid.* prescriben una parte de yerba y cuatro de aguardiente; — y fu. y li. una de yerba y seis de aguardiente.

R. Yerba fresca de torongil, una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, destílese al B. M. hasta la sequedad, y digiérase y destílese de nuevo el producto con otra yerba. (sa.)

wu. prescribe lib. y med. de yerba y diez de alcohol, y que se vuelva á destilar con tres onz. de yerba.

AGUA CARMELITANA.

Espíritu ó Alcohol de torongil compuesto, Agua aromática; Spiritus aromaticus, Aqua melissæ composita, s. *Carmelitana*, s. *Carmelitarum*, s. *melissæ spirituosa composita.* (a. ams. b. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. han. p. pa. sa. w. *br. ca. hp. sp. sw. vm.*)

R. Yerba fresca de torongil, libra y med.
Corteza fresca de cidra, cuatro onz.
Nuez moscada y
Cilantro, a. . . . . dos onz.
Canela y
Clavo, a. . . . . una onz.
Alcohol, ... seis lib.
Agua de torongil, . . . tres lib.
Déjense en digestion por tres dias y destílense seis lib. (br. d. sa. w.)

R. Yerba de torongil, . . doce onz.
Corteza de cidra, . . . dos onz.
Nuez moscada, ... una onz.
Cilantro, ... cuatro onz.
Clavo y
Canela, a. . . . . una onz.
Raiz de angélica, . . med. onz.
Alcohol, . . sesenta y cuatro onz.
Déjense en infusion por algunos dias, y destílese ochenta y ocho onz. (fe. *sp.*)

han. prescribe diez y ocho onz. de torongil, cuatro onz. de corteza de cidra, tres onz. de nuez moscada, otro tanto de raiz de angélica, una onza de clavos, otra de canela, seis lib. de alcohol, tres lib. de agua de torongil, tres dias de digestion, y que se destilen siete lib.; — *br.* dos lib. de torongil, cuatro onz. de corteza de cidra, dos onz. de nuez moscada, ocho onz. de cilantro, med. onz. de canela, otra media de clavos, ciento veinte onz. de alcohol, tres dias de digestion y que se destilen al B. M. ciento y veinte onz.; — fu. diez y seis onz. de torongil, cuatro de corteza de cidra, dos

de canela, una de nuez moscada, dos drac. de clavos, ocho lib. de vino blanco, veinte y cuatro horas de digestion, y que se destilen cuatro lib.; — p. dos lib. de melisa, cuatro onz. de corteza de cidra, dos de canela, una de nuez moscada, dos drac. de clavos, diez lib. de aguardiente, tres dias de maceracion y que se destilen cinco lib.; — ams. be. y b. cuatro onz. de torongil, una de corteza de cidra, otra de moscada, otra de cilantro, med. de clavos, otra med. de canela, cinco lib. de aguardiente, tres dias de digestion y que se destilen tres lib.; — c. ocho onz. de torongil, dos de corteza de cidra, otras dos de la de naranja, una de nuez moscada, otra de cilantro, med. de canela, cuatro lib. de aguardiente, veinte horas de maceracion y que se destile la mitad; — *sw.* una onza de nuez moscada, cuatro de cilantro, onza y med. de canela, otro tanto de raiz de angélica, una onza de clavos, dos de corteza de cidra, dos lib. de agua de torongil, cuatro lib. de alcohol, ocho dias de digestion y que se destile; — y a. dos lib. de torongil, la corteza de diez cidras, tres onz. de raiz de angélica, otro tanto de canela, seis onz. de cilantro, once lib. de alcohol (0,910), seis lib. de agua de fuente y que se destilen diez lib.

R. Yerba de torongil,
——— de menta piperita,
——— de salvia,
——— de romero,
Flores de espliego y
——— de hinojo, a. . tres onz.
Raiz de angélica, . . . dos onz.
Raiz de cálamo aromático,
. . . . . cuatro onz.
Alcohol, ... cuatro lib.
Agua, ... c. s.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas y destílense doce lib. (b.* *hp.*)

R. Flores de rosas rojas y
——— de romero, a. cuatro onz.
——— de espliego y
——— de lirio de los valles,
a. . . . . tres puñ.
Yerba de mejorana y
——— de torongil, a. un puñ.
Cardamomo menor,
Clavos,
Macías y
Cubebas, a. . . . . una onz.
Canela, ... dos onz.
Espíritu de guindas, tres azumb.

Déjense en digestion por dos dias y destílese. (pa.)

R. Canela,
Clavos,
Nuez moscada,
Anís y
Cilantro, a. . . . . una pt.
Hisopo,
Mejorana,
Romero,
Salvia y
Tomillo, a. . . . . dos pt.
Corteza fresca de cidra y
Raiz de angélica, a. . cuatro pt.
Torongil fresco, ... doce pt.
Aguardiente,
ciento noventa y dos pt.
Agua pura,
quinientas setenta y seis pt.

Destílense ciento veinte y ocho pt. (*vm.*)

R. 1.º Torongil, ... veinte pt.
Angélica, ... cinco pt.
Alcohol (22.º),
doscientas cincuenta pt.
2.º Canela, ... cinco pt.
Clavos y
Nuez moscada, a. . . . tres pt.
Alcohol (22.º), ciento y diez pt.
3.º Anís, ... dos pt.
Cilantro, ... cinco pt.
Corteza seca de cidra, . una pt.
Alcohol (22.º), . . ochenta pt.
4.º Romero,
Mejorana,
Hisopo y
Tomillo, a. . . . . dos pt.
Salvia, ... cuatro pt.
Alcohol (22.º), ciento veinte pt.

Destílense separadamente al B. M.; reúnanse los cuatro productos; añádase una décima parte de su peso total de agua, y destílense cuatro quintas partes al B. M. (ff.)

R. Canela,
Clavos de especia enteros,
Nuez moscada,
Anís,
Cilantro y
Corteza seca de cidra, a. una pt.
Alcohol (22.º), ... mil pt.

Déjense en maceracion cada una de estas sustancias aparte, por dos ó tres dias, en noventa y seis partes de alcohol; destílense en seguida al B. M. y recójase cada producto aparte. Por separado infúndanse por dos dias en la misma cantidad de alcohol, y destílese

Yerba de angélica entera,
——— florida de romero,
——————— de mejorana,
Yerba florida de hisopo,
——————— de tomillo y
——————— de salvia,
a. . . . . una pt.

Déjese tambien en maceracion y destílese lo mismo

Hojas frescas de torongil, una pt.

Entonces tómense tres cántaros y échese en el primero

Espíritu de canela y
——— de cilantro,
a. . . . . tres part. y med.
——————— de clavos y
——————— de nuez moscada,
a. . . . . tres pt.
——————— de anís, . dos pt.
——————— de corteza de cidra,
un cuarto de pt.

En el segundo.

Espíritu de angélica, . . diez pt.
——— de romero, . . . seis pt.
——— de mejorana y
——— de tomillo, a. . siete pt.
——— de hisopo, . . ocho pt.
——— de salvia,
quince partes y med.

Echese el espíritu de torongil solo en el último; y hecho esto mézclense cinco partes de las contenidas en cada uno de los dos primeros cántaros, y cinco y media del tercero, y échense todas en un alambique: añádase la décima parte de agua de fuente, y la cuadragésima de azucar en polvo; destílese hasta que solo quede una quinta parte, y recójase lo que haya pasado al recipiente. (f. *ca.*)

Esta última fórmula ofrece un egemplo, entre otros muchos, del ansia con que el nuevo código francés

procura reunir las fórmulas empíricas, revestidas de las minuciosidades mas insignificantes.

El agua carmelitana conservará ciertamente por mucho tiempo el privilegio de figurar en la farmacia doméstica, de los que creen en el poder mágico de todos los remedios que han gozado de una celebridad trivial, del mismo modo que se hallará todavía por largo tiempo el agua de colonia en los tocadores; pero ya es tiempo de que en los códigos farmacéuticos se destierren estas chucherías y se abandonen únicamente á los catálogos de los perfumistas. — Si se creyese necesario conservar un espíritu de torongil compuesto, se podria satisfacer perfectamente este objeto con una de las fórmulas colocadas al principio de este artículo.

AGUA DENTRIFICA. (*pie.*)

R. Alcohol, ... veinte onz.
Espíritu de canela,
——— de espliego,
——— de cidra y
Agua de torongil compuesta,
a. . . . . cinco drac.
Méz.

VINAGRE AROMÁTICO.

Acetum odoratum, s. *bezoardicum*, s. *odoriferum.* (b.* br. fu.)

R. Yerba de ligústico, . . dos onz.
Hojas de torongil y
—— de ruda, a. . cuatro onz.
Nueces verdes partidas, dos lib.
Cidras frescas machacadas,
una lib.
Vinagre, ... diez lib.
Déjense en digestion por doce horas y destílense hasta la sequedad. br.)

R. Vinagre, ... dos onz.
Espíritu de melisa, . med. onz.
Aceite esencial de cidra y
——— de espliego,
a. . . . . diez got.
——— de clavos,
cuatro got.
Méz. (b.* fu.)

TREMENTINA.

Aunque se ha intentado en estos últimos tiempos hacer estensivo el nombre de trementina á todas las resinas líquidas, ha prevalecido sin embargo la costumbre antigua y se continúa todavía designando bajo esta denominacion solamente las cuatro sustancias resinosas siguientes:

1.° *Trementina de Chipre, de Scio, pistacina; Terebynthina Cypria*, s. *Chia*, s. *pistacina.*

Cyprischer Terpenthin, Al.; cyprian turpenthine, In.; terebinthine de Chio, F.

ba. f. fe. ff. lo. w. *be. c. g. m. pa. sa. sp.*

Sustancia muy espesa, glutinosa, trasparente, de color cetrino verdoso, de olor agradable, y sabor aromático sin amargo ni acritud.

Fluye del *Pistacea Terebinthus*, L., arbol pequeño del Archipiélago (dioecia pentandria, L.; terebintaceas, J.).

2.° *Trementina comun, de pino, de Burdeos, de Boston, de Hungría, Resina líquida de pino, Bálsamo de Hun-*

gria; Terebinthina communis, s. *pini sylvestris*, s. *pinea*, s. *Balsamum nativum pini sylvestris.*

Gemeiner Terpenthin, Al.; common turpentine, In.; terebinthine commune, F.; trementina commune, I.

am. an. b. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. ham. han. li. lo. o. po. r. s. su. w. wu. ww. *a. be. c. g. m. pa.*

Es líquida, de consistencia de jarabe, de olor desagradable, y sabor acre, amargo y nauseabundo.

Esta resina fluye del *Pinus sylvestris*, L., arbol del mediodia de la Francia (monoecia monadelfia, L.; coniferas, J.); y del *Pinus maritima*, Lmk., arbol de los mismos sitios.

3.º *Trementina de Venecia, del larice, de Brianzon; Terebinthina laricea*, s. *larignà*, s. *laricina*, s. *Veneta, Resina liquida pini laricis, Terebinthina*, s. *Balsamum nativum.*

Venetianischer Terpenthin, Al.; Venice turpentine, In.; terebinthine de meleze au de Venise, F.; terebinthina fina, Por.

a. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. su. w. ww. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

Esta resina es bastante líquida, trasparente, de un color algo verdoso, de olor fuerte, no desagradable, y de sabor caliente, acre y amargo.

Se obtiene mediante incisiones hechas en el tronco del *Larix Europea*, Cand., arbol comun en los Alpes (monoecia monadelfia, L.; coniferas, J.).

4.º *Trementina de abeto, ó de Strasburgo; Terebinthina abiegna*, s. *abietina*, s. *Argentoratensis.*

Strasburger Terpenthin, Al.; Strasburgh turpentine, In.; terebinthine de sapin ou de Strasbourg, F.

an. e. f. ff. li. *be. c. g. pa. sp.*

Resina bastante fluida, trasparente ó algo diáfana, de olor fuerte y de sabor acre y muy amargo.

Se estrae del *Abies pectinata*, Cand., arbol que crece en Suiza (monoecia monadelfia, L.; coniferas, J.).

La trementina, lo mismo que todas las resinas, es un escitante enérgico, cuya accion no se limita al aparato digestivo cuando se ha tomado en cierta dósis variable segun los sujetos, sino que se trasmite á mas ó menos órganos por simpatía segun unos, y por absorcion segun otros. De todos estos efectos secundarios solo se han observado por espacio de mucho tiempo los que se manifiestan en el aparato urinario; pero por fin se ha fijado tambien la atencion en los que se verifican igualmente en los órganos respiratorios y en los de las sensaciones, de forma que la trementina, á la que solo se atribuia en otro tiempo una accion específica sobre las vias urinarias, pasa en el dia por egercerla del mismo modo sobre las vísceras torácicas y sobre los nervios. Se administra en la gonorrea especialmente crónica, en la leucorrea, los catarros antiguos de la vegiga, los catarros crónicos del pecho y en las nevralgias.

La trementina se compone principalmente de dos sustancias: una resina, y un aceite volatil. Por consiguiente interesa al médico bajo tres puntos de vista segun que se halle con estas dos sustancias reunidas, ó que presente

tan solo alguna de ellas: cuya distincion es bastante importante y los practicos no fijan en ella toda la atencion que merece, pues las tres sustancias no obran con igual energía sobre los tegidos vivos con quienes se ponen en contacto. Para colocarlas bajo este punto de vista segun su grado de energía, sería menester empezar por el aceite esencial, esponer en seguida la trementina entera y continuar despues con el residuo puro. Pero nosotros no seguiremos este órden, porque nos separaria sin necesidad del curso que hemos seguido en los demas artículos de esta obra.

§. I. PREPARACIONES QUE CONTIENEN LA TREMENTINA ENTERA.

A. *Preparaciones que la contienen disuelta en un liquido alcoholico.*

TINTURA DE TREMENTINA.

Bálsamo vulnerario comun; *Tinctura*, s. *Essentia Terebinthinæ.* (f. *vm.*)

R. Trementina clara, . . . una pt.
Alcohol (26.°), . . . cuatro pt.
Déjese en digestion por seis dias meneando de cuando en cuando y cuélese.

B. *Preparaciones que contienen la trementina suspendida en un liquido acuoso.*

LECHE DIURETICA.

Emulsion trementinada, ó de trementina; *Lac terebinthinaceum*, *Emulsio terebinthinata.* (b.* *pie. sa. sw. vm.*)

R. Trementina de Chio, onz. y med.
Lávese bien en aguardiente y dilúyase en un mortero de marmol con
Yema de huevo, ... n.° 1.
Añadiendo poco á poco
Agua de parietaria, . . . doce onz.
Hágase emulsion. (*pie.*)

R. Goma arábiga, ... tres drac.
Agua, ... c. s.
para hacer un mucílago espeso. Tritúrese este con
Trementina, ... dos drac.
Añadiendo poco á poco
Agua pura, ... nueve onz.
Jarabe comun, . . . onz. y med.
Hágase emulsion (*sw.*)

vm. prescribe una drac. de goma, dos de trementina, ocho onz. de agua y una de jarabe.

R. Trementina de Chio, . dos drac.
Tritúrense con c. s. de yema de huevo y añádase
Julepe comun, ... ocho onz.
Méz. ex. (*sa.*)

b.* prescribe med. onz. de trementina, dos yemas de huevo, dos onz. de jarabe de altea, y ocho onz. de agua ó vino blanco, como se quiera.

R. Trementina, ... dos drac.
Mucílago de goma arábiga, med. onz.
Tritúrense y añádase poco á poco
Miel blanca, ... onz. y med.
Agua de enebro, . . . nueve onz.
Espíritu de nitro dulce, una drac.
Méz. (*sw.**)

Escitante, que ha sido preconizado en las enfermedades crónicas de la vegiga, y de su conducto escretorio.

LOOC TREMENTINADO.

Looch leniens balsamicum. (sp.)

R. Polvos de goma tragacanto,
diez y seis onz.
Tisana comun, ... med. onz.
Hágase un mucílago y añádase meneando sin cesar
Jarabe de altea y
Aceite de almendras dulces,
a. . . . . una drac.
Trementina triturada con yema de huevo, ... un escrp.
Tisana pectoral, tres onz. y med.

AGUA TREMENTINADA.

Potio terebintinata. (sw.)

R. Trementina de Venecia,
cuatro lib.
Mirra, ... una onz.
Tritúrese y añádase poco á poco
Agua, . . . veinte y cuatro lib.
Déjese reposar y consérvese el líquido decantado en doce botellas.

Aconsejada en las enfermedades de las vias urinarias y respiratorias, las afecciones de la piel, la dismenorrea, la leucorrea, el histerismo, el período de supuracion de la viruela, &c. — Se administra del mismo modo que el agua de Pez. — Alguna vez se añade con ventaja una onz. de sub-carbonato de potasa.

MISTURA DIURETICA. (*bo. pie.*)

R. Trementina, ... una drac.
Yema de huevo, ... n.° 1.
Tritúrense juntos y añádase poco á poco
Agua de peregil y
—— de fresas, a. . . . tres onz.
Miel de Narbona, . . . med. onz.
Jarabe de altea, ... una onz.
Para tomar á cuch. cuatro veces al dia. — Barthez la usaba mucho.

MISTURA BALSAMICA. (*bo.*)

R. Trementina, ... dos drac.
Yema de huevo, ... n.° 1.
Tritúrense juntos y añádase
Infusion de regaliz, . . . diez onz.
Jarabe de altea, ... una onz.
Boerhaave la daba en la gonorrea.
Dósis; una cuch. cada med. hora.

INYECCION TREMENTINADA. (*b.* sa.*)

R. Trementina de Strasburgo,
tres drac.
Tritúrese con c. s. de yema de huevo y añádase poco á poco
Infusion espesa de simiente de lino,
una lib.
Hágase emulsion. (*sa.*)

R. Trementina de Venecia, med. onz.
Agua destilada, ... ocho onz.
Tritúrense juntos y añádase
Tintura de benjuí, . . dos drac.
Méz. ex. (b.*)

Detharding aconsejaba esta última inyeccion en la dureza de oido y en la sordera. — La otra lo ha sido en la leucorrea.

ENEMA TREMENTINADO. (b.* ff. *sa. sp. sw.*)

R. Trementina de Venecia,
de med. á una onz.
Tritúrese en c. s. de yema de huc-

vo ó en un mucílago cualquiera, y añádase poco á poco

Agua de fuente, . seis á ocho onz.

Méz. ex. (b.* ff.)

R. Trementina de Venecia, una onz.

Tritúrese con yema de huevo y añádase

Cocimiento de cebada, . . seis onz.

Méz. ex. *(sw.)*

R. Trementina de Venecia, c. s. q.
Yemas de huevo, ... c. s.
Cocimiento de cebada, . . seis onz.
Miel ó electuario lenitivo,
seis drac.

Hágase emulsion. *(sa.)*

R. Trementina triturada con yema de huevo, ... med. onz.
Cocimiento emoliente, . diez onz.
Aceite de simiente de lino,
una onz.

Méz. por trituracion. *(sp.)*

R. Trementina de Venecia triturada con yema de huevo,
de una drac. á med. onz.
Cocimiento emoliente, . una lib.
Aceite de simiente de lino y
Jarabe de espino serval,
a. . . . . una onz.

Méz. ex. *(sw.)*

Aconsejada en la constipacion, la nefritis, la iscuria calculosa, el cólico nefrítico y el de plomo.

ENEMA CALMANTE. (*au. sm*)

R. Trementina, ... una drac.
Yemas frescas de huevo, . n.° 1.

Tritúrense en un mortero y añádase

Triaca, ... cuatro drac.

Dilúyase en seguida todo en

Leche caliente, . . . cuatro onz.

Van-Swieten la usaba para calmar los cólicos y los pujos que acompañan la diarrea en los tísicos. Se ha usado tambien con buen éxito en las tisis llamadas intestinales, es decir, las que suceden á la enteritis aguda ó crónica. *(sm.)*

au. prescribe ocho onz. de leche, med. onz. de trementina triturada con yema de huevo, otro tanto de triaca y una onz. de miel rosada.

LAVATIVA ASTRINGENTE. (*sm.*)

R. Trementina comun, cuatro drac.
Aceite de lino, ... dos onz.
Yemas de huevo frescas, dos drac.

Tritúrense en un mortero y añádase poco á poco

Agua de cal, ... seis onz.

Prescrita por Wintringhan en los mismos casos que la precedente.

LAVATIVA BALSAMICA ASTRINGENTE. (*bo. pie.*)

R. Flores de manzanilla, . dos puñ.
Leche, ... c. s.

Hágase hervir hasta obtener ocho onz. de líquido colado y añádase á este

Trementina triturada con yema de huevo, ... tres drac.
Miel rosada, ... una onz.

Méz. ex. (*bo.*)

R. Azafran y
Hipericon, a. . . . . un puñto.
Leche, ... c. s.

Háganse hervir juntos y añádase al líquido colado

Trementina triturada con yema de huevo, ... med. onz.

Triaca, ... dos drac.
Méz. (*bo. pie.*)

Esta lavativa puede ser útil en las mismas circunstancias que las precedentes.

INYECCION TREMENTINADA.

Injectio terebintinacea. (au.)

R. Trementina, ... dos onz.
Yema de huevo, ... una onz.
Miel, ... dos onz.
Alcohol, ... med. onz.
Agua, ... nueve onz.
Méz.

R. Jabon medicinal, . . . una onz.
Trementina, ... med. onz.
Agua, ... ocho onz.
Tintura de benjui, . . . tres drac.
Méz. ex.

C. *Preparaciones que contienen la trementina mezclada con cuerpos grasos.*

MISTURA ASTRINGENTE. (b.*)

R. Trementina de Venecia,
Bálsamo de copaiba y
Aceite de sucino rectificado,
a. . . . . part. ig.

Aconsejada en la blenorrea y en las poluciones. — Dósis; de treinta á sesenta got. tres veces al dia con una cuchta. de azucar, bebiendo despues medio vaso de vino bueno.

MERMELADA ANTINEFRITICA.

Conditum nephriticum. (sw.)*

R. Trementina, . . . cuatro escrp.
Aceite de almendras dulces, dos onz.

Tritúrense juntos y añádase

Arrope de enebro sin azucar, cuatro onz.
Ojos de cangrejo porfirizados, med. onz.

Util en la nefritis crónica. — Dósis; dos drac. muchas veces al dia.

UNGUENTO DE TREMENTINA.

Unguentum terebinthinatum. (a.)

R. Ungüento simple, . nueve onz.
Trementina, ... dos lib.

Lícuense á un fuego suave y menéese hasta que se enfrie.

ESPARADRAPO ORDINARIO.

Esparadrapo comun. (a. ff. pa. *vm.*)

R. Trementina, ... una pt.
Aceite comun, ... cuatro pt.
Cera amarilla, ... ocho pt.

Lícuense juntos al B. M. y estiéndanse sobre tiras de lienzo. (ff.)

vm. prescribe una parte de trementina, una y media de sebo de carnero y cuatro de cera blanca; — a. seis onz. de cera amarilla, dos de sebo de carnero, una y media de manteca y otro tanto de trementina; — pa. med. lib. de cera blanca, cuatro onz. de sebo de ciervo, onza y med. de trementina y c. s. de aceite de rosas.

UNGUENTO EMOLIENTE.

Unguentum lenitivum. (g. *sw.*)

R. Mucílago cualquiera, . una lib.
Manteca de vacas fresca, dos lib.

Cera amarilla, ... media lib.

Cuézase á un fuego manso hasta que se consuma la humedad, y añádase

Trementina de Venecia, una onz.

Se añade alguna vez á cada lib. de este ungüento tres onz. de esencia de trementina y una drac. de opio. — Aconsejado en los infartos lácteos de los pechos, los dolores nefríticos, la iscuria, y la rigidez de las articulaciones.

g. prescribe tres drac. y med. de aceite, una lib. de cera amarilla, med. lib. de colofonia y tres onzas de trementina.

Este ungüento se parece mucho á alguna de las fórmulas que se han indicado para la preparacion del de altea ó el de mucílago.

PAPEL DE CAUTERIO. (*sa.*)

R. Trementina pura y
Cera blanca, a. . . onza y med.
Esperma de ballena, . una drac.
Lícuense al B. M. para estenderlo en papel muy liso.

PEZ PARA CAUTERIOS.

Pisa pro fonticulis. (*b.**)

R. Trementina de Venecia, c. s. q.
Cera amarilla . . . onza y med.
Polvos de raiz de curcuma, una onz.
——————— de lirio, media onz.

UNGUENTO DEPILATORIO. (*sw.*)

R. Trementina de Venecia, diez drac.
Resina comun, ... una onz.

Lícuense juntos y consérvense en sitio fresco. — Se toma un poco entre los dedos mojados, se coge el pelo y se arranca con un movimiento repentino.

EMPLASTO GRATIA-DEI. (*vm.*)

R. Cera amarilla y
Resina comun, a. . . nueve pt.
Lícuense juntos y añádase
Trementina, ... cinco pt.
y despues cuando la masa principie á congelarse
Polvos de incienso, . . . tres pt.

BÁLSAMO DE FRAHM.

Linimento digestivo; Unguentum Terebinthinatum, s. *balsami et olei laricis, Balsamum Frahmii.* (b.* ba. *sw. vm.*)

R. Cera amarilla, ... una pt.

Lícuense á un fuego manso y añádase una mezcla licuada aparte de
Trementina de Venecia y
Esencia de trementina, a. una pt.
Méz. ex. (b.* ba. *vm.*)

sw. prescribe una parte de esencia, cuatro de trementina y cuatro de cera.

Alabado mucho en las úlceras antiguas de las piernas.

LINIMENTO ANTI-HEMORROIDAL.

R. Trementina de Venecia,
Miel de Narbona y
Aceite comun, a. . . . una onz.

Méz. por trituracion.

DIGESTIVO LIQUIDO.

Digestivum liquefactum. (sp.)

R. Trementina clara, . . . dos onz.
Yemas de huevo, . . . una onz.
Tritúrense y añádase poco á poco
Miel, ... dos onz.
Agua de fuente, . . cuatro onz.
Alcohol, ... seis onz.

Usado por Plenk en inyecciones en las fístulas.

POMADA DULCIFICANTE Y BALSAMICA.

(*sm.*)

R. Aguardiente,
Flor de harina de trigo,
Azúcar blanca,
Clara de huevo fresca,
Trementina,
Aceite comun y
Miel blanca, a. . . . . una onz.

Mézclense la miel y la trementina; añádanse en seguida poco á poco las otras sustancias, triturando siempre.

Util en las úlceras, escoriaciones y heridas acompañadas de dolores vivos.

BALSAMO DE ARCEO.

Ungüento de elemi, Ungüento de elemi y de trementina, Ungüento de trementina y de manteca; Balsamum Arcei, Unguentum amyrci elemiferæ, s. *Arcei*, s. *balsamicum*, s. *basilicum*, s. *digestivum flabum*, s. *elemi*, s. *elemi compositum*, s. *elemi et terebinthinæ*, s. *resinæ flavæ*, s. *resinæ elemi*, s. *sebi Arcei.* (ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. ff. fu. g. han. he. li. lo. pa. po. pr. r. s. sa. w. *br. ca. pid. sp. sv. vm.*)

R. Trementina, . . diez y seis onz.
Goma elemi, ... dos lib.
Resina comun, . dos lib. y med.
Aceite comun, . . . lib. y med.
Cera amarilla, . . . cuatro onz.
Lícuense juntos. (fe.)

R. Trementina de Venecia,
Resina elemi y
Sebo de carnero, a. . . dos onz.
Aceite de hipericon, . . una onz.
Leño de sándalo rojo, una drac.

Lícuese la resina elemi en la trementina á un fuego muy suave; añádase poco á poco el sebo y el aceite licuados juntos, é incorpórese el leño pulverizado. (sa. w.)

R. Trementina y
Resina elemi, a. . . . . seis pt.

Lícuense juntos á un fuego suave meneando con frecuencia; retírese del fuego y añádase poco á poco

Sebo de carnero licuado, seis pt.
Aceite de hipericon, . . dos pt.

Cuélese por una franela, y tritúrese en un mortero hasta que se enfrie del todo. (li.)

a. ams. an. ba. be. o. po. pr. y s. prescriben partes ig. de trementina y de elemi, de manteca y de sebo de carnero; — p. y c. diez onz. de trementina, una lib. de elemi, dos onz. de aceite y dos lib. de sebo; — f. y ff. tres partes de trementina, otro tanto de elemi, dos partes de manteca y cuatro de sebo; — e. cinco de tre-

mentina, otras cinco de elemi, otro tanto de manteca y seis de sebo;—r. seis de trementina, seis de elemi, ocho de manteca y cuatro de sebo;—una y med. de trementina, otro tanto de elemi, uno de manteca y dos de sebo;—fu. he. y *pid.* tres de trementina, lo mismo de elemi, otro tanto de sebo de ciervo y dos de aceite de hipericon;—br. y pa. seis de trementina, otro tanto de elemi, dos de sebo de macho y una de aceite de hipericon.

R. Trementina y
Resina elemi, a. . . . seis pt.
Sebo de carnero, ... diez pt.
Lícuense juntos. (lo. *br.*)

an. prescribe una parte de trementina, otra de elemi y dos de sebo de carnero;—g. catorce de trementina, doce de elemi y veinte y cuatro de sebo de carnero.

R. Trementina de Venecia, seis onz.
Aceite comun, ... seis drac.
Añádase á la mezcla licuada
Resina elemi y
Sebo de carnero, a. . . seis onz.
Cera amarilla, ... seis drac.
Méz. ex. (du.)

Escitante bastante usado en la práctica quirúrgica, y uno de los mejores de todos los que sobrecargaban antiguamente esta ciencia.—La segunda fórmula es la del inventor.

BALSAMO VULNERARIO. (b.* w.)

R. Trementina de Venecia,
onz. y med.
Resina elemi, ... med. onz.
Añádase á la mezcla licuada
Aceite de hipericon, . onz. y med.
Aceite de cera, ... dos escrp.
Méz. (w.)

R. Trementina de Venecia y
Resina elemi, a. . . onz. y med.
Sebo de macho cabrío, . dos onz.
Bálsamo de Tolú, . . . una onz.
Hágase ungüento. (b.*)

Los mismos usos que el precedente, del que apenas se diferencia.

UNGUENTO DE TREMENTINA ALCANFORADO. (ff.)

R. Bálsamo de Arceo,
ciento y cincuenta pt.
Alcanfor, ... una pt.
Tritúrese con cuidado.

DIGESTIVO DE PLENK.

Bálsamo de Arceo líquido. (*ca. sp. vm.*)

R. Bálsamo de Arceo y
Yemas de huevo, a. . . una onz.
Tritúrense bien juntos y dilúyanse en
Aguardiente, ... ocho onz.
Consérvese. (*sp.*)

R. Trementina y
Miel comun, a. . . . . dos onz.
Yemas de huevo, . . . una onz.
Alcohol, ... seis onz.
Agua, ... cuatro onz.
Méz. por trituracion. (*ca.*)

R. Bálsamo de Arceo, . . . dos pt.
Petroleo rectificado, . . una pt.
Tritúrense juntos. (*vm.*)

Supurativo.—Puede usarse en inyecciones.

UNGUENTO DIGESTIVO SIMPLE.

Unguentum digestivum, s. *digestivum simplex*, s. *luteum*, *Unguentum terebin-*

thinæ, s. *de terebinthina*, *Balsamum terebinthinatum.* (d. f. fu. he. li. pp. r. ww. *br. pid. ra.*)

R. Trementina de Venecia, una lib.
Yemas de huevo, . . . n.º 80.
Méz. (r.)

R. Trementina de Venecia, una lib.
Yemas de huevo, . . . n.º 12.
Consérvese (ww.)

R. Trementina, ... med. lib.
Yemas de huevo, ... n.º 4.
Tritúrense juntos y añádase
Aceite de hipericon, onz. y med.
Méz. ex. (he. *pid.*)

f. prescribe dos partes de trementina, una de yema de huevo, y bastante aceite de hipericon por infusion para obtener un ungüento líquido; — y li. una lib. de trementina, ocho yemas de huevo y tres onz. de aceite comun.

R. Trementina de Venecia y
Aceite comun, a. . . . una lib.
Cera blanca, ... med. lib.
Lícuense juntos y menéese hasta que se enfrie completamente. (*br.*)

pp. prescribe dos partes de cera, dos de trementina, y seis de manteca de puerco.

R. Trementina de Venecia,
dos drac.
Cera amarilla, . . drac. y med.
Lícuense á un calor suave y añádase
Esencia de trementina, dos drac.
Méz. ex. (d.)

R. Trementina de Venecia,
med. onz.
Miel rosada, ... una onz.
Aceite de hipericon, . tres drac.
Yemas de huevo, ... n.º 1.
Méz. ex. (fu.)

R. Bálsamo de Arceo, . . una onz.
Cerato, ... dos onz.
Yemas de huevo, ... n.º 1.
Méz. (*ra.*)

Escitante, usado en la curacion de las heridas, y de las ulceras en cuya superficie se necesita reanimar la accion vital.

UNGUENTO DIGESTIVO COMPUESTO.

Ungüento digestivo animado; Unguentum digestivum aloeticum, s. *myrrhatum.* (br. fu. han. li. o. pa. po. pr. s. su. w. *pid. ra. sp. sw. vm.*)

1.º Con acibar.

R. Acibar . . . . . una pt.
Miel rosada, ... cuatro pt.
Tritúrense juntos y añádase
Trementiua clara, . . . doce pt.
Aceite de hipericon, . . tres pt.
Méz. ex. (han. pr. *vm.*)

R. Trementina de Venecia,
med. lib.
Miel cruda, ... cuatro onz.
Tintura de acibar, . . . tres onz.
Yemas de huevo, ... n.º 4.
Méz. ex. (po.)

R. Trementina, ... dos onz.
Aceite de hipericon, . med. onz.
Méz. y emulsiónese en seguida con
Yema de huevo, ... n.º 1.
Añádase poco á poco
Tintura de acibar y
——— de mirra, a. drac. y med.
Méz. ex. (*vm.*)

2.º Sin acibar.

R. Trementina de Venecia, med. lib.

Yemas de huevo, ... n.° 4.
Tritúrense juntos y añádase
Polvos de mirra, ... seis drac.
Aceite comun, . . . onz. y med.
Méz. ex. (su.)

R. Trementina de Venecia,
nueve onz.
Aceite de mirra, . . onz. y med.
Añádase
Yemas de huevo, ... n.° 2.
Méz. ex. *(sw.)*

R. Trementina de Strasburgo,
ocho onz.
Yemas de huevo, ... n.° 4.
Tritúrense juntos y añádase
Aceite de hipericon, onz. y med.
Polvos de incienso y
——— de mirra, a. . . tres drac.
Méz. ex. (br. w. *pid. sp.*)

pa. prescribe una lib. de trementina, tres yemas de huevo, tres onz. de aceite de hipericon y med. onz. de cada uno de los dos polvos; — y s. cuatro partes de trementina, c. s. de yemas de huevo, una parte de aceite de hipericon y la octava parte de cada uno de los dos polvos.

R. Trementina, ... med. lib.
Yemas de huevo, ... n.° 4.
Tritúrense juntos y añádase
Aceite de hipericon, onz. y med.
Polvos de mirra y
——— de incienso, a. tres drac.
Azafran macerado en alcohol, c. s. para teñir la masa de amarillo. (o.)

R. Bálsamo de Arceo, . . dos onz.
Yemas de huevo, ... n.° 2.
Aceite comun, ... dos onz.
Méz. ex. (ra.)

R. Bálsamo de Arceo y
Ungüento estoraque, a. dos drac.
Yemas de huevo, ... n.° 2.
Esencia de trementina, una onz.
Méz. ex. *(ra.)*

fu. prescribe que se haga el digestivo animado añadiendo al simple dos drac. de mirra y otro tanto de incienso; — li. añade cuatro gr. de mirra y otro tanto de incienso á cada drac. del digestivo simple. — Se puede tambien aumentar la propiedad detersiva de este ungüento, añádiendole ya sea ungüento egipciaco (f.), ó ya de verde gris *(sw.)*.

UNGUENTO DIGESTIVO OPIADO. (*ra.*)

R. Ungüento digestivo simple,
cuatro onz.
Láudano líquido de Sydenham,
una onz.
Méz. ex.

Se puede reemplazar el láudano con dos drac. de opio pulverizado.

BÁLSAMO LOCATELI.

Balsamum Locatelli, s. *Italicum*, s. *Italicum rubrum.* (ams. b. br. f.* fu. g. li. pa. s. sa. w. *sp. vm.*)

R. Aceite comun, ... una lib.
Trementina y
Cera amarilla, a. . . . med. lib.
Leño de sándalo rojo, . . una onz.

Lícuese la cera con un poco de aceite, añádase lo restante del aceite y la trementina, despues el leño pulverizado y menéese hasta que se enfrie. (g.)

R. Trementina, ... cuatro pt.
Leño de sándalo rojo, . . una pt.

Déjese en digestion por una hora so-

bre cenizas calientes en vasija tapada; lícuese despues á parte

Cera amarilla, ... seis pt.

Añádase

Aceite comun, ... doce pt.

despues el leño y la resina, déjese entonces al fuego por un cuarto de hora, cuélese esprimiendo con fuerza y añádase antes que acabe de enfriarse

Bálsamo del Perú, . . . una pt.

Menéese hasta que se haya incorporado el bálsamo. *(vm.)*

R. Cera amarilla, . . . cuatro onz.

Aceite comun, ... seis onz.

Lícuense á un fuego suave y añádase

Trementina de Venecia, seis onz.

Leño de sándalo rojo, med. onz.

Cuélese y añádase todavía

Bálsamo del Perú, . . dos drac.

Consérvese. (b.)

ams. prescribe cuatro onz. de cera, seis de aceite, seis de trementina, una de leño, y otra de bálsamo; — y pa. seis onz. de cera, nueve de aceite, cinco de trementina, c. s. de leño y seis drac. de bálsamo.

R. Aceite comun, ... seis onz.

Cera amarilla, . . . cuatro onz.

Vino de Madera, . . cinco onz.

Cuézase á un fuego lento hasta que se consuma la humedad y añádase

Trementina de Venecia, seis onz.

Bálsamo del Perú, . . dos drac.

Leño de sándalo rojo, . med. onz.

Consérvese. (w. *sp.*)

f.* prescribe seis onz. de cera, nueve de aceite, dos de vino de España, nueve de trementina, una de leño de sándalo rojo, y una y media de bálsamo del Perú.

R. Aceite comun, ... dos lib.

Vino de Madera, . . . una lib.

Trementina de Venecia, ocho onz.

Hiérvase á fuego manso hasta que se evapore la humedad y añádase

Bálsamo del Perú,

Sangre de drago y

Estoraque calamita, a. una onz.

Menéese hasta que se enfrie completamente. (sa.)

R. Cera amarilla, ... una pt.

Aceite comun, ... pt. y med.

Despues de derretida la mezcla añádase

Trementina de Venecia, pt. y med.

Añádase todavía al separarlo del fuego

Bálsamo del Perú negro, una décimasesta pt.

Goma quino, una duodécima pt.

Consérvese. (br. s.)

R. Aceite comun, . . . cuatro onz.

Cera amarilla, . . . onz. y med.

Lícuense lentamente y añádase

Trementina, ... tres onz.

Retírese del fuego y añádase todavía sin dejar de menear

Bálsamo de copaiba, . med. onz.

Goma quino, ... tres drac.

Consérvese. (fu. li.)

Usado al esterior como balsámico, detersivo y vulnerario. En el dia se usa poco.

BÁLSAMO DE GENOVEVA.

Ungüento de trementina alcanforado. (f. *ca. vm.*)

R. Vino tinto y

Aceite comun, a. . . . . tres lib.

Cera amarilla y
Agua de rosas, a. . . . med. lib.
Leño de sándalo rojo, . dos onz.
Hiérvase por media hora meneando con una espátula de madera; añádase
Trementina de Venecia, una lib.
incorpórense exactamente; cuando se haya enfriado un poco la masa añádase todavía
Alcanfor pulverizado, . dos onz.
cuélese, y despues de algunas horas de reposo esprímase. *(ca.)*

R. Cera amarilla, ... med. lib.
Aceite comun, ... una lib.
Lícuense y déjese al fuego la mezcla por una hora con
Leño de sándalo rojo, . dos onz.
Añádase en seguida
Trementina, ... una lib.
Cuélese esprimiendo con fuerza, y cuando la masa esté casi fria añádase
Alcanfor en polvo, . . dos drac.
Menéese hasta que se enfrie del todo. *(vm.)*

R. Aceite comun,
trescientas ochenta y cuatro pt.
Cera amarilla,
sesenta y cuatro pt.
Leño de sándalo rojo, catorce. pt.
Trementina,
ciento veinte y ocho pt.
Déjese en digestion á un calor suave, y un poco antes de enfriarse añádase
Alcanfor, ... dos pt.
Méz. ex. (f.)

En otro tiempo se alababa en las ulceraciones, y aun la gangrena.

BALSAMO CHIRON. (f.*)

R. Aceite comun, ... seis onz.
Trementina, ... dos onz.
Cera amarilla, ... una onz.
Raiz de Ancusa, ... c. s.
Caliéntense juntos, y añádase despues sucesivamente
Bálsamo del Perú negro,
drac. y med.
Alcanfor en polvo, . . . doce gr.

Este bálsamo, que se diferencia poco del precedente, ha caido en un olvido tan completo en el dia como él. Hace poco tiempo que un especulador ha solicitado permiso del gobierno para introducirle en Francia; pero esta pretension ridícula ó injuriosa á los farmacéuticos ha sido desechada.

BALSAMO PECTORAL.

R. Trementina y
Aceite de almendras dulces, a.
diez y ocho drac.
——— de hipericon, . dos onz.
Esperma de ballena, . med. onz.
Sangre de drago,
Estracto acuoso de opio y
Bálsamo del Perú, a. . dos drac.
Manteca de vacas, . onz. y med.
Méz. ex.

Meibomio hacia tomar diez ó quince gotas al dia de este bálsamo con la esperanza ridícula de precaver por su medio la tisis pulmonal.

ESPARADRAPO DE EMPLASTOS. (f.)

R. Emplasto comun,
——— diaquilon gomado y
——— de cera amarilla, a.
quince pt.
——— de trementina,
veinte y cinco pt.

Lícuense juntos al B. M., y estiéndanse despues sobre tiras de lienzo.

EMPLASTO CONTRA LA APOPLEGIA.

(w. *sp.*)

R. Trementina de Venecia, tres drac.
Gálbano y
Opoponaco, a. . . . . dos drac.
Raiz de pelitre,
Pimienta larga y
Castoreo, a. . . . . una drac.
Aceite de sucino, . . . un escrp.
Hágase emplasto. (w.)

R. Aceite de nueces, ... dos onz.
Trementina y
Resina comun, a. . . cuatro onz.
Colofonia, ... doce onz.
Cera amarilla, sesenta y cuatro onz.
Lícuense juntos y añádase
Polvos de sucino,
——— de tacamaca,
——— de resina caraña y
——— de sandaraca, a. onz. y med.
——— de incienso,
——— de almáciga,
——— de estoraque y
——— de benjuí, a. . . una onz.
——— de raiz de juncia redonda,
——— de pelitre,
——— de angélica y
——— de lirio de Florencia, a. med. onz.
Méz. ex. y cuando la masa esté casi fria añádase
Grasa de castor y
Alcanfor, a. . . . . dos drac.
Aceite esencial de macías
———— de mejorana,
———— de clavos,
———— de leño de Rodas y
———— de espliego, a. dos escrp.
———— de salvia,
———— de romero,
———— de manzanilla y
———— de sucino, a. doce got.
Méz. ex. (*sp.*)
En otro tiempo se usaba en la apoplegía y la paralísis, aplicándolo á la cabeza despues de rasurada.

BALSAMO VERDE. (pa.)

R. Yerba florida de espliego,
———— de salvia,
———— de hisopo,
———— de mejorana,
———— de tomillo,
———— de alcaravea con simiente,
———— de menta acuática
———— rizada,
———— de llanten,
———— de romero,
———— de alquimila,
———— de vara de oro,
Flores de manzanilla y
——— de rosas rojas, a. med. onz.
Aceite comun y
——— de rosas, a. . . . dos lib.
——— de lino, ... una lib.
Déjense en infusion aparte, y añádase despues
Trementina y
Sagapeno, a. . . . . una lib.
Incienso, ... med. lib.
Déjense en digestion al B. M., cué-

lese esprimiendo con fuerza, y añádase á la masa medio fria

Aceite de espliego,
Esencia de trementina y
Petróleo, a. . . . . cuatro onz.

Usado en otro tiempo al interior y al esterior como escitante, mundificante y aglutinante.

D. *Preparaciones que contienen la trementina mezclada con sustancias secas.*

PILDORAS DE TREMENTINA.

Píldoras diuréticas, Píldoras balsámicas aperitivas. (dd. g. *ca. e. pie. sm. sw.*)

R. Guayaco, ... una drac.
Trementina , ... c. s.
para hacer quince píldoras. — Dósis; una tres veces al dia. (*e.*)

R. Trementina , ... med. drac.
Bálsamo de Tolú , . . dos escrp.
Ojos de cangrejo , ... c. s.
Háganse píldoras de tres granos. (g.)

R. Trementina comun y
Ruibarbo en polvo, a. . dos drac.
Háganse píldoras de dos gr. (dd.)
Dósis ; cinco á la vez.

R. Goma arábiga, ... med. onz.
Agua , ... c. s.
para hacer un mucílago.
Trementina, ... seis drac.
Hágase una emulsion espesa y añádase
Polvos aperitivos, ... c. s.
Háganse píldoras de cinco granos. (*sw.**)
Dósis; tres, cuatro veces al dia. Si es necesario puede reemplazarse la trementina con el bálsamo de copaiba.

R. Trementina, ... dos drac.
Regaliz en polvo, ... c. s.
Háganse píldoras de cuatro granos. (*ca. sm.*)

Estas diversas píldoras, de las cuales las terceras son de De-Haen, se han usado con particularidad como diuréticas.

BOLOS ANTIGONORRAICOS. (*pie. sm.*)

R. Trementina de Venecia,
uno á dos escrp.
Tritúrese con una yema de huevo y añádase
Polvos de regaliz, ... c. s.
para hacer cuatro bolos.
Dósis; uno cada seis horas.

Estos bolos no se diferencian de las píldoras precedentes segun la fórmula de De-Haen. — Son de Astruc.

PILDORAS ASTRINGENTES. (*sm.*)

R. Trementina de Venecia, dos onz.
Estracto de ruibarbo, tres drac.
Alcanfor, ... dos drac.
Háganse píldoras de cuatro granos.

Contra la leucorrea y la blenorrea. — Dósis; nueve cada dia en tres veces.

PILDORAS TRAUMATICAS. (fu.)

R. Trementina de Venecia,
Zumo de regaliz y
Estracto de mil en rama, a.
una drac.
Polvos de almáciga y
—— de incienso, a. med. drac.
Hágase masa de píldoras.

Dósis; de diez á veinte gr.

PILDORAS BALSAMICAS. (*ca.*)

R. Trementina de Chio y
Esperma de ballena, a. med. onz.
Mirra, ... dos drac.
Incienso en polvo, ... c. s.
Háganse píldoras de tres granos.—Dósis; una cada tres horas en la tisis pulmonal.

PILDORAS FUNDENTES. (*pie. sm.*)

R. Trementina, ... veinte got.
Estracto de regaliz, . . dos drac.
Jabon blanco, . . . cuatro drac.
Jarabe de las cinco raices, . c. s.
Háganse píldoras de cuatro granos. (*pie. sm.*)

Dósis; tres cada vez, tres veces al dia, en los cálculos biliarios.

R. Trementina, ... dos escrp.
Estracto de ruibarbo, . una drac.
——— de diente de leon, med. onz.
Jabon blanco, ... dos drac.
Jarabe de las cinco raices, c. s.
Háganse píldoras de cuatro granos. (*sm.*)

Las mismas dósis que en las precedentes, en las obstrucciones abdominales.

Estas dos fórmulas son de Tronchin.

PILDORAS CONTRA LA TENIA. (*au.*)

R. Trementina de Venecia, una drac.
Jabon de jalapa, . . . med. drac.
Estracto de beleño, . . cuatro gr.
Mercurio dulce, ... ocho gr.
Háganse píldoras de doce granos.

Hufeland prescribe se tomen cuatro cada tres horas, continuando dos ó tres dias seguidos.

TROCISCOS CIFEOS.

Trochisci cypheos, *Cyphoides Galli.* (pa. *sp.*)

R. Trementina de Chio, . seis drac.
Pulpa de uvas, dos onz. y med.
Bedelio, ... med. onz.
Mirra,
Leño de aloes,
Azafran,
Canela,
Nardo de Indias y
Casia leñosa, a. . . . . una drac.
Esquenanto, ... tres drac.
Cálamo aromático, . . dos drac.
Miel, ... cinco onz.
Vino de Grecia, ... c. s.
Méz. ex. (*sp.*)

R. Pasas y
Trementina cocida, a. . tres onz.
Esquenanto y
Mirra, a. . . . . onz. y med.
Cálamo aromático, . nueve drac.
Bedelio,
Nardo de Indias,
Casia leñosa,
Juncia redonda y
Enebro, a. . . . . tres drac.
Asfalto, ... dos drac. y med.
Azafran, ... una drac.
Miel y
Vino de Creta, a. . . . . c. s.

Disuélvanse el bedelio, la mirra y la trementina en el vino, redúzcase el líquido á la consistencia de miel, mézclese el residuo con la miel y las pasas

trituradas juntas por mucho tiempo, y añádanse las otras sustancias reducidas á polvos muy finos. Séquense los trociscos á la sombra. (pa.)

Estos trociscos entran en el Mitridates.

§. II. Preparaciones que contienen el aceite de trementina esclusiva ó principalmente.

esencia de trementina.

Aceite esencial ó Epireto de Trementina; Ætheroleum, s. *Spiritus*, s. *Alcohol*, s. *Oleum Terebinthinæ*, *Oleum volatile*, s. *æthereum pini*, s. *laricis*, *Spiritus Olei Terebinthini æthereus.*

1.º Como se encuentra en el comercio. (am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. ff. fi. li. lo. r. su. *c. g. m. pa. sp.*)

Este es un líquido sin color, de un olor desagradable y muy fuerte, y de un sabor acre y quemante. Su densidad es de 0,870.

Se obtiene del *Pinus Muglio* un producto análogo, pero verdoso, y de un olor agradable que se llama *Oleum templinum.*

Muchas farmacopeas recomiendan se rectifique la esencia del comercio destilándola con agua; — an. ba. fi. y *br.* prescriben una parte de aceite y dos de agua; — y du. ed. lo. y *c.* una de aceite y cuatro de agua.

Van-Mons observa que cada vez que se rectifica se descompone una parte de aceite, que se forma ácido acético, que queda mas ó menos residuo, y que el aceite se hace cada vez menos soluble en el alcohol.

2.º Preparado por el farmacéutico. (a. an. br. du. e. fe. fu. g. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. w. wu. *c. pid. sw. vm.*)

R. Trementina de Venecia y
Agua comun, a. . . . . peso ig.

Pónganse en un alambique de vidrio al B. A.; enlódese la cabeza y destílese, y sepárese el aceite que sobrenade en el agua. (*vm.*)

a. han. o. po. pr. r. y *sw.* no fijan la proporcion relativa del agua y de la trementina; — am. y *c.* prescriben cinco partes de trementina y cuatro de agua; — he. su. wu. y *pid.* una de trementina y tres de agua; — fu. li. pa. s. y w. una de trementina y cuatro de agua; — br. g. sa. y w. una de trementina y seis de agua; — p. cinco de trementina y seis de agua; — y e. una de trementina y cuarenta de agua.

La esencia de trementina es mas escitante que la trementina misma, y se ha aconsejado y usado en las mismas circunstancias.

A. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina disuelta en eter.*

ETER TREMENTINADO. (*ca. sw.* vm.*)

R. Acido sulfúrico y
Alcohol rectificado, a. . part. ig.

Mézclense poco á poco y estráigase el eter por la destilacion. Añádase á este

Esencia de trementina, . . c. s. para saturarle, menéese bien, déjese

en reposo por un dia y destílese. (*vm.*)

R. Alcohol, ... dos lib.
Esencia de trementina, med. lib.
Mézclese y añádase poco á poco
Acido nítrico concentrado, dos lib.
Destílese la mitad á un fuego manso. (*ca. sw.**)

Usado tanto al esterior como al interior en los cálculos biliarios, ictericia, los infartos del hígado y los reumatismos.

Dósis; de veinte á cuarenta got. en miel ó en una yema de huevo azucarada.

LINIMENTO ETEREO DE TREMENTINA. (*vm.*)

R. Esencia de trementina, c. s. q.
Espíritu de nitro dulce, . . . c. s.
para disolver el aceite agitándolo.

Los mismos usos que la precedente.

MISTURA FUNDENTE. (b. dd. *au. ca. pie.*)

R. Esencia de trementina, una pt.
Eter sulfúrico, ... tres pt.
Disuélvase. (*b.* au.*)

dd. y *ca.* prescriben una parte de esencia y dos de eter; *pie.* dos de esencia y tres de eter; — y *ca.* en otro lugar una de esencia y catorce de eter.

Aconsejado por Durande contra los cálculos biliarios. — Dósis; de dos escrp. á una drac. cada dia en suero ó caldo.

MISTURA DIURETICA. (*ca.*)

R. Esencia de trementina, una onz.
Alcohol de coclearia, . med. onz.
Acido hydroclórico y
—— nítrico alcoholizado, a. . . . . tres drac.
Acido sucínico y
Elixir de propiedad, a. dos drac.

Dósis; de cuatro á quince gotas en vino blanco por muchos dias.

B. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina disuelta en líquidos alcoholicos ó mezclada con ellos.*

VINO DIURETICO. (*pie.*)

R. Esencia de trementina, dos drac.
Zumo de cidra, ... una onz.
Vino blanco, ... cuatro onz.
Para tomar en una dósis.

ESPIRITU ANTIESTERICO.

Spiritus antisthericus (b.* g. *au.*)

R. Esencia de trementina,
onz. y med.
Alcohol, ... med. lib.

Destílese á fuego manso, sepárese el aceite que sobrenade en el producto y consérvese.

Heberden y Niemann le alaban en la ptiriasis de los viejos.

BALSAMO VULNERARIO.

Tintura ú esencia vulneraria de Stahl; Liquor vulnerarius, Esentia vulneraria Stahlii. (b.* fu. w. *sp.*)

R. Esencia de trementina, una pt.
Tintura de mirra, . . . dos pt.
———— de sucino, , cuatro pt.

Déjense en digestion en un sitio caliente.

Se usaba en otro tiempo en inyecciones en las sinuosidades de las úlceras fistulosas y para curar las heri-

das y llagas de las partes blancas. — Puede muy bien reemplazar al bálsamo del Comendador.

BALSAMO DE FIORABANTI.

Alcohol de trementina compuesto; Balsamum Fiorabanti. (b. f. ff. *br. sp. vm.*)

R. Clavos de especia,
Nuez moscada,
Canela y
Gengibre, a. . . . . una pt.
Mirra,
Gálbano y
Estoraque líquido, a. . . dos pt.
Bayas de laurel, ... tres pt.
Trementina de Venecia,
cuatro pt.
Alcohol (10.°) y
Agua,
a. . . doscientas diez y seis pt.

Destílense ciento y ocho partes y consérvese el producto. (b.)

R. Bayas frescas de laurel,
cuatro onz.
Elemi y
Tacamaca, a. . . . . una onz.
Gálbano,
Incienso,
Mirra y
Goma de yedra, a. . . tres onz.
Estoraque líquido, . . dos onz.
Leño de aloes, ... tres onz.
Galanga menor,
Clavos de especia,
Canela,
Nuez moscada,
Cedoaria,
Gengibre,
Dictamo blanco,
Acibar sucotrino y
Sucino, a. . . . . una onz.
Alcohol, . . noventa y seis onz.

Déjense en digestion por algunos dias y añádase despues

Trementina, . . diez y seis onz.

Destílese. — El espíritu que pasa es conocido con el nombre de *Bálsamo de Fiorabanti espirituoso; Balsamum Fiorabanti spirituosum.* El residuo destilado á fuego manso en una retorta da un aceite amarillo llamado *Bálsamo de Fiorabanti oleoso; Balsamum Fiorabanti oleosum.* Aumentando el fuego se obtiene un magma negro y empireumático, cuyo nombre es *Bálsamo de Fiorabanti negro; Balsamum Fiorabanti nigrum.*

R. Trementina,
quinientas diez y seis pt.
Elemi,
Tacamaca,
Sucino,
Gálbano y
Mirra, a. . . noventa y seis pt.
Estoraque líquido,
sesenta y una pt.
Hojas de dictamo y
Acibar, a. . . . treinta y dos pt.
Bayas de laurel frescas,
ciento veinte y ocho pt.
Galanga,
Cedoaria,
Gengibre,
Canela,
Clavos de especia y
Nuez moscada,
a. . . . . cuarenta y ocho pt.
Alcohol (22.°), treinta mil pt.

Déjense en maceracion por seis dias, y destílese despues al B. M. dos mil y quinientas partes. (f. ff.)

R. Trementina, ... ocho pt.

Bayas de laurel y
Mirra, a. . . . . tres pt.
Estoraque líquido, . . . dos pt.
Nuez moscada,
Clavos de especia,
Gengibre y
Canela, a. . . . . una pt.
Aguardiente,
doscientas diez y seis pt.

Destílese una cuarta parte del todo poco mas ó menos. (b.* *br. vm.*)

Escitante muy celebrado en otro tiempo, que se ha colocado entre los analépticos, nervinos, antinefríticos, diuréticos, alexifarmacos, antihistéricos, vulnerarios y carminativos.

AGUA DE ANHALT.

Aqua anhaltina, Spiritus anhaltinus. (b.* br. han. pa. sa. w. *ca. sp. vm.*)

R. Trementina, ... med. lib.
Incienso macho, , . . . una onz.
Leño de aloes en polvo, tres onz.
Simiente de almáciga,
Clavos de especia,
Nuez moscada,
Cubebas y
Canela, a. . . . . seis drac.
Azafran, ... dos drac. y med.
Simiente de hinojo y
Bayas de laurel, a. . med. onz.
Alcohol, ... cinco lib.

Déjense en digestion por seis dias y destílese al B. M. (*pa.*)

sp. prescribe se separe el aceite que sobrenade al producto, y dice que, si se quiere, puede suspenderse dentro una muñequita con quince gr. de almizcle.

R. Hojas de romero, . . . una onz.
Yerba de ruda,
Simiente de hinojo y
Bayas de laurel, a. . . med. onz.
Clavos de especia,
Cubebas,
Nuez moscada y
Canela, a. . . . . seis drac.
Almáciga, ... dos onz.
Trementina de Venecia, med. lib.
Alcohol rectificado, . . cinco lib.

Despues de seis dias de digestion añádase

Agua de fuente, ... dos lib.

Destílense cinco lib. al B. M. (br.)

R. Raiz de galanga menor y
Flores de romero, a. . . seis drac.
Simiente de hinojo y
Bayas de laurel, a. . . una onz.
Clavos de especia,
Cubebas,
Nuez moscada,
Canela y
Almáciga, a. . . . . seis drac.
Incienso, ... una onz.
Trementina de Venecia, med. lib.
Alcohol rectificado, . . seis lib.

Déjense en digestion por seis dias y añádase

Agua pura, ... una lib.

Destílense cinco lib. al B. M. (han. sa. w.)

R. Bayas de laurel y
Simiente de hinojo, a. med. onz.
Canela,
Cubebas,
Galanga menor,
Clavos de especia,
Almáciga,
Nuez moscada y
Romero, a. . . . . seis drac.
Incienso, ... cuatro onz.
Aguardiente, noventa y seis onz.
Agua,
doscientas noventa y ocho onz.

Destílense ochenta onz. de espíritu y vuélvase á destilar el residuo con

Trementina, ... cuatro onz.
Agua, ... ciento sesenta onz.

para obtener sesenta y seis onz. de espíritu. *(vm.)*

Omitimos la fórmula de *ca.* por estar equivocada.

Esta agua, que apenas se diferencia del bálsamo de Fiorabanti, egerce la misma accion que él sobre la economía. Es tambien estomacal, carminativa y diurética. Se usa igualmente al esterior en fricciones, ya al vientre para detener los vómitos y la diarrea, ó ya sobre los miembros en la paralísis. —Dósis; sesenta gotas ó mas.

BALSAMO DE SCHAUER.

Balsamus Schœuerianus. (b.* br. *sp.*)

R. Trementina de Venecia, onz. y med.
Gálbano, ... nueve drac.
Raiz de consuelda mayor y
—— de fraxinela, a. . seis drac.
—— de imperatoria y
Almáciga, a. . . . . med. onz.
Raiz de cálamo aromático,
—— de galanga,
Estoraque calamita,
Incienso,
Gengibre,
Canela y
Benjuí, a. . . . . tres drac.
Nuez moscada,
Cubebas,
Clavos de especia,
Sándalo blanco,
Cardamomo menor,
Alcanfor y
Leño de aloes, a. . . . dos drac.
Raiz de betónica,
Raiz de énula y
Acibar hepático, a. . . una drac.
Mirra, ... med. drac.
Raiz de angélica, . . quince gr.
Alcohol concentrado, . ocho lib.

Déjese en digestion lo suficiente y destílese al B. M. hasta la sequedad.

Se parece tambien al bálsamo de Fiorabanti, y es igualmente estimulante, resolutivo, fundente y vulnerario. En otro tiempo se alababa con particularidad en las contusiones y las equimosis, en fricciones.

BALSAMO DE VIDA BLANCO.

Balsamum vitæ album, Spiritus balsamicus. (w.)

R. Incienso,
Mirra y
Gálbano, a. . . . . tres onz.
Leño de aloes,
Clavos de especia,
Canela,
Nuez moscada,
Galanga,
Cedoaria y
Gengibre, a. . . . . una onz.
Bayas de laurel, . . . cuatro onz.
Trementina de Venecia, doce onz.
Alcohol, . . . , . . . doce lib.

Déjense en digestion lo suficiente y destílese al B. M.

Este bálsamo, que no se diferencia mucho del de Fiorabanti, pasa por estomacal, diurético, carminativo y nervino, ya esterior, ya interiormente, á la dósis de cuarenta á sesenta got.

AGUA CONTRA LA GONORREA. (w.)

R. Trementina de Venecia, diez onz.
Raiz de lirio de Florencia, dos onz.

Yerba seca de menta, tres onz.
——————— de dictamo de Creta, una onz.
Simiente de agno casto y
——— de ruda,
a. . . . . dos onz. y med.
Vino blanco, ... diez lib.
Destílese la mitad al B. M.

Esta agua no se parece menos que las precedentes al bálsamo de Fiorabanti; Hoffmann la prescribia en la gonorrea y la leucorrea, á la dósis de cuatro cuch. cada dia en dos tomas.

ELIXIR AROMATICO ASTRINGENTE.
(*bo.*)

R. Flores de ortiga blanca, una lib.
——— de rosas blancas, dos onz.
Sumidades de romero, . una onz.
Simiente de ortigas, . . ocho onz.
Hojas de llanten, . . . dos onz.
Bellotas, ... n.º 24.
Raiz de bistorta, ... dos onz.
Vino blanco, ... ocho lib.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas y añádase
Trementina de Venecia, cuatro onz.

Destílese al B. M. hasta la sequedad, y añádase al producto
Sub-carbonato de potasa, una onz.
Arrope de sauco, . . cuatro onz.
Azucar blanca, ... una lib.

Escitante, alabado contra la leucorrea. — Dósis; dos ó tres onz. por la mañana en ayunas.

C. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina suspendida en liquidos acuosos.*

LAVATIVA TREMENTINADA.
(b.* *e. ra.*)

R. Esencia de trementina, una onz.
Tritúrese con una yema de huevo y añádase poco á poco
Agua de fuente, . . . ocho onz.
Méz. ex. (b.*)

Alabada por Cross contra las ascarides vermiculares.

R. Esencia de trementina, una onz.
Yema de huevo, ... n.º 1.
Cocimiento de cabezas de adormideras, ... ocho onz.

Aconsejada por Recamier en las nevralgias lumbares. (*ra.*)

R. Esencia de trementina, onz. y med.
Yemas de huevo, ... n.º 2.
Solucion de goma arábiga, dos cuartillos.
Méz. (*e.*)

LINIMENTO DIURETICO. (b.* han. *ca.*)

R. Esencia de trementina, med. onz.
Tritúrese bien con yema de huevo, y añádase poco á poco
Agua de menta piperita, seis onz.
Méz. ex. (b.* han.)

ca. prescribe una onz. de esencia y tres de menta.

En fricciones á la region inguinal en la iscuria llamada espasmódica.

JULEPE DIURETICO. (*bo. pie.*)

R. Esencia de trementina, quince got.
Mil pies en polvo, . . med. drac.
Zumo de sumidades de espárrago, una onz.
Cocimiento de espárragos y

Agua de herniaria, a. tres onz.
Jarabe de culantrillo, . seis drac.
En la iscuria, reumatismo y la gota.
Para tomar en dos veces por mañana y tarde.

LOOC TREMENTINADO. (*ra.*)

R. Esencia de trementina, tres drac.
Yema de huevo, , ... n.º 1.
Tritúrense juntos y añádase
Jarabe de menta, . . . dos onz.
——— de flores de naranja y
——— de eter, a. . . una onz.
Tintura de canela, . . med. drac.
Recamier le usa en las nevralgias.
Dósis; tres cuch. cada dia. — Se añade alguna vez una drac. de láudano para precaver los vómitos. (*ra.*)

POCION CONTRA LA TENIA. (*ca.*)

R. Esencia de trementina, tres onz.
Miel, ... seis drac.
Agua destilada de menta, tres drac.
Para tomar en un dia, en tres veces.

EMULSION TREMENTINADA. (b.* *vm.*)

R. Esencia de trementina, una drac.
Tritúrese con una yema de huevo, ó con dos drac. de mucílago de goma arábiga, y añádase poco á poco
Agua comun, . seis á ocho onz.
Méz. ex. (b.*)

R. Esencia de trementina,
media onz.
Goma arábiga, ... dos drac.
Agua, ... c. s.
Hágase emulsion y añádase
Miel blanca, ... dos onz.
Agua, ... c. s.
para hacer una pocion de seis onz. (*vm.*)
Dósis; una cuch. muchas veces al dia.

AGUA COSMÉTICA. (pa.)

R. Claras de huevo frescas diluidas en agua, ... dos lib.
Trementina de Venecia,
media lib.
Miel, ... ocho onz.
Estoraque, ... una onz.
Benjuí, ... dos drac.
Agua de rosas blancas, diez onz.
Destílese al B. M. hasta la sequedad.

POCION DIURÉTICA. (*e.*)

R. Esencia de trementina, cien got.
Goma arábiga y
Azucar blanca, a. . . una drac.
Agua de menta, . . cuatro onz.
Dósis; cuatro ó cinco cuch. cada dia.

POCION ESTIMULANTE. (*e.*)

R. Esencia de trementina,
ciento veinte got.
Goma arábiga y
Azucar blanca, a. . . dos drac.
Tintura de opio, . sesenta got.
——— de espliego compuesto,
dos drac.
Agua de menta, . . . cinco onz.
Dósis; una cuch. cada dos horas.

D. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina mezclada con cuerpos azucarados.*

OLEOSACARO DE TREMENTINA.

Pulvis terebinthinatus. (b.* *au.*)

R. Esencia de trementina, un escrp.
Acido pyro-tartárico, . diez gr.
Azucar blanca, ... c. s.
para absorverlo todo. Tritúrense y háganse polvos.

Preconizado por Gœze contra la tenia. — Dósis; tres tomas cada dia en agua fria. — Se purga en seguida con la goma guta.

OPIATA TREMENTINADA.

Electuarium Terebinthinatum. (g. *ra.*)

R. Esencia de trementina, dos drac.
Polvos de goma arábiga, onza y med.
——— de azucar, . . med. onz.
Jarabe de flores de naranjo, una onz.

Usada por Recamier en las nevralgias. — Dósis; la tercera parte cada dia en tres veces, envuelta en hostia ú obleas. *(ra.)*

R. Esencia de trementina, media onz.
Miel, ... una onz.
Regaliz en polvo, ... c. s.
Méz. ex. (g.)

MERMELADA FEBRIFUGA.

Conditum febrifugum. (*sw.**)

R. Esencia de trementina, dos drac.
Trementina pura, . onza y med.
Mézclese con una yema de huevo por trituracion y añádase
Trementina, ... dos onz.

Contra la tenia. — Dósis; una cucharadita por mañana y tarde.

BOLO ANTIARTRITICO. (sa.)

R. Esencia de trementina, veinte y cuatro got.
Miel escogida . treinta y seis gr.
Méz.

MIEL TREMENTINADA.

Linctus olei Terebinthinæ. (b.* *e. ra. sw.*)

R. Esencia de trementina, media onz.
Tritúrese con una yema de huevo y añádase
Miel blanca, ... tres onz.
Méz. *(sw.)*

R. Esencia de trementina, dos drac.
Miel cruda, ... una onz.
Méz. (b.* *e.*)

Home la ha propuesto en el lumbago reumático. Despues Recamier la ha aconsejado en todas las nevralgias, y sostituye á la miel simple la rosada, cuya cantidad varía desde una á cuatro onz. — Dósis; tres cuch. al dia.

E. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina mezclada con cuerpos grasos.*

POCION VERMIFUGA. (*b.*)

R. Esencia de trementina, cinco drac.
Aceite de nueces, . onza y med.
Para una sola dósis.

R. Esencia de trementina, cinco drac.

Aceite de nueces, . . . tres onz.
Para tomar en una dósis.

ACEITE ANTIELMINTICO. (b.*)

R. Aceite de trementina, cuatro pt.
——— de cuerno de ciervo,
una pt.

Destílense los dos tercios de la mezcla.

Neurohr dice haber dado con buen éxito diez á cien got. de esta mezcla contra la ténia.

R. Aceite de trementina, . tres pt.
——— de cuerno de ciervo,
una pt.

Destílense las tres cuartas partes.

Chabert hacia tomar este último producto á la dósis de una á dos cuchtas. por mañana y tarde, ó en lavativas á la de dos cuchtas. en un cocimiento mucilaginoso. Bremser prescribia dos cuchtas. por mañana y tarde en un poco de agua, dósis, sin duda, muy escesiva particularmente en los principios. Allers ha considerado este remedio como muy eficaz. Chabert asociaba la esencia de trementina á la de cuerno de ciervo, para quitar el sabor de esta última. Sin embargo, era el ingrediente principal del medicamento, y Grundler se ha equivocado cuando ha dicho que no servia de nada en la fórmula.

LINIMENTO TREMENTINADO.

(am. lo. *c. ra.*)

R. Esencia de trementina,
un cuartillo.

Líquese y añádase
Cerato de resina, . . . una lib.

En fricciones sobre las partes atacadas de reumatismo. (am. lo. *c.*)

R. Esencia de trementina, una onz.
Aceite de manzanilla, . dos onz.
Láudano líquido de Sydenham,
una drac.

Usado por Recamier en las nevralgias. (*ra.*)

ACEITE DE TRIBUS. (*vm.*)

R. Aceite de trementina,
——— de espliego,
——— de ladrillos, . . part. ig.

Méz.

F. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina combinada ó mezclada con ácidos.*

BALSAMO NARCOTICO. (*vm.*)

R. Esencia de trementina y
Acido sulfúrico fumante,
a. . . . . part. ig.

Méz. poco á poco, y despues de fria caliéntese la masa con agua, y lávese esta hasta que no quede en ella ácido libre.

Achard ha reconocido que la esencia de trementina puede unirse al ácido sulfúrico, de lo que resulta una sustancia llamada por él *Jabon ácido*, que es enteramente soluble en alcohol y en agua. Este jabon forma la base de la preparacion siguiente.

BALSAMO ASTRINGENTE.

Balsamum adstringens ischœmaticum.

(br. fu. *au. pie. sp. vm.*)

R. Acido sulfúrico, . . . diez drac.

Añádase gota á gota

Esencia de trementina, med. onz.

Cuando cese la efervescencia y el líquido se haya enfriado, añádase con precaucion

Alcohol, ... cuatro onz.

Consérvese. (br.)

pie. y *sp.* prescriben med. onz. de ácido, otro tanto de esencia, y tres onz. de alcohol; — *ca.* med. onz. de ácido, cuatro onz. de esencia y tres de alcohol.

R. Trementina clara, . . . dos pt.

Acido sulfúrico concentrado, dos partes y med.

Mézclense poco á poco en un mortero de vidrio al B. M. tibio, y despues que esté frio añádase en muchas veces

Alcohol, ... ocho pt.

Déjese en reposo por algunos dias, decántese y consérvese. (*vm.*)

fu. y *au.* prescriben tres partes de trementina, cinco de ácido sulfúrico y veinte y cuatro de alcohol rectificado.

Escitante, astringente que se ha aconsejado en la emotipsis. — Dosis; de uno á dos escrp. en una bebida apropiada.

ALCANFOR ARTIFICIAL. (*vm.*)

R. Sal comun en polvo, cinco part. y med.

Introdúzcase en un matraz y échese encima

Acido sulfúrico concentrado, cinco pt.

Hágase pasar, por medio de un tubo, el gas que se desprenda á un frasco que contenga

Esencia de trementina, diez pt.

Déjese en reaccion en frio por muchas horas; caliéntese despues un poco, aplicando sin cesar lienzos mojados con agua fria al frasco. Cuando haya concluido de pasar el gas, déjese enfriar el aparato; decántese el líquido; déjese escurrir la parte concreta, prénsese en seguida en un papel y consérvese en una redoma tapada.

LICOR DE ALCANFOR ARTIFICIAL. (*vm.*)

R. Alcanfor artificial lavado, una pt.

Alcohol rectificado, . . . seis pt.

Disuélvase en frio.

LICOR ARTRÍTICO DE POTT.

Linimento resolutivo, *Jabon artrítico de Pott*, *Espíritu artrítico*; *Sapo*, s. *Liquor*, s. *Spiritus arthriticus Pottii*, *Linimentum resolvens*, *Spiritus salis terebinthinatus*. (b.* li. s. wu. *ca. sw.*)

R. Sal comun pulverizada y

Esencia de trementina, a. . . . . dos onz.

Echese encima poco á poco y con cuidado

Acido sulfurico concentrado, una onz.

Destílese la mezcla al B. A. (b.* li. s. wu.)

ca. y *sw.* prescriben una parte de ácido hydroclórico y dos de esencia.

El ácido hydroclórico egerce sobre la esencia de trementina una accion análoga á la del ácido sulfúrico. Aquel forma con este aceite dos compuestos diferentes. El uno, que contiene me-

nos ácido, es el alcanfor artificial, indicado mas arriba; y el otro mas cargado de ácido, es líquido segun las observaciones de Hautón-Labillardiere, y forma la base del licor artrítico.

LINIMENTO ANTIREUMATICO.

Lotus ad rheumatismum. (sp.)

R. Esencia de trementina y
Acido hydroclórico, a. . una onz.
Aguardiente alcanforado, seis onz.
Méz.

FUNDENTE DE BICHARD. (*vm.*)

R. Esencia de trementina y
Acido hydroclórico concentrado,
a. . . . . una pt.

Echense en una retorta; agítese con frecuencia la mezcla y al cabo de un dia ó dos añádase

Alcohol, ... ocho pt.

Destílense ocho partes y disuélvase en el producto

Alcanfor, ... med. pt.

BÁLSAMO CONTRA LOS SABAÑONES.

(*bo. ra.*)

R. Bálsamo de Fiorabanti,
cuatro onz.
Acido hydroclórico,
treinta y dos got.
Méz. ex.

ra. prescribe dos onz. de aceite comun, una drac. de bálsamo del Perú, dos drac. de esperma de ballena, otro tanto de cera blanca, otro tanto de ácido hydroclórico, y seis drac. de agua pura.

R. Aceite comun, ... cinco pt.
——— de trementina, . dos pt.
Acido sulfúrico, . . . med. pt.
Méz. (*ca.*)

f.* prescribe ciento y sesenta partes de aceite, sesenta y cuatro de esencia y diez y seis de ácido.

En fricciones por mañana y tarde, sobre las partes amenazadas de sabañones.

G. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina combinada con los álcalis.*

JABON DE STARKEY.

Jabon de aceite volátil de trementina y de potasa; *Sapo Starkeyanus*, s. *tartareus*, s. *chemicus pro caso externo*, s. *potassæ therebinthinaceus*, s. *tartareus Stharkeyi*, *Corrector Starkeyi*, s. *opii*. (br. e. f. fe. fu. he. li. sa. w. wu. *au. pie. sp. sw.*)

R. Sub-carbonato de potasa, c. s. q.

Calcínese fuertemente, échese la masa antes de enfriarse en un mortero caliente, pulverícese y añádase un poco de trementina de Venecia, triturándolo bien; continúese añadiendo trementina por pequeñas porciones como de una drac. hasta que no absorva mas; disuélvase entonces la masa en alcohol concentrado, déjese reposar y fíltrese el líquido y evapórese despues suavemente. (fu. li.)

br. sa. y w. prescriben se calcine el sub-carbonato de potasa por una hora ó dos, que se pulverice y se añada gota á gota c. s. de esencia de trementina para impedir el contacto del aire; que se deje todo en la cueva, que se

añada un poco de aceite caliente al cabo de algun tiempo y que se continúe del mismo modo hasta que el álcali haya absorvido de esencia cerca del triple de su peso.

R. Sub-carbonato de potasa,
Esencia de trementina y
Trementina de Venecia,
a. . . . . part. ig.

Tritúrese la sal en un mortero de mármol con mano de vidrio, añadiendo primero la esencia y despues la resina, y cuando el mucílago haya adquirido la consistencia conveniente porfirícese (f.)

R. Trementina comun, . . una onz.

Lícuese en una vasija de barro y añádase

Potasa cáustica líquida, med. onz.

Menéese de cuando en cuando hasta que el mucílago haya tomado la consistencia de jabon (e.).

pie. prescribe tres onz. de potasa seca, dos de agua y cuatro de esencia de trementina.

R. Potasa cáustica, . . . una onz.

Lícuese á un fuego muy lento y añádase

Esencia de trementina, tres onz.

Menéese hasta que se incorpore perfectamente. (he. wu. *sp.*)

fe. y *sw.* prescriben diez partes de potasa y ocho de esencia.

R. Trementina, ... una onz.
Esencia de trementina, med. onz.
Aceite de almendras dulces y legía de jaboneros, a . una onz.

Méz. (*au.*)

Este jaboncillo, cuyo nombre es debido á las virtudes que se le han supuesto de corregir las cualidades dañosas del opio, del eléboro y de otras sustancias de este género, es balsámico, estimulante, aperitivo, diurético, y antiespasmódico, que se ha aconsejado con particularidad en la gonorrea é hidropesías. — Dósis; de ocho á diez gr. en píldoras, ó en vehículo acuoso.

A. *Preparaciones que contienen la esencia de trementina combinada con los jabones.*

BALSAMO DE VIDA ESTERNO.

Jabon trementinado, bálsamo de trementina, bálsamo de jabon; Balsamum saponaceum terebinthinatum, s. vitæ externum, linimentum stimulans, sapo terebinthinatus, Spiritus saponis compositus.

1.° Sin alcohol.

R. Jabon de Venecia, diez y seis pt.
Esencia de trementina,
treinta y dos pt.
Añádase á la solucion
Sub-carbonato de potasa líquido,
tres pt.

Méz. ex. (fu. he. li. pp. wu.)

br. prescribe veinte y cuatro partes de jabon, veinte y cuatro de esencia y una de sub-carbonato; — b.* d. han. pr. y s. seis de jabon, otras seis de esencia y una de sub-carbonato; — b.*, segun Theden, diez y ocho de jabon, quince de esencia y una de sub-carbonato; — *sp.* nueve de jabon, diez y ocho de esencia y una de sub-carbonato; — y wu. y *sw.* cuatro de jabon, ocho de esencia y una de sub-carbonato.

R. Jabon raspado, ... dos pt.
Esencia de trementina, . tres pt.
Disuélvanse triturando y añádase
Potasa cáustica calcinada,
part. y med.
disuelta en
Agua, ... med. pt.
Méz. ex. (*vm.*)

R. Jabon blanco, . . . cuatro pt.
Alcanfor, ... una pt.
Tritúrense juntos y añádase poco á poco
Esencia de trementina,
diez y seis pt.
Consérvese la solucion.

2.° Con alcohol.

R. Jabon de médula, , cuatro pt.
Trementina, ... una pt.
Tintura de sosa, . . cuatro pt.
Disuélvanse al B. M. tibio en vasija tapada y cuélese. (*vm.*)

R. Jabon blanco y
Esencia de trementina, a. una pt.
Tritúrense juntos y añádase
Alcohol, ... ocho pt.
Pónganse en digestion en agua tibia, déjese reposar por algunos dias y fíltrese la solucion. (he. li. w. *pid. vm.*)

La solucion del jabon en la esencia preparada aparte, se designa en muchas farmacopeas (he. *pid.*) con el nombre de *Corpus pro balsamo saponis.*

R. Alcanfor en polvo, . . una pt.
Alcohol rectificado, diez y seis pt.
Añádase á la solucion
Jabon blanco raspado, cuatro pt.
Déjese en digestion á un fuego suave y añádase
Esencia de trementina, . una pt.
Méz. meneándolo. (dd.)

R. Sub-carbonato de potasa,
onz. y med.
Agua de fuente,
veinte y cuatro onz.
Añádase á la solucion
Esencia de trementina, . tres onz.
Jabon de Venecia, . . dos onz.
Espíritu de enebro, . . dos onz.
Aceite de culilaban, . tres onz.
Méz. ex. (*sp.*)

R. Jabon y
Esencia de trementina,
a. . . . . med. lib.
Añádase á la solucion
Alcohol de serpol, . cuatro lib.
Amoniaco líquido,
diez y ocho onz.
Méz. ex. (*sv.*)

ca. prescribe una onz. de jabon, med. lib. de esencia, cinco onz de alcohol de serpol y dos drac. á una onz. de amoniaco.

R. Jabon de médula, . . . una pt.
Alcohol amoniacal, . . cuatro pt.
Esencia de trementina, ocho pt.
Espíritu de serpol,
sesenta y cuatro pt.
Fíltrese la solucion. (*vm.*)

Muchas de estas fórmulas son semejantes á las del bálsamo de Opodeldoc, á las que por otra parte se parece el bálsamo de vida esterno con respecto á su modo de obrar y á sus usos. —Escitante, fundente y resolutivo. —Se aplica al esterior en las luxaciones y para disipar ciertos tumores.

FOMENTO RESOLUTIVO. (fu. ham. li. *sp.*)

R. Bálsamo de vida esterno,
una pt.

Agua comun, veinte y cuatro pt.
Disuélvase.

BALSAMO DE BASBILLE.

Balsamum Basoillanum. (b.* *au.*)

R. Esencia de trementina, tres onz.
Sub-carbonato de potasa, onz. y med.
Jabon de Alicante raspado, dos onz.
Agua destilada, . . onz. y med.
Espíritu de enebro, . . dos onz.

Apenas se diferencia esta preparacion del bálsamo de vida esterno, con particularidad del de la fórmula de *sp.* Se diferencia menos todavía de la siguiente:

LICOR NERVINO DE PAREBOOM. (b.* ham. *vm.*)

R. Sub-carbonato de potasa, tres pt.
Jabon de Alicante, . . cuatro pt.
Tritúrense juntos, humedeciéndolos con
Agua tibia, ... dos pt.
Añádase poco á poco
Esencia de trementina, . seis pt.
Aceite de Cajeput, . . . una pt.
Añádase en seguida en muchas veces
Agua tibia, . cuarenta y seis pt.
Fíltrese al cabo de muchos dias. (*vm.*)

b.* y han. prescriben tres partes de sub-carbonato, cuatro de jabon, cuarenta de agua, seis de esencia, una de aceite de cajeput y cuatro de espíritu de enebro.

Escitante usado al esterior en la paralísis.

LINIMENTO ANTIARTRITICO. (*ca.*)

R. Alcanfor, ... un escrp.
Esencia de trementina, dos drac.
Añádase á la solucion
Jabon negro, ... una onz.
Ungüento nervino, . med. onz.
Cominos en polvo, . . dos drac.
Sal volátil de c. c. sucinado, quince gr.

Aconsejado por Home en fricciones en las afecciones reumáticas prolongadas y la ceática con particularidad.

§. III. PREPARACIONES QUE CONTIENEN LA PARTE RESINOSA DE LA TREMENTINA ESCLUSIVA O PRINCIPALMENTE.

La parte resinosa de la trementina se presenta bajo muchas formas diferentes, que en general dependen de su mayor ó menor pureza, y algunas de las cuales se hallan incluidas en la materia médica de diversas farmacopeas. Estas últimas son:

1.° *Pez blanca, Resina blanca de trementina, Pez de Borgoña; Pix Burgundica, Resina alba.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. pa. pid. sp.*)

Se obtiene derritiendo á fuego manso la trementina comun que se consolida en la superficie de las incisiones, y filtrándola despues por una capa de paja.

2.° *Pez resina, resina comun.*

Se prepara derritiendo la preceden-

te ó batiendo con fuerza la colofonia derretida con una cuarta parte de galipodio en agua para que pierda su trasparencia y darla un color amarillo sucio. Apenas se diferencia de la anterior, por lo que se hallan ambas confundidas en algunas farmacopeas.

3.° *Colofonia, Arcanson, árida, griega; Pez seca y Colophonium, Resina flava, Pix græca.*

ams. b. be. br. d. e. f. fc. ff. fi. fu. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. g. m. pid. sp.*

Este es el residuo de la destilacion de la trementina comun para estraer toda su esencia, cuyo residuo se licua y se deja despues en reposo para que no se enfrie.

4.° *Trementina cocida; Terebinthina cocta, Resina flava.*

a. br. du. e. f. ff. g. han. he. o. pa. po. pr. s. w. wu. *br. sw.* vm.*

Solamente se diferencia de la colofonia en que contiene agua, y de la resina comun en que contiene mayor cantidad de ella. Se obtiene ya tomando lo que queda en el alambique cuando se ha destilado la trementina con agua para sacar la esencia, ya haciendo hervir una parte de trementina en tres de agua, hasta que echando la masa en agua fria forme una pasta blanda.

f. prescribe que se hagan píldoras de seis gr. y que se conserve en agua.

5.° *Pez negra, Resina negra de trementina; Pix solida*, s. *atra*, s. *navalis*, s. *vegetabilis, Palampissa.*

ams. b. ba. br. d. dd. du. e. ed. f. fc. ff. fi. fu. han. he. li. lo. p. r. s. w. wu. *be. c. g. m. pa. pid. sp.*

Se obtiene por la combustion de la paja empleada para filtrar la trementina comun.

No es mas que resina algo alterada por el fuego y mezclada con carbon. Por consiguiente se parece á la pez líquida, pero es mucho menos impura que ella, y al parecer no contiene ácido acético.

Solo se administra al interior la trementina cocida, la cual pasa por balsámica y diurética, y es muy usada con especialidad en la gonorrea rebelde, en la gota y en los reumatismos inveterados, á la dósis de media drac. varias veces al dia. Las otras variedades se reservan con mas particularidad para el uso esterno.

A. *Preparaciones en que entra la trementina cocida.*

MERMELADA ASTRINGENTE.

Conditum corroborans. (sw.)*

R. Trementina cocida, . . una onz.

Méz. ex. en un mortero caliente con

Bálsamo de copaiba, . med. onz.

Añádase en seguida

Mucílago de goma arábiga, una onz.

Conserva de rosas rojas, cuatro onz.

Se usa á la dósis de dos á tres drac. tres veces al dia en la gonorrea inveterada.

PILDORAS DE TREMENTINA.

Pillulæ è terebinthina, s. *diureticæ roborantes*, s. *estimulantes ad gonorrheam.*

(b.* pp. sa. w. *au. sp. sw. sy.*)

℞. Trementina cocida, . . dos drac.
Polvos de ruibarbo, . . una drac.
Háganse treinta píldoras. (*sy.*)
Dósis; de cuatro á seis por mañana y tarde.

℞. Trementina cocida, . . dos onz.
Ruibarbo en polvo, . . . una onz.
Jarabe balsámico, ... c. s.
Háganse píldoras de cuatro granos. (*sw.*)
La misma dósis que en los precedentes.

℞. Trementina cocida y
Jabon, a. . . . . una drac.
Polvos de ruibarbo, . . med. onz.
Háganse píldoras de dos granos. (b.* pp.)

au. prescribe med. drac. de trementina cocida, otro tanto de jabon y una drac. de ruibarbo.

℞. Trementina cocida, . . una onz.
Ruibarbo, ... dos drac.
Sucino blanco,
Almáciga,
Regaliz y
Hueso de gibia, a. . . . una drac.
Trementina de Venecia, . . c. s.
Hágase masa de píldoras. (sa.)

℞. Trementina cocida, . onz. y med.
Sucino,
Almáciga,
Incienso,
Zumo de regaliz,
Ruibarbo,
Hueso de gibia y
Bol arménico, a. . . . dos drac.
Hágase masa de píldoras. (w.)

℞. Trementina cocida, . onz. y med.
Bol arménico y
Hueso de gibia, a. . . . med. onz.
Sucino y
Almáciga, a. . . . . dos drac.
Ruibarbo, ... una drac.
Jarabe balsámico, ... c. s.
Hágase masa de píldoras. (*sp.*)
Estas tres últimas fórmulas estan abandonadas con razon.
Dósis; un escrp. tres veces al dia en la gonorrea.

PILDORAS ASTRINGENTES. (*sm.*)

℞. Trementina cocida y
Sangre de drago, a. . . dos drac.
Trementina clara, ... c. s.
Háganse píldoras de cuatro granos.
Dósis; tres cada dia en tres veces en la gonorrea.

℞. Trementina cocida, . med. onz.
Sucino, ... dos drac.
Hueso de gibia, ... una drac.
Resina de guayaco, . cuatro escrp.
Bálsamo de copaiba, ... c. s.
Háganse ciento y cincuenta píldoras.
Dósis; doce cada dia en tres veces en la leucorrea y gonorrea.

PILDORAS BALSAMICAS.

Pillulæ balsamicæ Junkeri. (b.* *au. sp.*)

℞. Almáciga y
Mirra, a. . . . . una pt.
Trementina cocida y
Sucino amarillo, a. . . pt. y med.
Jalapa en polvo, ... tres pt.
Estracto de fumaria,
——— de cardo santo,
——— de agenjos y
——— de coclearia, a. dos pt.
Hágase masa de píldoras (b.*)
Estas píldoras, descritas por Junker, se han considerado en otro tiempo como emenagogas.

R. Trementina cocida, . med. onz.
Jabon raspado, ... una onz.
Resina de jalapa,
Estracto acuoso de acibar,
——— de centaura menor y
——— de genciana, á tres drac.

Háganse píldoras de dos gr. *(sp.)*

Se daban en otro tiempo hasta cuarenta.

UNGUENTO CONTRA LOS SABAÑONES. (SW.)

R. Trementina cocida y
Manteca de cacao, a. . . tres onz.

Lícuense juntos á un fuego suave y añádase

Bálsamo del Perú, . . med. drac.

CERATO OLEO-RESINOSO. (*sw.**)

R. Cera blanca y
Trementina cocida, a. . . una pt.
Aceite comun, ... dos pt.

Lícuense juntos á un calor suave, cuélese y menéese hasta que se enfrie del todo.

Util para la curacion de las escoriaciones ligeras.

ESPARADRAPO ADHESIVO. (*vm.*)

R. Trementina cocida y
Cera blanca, a. . . . . part. ig.

Lícuense juntos y estiéndanse sobre lienzo ó papel.

R. Trementina cocida, . . una pt.
Emplasto simple, ... tres pt.

Lícuense juntos y estiéndanse del mismo modo.

BALSAMO DE FOURCROY. (ca.)

R. Aceite comun, ... cuatro lib.
Polvos de raiz de angélica,
Polvos de raiz de escorzonera,
——— de hipericon y
——— de bayas de yedra,
a. . . . . dos onz.

Cuézanse á un fuego muy suave, déjense en maceracion por una noche, vuélvanse á poner al fuego por la mañana, y cuando el aceite haya principiado á hervir añádase

Triaca,
Azafran y
Estracto de enebro, a. . dos drac.
Acibar, ... una drac.

Cuézase, cuélese, déjese reposar por algunas horas, póngase al fuego y añádase

Trementina, ... diez onz.

Caliéntese hasta que no exhale olor á trementina; retírese entonces del fuego y añádase

Polvos de incienso,
——— de estoraque y
——— de benjuí, a. drac. y med.

Mézclese hasta que se enfrie del todo, déjese reposar por dos ó tres dias, cuélese por un lienzo y consérvese en una botella.

Aconsejado contra las grietas de la piel, las úlceras, los sabañones, los reumatismos y las distorsiones, en fricciones ó aplicado.

B. *Preparaciones en las que entra la resina propiamente dicha.*

FUMIGACION RESINOSA. (*sm.*)

R. Resina comun y
Cera amarilla, a. . . . part. ig.

Póngase en una vasija de barro puesta sobre un brasero ó encima de una lámpara de espíritu de vino.

Se ha aconsejado esta fumigacion en

la tisis pulmonal. Ha parecido útil en ciertos catarros crónicos acompañados de una abundante supuracion.

UNGUENTO CONTRA LA TIÑA. (f.* ca.)

R. Harina de trigo, . . . cinco pt.
Vinagre, ... cuarenta pt.
Hágase una pasta, y añádase una mezcla licuada y colada de
Pez de Borgoña y
—— negra, a. . . . . cuatro pt.
Méz. ex. (f.*)

ca. prescribe cinco partes de harina, otro tanto de cada una de las dos clases de pez, y treinta partes de vinagre.

Se estiende sobre un pedazo de piel que se aplica á la parte enferma, y que se quita al cabo de doce horas.

EMPLASTO COMUN.

Emplasto cetrino ó adhesivo, Emplasto de cera, Cerato adhesivo ó de resina, Cerato negro, Unguento simple; Cera arborea, Ceratum citrinum, s. *resinæ pini*, s. *resinosum, Emplastrum attrahens*, s. *cereum*, s. *cerœ*, s. *citrinum*, s. *cerœ terebinthinatum*, s. *picis navalis*, s. *simplex*, s. *sticticum*, s. *roborans, Unguentum flabum*, s. *resinœ albœ*, s. *resinosum.* (a. am. ams. b. br. d. dd. du. ed. fe. fi. fu. han. he. li. lo. o. pa. pr. r. s. su. w. wu. *c. hp. pid. sp. sw. vm.*)

R. Resina comun, ... una pt.
Sebo de carnero, ... dos pt.
Cera amarilla, ... tres pt.
Lícuense juntos y cuélese. (*vm.*)

ed. y *c.* prescriben dos partes de resina blanca, dos de sebo y tres de cera (*Emplastrum simplex*); — am. ed. y *c.* cinco partes de resina blanca, ocho de manteca y dos de cera amarilla (*Unguentum*, s. *Ceratum resinosum*); lo. wu. *c.* y *sw.* una parte de resina amarilla, tres de sebo y tres de cera amarilla (*Emplastrum commune*, s. *cerœ*); — *sp.* dos de resina, dos de cera amarilla y una de sebo. (*Emplastrum attrahens*); — du. dos de resina blanca, cuatro de manteca y una de cera (*Unguentum resinœ albœ*); — *sw.* diez y seis de resina, una de sebo y seis de cera, ó diez y seis de resina, una de sebo y diez de cera (*Emplastrum adhœsivum*, s. *roborans*).

R. Manteca de puerco, , . ocho lib.
Raiz de curcuma en polvo, dos onz.
Agua, ... cuatro onz.
Cuézase suavemente hasta que se consuma la humedad, y añádase
Cera amarilla y
Resina comun, a. . . . med. lib.
Lícuense y cuélese. (pr. s.) — Este es el *Unguentum flavum.*

R. Resina comun, . diez y ocho pt.
Pez de Borgoña, veinte y ocho pt.
Cera amarilla, ... veinte pt.
Lícuense á un fuego suave. (b.)

vm. prescribe cuatro partes y med. de pez negra, cinco de resina comun y seis de cera amarilla; — ams. doce de resina comun, catorce de pez de Borgoña y diez de cera; — s. nueve de resina comun, catorce de pez de Borgoña y diez de cera. — Este es el *Emplasto de pez negra. Emplastrum picis*, s. *piceum.*

R. Resina comun, ... cuatro pt.
Cera amarilla, ... med. pt.
Trementina, ... dos pt.

Lícuense juntos. (*vm.*) Este es el *Ungüento simple ó Cerato de resina.*

sw. prescribe treinta y dos partes de pez de Borgoña, una de cera y otra de trementina (*Emplastrum piceum*); y *vm.* en otro lugar, parte y med. de resina comun, tres de cera amarilla, y una de trementina (*Emplasto citrino*).

R. Resina comun, . diez y seis onz.
Cera amarilla, ... diez onz.
Trementina, ... tres onz.
Añádase á la masa licuada
Polvos de curcuma, . . tres drac.

Méz. ex. (*sp.*) Este es el *Emplastrum citrinum.*

R. Resina comun y
Cera amarilla y
Pez negra, a. . . . . doce pt.
Sebo de carnero, . parte y med.

Lícuense juntos y cuélese. (d. dd. wu.) — Este es el *Emplastrum piceum*, s. *sticticum*.

li. prescribe seis partes de resina comun, otro tanto de pez de Borgoña, cuatro de cera amarilla y dos de sebo de ciervo. (*Emplastrum piceum*, s. *adhæsivum.*)

R. Resina comun,
veinte y cuatro pt.
Pez negra, ... diez y seis pt.
Cera amarilla, ... ocho pt.
Trementina, ... cuatro pt.

Lícuense juntos. (fi. su.) — Este es el *Emplastrum picis.*

vm. prescribe seis partes de resina comun, doce de pez negra, tres de cera amarilla y una de trementina. (*Cerato negro.*)

R. Resina comun, ... ocho pt.
Cera amarilla, . . . cuatro pt.
Sebo, ... dos pt.
Trementina, ... una pt.

Lícuense juntos y cuélese. (fu. he. li. *pid.*) — Este es el *Emplastrum citrinum*, s. *cereum*, s. *attrahens*, el *Ceratum citrinum*, s. *resinæ picis.*

a. y pr. prescriben dos partes de resina comun, cuatro de cera amarilla, una de sebo y una de trementina (*Ceratum*, s. *Emplastrum citrinum.*); — han. y s. dos partes de resina comun, cuatro de cera, una de sebo y otra de trementina (*Ceratum*, s. *Emplastrum citrinum, Cera arborea.*); — *vm.* cuatro partes de resina comun, tres de cera, una de sebo y otra de trementina (*Cerato adhesivo.*); — *hp.* seis partes de resina, cuatro de cera, dos de sebo, y una de trementina (*Emplastrum citrinum.*); — fe. diez y seis de cera, catorce de resina, dos de sebo y tres de trementina. (*Ceratum citrinum.*)

R. Resina comun,
veinte y cuatro pt.
Cera amarilla, . . diez y seis pt.
Sebo de carnero, . . . ocho pt.
Trementina, ... cuatro pt.
Lícuense y añádase
Polvos de raiz de curcuma,
una pt.

Méz. ex. (br. o. pa. pr. r. w. wu.) Este es el *Emplastrum*, s. *Ceratum citrinum.*

R. Pez negra,
Resina comun,
Sebo de carnero y
Trementina, a. . . . . dos pt.
Cera amarilla, ... tres pt.

Lícuense juntos (b.*). — Este es el *Emplastrum picis navalis*, s. *stipticum Hamburguense.*

R. Cera amarilla, ... una lib.
Resina comun, ... med lib.
Sebo de carnero, . . cuatro onz.
Aceite comun y
——— de trementina, a. dos onz.
Raiz de curcuma en polvo,
dos drac.

Líquense y cuélese (fi.). — Este es el *Emplastrum cerœ terebinthinatum, s. citrinum.*

Algunas de estas fórmulas se parecen mucho á la del ungüento de basilicon, ya por la naturaleza y el nombre de las partes que la componen, ya por las proporciones respectivas de estas mismas partes.

EMPLASTO DE PEZ COMPUESTO.

Emplastrum picis compositum. (lo. *c. ca. vm.*)

R. Pez de Borgoña, ... dos lib.
Incienso, ... una lib.
Resina comun y
Cera amarilla, a. . . cuatro onz.
Aceite de nuez moscada, una onz.

Líquense juntas la cera, la pez y la resina, y añádase el incienso y despues el aceite de nuez moscada. (lo. *c.*)

vm. prescribe cuatro partes de pez de Borgoña, doce de resina comun, doce de pez negra, cuatro de cera amarilla y una de aceite de nuez moscada; — *ca.* una lib. de manteca, otro tanto de pez de Borgoña, diez onz. de cera amarilla, cinco onz. de resina comun, otro tanto de pez negra y diez drac. de incienso.

EMPLASTO DEFENSIVO VERDE.
(br. w.)

R. Cera amarilla, ... una lib.
Resina comun, ... dos onz.
Sebo de carnero, . . . seis onz.
Trementina, ... una onz.
Polvos de yerba de alquimila,
seis onz.

Méz.

Se puede dar mas color al emplasto añadiendo á cada lib. un escrup. de añil pulverizado.

br. sustituye la ruda á la alquimila.

EMPLASTO CONTRA EL RAQUITISMO.
(b.*)

R. Resina comun, ... una onz.
Cera amarilla, ... med. onz.
Aceite empireumático de tártaro,
una drac.

Líquense juntos.

Se dice haber aplicado este emplasto con buen éxito sobre la columna vertebral de los niños raquíticos.

ESPARADRAPO RESINOSO. (*vm.*)

R. Resina comun y
Trementina, a. . . . . una pt.
Cera blanca, ... cuatro pt.

Líquense juntos y estiéndase sobre lienzo ó papel.

EMPLASTO DE ANDRÉS DE LA CRUZ.

Emplasto de pez y de resina; Emplastrum Andrœa à Cruce, s. resinarum glutinans. (e. ff. *ca. vm.*)

R. Pez blanca, ... ocho pt.

Elemi, ... dos pt.
Trementina y
Aceite de laurel, a. . . . una pt.
Lícuense y cuélese. (ff. *ca. vm.*)

e. prescribe diez y seis onz. de pez, cinco de elemi, dos de trementina, dos de aceite comun y una de cera blanca.

EMPLASTO MADURATIVO.

Emplastrum maturans. (sw.)

R. Resina comun, ... med. lib.
Emplasto de gomo-resina, una lib.
Lícuense juntos.

UNGUENTO BASILICON.

Ungüento de pez y de cera, ó de trementina y de pez; Unguentum basilicum, s. *tetrapharmacum*, s. *picis*, s. *picis empyreumaticum*, s. *piceum compositum*, s. *regium*, s. *therebintinæ resinosum*, s. *pallidum*, *Unguentum resinæ flavæ*, *Ceratum resinæ*, *Unguentum emolliens*, s. *aureum*, s. *citrinum*. (ams. d. dd. e. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sa. su. w. *sw. vm.*)

1.º *Basilicon amarillo; Unguentum basilicum flavum.*

R. Colofonia y
Cera amarilla, a. . . . . una pt.
Aceite comun, ... tres pt.
Lícuense juntos. (ams.)

p. prescribe partes iguales de las tres sustancias; — y lo. una lib. de resina amarilla, otro tanto de cera amarilla y dos cuartillos de aceite.

R. Aceite de palma y
——— de lino, a. . . . dos lib.
Cera amarilla, ... med. lib.
Resina amarilla, . onza y med.
Lícuense suavemente (ams.). — Este es el *Unguentum emolliens.*

R. Colofonia y
Cera amarilla, a. . . . una pt.
Manteca de puerco y
Aceite comun, a. . . cuatro pt.
Lícuense á un fuego suave. (fu.)

sw. prescribe una parte de colofonia, otra de cera, seis de manteca y otras seis de aceite.

R. Colofonia,
Resina comun,
Cera amarilla y
Sebo de carnero, a. . . dos pt.
Aceite comun, ... tres pt.
Lícuense juntos y cuélese. (e.)

sw. y *vm.* prescriben una parte de las cuatro primeras sustancias y dos de aceite.

R. Resina comun,
Cera amarilla y
Trementina, a. . . . . una pt.
Aceite de nabos, ... dos pt.
Lícuese suavemente y cuélese. (dd.)

R. Colofonia,
Cera amarilla y
Sebo de carnero, a. . . una pt.
Manteca de puerco, . . . tres pt.
Lícuense y añádase al retirarlo del fuego
Trementina, ... med. pt.
Méz. ex. (d. han. he. o. po. pr. s.)

r. prescribe una parte de colofonia, una de sebo, otra de trementina, y cuatro de manteca; — fi. y su. tres de colofonia, tres de cera, tres de

sebo, tres de trementina y doce de aceite; — li. una de resina comun, otra de cera, una de sebo, otra de trementina y cinco de aceite; — g. doce partes de colofonia, otro tanto de pez de Borgoña, otro tanto de cera amarilla, tres onz. de trementina y catorce onz. de aceite comun.

R. Aceite comun, ... dos lib.
Trementina, ... una lib.
Cera amarilla y
Colofonia, a. . . . . siete onz.
Almáciga y
Incienso, a. . . . . dos onz.
Azafran, ... dos drac.

Lícuese la cera, la colofonia, la almáciga y la trementina en el aceite, y añádanse los polvos de incienso y de azafran á la mezcla cuando esté tibia.

w. prescribe dos lib. y med. de aceite, med. lib. de cera amarilla, dos onz. de trementina, med. onz. de colofonia, otro tanto de resina comun, una onz. de almáciga, una onz. de incienso y una drac. de azafran.

2.° *Basilicon negro; Unguentum basilicum nigrum*, s. *resinæ nigræ*. (ams. an. b. ba. be. br. e. f. ff. lo. pa. sa. w. *br. sp. sw. vm.*)

R. Pez negra,
Colofonia y
Cera amarilla, a. . . . una pt.
Aceite comun, ... cuatro pt.

Lícuense juntas la pez y la colofonia; añádase la cera y el aceite, y cuélese por un lienzo. (ams. b. ba. be. f. ff. sa. *sp.*)

lo. prescribe nueve onz. de pez, otro tanto de colofonia, otro tanto de cera, y dos cuartillos de aceite.

R. Pez negra,
Resina comun,
Cera amarilla y
Manteca de puerco, a. . una pt.
Aceite comun, ... dos pt.

Lícuense juntos. (an. *sw.* vm.*)

e. prescribe dos partes de las cuatro primeras sustancias y tres de aceite.

R. Pez negra,
Resina comun,
Cera amarilla y
Trementina, a. . . . . una pt.
Aceite comun, ... ocho pt.

Lícuense juntos. (br.)

br. prescribe tambien partes iguales de pez negra, de colofonia, de trementina y de aceite.

R. Cera amarilla,
Sebo de carnero,
Colofonia,
Pez negra y
Trementina, a. . . . . tres onz.
Aceite comun, ... una lib.

Lícuense y añádase
Polvos de incienso, onza y med.

Méz. ex. (br. w.)

sw. prescribe med. lib. de pez negra, otro tanto de colofonia, lo mismo de cera amarilla, lib. y med. de aceite, tres onz. de trementina y una onza de incienso.

R. Cera amarilla, ... dos onz.
Azafran, ... dos escrp.
Almáciga,
Mirra,
Pez negra,
Sebo y
Incienso, a. . . . . dos drac.

Colofonia y
Trementina, a. . . . med. onz.
Aceite comun, ... tres onz.
Hágase ungüento. (pa.)

UNGUENTO PARDO.

Ungüento fusco; Unguentum fuscum.

(br. w.)

R. Aceite comun, . . libra y med.
Cera amarilla, . . . cuatro onz.
Colofonia y
Pez negra, a. . . . . dos onz.
Almáciga y
Trementina, a. . . . . una onz.
Lícuese y añádase al líquido colado y frio
Polvos de gálbano,
——— de sagapeno y
——— de incienso, a. una onz.
——— de aristoloquia redonda, med. onz.
Méz. ex.

EMPLASTO AGLUTINANTE.

Cerato resinoso, Emplasto adhesivo, Emplasto de resina; Emplastrum adhæsivum, s. *litargyri cum resina*, s. *resinosum*, s. *commune cum resina*, s. *resinæ*, s. *polycrestum*, s. *commune adhæsivum*, s. *lithargyricum cum resina pini.* (am. ams. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. lo. p. po. pr. s. su. ww. *au. br. c. pid. sw. vm.*)

R. Aceite comun, ... dos lib.
Litargirio, ... una lib.
Albayalde, ... cuatro onz.
Cuézanse suavemente, meneando sin cesar y echando de cuando en cuando un poco de agua, hasta la consistencia de emplasto; añádase entonces
Cera amarilla, ... ocho onz.
Trementina comun, . . dos onz.
Méz. ex. (fi. su.)

ba. prescribe se cuezan ocho partes de litargirio en doce de manteca, y que se añadan seis partes de resina comun y despues tres de pez negra.

R. Emplasto simple, ... seis pt.
Lícuese á un calor suave y añádase
Pez blanca, ... una pt.
Méz. ex. (ams. b. be. f. g. lo. p. *vm.*)

br. prescribe ocho partes de emplasto y una de resina; — am. ed. y *c.* cinco de emplasto y una de resina; — r. w. y *sp.* dos de emplasto y una de resina; — du. siete partes de emplasto y una de trementina cocida; — *vm.* cinco de emplasto y una de trementina cocida; — fe. seis de emplasto simple, una del de albayalde y otra de resina comun; — y *au.* partes iguales de emplasto, de pez y de colofonia.

R. Emplasto simple,
veinte y cuatro pt.
Pez de Borgoña, ... seis pt.
Trementina, ... una pt.
Lícuense. (he.)

han. po. pr. y *vm.* prescriben veinte y cuatro partes de emplasto, doce de pez y una de trementina; — *sw.* diez y seis de emplasto, cuatro de pez y una de trementina; — s. doce de emplasto, seis de pez y una de trementina; — fu. cuatro de emplasto, diez y seis de resina y cuatro de trementina; — y *pid.* seis de emplasto, doce de resina y cuatro de trementina.

R. Emplasto simple, . . . dos lib.
Resina comun, ... una lib.
Cera amarilla, . . . onz. y med.

Licuése. (ww.)

R. Emplasto simple, . . treinta y ocho pt.
Cera amarilla, . . diez y seis pt.
Lícuense y añádase
Trementina, ... tres pt.
Manteca de puerco, . . una pt.
Méz. ex. *(vm.)*

R. Emplasto simple, . . lib. y med.
Ungüento de altea y
Aceite comun, a. . . . seis onz.
Trementina, ... tres onz.
Cera amarilla, ... dos onz.
Méz. ex. (br.)

R. Emplasto simple, ... seis lib.
Cola de pescado disuelta en dos onz.
de aguardiente, . . med. onz.
Hisopo humedo, . . . cuatro onz.
Resina comun y
Cera amarilla, a. . . cuatro onz.
Trementina, ... med. lib.
Lícuense juntas la cera, la resina y la trementina, añádase el emplasto licuado, despues el hisopo húmedo triturado con la cola de pescado, y caliéntese para consumir toda humedad. (e.)

UNGUENTO AGLUTINANTE MARCIAL.

Unguentum lithargyri resinosum martiale. (s.)

R. Colofonia, ... seis pt.
Trementina, ... cuatro pt.
Lícuense y añádase
Polvos de almáciga, . . . dos pt.
Azafran de Marte, . . . una pt.
Méz. con
Emplasto simple, . . . doce pt.

EMPLASTO FORTIFICANTE.

Emplastrum roborans, s. *stipticum.* (fu.)

R. Emplasto aglutinante, . dos onz.
Lícuese y añádase
Alcanfol pulverizado y
Aceite esencial de alcaravea,
a. . . . . una drac.
Méz. ex.

TRIDACIO.

Lactucarium.

Lettuce opium, In.

am. b.* ed. *c. sp.*

Sustancia de un color moreno obscuro, quebradiza, de olor ligeramente viroso, y de un sabor amargo muy sensible.

Es producida por la consolidacion del jugo lechoso que se obtiene cortando los tallos del *Lactuca sativa*, L., por capas horizontales.

Segun Caventow, el tridacio no contiene morfina, pero sí ácido málico y cal.

Se le atribuye la propiedad de producir el sueño sin determinar jamas el narcotismo, y de obrar disminuyendo la frecuencia del pulso y el calor animal. — Dósis; dos, cuatro mas gr. progresivamente.

TINTURA DE TRIDACIO.

Tinctura lactucarii. (b.* *c.*)

R. Tridacio, ... una onz.
Aguardiente, ... dos cuartillos.

Déjese en digestion lo suficiente. — Dósis; de diez á sesenta got.

JARABE DE TRIDACIO. (*f.***)

R. Zumo reciente de los tallos de la lechuga virosa, despojados de las hojas, ... una lib.
Azúcar blanca, ... dos lib.
Disuélvase en frio y fíltrese.

PILDORAS FUNDENTES.

Pillulæ torpentes ac resolventes. (*b.*)

R. Tridacio, ... doce gr.
Arrope de sauco y
Estracto de regaliz, a. . . . . c. s.
Háganse cuatro píldoras. — Dósis; una cada tres horas en las toses pertinaces sin espectoracion, y en las hidropesías llamadas activas.

POCION SEDANTE.

Potio nutriens et sedans. (*b.*)

R. Liquen islándico, . . . dos onz.
Agua de fuente, ... c. s.
para ocho de cocimiento; cuélese y añádase
Tridacio, ... med. drac.
Mucílago de goma arábiga, med. onz.
Jarabe simple, , . . . una onz.
Para tomar poco á poco en la tos pertinaz y en la tisis tuberculosa.

TRIFOLIO ACUATICO.

Trebol fibrino, trifolio fibrino, palustre; Menyanthes trifoliata, L.

Wasserkles, Feiberkler, Al.; common buckbean, In.; trefle d'eau, F.; trifoglio, I.; trevo d'aqua, Por.

a am ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f fe. ff. fi. fu. g. ham. han he li. lo. o. p. po. pr. r. s su. w. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal de Europa (pentandria monogynia, L.; lisimaquias, J.).

Se usa la yerba (*herba trifolii fibrini*, s. *aquatici*, s. *palustris*, s. *paludosi*, s. *antiscorbutici*) que se compone de una reunion de hojas radicales sostenidas sobre peciolos largos, y formadas por tres hojuelas lampiñas, ovales, obtusas, enteras y algo festoneadas por los bordes. No tiene olor, y el sabor es muy amargo.

Es amargo, tónico, estomacal y emenagogo. Se ha usado con especialidad en el escorbuto, la gota y las calenturas intermitentes.

CONSERVA DE TRIFOLIO ACUATICO.

Conserva trifolii fibrini. (fu.)

R. Hojas de trifolio acuático, machacadas y pasadas por tamiz, una pt.
Azúcar blanca en polvo, . dos pt.
Tritúrense juntos.

TE AMARGO.

Thea amara. (d. dd. *vm.*)

R. Raspaduras de leño de guayaco,
Enebro,
Hojas de sen y
—— de trifolio, a. . . . pt. ig.
Quebrántense. (d. *vm.*)

R. Hojas de trifolio acuático,
—— de sen,
Raiz de bardana y
Enebro, a. . . . . una onz.
Quebrántense. (dd.)

ZUMO DE TRIFOLIO ACUATICO.

Succus trifolii fibrini. (he. sa.)

R. Yerba fresca de trifolio acuático, c. s. q.

Macháquese en un mortero de piedra humedeciéndola con un poco de agua, esprímase con fuerza, déjese reposar el jugo y fíltrese.

sa. prescribe que se clarifique en el B. M.

Dósis; dos á tres onz.

JARABE DE TRIFOLIO ACUATICO.

Syrupus de menyanthe trifoliata. (f.)

R. Zumo de trifolio acuático, clarificado por la ebulicion y colado, y

Azúcar blanca, a. . . . pt. ig.

Cuézase á un calor suave hasta la consistencia de jarabe.

JARABE DE TRIFOLIO ACUATICO COMPUESTO. (br.*)

R. Zumo recien esprimido de trifolio acuático, ... dos pt.

——————————— de lechuga, cerrajas, achicorias y berros en proporciones iguales, una pt.

Méz.; déjense en reposo por un rato, para que se deposite la fécula en el fondo de la vasija; sepárese la parte clara, fíltrese y añádase al líquido

Azúcar blanca, . doble cantidad.

Disuélvase al B. M.

ESTRACTO ACUOSO DE TRIFOLIO ACUATICO.

Extractum trifolii fibrini aquosum. (a. ams. an. b. br. d. f. fe. fi. g. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. sa. w. wu. *pid. vm.*)

R. Hojas frescas de trifolio acuático, c. s. q.

Esprímase, clarifíquese el jugo y evapórese al B. M. hasta la consistencia de estracto. (f. p.)

R. Hojas frescas de trifolio acuático, c. s. q.

Macháquense en un mortero, esprímase el jugo y evapórese este sin quitar la espuma hasta que sea suficiente una cuarta parte de polvos de hojas secas del mismo vegetal para darle la consistencia de estracto.

R. Hojas frescas de trifolio acuático, doce lib.

Macháquense en mortero de hierro, añadiendo poco á poco seis lib. de agua, y esprímase el zumo, póngase este á hervir un poco y cuélese, y en seguida evapórese á un calor suave hasta la consistencia de miel. (han. o.)

R. Hojas frescas de trifolio acuático, una lib.

Agua fria, ... diez lib.

Déjese en maceracion por dos dias menéndolo de cuando en cuando, cuélese, déjese reposar y decántese el líquido, y evapórese en seguida hasta la consistencia de estracto. (po.)

R. Hojas de trifolio acuático, una pt.

Agua comun, ... ocho pt.

Pónganse en maceracion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues por un cuarto de hora, y cuélese esprimiendo con fuerza; hiérvase tambien el residuo con cuatro pt. de agua; mézclense los dos líquidos, y despues de reposados por veinte y cuatro horas,

evapórense hasta la consistencia necesaria. (s.)

R. Hojas frescas de trifolio acuático y
Agua fria, a. . . . . una pt.

Déjese en maceracion por doce horas, y añádase doble peso de la masa total de agua hirviendo. Despues de enfriado clarifíquese con clara de huevo, póngase al fuego, y cuando empiece á espesarse el líquido cuélese por un cedazo y evapórese lo necesario meneando continuamente. (*vm.*)

R. Hojas de trifolio acuático,
una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.

Déjese en digestion por cuatro dias en un sitio caliente, hiérvase despues ligeramente y evapórese el líquido colado hasta la consistencia de estracto. (br. li. pa. w.)

R. Yerba de trifolio acuático,
una lib.
Agua pura, ... diez lib.

Hiérvase por dos horas, cuélese por espresion, déjese reposar el líquido, cuélese por una manga y evapórese hasta que la masa no se pegue á los dedos. (ams. g.)

he. y *pid.* prescriben que se cueza una parte de trifolio acuático en seis de agua, que se cuele por espresion y que se evapore el líquido despues de decantado y reposado por veinte y cuatro horas; — wu. que se cuezan las hojas por espacio de una hora en c. s. de agua, y que se evapore el líquido decantado hasta la consistencia de miel espesa; — an. que se hiervan por un cuarto de hora dos lib. de hojas en diez de agua, y que se evapore el líquido despues de decantado; — y fe. que se haga hervir una pt. de yerba en tres de agua, y que se evapore el cocimiento clarificado con clara de huevo.

R. Yerba de trifolio acuático, una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.

Hiérvase ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion: cuézase tambien el residuo en cuatro pt. de agua y cuélese del mismo modo; mézclense los dos líquidos, decántense despues de reposados y evapórense hasta la consistencia de estracto. (d. han. pr.)

a. prescribe que despues de hervir sucesivamente en muchas aguas la yerba, se reunan los líquidos, y que despues de decantados se evaporen al B. M.; — y fi. que se cueza la yerba por un cuarto de hora con seis pt. de agua, que se hierva segunda vez con otra agua, y que se evaporen al B. M. los dos líquidos reunidos.

R. Hojas machacadas de trifolio acuático, ... ocho lib.

Déjese en maceracion por tres dias en un alambique, estráiganse despues por destilacion unas dos onz. de agua, añádase al residuo triple cantidad de agua, hiérvase hasta que se consuman dos terceras pt., clarifíquese y cuélese el líquido, evapórese hasta la consistencia de estracto, y añádase á este cuando esté tibia el agua destilada. (sa.)

Dósis; un escrp. á. una drac.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE TRIFOLIO ACUATICO.

Extractum trifolii fibrini alcoholicum. (fu.)

R. Yerba de trifolio acuático y

Aguardiente, a. . . . . una lib.
Agua comun, ... ocho lib.
Déjese en infusion por tres dias, cuélese por espresion, destílese el alcohol y evapórese lo demas cuanto convenga.

ELIXIR AMARGO VINOSO. (ham.)

R. Estracto de trifolio acuático, med. onz.
Vino blanco, ... dos onz.
Disuélvase.

ELIXIR ANTIESCORBUTICO. (fu.)

R. Estracto de trebol acuático,
——— de fumaria y
——— de grama, a.. med. onz.
Agua de manzanilla, . diez onz.
—— de rábano compuesta, cuatro onz.
Acido sulfúrico, . . . med. drac.
Para tomar á cuch.

POCION HIDRAGOGA.

Mixtura trifolii aquatici fœtida. (*au.*)

R. Estracto de trifolio acuático, media onz.
Vinagre escilítico, . . . dos onz.
Tintura de asafétida, med. onz.
Dósis; veinte got. tres veces al dia.

INFUSION DE TRIFOLIO ACUATICO.

Infusum menyanthis. (ff. *sa. sw.*)

R. Hojas de trifolio acuático, una onz.
Agua hirviendo, ... una lib.
Déjese en maceracion por dos horas y cuélese.
Es amarga y tónica. —Dósis; cuatro onz. dos veces al dia.

INFUSION CONTRA LA JAQUECA. (*sm.*)

R. Hojas de trifolio acuático, dos escrp. á una drac.
Agua hirviendo, . . . doce onz.
Déjese en infusion por doce horas, cuélese y añádase al líquido
Jarabe de valeriana, . . dos onz.
Se toma cada dia en tres veces.

VINO ESCITANTE.

Vinum trifolii fibrini. (*au.*)

R. Yerba fresca de trifolio acuático, media onz.
Simiente de mostaza, . una onz.
Vino tinto, ... tres lib.
Déjese en digestion por suficiente tiempo y fíltrese. —Para tomar á vasos en la dispepsia é hidropesía.

TINTURA DE TRIFOLIO ACUATICO.

Tinctura, s. *Essentia menyanthis*, s. *trifolii fibrini.* (br. d. dd. fu. han. li. w. *pid. sw.*)

R. Yerba seca de trifolio acuático, una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.
Déjese en digestion por tres dias, esprímase y fíltrese. (d. dd. fu. li.)

pid. prescribe una pt. de yerba y cinco de alcohol; —y han. una de yerba y seis de alcohol.

R. Yerba de trifolio acuático, cuatro onz.
Alcohol, ... dos lib.
Déjese en digestion lo suficiente, cuélese por espresion, y échese el líquido sobre
Yerba de trifolio acuático, dos onz.

Déjese tambien en digestion, esprímase y fíltrese. (br. w.)

R. Yerba de trifolio acuático, una lib.
Espíritu de trifolio acuático, tres lib.

Déjese en maceracion por dos dias y cuélese por espresion. (*sw.*)

R. Espíritu de trifolio acuático, tres lib.
Estracto de la misma sustancia, drac. y med.

Disuélvase.

Es amarga, considerada como estomacal, antiescorbútica y febrífuga.—Dósis; de cincuenta á sesenta got.

TINTURA DIURETICA.

Tinctura diuretica. (dd.)

R. Vinagre escilítico, . . med. onz.
Esencia de trifolio acuático, dos drac.

Méz.

Piderit prescribe media onz. de estracto, dos onz. de vinagre escilítico y med. onz. de tintura de naranja ó de enebro.

Es escitante, amarga y diurética. Dósis; sesenta got.

TINTURA AMARGA.

Tinctura, s. *Essentia amara.* (b.* br. li.)

R. Yerba de trifolio acuático y
——— de tanaceto, a. med. onz.
Raiz de angélica,
——— de pimpinela blanca,
——— de genciana,
Goma de yedra y
Ambar amarillo, a. . una drac.
Aguardiente, ... doce onz.

Déjese en maceracion por algunos dias y cuélese. (br. b.*)

R. Yerba de trifolio acuático,
——— de escordio y
——— de tanaceto, a. cuatro onz.
Agua hirviendo, . . lib. y med.

Déjese en digestion por doce horas, cuélese por un lienzo, arrójese el agua, y échese sobre el residuo

Alcohol, ... dos lib.

Añádase en seguida

Naranjas verdes quebrantadas, una onz.

Déjese en digestion por cuatro dias, esprímase ligeramente y fíltrese. (li.)

Es amarga y tónica.—Dósis; de cuarenta á sesenta got.

ESPIRITU DE TRIFOLIO ACUATICO.

Spiritus trifolii fibrini. (w. *sw.*)

R. Yerba fresca de trifolio acuático, seis pt.
Aguardiente, ... cuatro pt.
Agua pura, ... una pt.

Destílese parte y med. y vuélvase á destilar con otra yerba. (w.)

sw. prescribe que se mezclen doce lib. de yerba, seis de alcohol y tres de agua, que se destilen seis lib., que se eche el producto de la destilacion sobre doce lib. de yerba fresca, que se añadan dos lib. de agua y que se destilen todavia seis lib.

TRIFOLIO PRATENSE.

Trifolio de los prados; Tripholium pratense, L.

Bother Weisenklee, Al.; purple, In.; trefle, F.

f. w.

Planta bienal comun en toda Europa (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.).

Se usa la yerba florida *(herba cum floribus Trifolii pratensis*, s. *purpurei)* que se compone de hojas trifoliadas, con hojuelas ovales, enteras, vellosas, generalmente señaladas con una mancha blanca ó negra, y de flores encarnadas en forma de espigas, redondas, obtusas y rodeadas de bracteas membranosas.

Algunos pretenden que es algo laxante.

TRIOSTEO PERFOLIADO.

Triosteum perfoliatum, L.

Feverroot, bastard ipecacuanha, tinkeriveed, In.; trioste, F.

Planta de la América septentrional (pentandria monogynia, L.; caprifoliaceas, J.).

Se usa la corteza de la raiz, que es purgante y algunas veces emética.

TRIPOLI.

Tripela, *Tripolitiana terra.*

Trippel, Trippelerde, Al.; Tripoli, F.

br. w. *g. sp.*

Sustancia dura, áspera y seca al tacto, cuyo color varía desde el blanco ó amarillo, al rojo, verde ó pardo. El tripoli mas estimado, llamado de Venecia, viene de Corfú, y es apizarrado, poroso y de color rojo amarillento.

TURBIT.

Convolvulus Turpethum, L.

Turpethwind, Al.; square stalked bind-weedrot, Indian jalap, In.; turbith, F.; tassia, I.; athapsia, Por.

ams. an. br. e. f. fe. w. *a. be. br. g. m. sp. z.*

Planta bienal de Ceylan y del Malabar (pentandria monogynia, L.; convolvulaceas, J.).

Se usa la raiz *(radix Turpethi albi*, s. *vegetabilis)* que es larga, gruesa, leñosa, ramosa, del grueso de un dedo ó mas. La corteza es gruesa, compacta, agrisada por fuera, blanquecina por dentro, y cubre una sustancia blanca mas porosa. Se presenta en el comercio en pedazos de cuatro á cinco pulgadas. Solamente es eficaz la corteza, pues la médula es casi inerte. Apenas tiene olor; y el sabor poco sensible al principio, se hace nauscoso en bastante grado.

Es purgante drástico que rara vez se usa solo.

ESTRACTO DE TURBIT.

Extractum turpethi. (w.)

R. Raiz de turbit, ... una lib.
Alcohol, ... cinco á seis lib.

Déjese en digestion lo suficiente y cuélese por espresion; póngase en maceracion el residuo y hiérvase despues en tres lib. de agua, clarifíquese el cocimiento con clara de huevo, reúnanse los dos líquidos, estráigase el alcohol por destilacion, y evapórese lo demas hasta la consistencia de estracto.

TUSILAGO.

Uña de caballo; Tussilago Farfara, L.

Hufiattich, Al.; coltsfoot, In.; pas, dane, F.; tossilagine, In.; tossilagem, Por.

a. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. ham. han. he. lo. o. p. po. pp. pr. r. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Planta bienal que crece en toda Europa (syngenesia polygamia superflua, L.; synantereas, Cass.).

Se usa la raiz, las hojas y las flores.

La raiz (*radix Farfaræ*, s. *Tussilaginis*, s. *Bechii*, s. *Ungullæ caballinæ*) es larga, delgada, fibrosa, blanquecina, inodora é insípida.

Las hojas son redondeadas, algo acorazonadas por la base, angulosas, dentadas, con peciolos largos, de color verde obscuro y lisas por encima, vellosas por debajo y sin olor. El sabor es mucilaginoso, un poco amargo y algo áspero. Las flores son amarillas y de sabor agradable. Es ligero astringente y béquico.

ESPECIES BEQUICAS. (pp. ww.)

R. Hojas de tusilago, . . . dos onz.
Raiz de regaliz, ... una onz.
Flores de amapola y
Anís, a. . . . . dos drac.
Quebrántense.

CONSERVA DE TUSILAGO.

Conserva farfaræ. (pa. w. *sw.**)

R. Flores de tusilago, . . . una pt.
Azúcar blanca, ... dos pt.
Triturense juntas.

Aconsejada en la tos catarral. — Dósis; dos drac. cuatro veces al dia.

LOOC DE TUSILAGO.

Looc de farfara. (w. *pid. sp.*)

R. Raiz fresca de tusilago, . c. s. q.

Cuézase en agua, macháquese en seguida y pásese por un cedazo; hiérvase la pulpa con doble cantidad de miel hasta la consistencia de papilla espesa.

JARABE DE TUSILAGO.

Syrupus tussilaginis. (br. f. sa. w.)

R. Flores frescas de tusilago, . .
cuatro lib.
Agua hirviendo, . . . ocho lib.

Déjese en infusion por doce horas y cuélese esprimiendo ligeramente. Despues de reposado y decantado el líquido añádasele doble cantidad de azúcar blanca y lícuese al B. M. (f.)

br. y w. prescriben lib. y media de flores, dos lib. de agua hirviendo, veinte y cuatro horas de maceracion y diez onz. de azúcar para cada nueve de líquido despues de colado.

sa. permite que se mezclen partes iguales de zumo purificado y jarabe comun, ó ya dos partes de infusion y una de azúcar blanca.

AGUA DE TUSILAGO. (pa.)

R. Flores de tusilago, . . . una pt.
Agua, ... tres pt.
Destílese parte y media.

ELECTUARIO.

Electuarium resumptivum. (w. *sp.*)

R. Regaliz,

Yedra terrestre y
Verónica, a. . . . . med. onz.
Agua hirviendo, . . . cinco lib.

Déjese en maceracion por doce horas, cuélese y pongánse á hervir en el líquído

Raiz fresca de tusílago y
Pasas de Corinto,
a. . . . . diez y seis onz.

Pásense la raiz y las pasas por un cedazo de seda; emulsiónese el cocimiento con

Almendras dulces peladas,
siete onz.

Desláse la pulpa en la emulsion, cuézase todo con

Azúcar blanca,
treinta y dos onz.

añádase por último

Cortezas de cidra, . . . n.º 3.
Polvos de canela, . . media onz.
—— de clavo, . . . tres drac.

y méz. ex. — La dósis es de media á una onz. dos ó tres veces al dia en la tos pertinaz.

V.

VACA DE SAN ANTON.

Coccinella septempunctata, L.

Siebenpunkt, siebenmat punctirter Sonnenkæfer, Al.; coccinelle, F.

sa. *g.*

Insecto coleoptero muy comun en Europa, abultado, hemisférico, negro, con élytres encarnados, y señalados los bordes del corselete con dos manchas blancas y siete puntos negros sobre los élytres.

TINTURA DE VACA DE SAN ANTON.

Tinctura coccinellæ septempunctatæ.
(b.*)

R. Vacas de San Anton, n.º 60 á 80.
Alcohol concentrado, . una onz.

Déjese en digestion por ocho dias y cuélese. — Esta preparacion se ha considerado como odontálgica. — Dósis; treinta á cuarenta got. cuatro veces al dia.

VALERIANA.

En las farmacopeas se hace mencion de dos plantas de este nombre:

1.º *Valeriana mayor, de jardin; Valeriana Phu*, L.

Grosser Baldrian, Al.; garden valerian, In.; kazijk velssy, B.; storbaldrian, D.; grande valeriane, F.

br. d. e. f. su. w. *be. g. m.*

Planta bienal de las provincias templadas de Europa (triandria digynia, L.; valerianas, J.).

Se usa la raiz (*Radix valerianæ majoris*) que es gruesa, larga, arrugada, fibrosa, de color moreno pálido por fuera y blanquecino por dentro, de olor nauseoso, y sabor desagradable, amargo y acre.

2.º *Valeriana silvestre, oficinal,*

menor, de las boticas; Valeriana officinalis, L.

Gemeiner Baldrian, Al.; officinal valerian, wild valerian, In.; kozlik obecky, B.; buldrian, æienrod valerian, vild nardus, D.; valeriane sauvage, F.; valeriana, I. Por.; wilde valerian, Ho.; kozlki, koztkowy, Po.; baiderjan, R.; wændelrot, Su.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp. z.*

Planta bienal que se cria en toda Europa.

Se usa la raiz *(radix Valerianæ minoris*, s. *silvestris)* que es amarillenta por fuera, blanquecina por dentro, compuesta de muchas raicillas largas, casi inodora cuando está fresca, pero dotada de un olor fétido, penetrante y particular despues de seca. El sabor es acre y amargo.

Segun Tromsdorf, contiene un aceite volátil alcanforado y verdoso, goma, almidon, resina y un principio particular.

Es un poderoso escitante que se dice obra de una manera especial sobre el sistema nervioso, que se usa con particularidad en las enfermedades nerviosas y que tambien se ha empleado como febrífugo. — La dósis en polvo es de media drac. á una onza, y aun mas, dos ó tres veces al dia.

§. I. PREPARACIONES QUE CONTIENEN LA VALERIANA EN SUSTANCIA.

ESPECIES ANTIESPASMÓDICAS. (wu. *hp. pid.*)

R. Raiz de valeriana, . . tres onz.
Hojas de naranjo, . . . dos onz.
Yerba de mil en rama, una onz.
Quebrántense y méz. *(wu. pid.)*

R. Raiz de valeriana,
—— de betónica,
Yerba de menta piperita y
Hojas de naranjo, a. . part. ig.
Quebrántense y méz. *(hp.)*
Dósis; dos cuchtas. para infusion.

POLVOS ANTIESPASMÓDICOS.

Pulvis nervinus, s. *epilepticus*, s. *roborans antispasmodicus*, s. *valerianæ aromaticus.* (b.* dd. ff. fu. ham. pp. *au. b. hp. sm.*)

R. Raiz de valeriana y
Hojas de naranjo, a. . dos drac.
Háganse polvos. (fu.)

R. Raiz de valeriana, . . veinte pt.
Canela, ... tres pt.
Pulverícense. (ff.)

au. prescribe dos drac. de valeriana, un escrp. de canela, y drac. y med. de oleosácaro de valeriana.

R. Raiz de valeriana . . . una onz.
Leño de quasia, . . . media onz.
Pulverícense. (ham.)

R. Raiz de valeriana, . . un escrp.
Alcanfor, ... un gr.
Pulverícense. (dd.)

R. Raiz de valeriana, media drac.
Canela, ... cinco gr.
Oleosácaro de valeriana,
un escrp.
Háganse polvos. (pp.)

R. Raiz de valeriana, . media onz.
Corteza de naranja y
Azúcar blanca, a. . . dos drac.

Aceite de valeriana, . . seis got.
Háganse polvos. (ham.)

R. Ojos de cangrejo,
Cuerno de ciervo raspado,
Raiz de valeriana y
Visco de encina, a. . . part. ig.
Háganse polvos muy finos. (b.* *hp.*)

R. Raiz de valeriana, . media onz.
—— de peonía, . . . dos drac.
Raspaduras de c. c., . tres drac.
Aceite de nuez moscada, tres gr.
Azúcar, ... tres onz.
Pulverícense. *(sm.)*

R. Raiz de valeriana, . media onz.
Corteza de naranja y
Tártaro tartarizado, a. dos drac.
Háganse polvos. (fu.)

R. Raiz de valeriana, . . una drac.
Hojas de naranjo, . . un escrp.
Sal amoniaco, ... dos gr.
Aceite de cajeput, . cuatro got.
Pulverícense. (b.*)

R. Valeriana, ... media drac.
Sub-carbonato de magnesia y
Sal amoniaco, a. . . . . tres gr.
Aceite de cajeput, . . . dos got.
Redúzcanse á polvos. (b.* *au.*)

R. Valeriana, ... una drac.
Lirio de Florencia,
dracma y med.
Regaliz, ... dos drac.
Anís, ... med. drac.
Azafran, ... ocho gr.
Sub-carbonato de magnesia,
una drac.
Pulverícense. *(au.)*

R. Valeriana, ... una onz.
Flores de zinc, ... un escrp.
Almizcle, ... diez gr.
Háganse polvos. *(b.)*

La dósis de estos polvos en general es de veinte gr.

POLVOS ANTIELMÍNTICOS. (*au.*)

R. Raiz de valeriana, . . dos drac.
—— de jalapa y
Azufre de mercurio negro,
a. . , ... una drac.
Dósis; una cuchta. de cuando en cuando.

BOLOS ANTIEPILÉPTICOS.

Boli ad epilepticos, s. *è valeriana.*
(ff. ra. sa. sw.)

R. Raiz de valeriana, . . . diez pt.
Canela, ... tres pt.
Jarabe simple, ... c. s.
Hágase una masa. (ff.)

R. Raiz de valeriana, . media drac.
Jarabe simple, . . drac. y med.
Incorpórense los polvos con el jarabe. *(sa.)*

sw. prescribe el jarabe de flores de naranjo. — Si es necesario se añaden diez gr. de castoreo, ó siete de óxido negro de hierro.

R. Raiz de valeriana, . veinte gr.
Sulfato de potasa, . . . dos gr.
Jarabe de corteza de naranja,
c. s.
Méz. ex. *(ra.)*

PILDORAS ANTIEPILEPTICAS.

Píldoras antiespasmódicas. (ca. ra. sm.)

R. Valeriana, ... seis drac.
Gálbano y
Sagapeno, a. . . . drac. y med.

Asafétida, ... una drac.
Háganse píldoras de tres gr. *(ca.)*

R. Valeriana, ... treinta gr.
Castoreo, ... cuatro gr.
Oxido de zinc, . . . veinte gr.
Jarabe simple, ... c. s.
Háganse tres píldoras. *(ra.)*—Usadas por Dupuytren.

R. Manteca de cacao, cuatro drac.
Acetato de potasa y
Valeriana, a. . . . . dos drac.
Castoreo, ... una drac.
Cinabrio, ... un escrp.
Jarabe de flores de naranjo, c. s. para hacer píldoras de tres gr. *(sm.)*

R. Valeriana, ... una onz.
Limaduras de hierro,
Catecú y
Cascarilla, a. . . . . dos drac.
Jarabe de quina, ... c. s.
Háganse píldoras de tres gr. *(sm.)*

ELECTUARIO ANTIESPASMODICO.

Conditum epilepticum. (sm. sw.)*

R. Raiz de valeriana, . . dos onz.
Sub-carbonato de magnesia, dos drac.
Jarabe de peonía, ... c. s.
Méz. *(sm.)*

R. Raiz de valeriana y
Hojas de naranjo, a. . seis drac.
Jarabe de agenjos, ... c. s.
Méz. *(sw.*)*

Dósis; una cuchta. dos ó tres veces al dia.

ELECTUARIO ANTIELMÍNTICO.

Electuarium anthelminticum.
(b.* ham. han. r. ww.)

R. Sulfato de potasa,
Raiz de jalapa y
—— de valeriana, a. una drac.
Ogimiel escilítico, . cuatro onz.
Méz. (br.* r.)

R. Raiz de valeriana, . . dos drac.
—— de jalapa, . . . dos escrp.
Simiente de Alejandría, dos drac.
Miel de regaliz, ... tres onz.
Méz. (ham.)

R. Semen contra, ... una onz.
Valeriana y
Jalapa, a. . . . . dos drac.
Sulfato de potasa, . . . med. onz.
Ogimiel escilítico, . . . cinco onz.
Méz. (han.)

ww. prescribe drac. y med. de valeriana, una drac. de jalapa, med. onz. de simiente de Alejandría, dos drac. del sulfato, seis del ogimiel escilítico y c. s. de miel despumada.

Dósis; de una drac. á dos para los niños, y med. onz. para los adultos, cuatro veces al dia.

LOOC VERMIFUGO.

Linctus vermifugus. (sa.)

R. Valeriana en polvo, . una drac.
Aceite comun, ... una onz.
Méz. ex.

POCION ANTIEPILEPTICA. (bo.)

R. Agua de cerezas,

Agua de tilo y
—— de flores de naranjo,
a. . . . . dos onz.
Polvos de guteta y
—— de valeriana, a. med. drac.
Jarabe de kermes vegetal,
tres drac.

Para tomar en dos veces.

POCION ESCITANTE Y ANTIESPASMODICA. (*ca. pie.*)

R. Raiz de valeriana,
veinte y cuatro gr.
Licor anodino de Hoffmann,
treinta got.
Agua de yerbabuena y
—— de canela hordeada,
a. . . . . dos onz.

§ II. PREPARACIONES QUE SOLO CONTIENEN EL PRINCIPIO ACTIVO DE LA VALERIANA.

A. *Estraido por el agua.*

INFUSION DE VALERIANA.

Infusum valerianæ. (am. b.* du. ham. ff. pp. ww. *c. f. hp. ra. sa. sw.*)

R. Raiz de valeriana, . . . dos drac.
Agua hirviendo, . . . siete onz.

Déjese en digestion por una hora y cuélese despues de fria. (am. du. *c.*) *ra.* prescribe una onz. de raiz y dos lib. de agua; — b.* y dd. una onz. de raiz y una lib. de agua; — ham. una onz. de raiz y suficiente cantidad de agua para obtener ocho onz. de líquido despues de colado; — pp. y ww. onz. y med. de raiz y lib. y med. de agua; — *fp.* dos drac. de valeriana, otras dos de regaliz y dos cuartillos de agua; — y *hp.* med. onz. de valeriana y c. s. de agua para ocho onz. de infusion.

Es escitante, nervina y diaforética. — Dósis; una ó dos cuch. de hora en hora.

R. Raiz de valeriana, . . . una onz.
Agua hirviendo, . . . doce onz.

Dejese en maceracion dos horas, y despues de colada añádase
Espíritu de espliego compuesto,
seis drac.
ó Tintura de valeriana amoniacal,
tres drac.

Méz. (*sa. sw.*)

JARABE DE VALERIANA.

Syrupus valerianæ radicis. (han.)

R. Raiz de valeriana, . . ocho onz.
Agua hirviendo, ... tres lib.

Déjese en infusion por algunas horas, cuélese y añádase á cada veinte onz. de líquido
Azucar blanca, . . . cuatro lib.

INFUSION DE VALERIANA COMPUESTA.

Infusum valerianæ compositum, s. *tonico-nervosum.* (dd. *au.*)

R. Raiz de valeriana y
—— de cálamo aromático,
a. . . . . una onz.
Flores de arnica, . . . dos drac.
Agua hirviendo, ... una lib.

Déjese en digestion hasta que se enfrie, cuélese esprimiendo con fuerza, y añádase al líquido
Esencia de trebol acuático,
tres drac.
Eter sulfúrico, ... dos drac.

Méz. ex. — Dósis ; med. onz. (dd.)

R. Raiz de valeriana ,
de dos á seis drac.
Agua hirviendo , . . . ocho onz.
Déjese en infusion y añádase al líquido despues de frio y colado
Agua de canela simple , dos onz.
Licor de Hoffmann , . dos drac.
Jarabe simple , ... una onz.

R Raiz de valeriana , . . . dos drac.
Agua hirviendo , . . . una onz.
Déjese en infusion y añádase al líquido despues de colado
Agua de canela , ... una onz.
Sapos vivos , ... n.º 50.
Déjese todo en digestion por dos horas al B. A. , cuélese por espresion y añádase
Jarabe de corteza de naranja ,
una onz.
Tintura de opio, ... seis got.
Méz. y añádase al tiempo de administrarla una pulgada cúbica de gas hidrógeno puro. — Esta pocion se recomienda en la amaurosis. (*au.*)

INFUSION NERVINA. (*sa.*)

R. Raiz de valeriana, . onz. y med.
Cocimiento de quina, . . dos lib.
Déjese en infusion y añádase al líquido despues de colado
Jarabe de manzanilla, onz. y med.
Alcanfor triturado con mucílago de goma arábiga , . veinte gr.
Méz.

ENEMA ANTIELMINTICO.

R. Yerba de agenjos y
Raiz de valeriana , a. . . una onz.
Tanaceto y
Corteza de naranja , á. med. onz.
Echense á dos cuch. de estos polvos una lib. de agua hirviendo, déjese en infusion por espacio de una noche, y cuélese por espresion. — Para dos enemas , á cada uno de los cuales se añade una cuch. de aceite de cuerno de ciervo. — Alabado por Bremser.

BEBIDA ANTIESPASMODICA. (*sm.*)

R. Visco de encina ,
Raiz de valeriana y
—— de peonía , a . . . dos drac.
Hojas de naranjo, . . . un puñto.
Agua, ... dos cuartillos.
Hiérvase hasta consumirse la cuarta parte.

POCION ESCITANTE. (ff. *au. b.*)

R. Valeriana , . . dos drac. y med.
Agua, ... c. s.
para cuatro onz. de cocimiento.
Añádase al líquido despues de colado
Jarabe simple , ... una onz.
Tintura de canela , . . . diez got.
Méz. (ff.)

R. Valeriana , ... una drac.
Cocimiento de quina, . . . c. s.
para obtener ocho onz. de infusion; cuélese y añádase al líquido
Eter sulfúrico, ... med. drac.
Tintura tebaica , . . . treinta got.
Méz. ex. (*b.*)

R. Alcanfor , ... un escrp.
Eter sulfúrico , ... dos drac.
Añádase á la disolucion
Estracto de valeriana, . seis drac.
Agua de menta piperita , seis onz.
Láudano líquido de Sydenham ,
una drac.

Dósis; med. cuch. cada dos ó tres horas. (*au.*)

ESTRACTO ACUOSO DE VALERIANA.

Extractum valerianæ aquosum. (a. an. b. ba. br. du. e. f. fu. han. li. pr. s. su. *pid.*)

R. Raiz de valeriana, ... c. s. q.

Póngase en una manga de bayeta y échese encima agua caliente hasta que esta pase insípida, y evapórese lentamente el líquido hasta la consistencia de estracto. (fu.)

R. Raiz de valeriana, . . . una pt.
Agua, ... seis pt.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y cuélese por espresion; déjese reposar dos horas, decántese y evapórese el líquido hasta la consistencia necesaria. (ba.)

R. Raiz de valeriana, . . . una lib.
Agua fria, ... cuatro lib.

Póngase en maceracion por veinte y y cuatro horas, meneando de cuando en cuando y cuélese; déjese en maceracion del mismo modo el residuo con otra agua, y cuélese tambien; mézclense los dos líquidos y evapóreseles hasta la consistencia de estracto. (f.)

han. pr. y s. prescriben dos dias de maceracion en doce partes de agua; que se deje evaporar hasta la sesta parte; que se filtre, y que se evapore por último al B. M.

R. Raiz de valeriana, . . . una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.

Déjese en digestion por cuatro dias en un sitio caliente, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion y evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto. (br.)

pid. prescribe que se hierva una lib. de raiz en ocho de agua, hasta que se consuma la mitad.

Raiz de valeriana en polvo, seis onz.
Agua hirviendo, ... tres lib.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas en un sitio caliente, cuélese por espresion y evapórese despues el líquido hasta la consistencia conveniente. (du.)

R. Raiz de valeriana, . . . una pt.
Agua hirviendo, ... ocho pt.

Hágase hervir ligeramente por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hágase hervir todavía el residuo con cuatro partes de agua y cuélese del mismo modo; méz. los dos líquidos, decántense despues del suficiente reposo y evapórense hasta la consistencia de estracto. (an. fe. *e.*)

a. prescribe que se estraigan los principios de la raiz por muchas ebuliciones sucesivas, que se reunan los líquidos, que se decanten despues del suficiente reposo y que se evaporen al B. M.; — su. que se haga hervir la valeriana con el doble de agua, despues otra segunda vez con otra nueva, y que se evaporen al B. M. los dos líquidos reunidos; — b. que se deje en digestion por veinte y cuatro horas, que se hierva por dos en diez partes de agua, y que se haga hervir otra vez el residuo por dos horas con otras diez partes de agua; — ams. que se haga hervir primero con veinte y despues con quince partes de agua reducidas ambas á la mitad; — e. que se

deje en digestion la raiz por veinte y cuatro horas, que se hierva despues por dos con diez partes de agua, y que se vuelva á hervir el residuo con nueva cantidad de agua reducida á la mitad.

Dósis; de un escrúpulo á una drac.

B. *Estraido por la cerbeza.*

CERBEZA ANTIESPASMODICA. (*vm.*)

R. Raiz de valeriana, . . cinco pt.
Hojas de romero y
—— de salvia, a. part. y med.
Serpentaria de Virginia, una pt.
Cerbeza fuerte,
ciento veinte y ocho pt.

Déjese en maceracion por ocho ó diez dias y cuélese.

CERBEZA CEFALICA. (*ca. sa.*)

R. Raiz de valeriana, . . una onz.
Mostaza, ... seis drac.
Romero, ... cuatro drac.
Serpentaria de Virginia,
tres drac.
Cerbeza, . . . cuatro azumbres.

Déjense en maceracion por dos dias y cuélese. (*sa.*)

ca. prescribe diez onz. de valeriana, seis onz. de mostaza, tres onz de romero, otro tanto de salvia, dos onz. de serpentaria y dos azumbres de cerbeza.

C. *Estraido por el vino.*

VINO DE VALERIANA.

Infusum valerianæ vinosum. (b.*)

R. Raiz de valeriana, . una onz.
Vino blanco, ... una lib.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas y cuélese.

Dósis; una cuch. cada una ó dos horas.

D. *Estraido por el alcohol.*

TINTURA DE VALERIANA.

Tinctura, s. *Essentia valerianæ sylvestris*, s. *officinalis.* (a. am. ams. an. be. br. dd. du. fu. han. lo. po. pr. s. *br. hp. sw. vm.*)

R. Raiz de valeriana silvestre seca y partida menudamente, dos onz.
Alcohol (0,910.), . . . una lib.

Déjense en digestion lo suficiente y filtrese. (a. ams. *hp.*)

an. prescribe una parte de valeriana y seis de alcohol de 20.°; — b. y be. una de raiz y seis de alcohol de 15.° — am. du. lo. y *e.* cuatro onz. de raiz y una azumbre de alcohol (0,930); — *vm.* una parte de raiz y seis de aguardiente; — *br.* una de raiz y cinco de alcohol; — han. po. y pr. cinco onz. de raiz y dos lib. de alcohol; — s. una parte de raiz y cuatro de alcohol; — y dd. y *sw.* una de raiz y seis de alcohol.

R. Raiz de valeriana, . . dos onz.
Agua de manzanilla, . . seis onz.
Alcohol, ... dos onz.

Déjense en infusion lo suficiente y cuélese por espresion. (fu.)

Escitante, reputada por antiespasmódica, nervina, vermífuga y diaforética. — Dósis; de treinta á sesenta gotas.

ESTRACTO ALCOHOLICO DE VALERIANA.

Extractum valerianæ alcoholicum. (b. d. li. po. wu.)

R. Raiz de valeriana y

Alcohol , a. . . . . dos lib.
Agua comun , ... nueve lib.
Déjese en digestion por doce horas, cuélese por espresion , estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese el residuo hasta la consistencia conveniente. (po.)

b. prescribe dos partes de raiz, tres de alcohol y nueve de agua ; — y d. una parte de raiz, dos de alcohol y cuatro de agua.

R. Raiz de valeriana , . . . c. s q.
Alcohol , ... c. s.
para cubrirle cuatro dedos. Déjese en digestion en un sitio caliente y decántese ; hágase hervir por una hora en agua el residuo y cuélese por espresion ; evapórese la tintura hasta la consistencia de miel , añadiendo el líquido colado hácia el fin , meneando sin cesar para que la masa se haga homogénea y sin grumos. (li. wu.)

TINTURA DE VALERIANA ALCANFORADA. (ham.)

R. Raiz de valeriana silvestre ,
. . . . . dos onz.
Alcanfor , ... una drac.
Alcohol , ... ocho onz.
Déjense digerir hasta la perfecta estraccion y cuélese.

TINTURA DE VALERIANA COMPUESTA.

Tinctura , s. *Essentia valerianæ composita.* (br. w. *pid. vm.*)

R. Raiz de valeriana ,
—— de serpentaria de Virginia,
a. . . . . una onz.
Alcanfor , ... una drac.
Alcohol , ... ocho onz.
Déjese en infusion lo suficiente, esprímase y filtrese. (br. w. *pid.*)

R. Raiz de valeriana , . . una onz.
—— de serpentaria de Virginia, med. onz.
Aguardiente , ... ocho onz.
Déjese en infusion , esprímase despues , filtrese y añádase al líquido
Alcanfor , ... una drac.
Consérvese la sulucion. (*vm.*)
Escitante , reputada por alexiterea, uterina y antiepiléptica. — Dósis ; de cuarenta á sesenta gotas.

TINTURA ANTIESPASMODICA Y TONICA. (*pie.*)

R. Raiz de valeriana y
Polvos de quina, a. . . . dos drac.
——— de ipecacuana, treinta gr.
Cocimiento hirviendo de dos cabezas de adormidera blanca , quebrantadas , . . . diez y seis onz.
Déjense en infusion por veinte y cuatro horas en vasija tapada, y añádase en seguida
Jarabe de yedra terrestre,
una onz.
Escitante ; — Dósis ; una cuch. tres veces al dia.

TINTURA NERVINA Y TONICA. (*ca. vm.*)

R. Raiz de valeriana y
Yerba de menta piperita ,
a. . . . . onz. y med.
Castoreo , ... una onz.
Azafran , ... med. drac.
Esencia de menta , . . una drac.
Alcohol , ... dos lib.
Déjese en digestion , cuélese por espresion y filtrese. (*ca.*)

R. Castoreo , ... dos pt.

Azafran, ... una pt.
Aguardiente y
Agua de menta piperita,
a. . . . . veinte pt.

Déjense en infusion fria por muchos dias y añádase despues

Raiz de valeriana, . . . dos pt.

Al cabo de algunos dias esprímase con fuerza y filtrese. *(vm.)*

Escitante aconsejado en las afecciones atribuidas á la debilidad y al espasmo del estómago.—Dósis; veinte á treinta gotas.

TINTURA AMONIACAL DE VALERIANA.

Tinctura, s. *Essentia valerianæ ammoniata*, s. *volatilis*. (am. an. b.* d. du. ed. g. han. lo. o. p. po. pr. s. su. wu. *c. sw. vm.*)

R. Raiz de valeriana silvestre,
una pt.
Alcohol amoniacal, . . . seis pt.

Déjense en digestion fria por muchos dias en vasija tapada, meneando de cuando en cuando, y cuélese en seguida. (b.* d. g. han. o. po. pr. s. wu. *sw.*)

du. prescribe dos onz. de raiz y dos cuartillos de alcohol amoniacal; —ed. cuatro onz. de raiz y cinco cuartillos de alcohol amoniacal; —y *vm.* una parte de raiz y ocho de alcohol amoniacal.

R. Raiz de valeriana, . cuatro onz.
Tintura aromática amoniacal,
una azumbre.

Déjese en maceracion al frio por quince dias y cuélese. (am. lo. *e.*)

p. prescribe cuatro onz. de raiz, dos lib. y media de tintura y ocho dias de maceracion.

R. Raiz de valeriana en polvo,
dos onz.
Solucion alcohólica de sub-carbonato de amoniaco. . una lib.

Déjese en maceracion por ocho dias, meneando con frecuencia la vasija, y cuélese. (su.)

R. Valeriana quebrantada,
onz. y med.
Alcohol (30.°), . . cuatro onz.
Amoniaco líquido (19.°),
dos onz.

Déjense en maceracion por seis dias en vasija tapada, meneando con frecuencia, cuélese despues y filtrese. (an.)

Escitante que se ha aconsejado en muchas enfermedades espasmódicas, particularmente en la epilepsia y el hisrismo.—Dósis; de una á tres drac. en un vehículo apropiado, como leche ó harina de avena.—Niemann propone como un medio muy suave mezclar una parte de sub-carbonato de amoniaco líquido con dos partes de tintura alcohólica simple de valeriana.

TINTURA AMONIACAL DE VALERIANA COMPUESTA. (*pie. vm.*)

R. Raiz de valeriana, . . dos onz.
Aceite esencial de cidra,
una drac.
Clavos de especia, . med. drac.
Espíritu de sal amoniaco,
med. onz.
Alcohol, ... diez y seis onz.

Déjense en digestion al B. A. por dos ó tres dias y filtrese. *(pie.)*

R. Raiz de valeriana, . . una onz.
Clavos de especia y
Macias, a. . . . . una drac.

Corteza fresca de cidra,
drac. y med.
Tintura aromática amoniacal,
veinte y cuatro onz.
Déjese en infusion fria por algunos dias, esprímase y fíltrese.

Escitante aconsejado contra la epilepsía. — Dósis; de veinte á treinta got. en una infusion de valeriana.

AGUA ACUSTICA.

Aqua acustica Ludovici. (pa. *sp.*)

R. Raiz de valeriana,
——— de ligústico,
Yerba de romero y
Flores de espliego, a. med. onz.
Bayas de laurel,
Castoreo y
Alcanfor, a. . . . . dos drac.
Espíritu de enebro, . . una lib.
Déjese en maceracion por cuatro dias y añádase
Amoniaco líquido, . . med. onz.
Aceite de enebro, . . med. drac.
Se introducen algunas gotas con algodon en el conducto auditivo.

E. *Estraido por el Eter.*

Tintura etérea de valeriana, *Tintura antiespasmódica de Kenp*; *Tinctura valerianæ ætherea.* (b.* fi. ham. han. he. li. o. po. pr. s. su. ww. *au. br. ca. pie. sw. vm.*)

R. Raiz de valeriana quebrantada,
una onz.
Licor anodino mineral,
ocho onz.
Déjense en digestion fria por tres dias en vasija tapada y fíltrese. (b.* fi. han. po. pr. s. *sw.*)

he. prescribe dos onz. de valeriana y una lib. de licor anodino; — *pie.* ocho onz. de valeriana y lib. y med. de licor; — *vm.* una parte de raiz y diez de licor; — *br.* tres onz. de raiz y una lib. de licor: este último solo aconseja la digestion á un calor suave; — y han. li. o. y *ca.* una parte de raiz y cuatro de licor.

R. Raiz de valeriana en polvo,
una onz.
Alcohol concentrado, . seis onz.
Déjese en digestion á un calor suave en vasija tapada, y añádase al líquido filtrado
Eter súlfurico, ... dos drac.
Bátanse bien juntos para hacer la mezcla. (sa. ww.)

au. prescribe diez y seis onz. de valeriana, veinte de alcohol y doce de acido sulfúrico.

Escitante aconsejado en las enfermedades llamadas nerviosas, especialmente en las convulsiones, los espasmos y el histerismo. — Dósis; de uno á cuatro escrúpulos, tres ó cuatro veces al dia, en una taza de infusion de torongil ó de menta piperita.

TINTURA ETEREA ALCANFORADA DE VALERIANA.

Tinctura valerianæ camphorate. (*au.*)
R. Alcanfor, ... med. drac.
Tintura etérea de valeriana,
tres drac.
Dósis; de veinte y cinco á treinta got. en la gota anómala.

TINTURA ANODINA. (b.*)

R. Raiz de valeriana, . . una onz.

Corteza de naranja, . dos drac.
Eter sulfúrico, . . . cuatro onz.

Déjense en digestion á un calor muy suave por ocho dias y hiérvase á lo último un poco.

Escitante clasificado entre los espasmódicos—Dósis; de cuarenta á sesenta gotas.

TINTURA ANTIESPASMODICA. (b.*)

R. Raiz de valeriana y
Yerba de maro, a. . . una onz.
Licor anodino mineral, seis onz.

Déjese en digestion por seis dias y fíltrese.

Niemann ha modificado así esta formula:

R. Raiz de valeriana y
Yerba de maro, a. . . med. onz.
Alcohol, ... cuatro onz.
Acido sulfúrico dilatado en agua, una drac.

Déjense en digestion por cuatro horas á un calor suave.

Escitante, reputada por antiespasmódica y antiepiléptica. — Dósis; una cuchta. en vino.

ELIXIR ANTIESPASMODICO.
(fu. *sw. vm.*)

R. Tintura de valeriana, . dos onz.
Licor anodino mineral, dos drac.
Mézclese y disuélvase
Alcanfor, ... una drac.
Consérvese. (*vm.*)

R. Raiz de valeriana y
—— de serpentaria de Virginia, a. . . . . una onz.
Alcohol, ... doce onz.

Déjese en infusion lo suficiente, cuélese por espresion, fíltrese y añádase
Eter sulfúrico, ... dos onz.
Alcanfor, ... una drac.
Disuélvase. (*sw.*)

R. Alcanfor, ... una drac.
Eter sulfúrico. . . . . dos onz.

Añádase á la solucion
Estracto de valeriana, . una onz.
Agua de manzanilla, . seis onz.
Méz. (fu.)

Dósis; de uno á dos escrp. muchas veces al dia.

F. *Estraido por la destilacion.*

ACEITE ESENCIAL DE VALERIANA.

Oleum valerianæ æthereum, Ætheroleum valerianæ. (a. ba. be han. he. li. o. po. pr. r. s. *sw.*)

R. Raiz de valeriana, . . . c. s. q.
Agua, ... c. s.
Destílese. (be. r.)

sw. prescribe una parte de raiz y cuatro de agua;—han. o. po. pr. y s. una parte de raiz y ocho de agua;—ba. una de raiz y nueve de agua;—y a. una de raiz y doce de agua.

R. Raiz de valeriana, . . cuatro pt.
Agua, ... diez y seis pt.

Déjese en maceracion por tres dias y añádase
Sal comun, ... una pt.
Destílese. (he.)

R. Raiz de valeriana, . . seis lib.
Alcohol, ... una lib.

Al cabo de dos dias añádase
Agua, ... diez y ocho lib.
Destílese. (li.)

OLEOSÁCARO DE VALERIANA.

Oleosacharum valerianæ. (a. han. pr.)

R. Azucar blanca, . . . una drac.

Aceite esencial de valeriana,
tres got.

Tritúrense juntos. (*a.*)

han. y p. prescriben una onza de azúcar y veinte y cuatro gotas de aceite.

AGUA DE VALERIANA.

Aqua valerianæ.

(a. b.* ba. br. f. han. hc. li. po. s. *vm.*)

R. Raiz de valeriana, . . . una pt.
Agua, ... c. s.

Al cabo de veinte y cuatro horas destílense seis pt. (he.), ó siete (han.).

br. prescribe una parte de raiz y tres de agua, destilando la mitad; — f. una parte de raiz, cinco de agua y que se destilen dos partes; — *vm.* una parte de raiz, diez de agua y que se destilen dos; — a. una parte de raiz, doce de agua y que se destilen cuatro; — po. y s. una parte de raiz, doce de agua y que se destilen nueve; — y b.* y ba. una parte de raiz, diez de agua y que se destilen diez partes.

R. Raiz de valeriana, . . . dos lib.
Agua, ... doce lib.

Póngase la raiz en un saco suspendido en un alambique de modo que no toque al agua y destílense seis lib. (li.)

ESPÍRITU DE VALERIANA COMPUESTO.

Aqua valerianæ composita. (pid.)

R. Raiz de valeriana, . nueve onz.
—— de apio, ... tres onz.
Yerba de poleo, . . . dos onz.
—— de sabina, . . . una onz.
Agua de fuente y
Alcohol, a. . . . . ocho lib.

Déjense en digestion por dos dias y destílense ocho libras.

VALERIANILLA.

Macha, Leucolacharum, Chalcetum de Plinio, Valerianella olitoria, Mæ.

f. *be.*

Planta ánua comun en Europa (triandria monogynia, L.; valerianas, J.).

Se usa la yerba, que se compone de un tallo ramoso, con hojas oblongas, sentadas, enteras ó poco dentadas.

Su sabor es insípido.

Es emoliente.

VAINILLA.

Vanilla aromatica, Sw.

Vanille, Al. F.; vanilla, In.; vaniglia, I.

an. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. han po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta parásita y sarmentosa de la América meridional (gynandria diandria, L.; orchideas, J.).

Se usan los frutos (*Siliquæ Vanillæ*, s. *Vanilliæ*, s. *Vaniglioe*, s. *Banillæ*, s. *Araci aromatici*) que son unas vainas de cuatro á ocho pulgadas de longitud, y de dos á tres líneas de ancho, derechas, aunque encorvadas por su orígen, terminadas en una especie de mamelon pediculado, cilíndricas, surcadas, lustrosas, comprimidas, de color pardo negruzco, bivalvas, de válvulas gruesas y quebradizas, aunque

algo blandas, que contienen una pulpa blanda y morena, dentro de la cual hay un gran número de granos redondeados, negruzcos y lustrosos. El olor es fuerte y al mismo tiempo suave, y el sabor caliente y picante.

Es escitante. — Dósis; de quince gr. á una drac. en polvo.

POLVOS DE VAINILLA. (f.)

R. Vainilla partida en pedazos pequeños, ... una pt.
Azúcar blanca, ... dos pt.

Macháquense en un mortero de hierro para reducirlas á un polvo muy fino, y pásese por un tamiz de seda; macháquese de nuevo lo que quede sobre el tamiz hasta que pase todo.

f.* y f.** prescriben cuatro partes de azúcar.

WAKAKA DE INDIAS. (*ca.*)

R. Polvos de azúcar, . cuatro onz.
——— de cacao mondado, onza y med.
——— de azúcar de vainilla, seis drac.
——— de canela y
——— de achiote, a. una drac.

Méz. — Dósis; una cuch. en leche ó chocolate.

JARABE DE VAINILLA. (*br.** *vm.*)

R. Vainilla en polvo, . . cuatro pt.
Goma arábiga, ... una pt.
Agua, ... seis pt.

Tritúrense juntos para hacer una emulsion; cuélese esprimiendo con fuerza, y añádase al líquido colado un jarabe frio hecho con

Azúcar blanca, . veinte y dos pt.
Agua, ... doce pt.

y líquense á un calor suave en la mezcla

Azúcar blanca, . veinte y dos pt.

R. Vainilla escogida, . . dos onz.
Azúcar blanca, diez y siete onz.
Agua de rio, ... diez onz.
Alcohol (21.°), . . . seis drac.

Pártase la vainilla en pequeños pedazos; porfirícense y añádase poco á poco azúcar y alcohol, para hacer una pasta blanda y homogénea; introdúzcase en un matraz con lo restante de la azúcar y el agua; añádase una clara de huevo; póngase al B. M. por diez y ocho á veinte horas, meneando de cuando en cuando; déjese despues en reposo un dia entero, y cuélese por una franela.

TINTURA DE VAINILLA.

Tinctura vanigliæ. (b.* s.)

R. Vainilla, ... una pt.
Alcohol, ... diez pt.

Déjese en digestion á un calor suave por ocho dias. (s.)

b.* prescribe, segun Pfaff, una parte de vainilla y seis de alcohol.

Escitante reputado por nervino y analéptico. — Dósis; cuarenta got. en vino.

ALKERMES LIQUIDO. (*vm.*)

R. Ambar gris, ... un escrp.
Clavos de especia, . media drac.
Canela, ... dos drac.
Vainilla y
Cochinilla, a. . . . media onz.

Aguardiente, ... tres lib.

Déjense en infusion por dos dias al B. M. tibio; fíltrese en seguida y lícuese en el líquido al B. M. caliente á los 60.° de R.

Una mezcla de

Azúcar blanca, ... tres lib.

Miel de Narbona, . . . seis lib.

Decántese el jarabe despues que se haya aclarado y cuélese por una franela.

AGUA DE VAINILLA.

Aqua vanillæ. (b.*)

R. Vainilla, ... una lib.

Sub-carbonato de potasa, tres onz.

Agua, ... doce lib.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas y destílese la mitad.

ESPIRITU DE VAINILLA.

Spiritus vanillæ. (b.*)

R. Vainilla, ... seis onz.

Sub-carbonato de potasa, onza y med.

Alcohol, ... seis lib.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas y añádase

Agua, ... seis lib.

Destílense lentamente seis lib.

VARA DE ORO.

Vara de oro oficinal, virga aurea; Solidago virga aurea, L.

Goldruthe Heidenwundkraut, Al.; Verge d'or, F.; saracens wound wort, In.

am. ams. br. du. e. f. fu. g. li. w. wu. *br. c. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en Europa (syngenesia polygamia superflua, L.; synanthereas, Cass.).

La yerba (*herba virgæ aureæ*, s. *Consolidæ saracenicæ*, s. *Solidaginis saracenicæ*) se compone de un tallo pubescente, ramoso, cuyas hojas inferiores son elípticas, y las superiores lanceoladas, Su sabor es amargo, estíptico y un poco aromático.

Diurética.

ESTRACTO DE VARA DE ORO.

Extractum virgæ aureæ. (wu.)

R. Yerba de vara de oro, . c. s. q.

Hágase hervir por una hora en c. s. de agua comun; cuélese por espresion; déjese reposar; decántese el líquido y evapórese hasta la consistencia de miel espesa.

VENCETOSIGO.

Asclepias Vincetoxicum, L.

Schwalbenwurzel, Al; swallow wort, In.; Dompte-venin, F.; Vincetorsico, I.; vincetoxico, Por.

ams. b. br. d. e. f. fe. g. li. s. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en Europa (pentandria digynia, L.; apocineas, J.).

Se usa la raiz (*radix vincetoxici*, s. *Hiriundinariæ*, s. *contrayerbæ germanicæ*) que se compone de muchas fibrillas contorneadas, nacidas de una cabeza comun, largas, y de un amarillo pálido. Su olor es fuerte que se disipa en gran parte por la desecacion,

y su sabor amargo, acre y desagradable.

Contiene, segun Feneulle, un principio emético diferente de la emetina resina, mucus, fécula, aceite graso, aceite volátil, ácido péctico, leños y sales.

Es escitante, emética, purgante, sudorífica y diurética. Se usa con particularidad en las hidropesías, las escrófulas y la amenorrea.

Dósis en polvo; med. dracma y mas.

ESTRACTO DE VENCETOSIGO.

Extractum vincetoxici. (br. sa. w.)

R. Raiz de vencetósigo, . una lib.
Agua de fuente, . . . seis lib.

Déjense en digestion por cuatro dias en un sitio caliente; hiérvase depues un poco; cuélese por espresion y evapórese el líquido colado hasta la consistencia de estracto. (br.)

R. Raiz de vencetósigo, . una lib.
Alcohol, ... cinco á seis lib.

Déjense en digestion lo suficiente; cuélese por espresion; déjese el resíduo en digestion, y hiérvase despues un poco con tres lib. de agua; cuélese por espresion y clarifíquese con clara de huevo; mézclense los dos líquidos; estráigase el alcohol por la destilacion, y evapórese lo restante hasta la consistencia conveniente.

R. Raiz de vencetósigo, . una lib.
Vino blanco generoso,
cinco á seis lib.

Déjense en digestion por tres dias sobre el baño de arena y cuélese esprimiendo con fuerza; cuézase el resíduo con c. s. de nuevo vino; redúzcase á la mitad y cuélese; evapórense las dos tinturas reunidas hasta la consistencia necesaria. (sa.)

TINTURA DE VENCETOSIGO.

Tinctura, s. *Essentia vincetoxici.*

(br. d. pa. w.)

R. Raiz de vencetósigo, . . una pt.
Alcohol, ... cinco pt.

Déjese en maceracion algunos dias y cuélese.

Es escitante, reputado por diaforético, diurético y alexifarmaco. — Dósis; de cuarenta á setenta got.

VERATRINA.

Veratrinum, Veratrina, Veratria.

Veratrine, F.

ma.

R. Simiente de cebadilla, . c. s. q.

Infúndase en alcohol hirviendo hasta que estraiga sus principios, fíltrese despues, déjese enfriar, vuélvase á filtrar, evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto, disuélvase este en agua, fíltrese la disolucion y evapórese lentamente; sepárese el precipitado que se forma, añádase al líquido colado acetato de plomo líquido, sepárese otra vez el precipitado por la filtracion, hágase pasar al través del líquido una corriente de ácido hidrociánico, fíltrese de nuevo, concéntrese por la evaporacion, trátese con la magnesia, póngase el precipitado que se forma en alcohol hirviendo hasta que se disuelvan sus principios, y evapórense

hasta la sequedad las tinturas alcohólicas.

Es un escitante violento, y un veneno temible que obra como purgante á la dósis de una cuarta parte de gr.

SOLUCION DE VERATRINA. (*ma.*)

R. Sulfato de veratrina, . . un gr.
Agua destilada, ... dos onz.

TINTURA DE VERATRINA. (*ma.*)

R. Veratrina, ... cuatro onz.
Alcohol, ... una onz.

Dósis; diez, quince y aun veinte y cinco got. en pocion.—Al esterior se usa en fricciones en la gota, anasarca, hidropesía y leucoflegmasia.

PILDORAS DE VERATRINA. (*ma.*)

R. Veratrina, ... med. gr.
Goma arábiga y
Jarabe de goma, a. . . . . c. s.
Háganse seis píldoras de gr.

Dósis; una al principio, aumentando hasta tres al dia.

POMADA DE VERATRINA. (*ma.*)

R. Veratrina, ... cuatro gr.
Manteca de puerco, . . una onz.

Para fricciones en los reumatismos crónicos, la anasarca y la gota.

VERBENA.

En medicina se usan dos especies de este género de plantas.

1.° *Verbena, Verbena comun, oficinal; Verbena oficinalis*, L.

Eisenhart, Eisenkraut, Al.; vervaine holy, herb, In.; verveine, F.; verbena, I. Por.

an. e. f. fe. g. li. w. wu. *br. g. m. sp. z.*

Planta ánua ó perenne de Europa (diandria monogynia, L.; verbenaceas, J.).

Se usa la yerba (*herba Verbenæ*) que se compone de un tallo tetrágono, duro, simple, ó con algunas ramas opuestas; con hojas tambien opuestas, pecioladas, ovales, oblongas, algo rizadas, sembradas de polvos cortos, y hendidas profundamente en lóbulos desiguales, obtusos, divididos, de los cuales el terminal es mucho mayor que los otros. Carece de olor y el sabor es un poco amargo y astringente.

2.° *Verbena olorosa de tres hojas, Yerba Luisa, de la Princesa; Verbena Triphylla*, L.

Vervesine citronelle, F.

e. f. fe. *br.*

Planta de Chile (decandria monogynia, L.; verbenaceas, J.).

Se usan las hojas (*folia Aloysiæ*) que son ásperas y de un olor suave parecido al de cidra.

VERDOLAGA.

Verdolaga comun; Portulaca oleracea, L.

Portulak, Al.; purslane, In.; pourpier, F.; porcellana, I.; beldroega, Por.

ams. br. e. f. w. *be. g. m. sp.*

Planta ánua cultivada en Europa (dodecandria monogynia, L.; portulaceas, J.).

Se usa la yerba y la simiente.

La yerba *(herba Portulacæ)* se compone de un tallo redondo, liso, lustroso, jugoso, y de hojas oblongas, cuneiformes, carnosas, lisas y de color verde obscuro. Su sabor es acuoso y ligeramente aromático.

La simiente es pequeña, reniforme, encorvada, algo arrugada, negra é insípida.

Estos granos se colocan entre las cuatro simientes frias menores. En cuanto á la yerba es mas bien alimenticia que medicinal, y se dice que obra como purgante cuando se toma en gran cantidad.

CONSERVA DE VERDOLAGA.

Conserva portulacæ. (vm.)

R. Hojas de verdolaga, . . una pt.
Azúcar blanca, . . . , dos pt.
Macháquense las hojas, añádase el azúcar y caliéntese un poco.

AGUA DE VERDOLAGA.

Aqua portulacæ. (f. pa.)

R. Yerba de verdolaga, . . cinco pt.
Agua, ... doce pt. y med.
Destílense unas diez pt., échese el producto de la destilacion sobre diez pt. de yerba, añádanse diez partes de agua y destílense todavía diez pt. Puede repetirse por tercera vez la operacion. (f.)

pa. prescribe una pt. de yerba y cuatro de agua, y que se destile parte y med.

VERÓNICA.

Tres plantas de este nombre se citan en las farmacopeas:

1.° *Verónica oficinal, Verónica macho, Te de Europa; Veronica officinalis*, L.

Ehrenpreiss, Al.; male speedwell, In.; veronica, I. Por.

a. ams. an. b. ba. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. han. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en toda la Europa (diandria monogynia, L.; pediculares, J.).

Se usa la yerba florida *(herba Veronicæ)* que se compone de un tallo cilíndrico, velludo, guarnecido de hojas opuestas, medio pecioladas, ovales, obtusas ó un poco agudas, angostas por la base, ásperas, velludas, manchadas y aserradas. Carece de olor, y su sabor es un poco amargo y débilmente estíptico.

Es un tónico débil y antiescorbútico. — Dósis del zumo; una á dos onzas.

2.° *Verónica Teucrio; Veronica Teucrium*, L.

Brusttheckraut, Al.

f.

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba florida *(herba Veronicæ teucriifoliæ)* que se compone de hojas ovales, rojizas, dentadas, obtusas, colocadas en un tallo redondo y velludo; las flores son de un azul claro

y en largos racimos. No tienen olor y su sabor es amargo y astringente.

3.º *Verónica de Virginia; Veronica Virginica*, Willd.

am. *c.*

Se usa la raiz cuyas propiedades medicinales no estan aun bien conocidas.

CONSERVA DE VERÓNICA.

Conserva veronicæ. (w.)

R. Yerba fresca y machacada de verónica, ... una pt.
Azúcar, ... una pt.
Tritúrense juntos.

ESPECIES PECTORALES.

Species pectorales, s. *pro The*, s. *Thea.* (li. r. *ca. pid.*)

R. Raiz de grama, . . onz. y med.
Yerba de mil en rama, dos onz.
——— de verónica, . . tres onz.
Pártanse y mézclense. *(pid.)*

R. Yerba de mucílago y
——— de verónica, a. cuatro onz.
Raiz de regaliz y
——— de polipodio, a. . dos onz.
——— de malvavisco, . una onz.
Hinojo, ... seis drac.
Pártanse, quebrántense y mézclense. (li.)

R. Hojas de verónica,
——— de yedra terrestre,
——— de tusílago y
——— de escabiosa, a. . tres onz.
Hojas de torongil y
——— de salvia, a. . med. onz.
Pártanse y mézclense. *(ca.)*

R. Flores de manzanilla ordinaria y
Yerba de verónica, á. . seis. pt.
Hojas de salvia, ... dos pt.
Pártanse y mézclense. (r.)

AGUA DE VERÓNICA.

Aquæ veronicæ. (f. pa.)

R. Yerba de verónica, . . cinco pt.
Agua, ... veinte pt.
Destílense diez partes. (f.)

pa. prescribe una parte de yerba y tres de agua, destilando la mitad.
Dósis; de dos á cuatro onz.

ESPIRITU DE VERÓNICA.

Aqua veronicæ vinosa. (br. w. *sp.*)

R. Yerba florida de verónica, tres lib.
Vino blanco, ... ocho lib.
Destílese la mitad despues de algunos dias de maceracion.

INFUSION DE VERÓNICA. (ff. *ra.*)

R. Flores de verónica, . med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Infúndase y cuélese. *(ra.)*

R. Flores de verónica, . . . cien pt.
Regaliz raspado, ... ocho pt.
Agua hirviendo, ... c. s.
Déjese en infusion lo suficiente y cuélese. (ff.)

ESTRACTO DE VERONICA.

Extractum Veronicæ. (br. sa. w.)

R. Yerba de verónica, . . . una lib.
Agua . . . . . seis lib.

Déjese en maceracion por cuatro dias en un sitio caliente, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion y evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto. (br. w.)

R. Yerba fresca y machacada de verónica, ... ocho lib.

Déjese en maceracion por tres dias en un alambique, estráiganse despues como dos onz. de agua por la destilacion al B. M., échese el triple de agua sobre el residuo, redúzcase á un tercio por la coccion, clarifiquese y cuélese el líquido, evapórese hasta la consistencia de electuario, y añádase á este el agua destilada cuando no esté mas que tibio.

Dósis; de un escrp. á una drac.

JARABE DE VERONICA.

Syrupus de Veronica. (w.)

R. Yerba de verónica, . . seis onz.
Agua alcohólica destilada de verónica, ... una lib.

Déjese en infusion en un sitio caliente, cuélese esprimiendo con fuerza y disuélvase en el líquido

Azúcar blanca, . diez y seis onz.

Dósis; de med. á dos onz.

JARABE PECTORAL.

Syrupus pectoralis. (li.)

R. Especies pectorales (fórmula de li.) ocho onz.
Higos, ... cuatro onz.
Agua, ... cinco lib.

Cuézase hasta que se consuma un tercio, cuélese por espresion y añádase al líquido

Azúcar blanca, . . . cuatro lib.

Cuélese la solucion despues que haya dado uno ó dos hervores.

VEZA CULTIVADA.

Vicia sativa, L.

Futterwicke, Al.; vesce, F.

f.

Planta ánua originaria de Levante y cultivada en toda Europa (diadelfia decandria, L.; leguminosas, J.).

Se usa la simiente (*semen Viciæ*) que es negra y comprimida.

VICTORIAL LARGA.

Falso espicanardo; Allium victoriale, L.

Schlangenk noblauchwurzel, Allermanns harnisch, Atrunswurzel, Al.; victoriale, F.; allio vittoriale, I.; tang rooted gartik, In.; alho victorino, Por.

br. f. w. *be. m. sp.*

Planta bienal de Europa (hexandria monogynia, L.; asphodelos, J.).

Se usa la raiz (*radix Victorialis longæ*, s. *maris*, s. *Allii Alpini*, s. *montani latifolii maculati*) que es larga y ahusada, de olor y sabor de ajos, que le pierde despues de seca.

VID.

Vitis vinifera, L.

Weinsteck, Al.; vine, In.; vigne, F.; vite, I.; videira, Por.

Planta que probablemente es origi-

naria de Asia (pentandria monogynia, L.; vides, J.).

Se usan las hojas y el fruto.

Las hojas son anchas, primero vellosas por encima, y borrosas y blancas por debajo; y despues casi lampiñas, acorazonadas por su base, divididas en cinco ó seis lóbulos dentados y agudos.

Pasan por fortificantes.

El fruto que es bien conocido se llama *Ubag*, *Uva*.

Rosineu, Al.; raisin, F. In.
e. g. *m*.

Antes de madurar se llama *Agraz*; *Omphacium Agresta*.

En este estado es ácido y astringente, se usa poco, y siempre en los casos en que parecen indicados los remedios acídulos.

Cuando está maduro tiene un sabor suave y azucarado, y el zumo esprimido se llama *Mosto*, *Mostum*.

Bajo esta forma pertenece menos á la medicina propiamente dicha que á la higiene y que á las artes, por suministrar el vino. Pero se usa con bastante frecuencia despues de seco al sol. Se distinguen dos clases de pasas.

1.º *Pasas; Passulæ majores*, *Uvæ passæ*, *Zibebco*.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. ham. he. lo. p. r. s. su. w. wu. *be. c. g. m. pid. sp.*

Presentan muchas variedades.

A. *Pasas de Esmirna*, casi del grueso de una ciruela pequeña, prolongadas, comprimidas, y de color amarillo pardusco.

B. *Pasas de Francia ó de España*, que son mas pequeñas y mas gruesas con un tinte pardusco.

C. *Pasas de Calabria*, gruesas, de color obscuro y algo viscosas.

2.º *Pasas de Corinto*; *Passulæ minores*, s. *Corinthiacæ*, s. *Corinthinaceæ*.

ams. an. b. ba. be. br. d. g. fe. fu. ham. he. p. r. s. su. *be. g. m. pid. sp.*

Estas son negras, del grueso de lentejas y sin granos.

Todas las pasas son emolientes.

PULPA DE PASAS.

Pulpa passularum. (br. pa. w. wu.

R. Pasas de Corinto, ... c. s. q.
Agua, ... c. s.

Reblandézcanse las bayas por la ebulicion, cuélese la pulpa por un cedazo de cerda, añádase agua al cocimiento y evapórese despues todo hasta la consistencia conveniente. (f.)

br. pa. y w. prescriben se añada á la pulpa una mitad de azucar; y wu. solamente una tercera parte.

ARROPE DE PASAS.

Roob, s. *Sapa uvarum.* (f. sa. wu.)

R. Zumo de pasas, ... c. s. q.

Cuézase á un fuego moderado hasta la consistencia de miel. (f. sa.)

R. Zumo de pasas depurado,
. . . una lib.
Azúcar blanca, ... tres onz.

Cuézanse juntos hasta la consistencia de miel. (wu.)

COCIMIENTO DE PASAS.

Decoctum passularum majorum (b.* *au.*)

R. Pasas de Corinto lavadas y sin simientes, ... cuatro onz.

Agua de fuente, ... tres lib.

Redúzcase la tercera parte por la coccion y cuélese. (b.*)

R. Pasas de Corinto, . . cuatro onz.
Cebada mondada y
Regaliz, a. . . . . med. onz.
Agua, ... seis lib.

Hágase hervir y añádase al líquido colado y frio

Jarabe de zumo de cidra, dos onz.

Méz. *(au.)*

JARABE DE PASAS.

Syrupus uvarum. (a.)

R. Zumo de uvas recien esprimido, cien lib.

Hiérvase en vasija de cobre estañada hasta que no forme espuma; sepárese entonces del fuego y añádase poco á poco y meneando siempre

Greda pulverizada, . . . una lib. ó c. s. para saturar los ácidos; déjese reposar por doce horas en un sitio fresco; decántese el zumo claro, y cuézase despumándolo hasta la consistencia de jarabe.

ESPECIES BEQUICAS.

R. Pasas de Corinto, . . . una onz.
Algarrobas y
Azofaifas, a. . . . . seis drac.
Dáctiles, . . . , . . . dos onz.
Higos y . . .
Cebada mondada, a. . . una onz.
Regaliz y
Culantrillo de Montpeller,
a. . . . . med. onz.
Hisopo, ... dos drac.

Pártanse y méz. (br. w. *sp.*)

pa. trae la misma fórmula, pero reemplaza las algarrobas por el fruto de serval.

ZUMO DE AGRAZ.

Succus agrestæ Omphacium. (e. f. sa.)

R. Agraz, ... c. s. q.

Machúquese en un mortero de mármol, cuélese por una manga, déjese reposar el zumo y consérvese en botellas de cuello largo con una capa de aceite.

Acido agradable que conviene en todos los casos en que estan indicados los acídulos.

JARABE DE AGRAZ.

Syrupus agrestæ, s. *de agresta.* (e. f. p. sa. w.)

R. Zumo de agraz fresco, depurado y filtrado, ... dos lib.
Azúcar blanca, tres lib. y med.

Lícuese á un calor suave (f.). w. prescribe lib. y med. de zumo y dos lib. de azúcar; — pa. cinco lib. de zumo y tres de azúcar; — e. una lib. de zumo y dos de azúcar; y su. cantidad suficiente de zumo y de jarabe comun para hacer el jarabe por la evaporacion al B. M.

POMADA ASTRINGENTE. (bo.)

R. Agraz, ... ocho onz.
Ungüento rosado, . . . una lib.
Cera amarilla, . . . cuatro onz.

Cuézase hasta que se consuma el líquido acuoso, déjese enfriar, quítense las heces, lícuese de nuevo y aromatícese con esencia de rosas.

VINCA PERVINCA.

En las farmacopeas se indican dos especies de este género de plantas:

1.º *Vinca pervinca mayor ; Vinca major* , L.

Pervenche majeure , F.

f.

Planta bienal del Mediodia de Europa (pentandria monogynia, L.; apocyneas, J.).

Se usa la yerba, que se compone de hojas ovales, ligeramente pestañosas por los bordes, y acorazonadas por su base.

2.º *Vinca pervinca menor ; Vinca minor* , L.

Suingrun , Al. ; small, In. ; pervenche mineure, F. ; pervinca , I. Por.

Planta bienal comun en gran parte de Europa.

Se usa la yerba (*herba Vincæ* , s. *Pervincæ* , s. *Clematidis* , s. *Daphnoidis*) que se compone de un tallo delgado y sarmentoso, provisto de hojas ovales, oblongas, lampiñas, lustrosas y con peciolos muy cortos. Carece de olor y el sabor es amargo y astringente.

Estas dos plantas son ligeramente astringentes.

VINO.

Vinum œnos.

Wein , Al. ; wine , In. ; Vino , I. ; winho , Por.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr s. su. *a. be. c. m. pa. sa.*

Licor tinto ó blanco obtenido por la fermentacion del zumo ó del mosto de la uva.

El vino es compuesto de agua , alcohol , mucílago , ácido acético , sobretartrato de potasa , de tartrato de cal y de principios colorantes , cuya diversidad de proporciones respectivas producen las variedades cuasi sin número de este líquido que existen en el comercio.

El modo de obrar el vino sobre la economía varía mucho, segun que predomina el alcohol, la azúcar , el ácido acético ó el ácido carbónico. Pero como en general no se usan en medicina mas que los vinos abundantes de alcohol y de principios mas ó menos austeros , como el de Bordeaux , de Bourgoña , de Madera , de Alicante y de Jerez , obran á un mismo tiempo como tónicos y estimulantes. Sin embargo rara vez se usa el vino solo como medicamento, sino que las mas veces sirve de vehículo á otras sustancias, cuya accion es ó se juzga ser mas activa.

CATAPLASMA DESECANTE.

(fe.)

R. Harina de altramuces , ocho onz.
——— de centeno , . cuatro onz.
Vino blanco , ... cuatro lib.
Cuézase hasta el grado conveniente.

FOMENTO VINOSO.

Locion vinosa. (ff. *ra.*)

R. Vino tinto , ... una lib.
Miel , ... dos onz.
Disuélvase. (*ra.*)
R. Tintura aromática , . . una pt.

Vino tinto , ... veinte pt.
Méz. (ff.)

BALSAMO SAMARITANO.

(*ca. pie. sp.*)

R. Vino generoso y
Aceite comun , a. . . . part. ig.
Méz. ex.

POCION VINOSA.

Limonada vinosa ; Posca Galeni. (e. ra. sm. sp.)

R. Vino , ... tres pt.
Agua , ... dos pt.
Hiérvase un poco. (*sp.*)

R. Vino de España ,
Agua de fuente y
Jarabe de grosellas , a. . dos drac.
Méz. (*sm.*)

R. Vino blanco y
Agua , a. . . . . una lib.
Alcohol y
Jarabe tartárico , a. . . una onz.
Méz. (*ra.*)

R. Hielo machacado , . . . una lib.
Vino de Madera , . . una cuch.
Agua de canela ordeada ,
una cuchta.
Azúcar en polvo , . . . c. s. q.
Méz. (*sm.*)

R. Yema de huevo , ... n.º 1.
Aceite de canela , . . . veinte got.
Vino blanco y
Agua de canela , a. . . tres got.
—— pura , ... dos onz.
Azúcar , ... dos drac.
Méz. (*e.*)

Se toman tres cuch. á la vez de esta última pocion.

VIOLETA.

Entre las especies de este género de plantas que se usan en medicina, citaremos nosotros las siguientes.

1.º *Violeta, Violeta de Marzo, Olorosa ; Viola odorata* , L.

Mærzveilchen , Al. ; swetet , In. ; violeta , Por. ; viola , I.

ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. han. li. o. po. pr. r. s. w. wu. *be. br. c. g. m. sp. z.*

Planta bienal que crece en toda la Europa (singenesia monogynia , L. ; viola , J.).

Se usa la raiz, la yerba, las flores y la simiente.

La raiz (*radix Violariæ*, s. *Martiæ*) se compone de un gran número de fibras enredadas. Su sabor es acre y nauseabundo.

La yerba se compone de un manojo de hojas radicales, cordiformes, finamente dentadas, verdes, lampiñas, obtusas , ó un poco agudas por la punta. Es inodora , y su sabor es herbáceo , mucoso y un poco amargo.

Las flores son violadas. Por la desecacion pierden su olor suave. Su sabor es amargo y un poco mucilaginoso.

La simiente es pequeña, redonda y blanquecina.

Toda la planta es mas ó menos escitante, nauseosa y emética.

2.º *Violeta silvestre*; *Violata canina* , L.

Hundsveilchen , Al. ; dog's violet , In.

f. m.

Planta bienal muy comun en Europa (pentandria monogynia L.; violas, J.).

La raiz (*radix Violæ caninæ*) es acre y nauseosa.

3.º *Viola pedata*, L.

am. *c.*

Planta de la América septentrional.

Se usa la yerba, que se compone de un manojo de hojas palmadas.

AGUA DE VIOLETAS.

Aqua violarum. (fe. pa. sa.)

R. Flores de violeta, . . . una pt.
Agua, ... cuatro pt.
Destílense dos partes al cabo de seis horas. (sa.)

pa. prescribe una parte de flores y tres de agua y que se destile parte y media; — y fe. tres partes de flores y diez y seis de agua, destilando ocho partes.

JULEPE VIOLADO.

Julapium violarum. (pa. w. *sp.*)

R. Azúcar blanca, . dos lib. y med.
Agua de violetas, . . veinte onz.
Désele un hervor y cuélese.

EMULSION DE VIOLETAS.

Emulsio violata. (w. *sp.*)

R. Almendras dulces, . . una onz.
Simiente de violeta, . dos drac.
——— de adormidera blanca, med. drac.
Agua de violetas, . . . seis onz.
—— de nenufar y
Agua de lechuga, a. . tres onz.
Añádase á la emulsion
Jarabe de violetas, . . una onz.

ZUMO DE VIOLETAS.

Succus violarum. (e sa.)

R. Flores de violeta sin cálices, c. s. q.

Máchaquense en un mortero de barro, cuélese por espresion, déjese reposar el zumo en un sitio fresco, y al cabo de algun tiempo decántese la parte clara.

PASTILLAS DE VIOLETA.

Tabellæ violatæ. (sa.)

R. Zumo de violetas, . . tres onz.
Azúcar en polvo, . . . dos lib.
Lirio de Florencia en polvo, una onz.
Háganse pastillas.

CONSERVA DE VIOLETAS.

Conserba violarum. (e. pa. sa. w.)

R. Flores frescas de violeta, una pt.
Azúcar blanca, ... dos pt.
Tríturense juntos. (pa. w.)

sa. prescribe que se eche una parte de pétalos triturados con un poco de azúcar en tres partes de azúcar clarificada y que se le haga dar un hervor; — y e. que se machaque una parte de pétalos, que se añadan dos partes de jarabe espeso y que se evapore suavemente la humedad hasta la consistencia conveniente.

INFUSION DE VIOLETA. (sa. *fp. ra.*)

R. Flores de violeta, . . . dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Infúndase y cuélese. *(ra.)*

R. Flores de violeta, . . . dos lib.
Agua hirviendo; . . . ocho lib.
Déjense en digestion por ocho horas, cuélese esprimiendo ligeramente y repítase la operacion nueve veces seguidas sobre nuevas flores. (sa.)

R. Flores de violeta y
Regaliz, a. . . . . dos drac.
Agua hirviendo, . med. azumb.
Cuélese despues de frio. *(fp.)*
Aconsejada en las inflamaciones de pecho.

MIEL DE VIOLETAS.

Mel violarum. (pa. sa. w.)

R. Flores de violeta mondadas y
Agua hirviendo, a. . . seis lib.
Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas, cuélese por espresion y añádase al líquido colado
Miel blanca, ... seis lib.
Hiérvase, despumándolo hasta la consistencia de jarabe espeso. (pa. w.)

R. Zumo depurado de violetas y
Miel comun, a. . . . . part. ig.
Hiérvanse juntos, despúmense, cuélese y redúzcase á la consistencia de jarabe. (sa.)
En otro tiempo se usaba (en lavativas particularmente) á la dósis de onz. y med. á dos onzas.

JARABE DE VIOLETAS.

Syrupus violarum, s. *violæ odoratæ*, s. *petalorum violarum.* (ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fu. g. han. he. li. o. pa. po. pr. r. sa. w. wu. *c. sw. vm.*)

R. Pétalos frescos de violetas,
ocho onz.
Agua hirviendo, diez y seis onz.
Déjense en digestion por veinte y cuatro horas á un calor suave; cuélese sin casi esprimir y añádase á ocho partes de líquido
Azucar blanca, . . . quince pt.
Hágase jarabe. (ams.)
Las proporciones de esta fórmula varían mucho. — b. y be. ocho onz. de pétalos, veinte de agua hirviendo, seis horas de maceracion y tres lib. de azúcar; — sa. dos partes de infusion y una de azúcar; — ba. una parte de pétalos, tres de agua, doce horas de infusion y dos partes de azúcar por cada una de líquido colado; — f. cuatro lib. de pétalos, ocho de agua, doce horas de infusion y el doble del líquido colado de azúcar; — *sw.* una parte de pétalos, dos de agua, veinte y cuatro horas de infusion y cinco partes de azúcar por cada tres de líquido colado; — e. una lib. de pétalos, dos de agua, ocho horas de infusion y cuatro lib. de azúcar; — he. ocho onz. de pétalos, veinte de agua, seis horas de infusion y tres lib. de azúcar; — han. y pr. las mismas proporciones, pero doce horas de infusion; — o. y po. ocho onz. de pétalos, dos lib. de agua, doce horas de maceracion, y tres lib. de azucar por cada veinte onzas de líquido colado; — wu. una lib. de violetas, tres de agua y siete de azúcar; — ed. y *c.* dos partes de violetas, ocho de agua, veinte y cuatro horas de maceracion y quince partes de azú-

car ; — du. dos lib. de violetas, cinco de agua, y veinte y nueve onz. de azúcar ; — r. una lib. de violetas, tres de agua, y de azúcar el doble del líquido colado ; — fu. doce onz. de violetas, diez y ocho de agua hirviendo y doce horas de digestion, otras doce horas de maceracion del líquido esprimido con seis onz. de pétalos frescos, y la adicion de doce onz. de azúcar machacada ; — y fe. una lib. de violetas, otra de agua, dos dias de digestion y dos lib. de azúcar.

e. indica ademas de este, otro jarabe con el nombre de *Syrupus violarum communis*, que se prepara con una lib. de violetas en infusion, por un cuarto de hora, en cuatro de agua hirviendo, y con seis lib. de azúcar disueltas en el líquido colado.

R. Azúcar blanca, . . . cuatro lib.
Agua, ... c. s.

Cuézase hasta la consistencia de jarabe espeso, y échese sobre

Pétalos frescos de violeta, dos lib.

Déjese en maceracion por tres dias en vasija tapada; cuézase despues ligeramente y cuélese esprimiendo con fuerza. (g.)

R. Pétalos de violeta frescos y mondados, ... una lib.

Tritúrense en un mortero de piedra y añádase

Agua hirviendo, diez y ocho onz.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas; cuélese por espresion y añádase á veinte onz. de líquido colado

Azúcar blanca,
treinta y dos onz.

Hiérvase suavemente. (br. pa. w.)

an. prescribe una lib. de violetas reducidas á pasta, dos de agua, veinte y cuatro horas de digestion, y tres lib. y med. de azúcar ; — y li. que se machaque una lib. de flores, que se dejen en digestion caliente por doce horas en tres lib. de agua, y que se haga el jarabe con una lib. de esta infusion y veinte onz. de azúcar en polvo.

R. Pétalos de violeta, . . . c. s. q.
Agua fria, ... c. s.

Déjense en maceracion por cuatro horas ; enjúguense en seguida las flores frotándolas con una servilleta ; macháquense para reducirlas á pasta, y añádase

Agua fria, ... peso igual.

Despues

Agua hirviendo, el mismo peso.

Cuélese esprimiendo un poco cuando esté frio ; déjese reposar; decántese y añádase á cuatro partes de líquido colado

Azúcar blanca, ... siete pt.

Disuélvase sin ebulicion. (*om.*)

JARABE DE VIOLETAS SOLUTIVO.

Syrupus violarum solutivum. (w.)

R. Flores mondadas de violeta,
cuatro onz.
Hojas de sen mondadas, dos onz.
Agua hirviendo, ... una lib.

Déjense en digestion toda una noche en un sitio caliente; esprímase por la mañana y añádase á nueve onz. de líquido colado

Azúcar blanca, . diez y seis onz.

ACEITE DE VIOLETAS.

Oleum violarum. (br. sa. w.)

R. Flores mondadas de violeta,
parte y med.
Aceite comun, ... tres pt.
Déjense en digestion por dos dias al B. M.; cuélese por espresion y repítase la digestion con nueva yerba. (sa.)

R. Flores de violeta y
Aceite comun, a. . . partes ig.
Cuézase suavemente hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion. (br. w.)

VISCO.

Visco blanco, comun, quercino; Viscum album, L.

Mistel, Al., In.; gui, F.; vischto, I.; visgo, Por.

a. ams. ba. br. e. f. fe. g. han. li. o. po. pr. s. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Planta parásita que crece en toda Europa (dioecia tetrandria, L.).

Se usan los tallos *(Viscum quernum, s. quercinum, s. lignum visci)* que son leñosos, cilíndricos, divididos, casi desde su base, en numerosos ramos dichotomos, de un verde claro ó un poco amarillento. Su olor es débil, particular y desagradable, y su sabor repugnante, un poco acerbo y mucilaginoso. Uno y otro se disipan por la desecacion.

Es astringente, nauseoso, vomitivo celebrado por mucho tiempo contra la epilepsía. — La dósis en polvo es de media á una dracma tres ó cuatro veces al dia en un jarabe. Colbath le asocia á la asafétida; Hufeland y Tissot á la valeriana.

POLVOS ANTIESPASMODICOS.

Pulvis antíspasmodicus infantum.

(au. hp.)

R. Ojos de cangrejo,
Cuerno de ciervo raspado,
Raiz de valeriana y
Visco, a. . . . . part. ig.
Aconsejados en la diarrea, los vómitos y la denticion dificil en los niños. — Dósis; med. escrp. *(hp.)*

R. Visco,
Raiz de peonía y
—— de fraxinela,
a. . . . . dos drac. y med.
Leño de aloes y
Ojos de cangrejo, a. . una drac.
Sucino blanco, . . . med. drac.
Carbon, ... dos drac.

ESTRACTO ACUOSO DE VISCO.

Extractum visci albi aquosum. (fe.)

R. Tallos de visco, ... una lib.
Agua, ... tres lib.
Cuézanse, cuélese por espresion, clarifiquese con clara de huevo y evapórese lo conveniente.

ESTRACTO VINOSO DE VISCO.

Extractum visci albi vinosum. (sa.)

R. Tallos de visco, ... una lib.
Vino blanco generoso,
cinco á seis lib.

Déjese en digestion por tres dias al B. A.; cuélese esprimiendo con fuerza; hágase hervir el resíduo con c. s. de nuevo vino hasta reducirlo á la mitad; reúnanse los dos líquidos, y evapórense lentamente hasta la consistencia de estracto.

COCIMIENTO DE VISCO.

Decoctum visci albi. (b.*)

R. Visco, ... una á dos onz.
Agua de fuente, . . una azumb.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion.

Aconsejado en la epilepsía.

VIVORERA COMUN.

Echium vulgare, L.

Natterkopf, Al.; viperine, F.

br. f.

Planta perenne comun en toda Europa (pentandria monogynia, L.; borragineas, J.).

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz *(radix viperinæ)* tiene un sabor estíptico.

La yerba se compone de un tallo tuberculoso y con pelos, y de hojas lanceoladas, sentadas y enteras.

VULVARIA.

Armuelle hediondo, Sardinera; Chenopodium vulvaria, L.

Amidsmelter, Al.; stinking goose foot, In.; vulvaria, Por.

f. g. li. w. *g. m. sp. z.*

Planta ánua comun en Europa (pentandria digynia, L.; atriplices, J.).

Se usa la yerba florida *(herba vulvariæ*, s. *Atriplicis fœtidæ*, s. *olidæ)* que se compone de un tallo ramoso, guarnecido de hojas pequeñas, ovales, romboideas, farinaceas, y llevan pequeños racimos de flores en el asiento de las superiores. Su olor es fétido insoportable, y su sabor nauseoso y un poco salado.

Contiene sub-carbonato de amoniaco.

Se usa como antiespasmódica.

AGUA DE VULVARIA.

Aqua atriplicis fœtidæ. (li.)

R. Yerba de vulvaria, . . dos lib.
Agua, ... doce lib.

Póngase la yerba en un saco suspendido en medio de una cucúrbita de modo que no toque al agua, y destílense seis lib.

Y

YARO.

En las farmacopeas se hace mencion de muchas especies de plantas pertenecientes á este género, de las cuales deben colocarse en este artículo las siguientes:

1.° *Arisaro ó Arisaron, Candiles; Arum, Arisarum*, L.

Mænchskappenaron, Al.; hoded, In.; gouet à capuchon, F.

Planta bienal del Mediodia de Europa (gynandria polyandria, L.; aroideas, J.)

Se usa la raiz (*radix Arisari*) que es pequeña, prolongada y densa. Tiene un sabor dulce fastidioso, y al mismo tiempo acre.

2.° *Yaro, Yaro comun; Arum maculatum*, L.

Aaronsmurzel, Al.; common aron, In.; gouet tacheté, F.; aro vulgare, I.; jarro, Por.

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. fn. g. ham. han. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal comun en casi toda Europa.

Se usa la raiz (*radix Ari*, s. *Barbæ Aronis*, s. *Alamæ*, s. *Laphæ*, s. *Serpentariæ minoris*, s. *Draconhæ minoris*) que es redondeada, casi del grueso de un huevo de paloma, quebradiza, de color pardo amarillento por fuera y blanca y farinacea por dentro. Cuando está fresca contiene un jugo lechoso y acre que desaparece en gran parte por la desecacion, y exhala un olor parecido al del rábano que tambien cesa á medida que se seca. El sabor es sumamente acre y quemante en el primer estado, pero se hace casi nulo y mucilaginoso en el segundo.

Contiene, ademas de un principio acre, mucho almidon, goma, aceite, &c. El principio acre es tan volátil, que despues de esprimida la raiz apenas contiene de él el zumo, y el residuo nada absolutamente.

Dósis; de seis á veinte gr.

3.° *Yaro de tres hojas*; *Arum triphyllum*, L.

Indian turnip, In.; gouet à trois feuilles, F.

am. *c.*

Planta bienal de la América septentrional.

Se usa la raiz, que es redonda, abultada y doblada. Cuando está fresca es acre, y despues de seca suave y feculenta.

4.° *Yaro dragoncillo*; *Arum Dracunculus*, L.

Drachenwurz, Al.; tarragon, In.; gouet Serpentaire, F.

Planta bienal del Mediodia de Europa.

Se usa la raiz y la yerba.

La raiz es tuberosa, gruesa y muy acre.

La yerba se compone de hojas radicales, lanceoladas, enteras, con manchas blancas, y sostenidas por peciolos largos y delgados.

CONSERVA DE YARO. (li. *br.*)

R. Raiz de yaro machacada y reducida á una pasta blanda, una pt.
Azúcar en polvo, ... dos pt.
Hágase una pasta homogénea. (*br.*)

li. prescribe una parte de raiz y tres de azúcar.

FECULA DE YARO.

Fœculà ari. (f. g. pa. w. *om.*)

R. Raiz fresca de yaro, . . . c. s. q.

Despues de rallada, échese la pulpa en un saco de lienzo y prénsese; añádase al jugo un poco de agua, dé-

jese reposar, decántese la parte clara, déjese secar el sedimento á un calor suave y pulverícese.

POLVOS ESTOMACALES.

Polvos de yaro compuestos ; Pulvis ari alcalinus, s. *compositus*, *Pulvis stomachicus Birckmanni.* (ams. br. f. fu. han. li. o. p. pa. sa. su. w. *ca. pid. sp. sw. vm.*)

1.° Sin sal alcalina.

R. Raiz de yaro y
——— de cálamo aromático,
a. . . . . tres drac.
Canela blanca, ... dos drac.
Háganse polvos. (fu.) — Dósis; de veinte á treinta gr.

2.° Con sulfato de potasa.

R. Raiz de yaro, ... dos drac.
——— de cálamo aromático,
tres drac.
Sulfato de potasa, . . . un escrp.
Méz. (p.)

R. Raiz de yaro, ... dos drac.
——— de cálamo aromático y
——— de pimpinela blanca,
a. . . . . tres drac.
Canela, ... dos escrp.
Sulfato de potasa, . . . dos drac.
Háganse polvos. (ams.)

pid. prescribe una drac. de canela.

R. Raiz de cálamo aromático,
——— de yaro,
——— de pimpinela,
a. . . . . cuarenta y ocho pt.
Ojos de cangrejos, . . . doce pt.
Canela, ... nueve pt.
Sulfato de potasa, ... seis pt.
Sal amoniaco, ... dos pt.
Háganse polvos finos. (f. *ca.*) — Dósis ; de dos á cuatro drac.

3.° Con sub-carbonato de potasa ó de sosa.

R. Raiz de yaro, ... ocho pt.
——— de pimpinela y
——— cálamo aromático,
a. . . . . cuatro pt.
Ojos de cangrejos, ... dos pt.
Canela, ... pt. y med.
Sub-carbonato de potasa, una pt.
Pulverícese. (*vm.*)

R. Raiz de yaro, . . . diez y seis pt.
——— de cálamo aromático y
——— de pimpinela blanca,
a. . . . . ocho pt.
Ojos de cangrejos, . . cuatro pt.
Canela, ... tres pt.
Sub-carbonato de sosa, dos pt.
Azúcar, ... cuarenta pt.
Pulverícense. (br. han. pa. w. *sp.*)

R. Raiz de yaro,
——— de cálamo aromático,
——— de pimpinela blanca y
Sub-carbonato de cal, a. una onz.
———————— de sosa, dos drac.
Háganse polvos. (*sw.*)

R. Raiz de yaro, ... una onz.
——— de cálamo aromático y
——— de pimpinela blanca,
a. , ... med. onz.
Canela y
Sub-carbonato de sosa,
a. . . . . dos drac.
Háganse polvos. (li.)

o. disminuye á la mitad la cantidad del sub-carbonato ; — sa. prescribe onza y media de yaro, una onza de cálamo aromático, lo mismo de pimpinela, media onza de canela y una dracma de sub-carbonato ; — y

su. una dracma de yaro, otro tanto de cálamo aromático, lo mismo de pimpinela, media dracma de canela y un escrp. de sub-carbonato.

Es una cosa admirable la obstinacion con que se ha atribuido algunas veces la virtud medicinal de una composicion, precisamente á la sustancia que no goza de actividad alguna. Los célebres polvos de Birckmann son un egemplo de esta verdad. En el primer caso deben su actividad al cálamo aromático, en el segundo al sulfato de potasa, y en el tercero al sub-carbonato alcalino; y sin embargo han conservado el nombre de una planta que solo suministra almidon, esto es, una sustancia casi inerte.

YATROPHA CURCAS.

Jatropha Curcas, L.

Grosser Wunderbaum, Al.; angular leav, In.; pignon des barbades, F.

br. f. *g. m.*

Arbolillo del Brasil, de Surinam y de la Jamaica (monoecia monadelfia, L.; euforbiaceas, J.).

Se usa la simiente *(semen Ricini majoris, Nux cathartica americana, Nux barbadensis)* que es oval, algo comprimida, del grueso de una avellana, negruzca y arrugada, y de sabor acre y quemante.

Es purgante.

ACEITE DE YATROPHA CURCAS.

Oleum ricini americani. (sw.)*

R. Simiente de yatropha, . c. s. q. Macháquese en un mortero, échese la pasta en un saco de lienzo y esprímase.

Es drástico y emético, aconsejado contra el íleo, las lombrices y las hemorroides pertinaces.

Dósis; de media á dos onz.

YEDRA.

Yedra arborea, comun, de cauterio, de los poetas; Hedera Helix, L.

Epheu, Al.; ivy, In.; lierre, F.; edera, I.; hera, Por.

br. e. f. fe. g. ham. w. *be. br. g. m. sp. z.*

Planta que se halla en casi toda Europa (pentandria monogynia, L.; caprifoliadas, J.).

Se usan las hojas y los frutos.

Las hojas *(folia Hederæ arboreæ)* son lampiñas, lustrosas, de color verde obscuro, ovales ó divididas en tres ó cinco lóbulos, de figura variable.

Las bayas son poco jugosas, de color verde obscuro, casi negruzcas y con tres ó cuatro celdas monospermas.

YEDRA TERRESTRE.

Glecoma hederacea, L.

Gundermann, Al.; léerre terrestre, F.; ellera terrestre, I.; ground ivy, In.; hera sewestre, Por.

a. ams. an. b. ba. br. e. f. fe. ff. fu. g. hau. li. o. p. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal que crece en toda Europa (didynamia gymnospermia, L.; labiadas, J.).

La yerba *(herba Hederæ terrestris; s. Chamæclemæ, s. laminthæ humilioris)* se compone de un tallo cuadran-

gular, delgado, ramoso, con hojas reniformes ó acorazonadas y dentadas. Cuando se frota exhala un olor fuerte y aromático, y el sabor es algo acre, amargo y ligeramente balsámico.

Es estimulante, béquica y espectorante.—Dósis del zumo; de una á tres onzas.

ESPECIES BÉQUICAS. (f. f.** po. r. *ca.*)

R. Hojas de yedra terrestre,
——— de culantrillo,
——— de verónica y
——— de hinojo, a. . . part. ig.
Pártanse y mézclense. (f. *ca.*)

R. Yedra terrestre,
Verónica y
Tusílago, a. . . . . seis pt.
Raiz de regaliz y
Tallos de dulcámara, a. dos pt.
Pártanse y mézclense. (f.** r.)

R. Cebada perlada, . . cuatro onz.
Raiz de regaliz,
Yerba de tusílago,
——— de yedra terrestre y
——— de verónica, a. . dos. onz.
Flores de amapolas,
——— de gordolobo y
Simiente de anís, a. . una onz.
Higos secos, ... tres onz.
Pártanse y mézclense. (po.)

CONSERVA DE YEDRA TERRESTRE.

(a. e. pa. w. *ca. vm.*)

R. Yerba florida de yedra terrestre, una pt.
Azúcar blanca, ... dos pt.
Tritúrense juntas y caliéntese al B. M. para que el azúcar se disuelva. (*vm.*)

R. Polvos de yerba florida de yedra terrestre, ... una pt.
Agua destilada de yedra terrestre, c. s.
Azúcar blanca en polvo, una lib.
Tritúrense juntos. (e. pa. w.)

a. prescribe una onza de hojas y tres lib. de azúcar.

Dósis; de un escrp. á una drac.

ESTRACTO DE YEDRA TERRESTRE.

Extractum glechomæ hederaceæ.

(fe. sa. w.)

R. Yerba de yedra terrestre, una lib.
Agua de fuente, ... seis lib.
Déjese en digestion por cuatro horas, hiérvase despues un poco, cuélese por espresion y evapórese el líquido hasta la consistencia de estracto.

INFUSION DE YEDRA TERRESTRE.

(ff. *ca.*)

R. Hojas de yedra terrestre, dos drac.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Infúndase y cuélese. (*ra.*)

R. Hojas de yedra terrestre, dos drac.
Regaliz raspado, . . . una drac.
Agua, ... c. s.
para obtener una lib. de líquido colado. (ff.)

Es un ligero arómatico que se prescribe en las afecciones catarrales para favorecer la espectoracion.

INFUSION PECTORAL.

Infusum pectorale. (sw.)

R. Hojas de yedra terrestre y
—— de tusílago, a. . una onz.
Raiz de regaliz, . . . med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjese en maceracion por dos horas y cuélese.

Para tomar en el dia.—Se ha aconsejado esta infusion en la tísis pulmonal.

JARABE DE YEDRA TERRESTRE.

Syrupus hederæ terrestris. (br. e. f. sa. w. *vm.*)

R. Hojas frescas de yedra terrestre, med. lib.
Agua hirviendo, ... tres lib.
Déjense en infusion por doce horas, fíltrese y añádase al líquido
Azúcar blanca, ... el doble.
Hágase jarabe en vasija tapada. (f.)

e. prescribe dos onzas de hojas secas, dos libras de agua para hacer la infusion y cuatro libras de azúcar disuelta en el líquido colado; — br. lib. y med. de hojas frescas, dos libras de agua, veinte y cuatro horas de infusion y diez y seis onzas de azúcar por cada nueve de líquido colado; —y sa. una parte de azúcar por cada dos de infusion.

R. Hojas frescas de yedra terrestre, cuatro onz.
Agua destilada de yedra terrestre, una lib.
Infúndase, cuélese por espresion y añádase á nueve onz. de líquido colado
Azúcar blanca, diez y seis onz.
Cuélese el jarabe despues que dé un hervor. (w.)

R. Zumo depurado de yedra terrestre y
Jarabe comun, a. . . . . dos lib.
Hágase jarabe. (sa.)

R. Hojas frescas de yedra terrestre, c. s. q.
Machúquense sin añadir agua, y esprímase el zumo; hágase coagular este al fuego, y añádase á cada cinco partes
Azúcar, ... nueve pt.
Hágase jarabe. *(vm.)*
Dósis; una á dos onzas.

SUERO DE HAGUENOT. *(pie.)*

R. Leche de vacas, . . med. azumb.
Coagúlese por la ebulicion con un poco de prisa; clarifíquese en seguida con clara de huevo; añádase si se quiere siete ú ocho puñaditos de hojas de yedra terrestre, y endúlcese despues con c. s. de azúcar.

Aconsejado en ayunas en el mal de piedra y el cólico nefrítico.

ESENCIA DE YEDRA TERRESTRE.

Essentia glechomæ hederaceæ. (br.)

R. Yerba de yedra terrestre, una onz.
Espíritu de enebro, . cuatro onz.
Digiérase, esprímase y fíltrese.

Escitante reputado pectoral y béquico.

YERBA BUENA.

Entre las muchas especies de este género de plantas que se usan en medicina, estractaremos las siguientes:

1.° *Yerba buena roja de los jardines, yerba del corazon; Mentha gentilis*, L.

Menthe apparente, F.

f. *be. g. sp.*

Planta bienal de Europa (didynamia gymnospermia, L.; labiadas, J.).

Se usa la yerba (*herba Menthæ balsaminæ*) que se compone de un tallo algo velludo, muy ramoso, con hojas ovales, pecioladas y dentadas. Tiene un olor agradable y el sabor algo acre y amargo.

2.° *Sándalo de agua; Mentha acuatica*, L.

Wassermienze, Al.; waterminte, In.; menthe aquatique, F.; menta aquatica, I.

a. f. fe. ff. ww. *g. sp. z.*

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba (*herba Menthæ aquaticæ*, s. *rubræ*, s. *balsami palustris*) que se compone de tallos lampiños, con hojas igualmente lampiñas, pecioladas, ovales, acorazonadas y dentadas. Tiene un olor fuerte poco agradable, y un sabor amargo y algo acre.

3.° *Mentha arvensis*, L.

Ackermunze, Al.; corn mint, In.; menthe des champs, F.

f.

Planta bienal comun en toda Europa.

Se usa la yerba (*herba Menthæ equinæ*, s. *sylvestris*) que se compone de un tallo cuadrado, ramoso, débil y guarnecido de hojas opuestas, ovales, pecioladas, con dientes obtusos y agrisados. Tiene un olor desagradable y un poco amargo y algo acre.

4.° *Yerba buena rizada, Menta rizada; Mentha crispa*, L.

Krause Munze, Al.; carled mint, In.; menthe crupue, F.; menta crispa, I.; hortela vulgar, Por.

a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. *be. br. g. m. pid. sp. z.*

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba (*herba Menthæ crispæ*) que se compone de tallos felposos, con hojas arrugadas por encima, ovales ó redondeadas, y con dientes desiguales en los bordes. Su olor es fuerte, balsámico, particular y poco agradable, y el sabor caliente, aromático y algo amargo.

5.° *Menta, Mienta, Yerba buena; Mentha sativa*, L.

Zahme Münze, Al.; menthe cultive, F.

du. e. *a. pa.*

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba (*herba Menthæ verticillatæ*, s. *cryspæ verticillatæ*) que se compone de un tallo simple ó poco ramoso, lampiño, con hojas ovales, puntiagudas, dentadas y pecioladas. Su olor y sabor son semejantes á los de la menta rizada.

6.° *Mastranzos, Menta fequina, Padrastos; Mentha rotundifolia*, L.

Menthe à feuilles rondes, F.

f.

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba (*herba Menthæ sylvestris folio rotundiore*) que consta de un tallo felposo, con hojas sentadas, ovales ó redondeadas, arrugadas por encima, borrosas y blanquecinas por debajo y dentadas por los bordes. Su olor es fuerte y agradable.

7.° *Yerba buena piperita*, *Menta piperita*, *de Inglaterra*; *Mentha piperita*, L.

Pfeffermunze, Al.; peppermint, In.; menthe poivré, F.; hortela apimentada, Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. w. wu. ww. *be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Planta bienal estendida por toda Europa, al parecer originaria de Inglaterra.

Se usa la yerba (*herba Menthæ piperitæ*, s. *piperitidis*) que se compone de un tallo ramoso, un poco velloso, con hojas pecioladas, ovales, puntiagudas ó lanceoladas, dentadas, lampiñas y de color verde obscuro por encima. Su olor es aromático, penetrante y muy agradable. El sabor es balsámico, picante, caliente, alcanforado, dejando en la boca una sensacion de frio.

8.° *Menta silvestre*; *Mentha sylvestris*, L.

Menthe sauvage, F.

f. *be. g. m. sp.*

Planta bienal comun en toda Europa.

Se usa la yerba (*herba Menthæ sylvestris*, s. *longifoliæ*) que es borrosa y se compone de un tallo con hojas sentadas, oblongas, lanceoladas, con dientes desiguales y blanquecinas. Tiene un olor muy fuerte y agradable y un sabor amargo.

9.° *Menta verde*, *romana*, *de hojas estrechas*; *Mentha viridis*, L.

Menthe verte, F.

am. fe. g. lo. s. *be. c. g.*

Planta bienal de Europa.

Se usa la yerba florida (*herba et flores Menthætris*) que se compone de un tallo lampiño, con hojas lanceoladas, sentadas, con dientes separados, y terminadas en una espiga larga de flores purpurinas y verticiladas. Su olor es agradable y aromático.

Todas estas plantas son mas ó menos estimulantes, siendo la mas activa la menta piperita. —Dósis en polvo; de un escrp. á med. drac.

ESPECIES CEFALICAS.

Species cephalicæ, s. *nervinæ externæ.* (li.)

R. Yerba de menta rizada,
——— de mejorana,
——— de orégano y
——— de serpól, a. . tres onz.
Flores de manzanilla,
——— de espliego,
Bayas de laurel,
——— de enebro y
Simiente de alcaravea,
a. . . . . onz. y med.

CONSERVA DE YERBA BUENA.

Conserva foliorum menthæ. (ams. an. b. be. fu. g. p. pa. r. s. w. wu. *sw. vm.*)

R. Hojas frescas de yerba buena

machacadas, ... una pt.
Azúcar blanca, ... dos pt.
Tritúrense juntas y consérvense en un sitio fresco. (b. be. fu. p. pa. r. w. wu. *sa.*)

ams. y g. prescriben una pt. de menta y tres de azúcar; —y sa. partes iguales de azúcar y de menta.

R. Yerba fresca de menta, una pt.
Azúcar, ... dos pt.
Macháquese la yerba, tritúrese la pulpa con el azúcar y caliéntese en el B. M. hasta que este se disuelva. (*vm.*)

R. Hojas de menta en polvo,
una drac.
Azúcar blanca, . . . cinco drac.
Agua pura, ... dos drac.
Méz. (an.)

Estos procedimientos son aplicables á las mentas rizada, piperita y verde.

SAQUILLO AROMATICO. (*au.*)

R. Flores de manzanilla romana,
Menta rizada,
Ruda y
Cálamo aromático, a. . tres onz.
Alcanfor, ... seis drac.
Háganse polvos gruesos, rocíense con aguardiente caliente y aplíquense á la cabeza.

INFUSION DE MENTA.

Infusum menthæ. (dd. ff. *ra.*)

R. Yerba seca de menta piperita *ó* de menta acuática y
Regaliz raspado, a. . med. onz.
Agua hirviendo, ... c. s. para obtener treinta y dos onz. de líquido despues de colado. (ff.)

R. Hojas de menta, . . . med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Déjese en infusion. (*ra.*)

dd. prescribe una drac. de menta y doce onz. de agua.

Es ligeramente escitante, útil en los casos en que conviene estimular un poco el estómago, y que se ha aconsejado tambien en los cólicos llamados nerviosos.

INFUSION DE MENTA COMPUESTA.

Infusum menthæ compositum. (b.* du. *c.*)

R. Hojas frescas de yerba buena comun, ... dos drac.
Agua hirviendo, ... c. s. para obtener seis onz. de líquido colado; déjese en digestion por media hora en vasija tapada; cuélese despues de frio y añádase al líquido
Azúcar blanca, ... dos drac.
Aceite de yerba buena comun,
tres got.
Tintura de cardamomo compuesta,
media onz.
Méz.

Es estomacal y diaforética muy agradable. —Dósis; de una á dos cuch.

JARABE DE YERBA BUENA.

Syrupus menthæ, s. *menthæ crispæ.* (ams. an. b. br. e. f. ham. pa. sa. w.)

R. Hojas secas de menta rizada,
dos onz.
Agua, ... dos lib.
Pónganse en infusion; cuélese y añádase al líquido
Azucar blanca, . . . cuatro lib.
Cuélese el jarabe. (e. sa.)

han. prescribe que se infundan ocho onzas de yerba buena en tres libras de

agua, y se disuelvan cuatro libras de azúcar en veinte onzas de líquido colado.

R. Hojas secas de menta rizada, una onz.
Agua destilada de menta rizada, dos lib.
Déjese en digestion por dos horas al B. M. en vasija tapada; cuélese, fíltrese y añádase al líquido
Azúcar blanca, . doble cantidad.
Disuélvase al B. M. (f.)

br. y w. prescriben cuatro onz. de menta, una lib. de agua destilada, dos dias de digestion, y diez y seis onz. de azúcar para hacer el jarabe mediante una corta ebulicion.

R. Zumo de menta rizada purificado por el reposo y
Azúcar blanca, a. . . . tres lib.
Hiérvanse juntas. (pa.)

sa. prescribe jarabe simple en lugar de azúcar.

R. Yerba seca de menta, med. lib.
Agua pura, ... cinco lib.
Déjese en maceracion por dos horas; destílense despues cuatro onz. de líquido; disuélvanse en este ocho onz. de azúcar y añádase al resíduo despues de esprimido y colado
Azúcar blanca, dos libras y cuatro onz.
Hiérvase hasta la consistencia necesaria, y mézclense los dos jarabes despues de enfriados. (ams.)

R. Sumidades floridas de menta seca, cuatro onz.
Agua, ... tres lib.
Infúndase por doce horas en vasija tapada; cuélese esprimiendo ligeramente; déjese reposar; fíltrese y añádase
Azúcar blanca, . . . cuatro lib.
Clarifíquese y evapórese hasta la consistencia necesaria. Despues de enfriado el jarabe, añádase otro preparado en frio con
Agua de menta rizada, una lib.
Azúcar blanca, . . . veinte onz.
Consérvese. (an.)

br. prescribe que se infundan por veinte y cuatro horas cuatro onzas de yerba seca en cuatro lib. de agua; que se destilen en seguida tres onz. de líquido; que se disuelvan en este seis onz. de azúcar; que se esprima despues el resíduo; que se añada al líquido dos lib. y med. de azúcar; que se haga el jarabe á un calor suave y que despues de frio se mezcle con el precedente.

Dósis; de med. á dos onz.

JARABE DE MENTA PIPERITA.

Syrupus menthæ piperitidis, s. *de mentha piperitæ*. (b. be. f.)

R. Sumidades secas de menta piperita, ... una onz.
Agua destilada de menta piperita, dos lib.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas al B. M. en vasija tapada; cuélese; fíltrese y añádase al líquido
Azúcar blanca, . doble cantidad.
Disuélvase al B. M. y despues de frio cuélese por una manga. (f.)

Henry propone que se haga el jarabe mezclando una parte de infusion con tres de jarabe simple.

R. Sumidades de menta piperita, cuatro onz.

Agua, ... libra y med.
Déjese en digestion por tres dias en vasija tapada; esprímase; déjese en reposo; cuélese y añádase
Agua de menta piperita, libra y med.
Azúcar blanca, ... tres lib.
Hágase jarabe á un calor suave. (be.)

R. Yerba seca de menta piperita, cuatro onz.
Agua, ... cuatro lib.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas en vasija tapada; destílense en seguida tres onzas de líquido y añádase
Azúcar blanca, dos libras y med. para hacer jarabe. Despues de frio mézclese con el precedente. (b.)

JARABE VINOSO DE MENTA PIPERITA.

(*vm.*)

R. Agua vinosa de menta piperita, cinco pt.
Azúcar blanca, . . . nueve pt.
Disuélvase al B. M. tibio en vasija tapada.

TINTURA DE MENTA PIPERITA.

Tinctura, s. *Essentia menthæ piperitæ.*

(am. an. br. *c.*)

R. Yerba de menta piperita, una pt.
Alcohol de 20.°, ... ocho pt.
Despues de tres dias de digestion fíltrese. (an.)

R. Sumidades frescas de menta piperita, ... cuatro onz.
Espíritu de vino rectificado, dos lib.
Déjese en digestion lo suficiente; cuélese por espresion y échese el líquido sobre
Yerba florida de menta piperita, dos onz.
Déjese todavía en digestion por algun tiempo; cuélese por espresion y fíltrese. (br.)

R. Aceite de menta piperita, dos drac.
Alcohol, . . . treinta y dos onz.
Disuélvase. (am. *c.*)
Es escitante. — Dósis; de una á dos drac.

TINTURA DE MENTA RIZADA.

Tinctura menthæ crispæ. (an. *vm.*)

R. Yerba de menta rizada, una pt.
Alcohol de 20.°, . . . ocho pt.
Despues de tres dias de infusion fíltrese.
Es escitante.

TINTURA DE MENTA VERDE.

Tinctura menthæ viridis. (am. *c.*)

R. Aceite de menta verde, dos drac.
Alcohol, . . . treinta y dos onz.
Disuélvase.
Es escitante.

ACEITE DE MENTA POR INFUSION.

(br. o. s. sa. w.)

R. Yerba de menta, . . . una pt.
Aceite comun, ... ocho pt.
Despues de algunos dias de digestion esprímase. (s.)

R. Yerba de menta, . . . una pt.
Aceite comun, ... tres pt.

Déjese en digestion por cuatro dias en un sitio caliente; esprímase; repítase la misma operacion una ó dos veces con nueva yerba y fíltrese. (o.)

sa. prescribe una parte de yerba y dos de aceite.

R. Yerba de menta y
Aceite comun, a. . . partes ig.

Cuézase lentamente hasta que se consuma la humedad y esprímase. (br. w.)

Estomacal y carminativo.

ACEITE ESENCIAL DE YERBA BUENA.

Oleum menthæ æthereum, Ætheroleum menthæ.

R. Yerba fresca de yerba buena, c. s. q.
Agua de fuente, ... c. s.

Destílese y recójase el aceite que sobrenada. (am. ams. b. be. ed. fe. fi. g. lo. p. r. su. *br. c.*)

fu. y li. prescriben una parte de yerba y tres de agua; — an. tres de yerba y diez de agua; — f. cinco de yerba y siete de agua; — d. una de yerba y seis de agua; — e. han. o. pa. pr. y s. una de yerba y ocho de agua; — ba. una de yerba y nueve de agua; — a. una de yerba y doce de agua; — y *sw.* una de yerba y cuatro de agua.

R. Yerba de menta, veinte y cinco pt.
Agua, . . . setenta y cinco pt.
Sal comun, ... tres pt.

Destílese. (br. he. pa. sa. w. *pid.*)

R. Yerba buena, ... c. s. q.
Agua destilada de yerba buena, c. s.

Destílese. (wu.)

En du. se encuentra el *Aceite de yerba buena ó menta*; en am. g. lo. c. y *sw.* el de *menta verde*; en a. ams. an. b. ba. br. d. fu. han. o. p. po. pr. r. s. w. wu. *pid.* y *sw.* el de *menta rizada*; y últimamente en a. am. ams. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sa. su. w. wu. *br. c. pid.* y *sw.* el de *menta piperita.*

Dósis; de dos á seis got.

OLEOSACARO DE MENTA PIPERITA.

Oleosaccharum menthæ piperitæ.

(a. d. ham. o. pp. pr. w. *br.**)

R. Azúcar blanca, ... una onz.
Aceite esencial de menta piperita, ocho got.

Tritúrense juntas. (d. *br.**)

han. o. pp. y pr. prescriben media onz. de azúcar y doce got. de aceite; — a. una drac. de azúcar y tres got. de aceite; — y w. una onz. de azúcar y diez y seis gotas de aceite.

PASTILLAS DE MENTA PIPERITA.

Rotulæ, s. *Morsuli*, s. *Trochisci menthæ piperitæ.* (a. b.* ba. f. fu. han. he. li. o. s. w.)

R. Azúcar blanca y
Agua de yerba buena, a. dos onz.

Hiérvase hasta la consistencia de electuario blando; añádase un oleosácaro pp. con

Azúcar blanca, . . . cuatro onz.
Aceite esencial de menta piperita, media drac.

Echese la mezcla gota á gota sobre una mesa de mármol, y despues de que se hayan solidificado, pónganse á secar por muchas horas á un calor moderado sobre un cedazo. (f.)

li. y w. prescriben catorce drac. y med. de azúcar, med. drac. y quince gotas de agua de yerba buena, y un oleosácaro preparado con drac. y med. de azúcar y diez got. de aceite; — s. una cantidad arbitraria de azúcar, una cuarta pt. de agua de menta y cantidad suficiente de oleosácaro, para que una masa total de dos lib. contenga cosa de dos drac. de aceite esencial; — o. med. lib. de azúcar, c. s. de agua de menta, y un oleosácaro preparado con med. drac. de azúcar y treinta got. de aceite; — y a. una onz. de azúcar, c. s. de agua de yerba buena, y un escrp. de aceite esencial.

R. Azúcar blanca, ... med. lib.
Agua destilada, ... una onz.

Póngase á calentar hasta que una gota del líquido se solidifique por el frio, y añádase á la mezcla medio fria

Aceite esencial de yerba buena, med. drac.

Háganse pastillas. (hc.)

han. prescribe cuatro onz. de azúcar, c. s. de agua, y treinta y seis got. de aceite; — y ba. partes iguales de azúcar y de oleosácaro de menta, para que se hiervan juntos, añadiendo un poco de agua de menta piperita.

R. Azúcar pluma, ... seis onz.
Polvos de menta piperita, seis drac.

Méz. ex. Añádase á la masa medio fria

Aceite esencial de menta piperita, treinta got.

Háganse treinta pastillas. (fu.)

R. Azúcar en polvo, . . . una onz.
Aceite de menta piperita, seis got.
Mucílago de goma tragacanto, c. s.

Háganse trociscos. (fu.)

fe. prescribe med. drac. de aceite, seis onz. de azúcar, y c. s. de mucílago de goma arábiga hecho con agua de menta.

R. Cola de pescado, . . una drac.
Agua, ... tres onz.

Disuélvase y añádase

Oleosácaro de menta piperita, una lib.

Háganse pastillas. (b.*)

AGUA DE MENTA RIZADA.

(am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. fe. fi. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. su. wu. *br. pid. sw. vm.*)

R. Yerba fresca de menta rizada, una pt.
Agua, ... c. s.

Despues de veinte y cuatro horas de digestion destílense diez partes. (ams. b. be. *sw.*)

d. o. po. y pr. prescriben una pt. de yerba, c. s. de agua y que se destilen diez pt.; — han. ocho pt. de yerba, c. s. de agua y que se destilen veinte y cuatro pt.; — fi. y su. cuatro pt. de yerba y s. c. de agua para destilar seis partes; — p. seis pt. de yerba y c. s. de agua para destilar ocho pt.; — fe. y pa. una pt. de yerba, cuatro de agua y que se destilen dos par-

tes; — an. una pt. de yerba y cinco de agua para destilar cuatro; — wu. y *br.* una pt. de yerba, seis de agua y que se destilen dos; — he. r. y *pid.* una pt. de yerba, ocho de agua y que se destilen cuatro; — a. una de yerba, doce de agua y que se destilen cuatro; — s. una de yerba y quince de agua para destilar diez; — ba. una de yerba, diez y seis de agua y que se destilen cuatro; — y du. lib. y med. de yerba, y c. s. de agua para destilar cuatro azumbres.

R. Yerba de menta rizada, una pt.
Agua, ... cuatro pt.
Destílese la mitad y hágase la cohobacion del producto con nueva yerba. (sa.)

R. Yerba fresca de menta rizada, diez pt.
Aguardiente, ... med. pt.
Agua, ... ciento sesenta pt.
Destílense cuarenta partes. *(vm.)*

br. prescribe una pt. de yerba, cuatro de vino blanco y que se destile parte y media.

AGUA DE MENTA PIPERITA.

(a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. p. po. pp. pr. r. s. su. wu. c. *pid. sw. vm.*)

R. Yerba fresca de menta piperita, una pt.
Agua, ... c. s.
Despues de veinte y cuatro horas de maceracion destílense diez pt. (ams. b. be. d. *sw.*)

am. du. ed. y lo. prescriben pt. y med. de yerba, c. s. de agua y que se destilen ocho pt.; — han. o. po. y pr. una parte de yerba, c. s. de agua y que se destilen siete pt.; — g. una pt. de yerba y c. s. de agua para destilar seis pt.; — fi. y su. dos de yerba, c. s. de agua y que se destilen tres; — p. tres partes de yerba, c. s. de agua y que se destilen cuatro; — f. una de yerba, cuatro de agua y que se destilen dos; — an. una de yerba, cinco de agua y que se destilen cuatro; — a. br. wu. y *pid.* una de yerba, seis de agua y que se destilen dos; — he. y r. una de yerba y ocho de agua para destilar cuatro; — s. una de yerba, quince de agua y que se destilen diez; — y ba. una parte de yerba y diez y seis de agua para destilar ocho.

R. Yerba fresca de menta piperita, tres pt.
Agua, ... c. s.
Pónganse en un saco suspendido dentro de un alambique de modo que no llegue á tocar al agua, y destílense seis partes. (fu. li.)

R. Yerba de menta piperita, diez pt.
Aguardiente, ... med. pt.
Agua, ... ciento sesenta pt.
Destílense cuarenta partes. *(vm.)*

ed. y *c.* prescriben que se mezclen una lib. de yerba con c. s. de agua para evitar el empireuma, que se destilen diez lib. y que se añadan al producto cinco onz. de aguardiente.

R. Oleosacaro de menta piperita, una drac.
Agua destilada, . . . ocho onz.
Tritúrese para que se disuelva. (pp.)

R. Aceite esencial de piperita, una pt.
Azúcar y

Alcohol (de 22.°), a. . tres pt.
Agua, . . . mil y doscientas pt.
Disuélvase. (f.)
Dósis; de una á cuatro onz.

AGUA DE MENTA VERDE.
(am. b.* lo. *sw.*)

R. Yerba florida de menta verde, tres lib.
Agua, ... c. s.

para evitar el empireuma. Déjese en digestion y destílense cuatro azumbres y media. (am. b.*)

lo. prescribe lib. y med. de yerba, c. s. de agua y que se destilen diez y seis cuartillos: — y *sw.* una parte de yerba y c. s. de agua para destilar diez partes.

AGUA ESPIRITUOSA DE YERBA BUENA.

Espíritu de menta; Aqua menthæ spirituosa, s. *vinosa*, s. *alcoholica Spiritus menthæ.*

R. Yerba buena fresca, . . una pt.
Alcohol (de 20.°), . . cuatro pt.
Destílese un alcohol de 28.° (an.)

bc. prescribe una pt. de yerba, diez y seis de alcohol y que se destile un alcohol de 16.°; — br. pa. y w. una pt. de yerba, cuatro de alcohol y que se destile la mitad; — ams. dos pt. de yerba, nueve de alcohol y que se destile; — p. parte y med. de yerba, diez de alcohol y que se destilen cinco; — *sw.* una pt. de yerba, catorce de alcohol y que se destilen quince; — br. una lib. y diez onz. de yerba y ocho de alcohol; — y fe. parte y med. de yerba y ocho de alcohol para destilar seis.

R. Yerba buena fresca, . . una pt.
Alcohol (0,910.),
cuatro pt. y med.
Agua, ... seis pt.

Despues de veinte y cuatro horas de maceracion destílense cuatro pt. (an.)

ed. lo. y *c.* prescriben pt. y med. de yerba, nueve de aguardiente, c. s. de agua y que se destilen nueve pt.: — *vm.* una pt. de yerba, tres de alcohol y seis de agua para destilar dos partes y med.; — han. o. po. y pr. una pt. de yerba, una y med. de alcohol y c. s. de agua para destilar seis pt.; — y ba. una pt. de yerba, dos y med. de alcohol, diez y seis de agua y que se destilen ocho.

R. Yerba buena fresca, . . una pt.
Alcohol, ... cuatro pt.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas y destílese hasta la sequedad. Póngase en maceracion con nueva yerba y destílese segunda vez. (sa.)

wu. prescribe lib. y med. de yerba, diez de alcohol y la cohobacion del producto sobre nueva yerba, — y *sw.* doce partes de yerba, seis de alcohol y dos de agua; que se destilen seis partes; que se eche el producto con dos partes de agua sobre doce de yerba fresca y que se destilen seis partes.

R. Yerba buena fresca, . . dos lib.
Alcohol y
Agua, a. . . . . pt. ig.

y en cantidad proporcionada para obtener ocho lib. de producto. Añádase á este

Agua comun y . . . . .
Azúcar blanca, a. . . . dos onz.
Consérvese. (dc. *pid.*)

R. Yerba buena florida, . . doce pt.

Alcohol (de 22.°),
treinta y seis pt.
Agua destilada de yerba buena,
doce pt.

Despues de cuatro dias de infusion destílense al B. M. treinta partes. (f.)

r. prescribe med. pt. de yerba buena, cuatro de alcohol, una de agua de menta y veinte y cuatro horas de infusion para destilar tres partes.

R. Agua de yerba buena, una lib.
Alcohol, ... una onz.
Méz. *(br.)*

Se halla ademas indicado el *Espíritu de menta verde* en lo. *c.* y *sw.*; el *Espíritu de menta rizada* en a. ams. an. b. ba. br. f. li. p. r. y *sw.*; y el *Espíritu de menta piperita* en ams. an. b. ba. br. ed. f. han. he. lo. o. p. pa. po. pr. sa. w. wu. *br. c. pid. sw.* y *vm.*

AGUA ESTOMACAL.

Aqua stomachica, s. *menthæ composita.* (w. *sp.*)

R. Yerba fresca de menta rizada,
tres onz.
Galanga,
Nuez moscada y
Canela, a. . . . . una onz.
Vino generoso, ... ocho lib.
Destílese la mitad. (w.)

R. Yerba fresca de menta, dos lib.
——— de agenjos,
tres onz.
——— de albahaca y
——— de poleo,
a. . . . . dos onz.
——— de romero y
Flores de espliego, a. . dos drac.
Canela,
Clavo y
Cilantro, a. . . . . una drac.
Alcohol, ... diez y seis onz.
Agua de yerba buena,
sesenta onz.
Destílese casi hasta la sequedad. (*sp.*)
Dósis; de med. á una onz.

ESPIRITU DE YERBA BUENA AZUCARADO.

Pocion carminativa, *Julepe de menta.* (*sa. sm. sw. vm.*)

R. Espíritu de menta piperita,
setenta y cuatro onz.
Jarabe simple, ... doce onz.
Tintura de menta piperita,
tres drac.

Fíltrese la mezcla despues de algunos dias. (*vm.*)

R. Agua de yerba buena, . seis onz.
Espíritu de menta piperita y
Jarabe de menta piperita,
a. . . . . una onz.
Aceite esencial de yerba buena,
seis got.
Azúcar, ... med. onz.
Méz. (*sm.*)

R. Agua de yerba buena, ocho onz.
Espíritu de yerba buena,
onz. y med.
Jarabe simple, ... med. onz.
Méz. (*sa.*)

sw. prescribe ocho onz. de agua de menta verde, una onz. de tintura de yerba buena, y otra de jarabe simple. Se toma á cuch.

POCION ESTOMACAL. (*sm.*)

R. Agua de menta rizada,
cuatro onz.

Agua de menta piperita,
—— de canela ordeada y
Jarabe diacodion, a. . una onz.

POCION ANTIESPASMODICA.

Aqua ad tormina infantum. (sm. sp.)

R. Agua de yerba buena y
—— de manzanilla, a. dos onz.
Jarabe de amapolas y
—— de manzanilla,
a. . . . . med. onz.
Méz. *(sp.)*
R. Aceite esencial de canela,
dos got.
———— de menta piperita,
tres got.
Espíritu de menta piperita,
una onz.
Jarabe de altea, . . . tres onz.
Agua destilada de menta piperita,
cuatro onz.
Méz. *(sm.)*
Para tomar á cuch.

YERBA MORA.

Solano, Solano negro, Yerba cotones; Solanum nigrum, L.

Schwarzer Nachtschatten, Al.; black nightshade, In.; morelle, F.; solano nero, I.; herba moira, Por.

an. ba. br. d. e. f. fe. ff. g. w. wu. *be. br. g. m. sp. z.*

Planta ánua muy comun en toda Europa (pentandria monogynia, L.; solanos, J.).

Se usa la yerba *(herba Solani nigri)* que consta de un tallo redondo, ramoso, liso, provisto de hojas ovales, con dientes angulosos y puntiagudos. Tiene un olor desagradable y estupefaciente y un sabor nauseoso.

Las bayas contienen, segun Desfosses, un principio alcaloide particular llamado *Solanina, Solaninum.*

Es un sudorífico ligero, emoliente, y sedante al esterior.

COCIMIENTO NARCÓTICO. (*ra.*)

R. Hojas secas de yerba mora,
dos onz.
Adormideras blancas, . . n.º 4.
Agua, ... dos lib.
Hiérvase y cuélese.

Emoliente y calmante que puede usarse en fomentos, baños locales, inyecciones y enemas.

ACEITE DE YERBA MORA.

Oleum Solani nigri. (e. f.)

R. Hojas y frutos de yerba mora,
seis lib.
Aceite, ... ocho lib.

Déjese en digestion por tres ó cuatro dias; hiérvase despues hasta que se consuma la humedad y cuélese por espresion. (e.)

f. prescribe una parte de hojas y dos de aceite.

UNGUENTO DE YERBA MORA.

Unguentum Solani. (sp.)

R. Jugo esprimido de las hojas y bayas de yerba mora,
treinta y seis onz.
Aceite comun,
cincuenta y cuatro onz.
Albayalde, . . diez y ocho onz.

Litargirio, . . treinta y seis onz.
Cuézase y añádase
Cera blanca, ... seis onz.
Polvos de incienso, . . tres onz.

AGUA DE YERBA MORA. (br. f. pa.)

R. Yerba mora, ... una pt.
Agua, ... tres pt.
Destílese la mitad. (br. pa.)

f. prescribe que se sumerjan cinco pt. de yerba en doce y med. de agua; que se destilen diez partes; que se mezcle el producto con cinco partes de yerba y diez de agua; que se destilen todavía diez partes, y que se repita la operacion por tercera vez si se juzga necesario.

YERBA PARIS.

Paris quadrifoliata, L.

Enibeere, Al.; one berry, In.; vba di volpo, I.; pariseta, Por.

g. w. *be. m. sp.*

Planta bienal de Europa (octandria tetragynia, L.; asparagineas, J.).

Se usa la raiz, la yerba y el fruto.

La raiz (*radix Paridis*, s. *Solani quadrifolii*) es carnosa, un poco nudosa y guarnecida de algunas fibras. Su olor y sabor son nauseosos. Escita á los vómitos á la dósis de treinta á cuarenta granos. Los antiguos la prescribian en el cólico.

La yerba se compone de un tallo largo y delgado, lampiño, desnudo inferiormente y cargado superiormente de cuatro hojas ovales, agudas y verticales. Su olor es muy desagradable y su sabor dulzacho. Es purgante. Se ha considerado en otro tiempo como anodina, sudorífica y alexifarmaca. Ha sido empleada con particularidad en la manía, los espasmos, la coqueluche y el envenenamiento por la nuez vómica, &c.

Los frutos (*Uvæ versæ*, s. *vulpinæ*) son unas bayas de color púrpura bronceado ó de un moreno negro, gruesas como cerezas y brillantes. Su olor es desagradable y su sabor viroso. Su introduccion en el estómago produce un verdadero envenenamiento.

YERBA DEL PARAGUAY.

Ilex vomitoria, Ait.

Apalachine, F.

br. f. w. *c. sp.*

Planta de la Florida (tetrandria tetragynia, L.; rhamneas, J.).

Se usan las hojas, que son elípticas ó lanceoladas, obtusas, aserradas, lampiñas y lustrosas.

Es emético muy fuerte y diurético.

YERBA DE LA PERLESIA.

Yerba de la feridura, *Estaquis recta*; *Stachys recta*, L.

Berufskraut, Al.; white stachys, In.; crapaudine, F.

e. w. *sp.*

Planta bienal del mediodia de Europa (didynamia gymnospermia, L.; labiadas, J.).

La yerba (*herba Sideritis hirsutæ*) presenta un tallo cuadrado, poco ramoso y algo velloso, con hojas elípticas, acorazonadas, y ásperas al tacto.

El olor es agradable y el sabor aromático.

Escitante considerada como vulneraria.

YERBA DE LA PLATA.

Mesembryanthemum crystallinum , L.

Glaciale, F.

an. b. ba. fu. *m.*

Planta ánua del Archipiélago (icosandria pentagynia, L.; ficoideas, J.).

Se usa la yerba, que se compone de un tallo ramoso, con hojas pequeñas, ovales, ondeadas, opuestas ó alternas, en las cuales, lo mismo que en el tallo, se observan unas vegigas gruesas, cristalinas y brillantes. El sabor es soso y algo nauseoso.

Es un atemperante y resolutivo que se ha aconsejado en la tos convulsiva y en la disuria, y que se ha proclamado tambien como diurético especial. — Dósis del jugo; una cuch. cada hora.

CONSERVA DE YERBA DE LA PLATA.

Conserva mesembryanthemi cristallini.

(fu.)

R. Yerba de la plata fresca, machacada y pasada por un cedazo, una pt.
Azúcar blanca, ... dos pt.
Méz. por trituracion.

LOOC DE YERBA DE LA PLATA.

Linctus mesembryanthemi cristallini.

(b.* *au.*)

R. Jugo de yerba de la plata y
Jarabe de musgo arbóreo, una onz.
Méz. — Dósis; med. cuch. seis veces al dia en la tos convulsiva de los niños.

JARABE DE YERBA DE LA PLATA.

Syrupus mesembryanthemi cristallini.

(ba.)

R. Jugo esprimido de yerba de la plata, purificado por la ebulicion y despumado, . . una pt.
Azúcar, ... pt. y med.
Hágase jarabe.

YERBA DE SANTA BARBARA.

Yerba de los carpinteros; Erisimo silvestre; Erysimum barbarea, L.

Winterkresse, Al.; winter cresse, In.; herbe de Sainte-Barbe, F.

f. *be. m. sp.*

Planta bienal comun en toda Europa (tetradynamia siliquosa, L.; cruciferas, J.).

Se usa la yerba (*herba Barbareæ*) que se compone de un tallo liso, ramoso y provisto de hojas; de las cuales las superiores son ovales y dentadas, y las inferiores en forma de lira, con el lóbulo terminal redondeado. Tiene un sabor algo acre, amargo y semejante al del berro.

Es escitante y antiescorbútica.

YERBA DE SANTIAGO.

Senecio Jacobæa, L.

Jacobskraut, Al.; ragwoot, In.; jacobee, F

f. *sp.*

Planta bienal comun en toda Eu-

ropa (syngenesia polygamia igual, L.; synanthereas, Cass.).

Se usa la yerba (*herba Jacobeæ*) que se compone de hojas liradas, bipinadas, dentadas y lampiñas. Tiene un sabor acre, desagradable y amargo.

Es tónica.

YERBA CANA.

Senecio; *Senecio vulgaris*, L.

Gemeine Kreutzkraut, Al.; common grundsel, In.; seneçon, F.; senecione, I.; tarneirinha, Por.

br. e. f. w. *m. sp.*

Planta ánua muy comun en toda Europa (syngenesia polygamia superflua, L.; synanthereas, Cass.).

Se usa la yerba florida (*herba senecionis*, s. *Erigeri*) que se compone de un tallo fistuloso, casi lampiño, ramoso, con hojas alternas, sentadas, abrazadoras, pestañosas, hendidas, con dientes irregulares, lampiñas y con flores que forman un corimbo terminal muy flojo. No tiene olor, y el sabor es herbáceo, ligeramente ácido y como salado.

Finazzi dice que una cucharada del zumo precave las convulsiones histéricas, tomada antes de la invasion.

YERBA PASTEL.

Isatis tinctoria, L.

Fœrberwaid, Al.; woad, In.; pastel, F. Por.; guado, I.

br. f. *be. g.*

Planta perenne de Europa (tetradynamia siliculosa, L.; cruciferas, J.).

Se usa la yerba (*herba Clasti*, s. *Isatis*) que se compone de hojas lampiñas, de las cuales las radicales son lanceoladas y terminadas en peciolos por su base, y las del tallo sentadas, abrazadoras y prolongadas en dos apéndices por su base. El sabor es acre y algo amargo.

Se estrae de esta planta un principio colorante semejante al añil, la *Indigatina*, ó *Isatina*.

Z.

ZANAHORIA.

En medicina se usan dos plantas de este nombre:

1.ª *Zanahoria*, *Zanahoria cultivada*, *comun*; *Daucus Carotta*, L.

Mohrrube, Al.; carrot, In.; carotte commune, F.; carota, I.; cenoira, Por.

a. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. w. *be. br. c. m. pid. sp. z.*

Planta perenne que se cultiva en Europa, donde ha producido muchas variedades (pentandria monogynia L.; ombeliferas, J.).

Se usa la raiz y la simiente.

La raiz (*radix Dauci vulgaris*, s. *sativi*) es derecha, cónica, carnosa, tierna, amarilla, blanca ó roja con diversos matices. Tiene un olor particular y aromático, y un sabor dulce y algo mucilaginoso.

La simiente (*semen Dauci silvestris*) es pequeña, blanca, aplastada por un lado, abultada por el otro y con cerdas por los lados. Su olor y sabor son algo aromáticos.

La raiz pasa por demulcente, vermífuga y anti-ictérica al interior, y emoliente y antiséptica al esterior.

Las semillas son escitantes, carminativas y diuréticas.

2.º *Zanahoria de montaña*, *Peregil de montaña; Selinum cervaria*, Ro.

Hirschwurz, Al.; broad leav'd spinel, In.; carotte de montagne, F.

w. *sp.*

Planta bienal de las montañas de Europa (pentandria digynia, L.; ombeliferas, J.).

Se usa la raiz (*radix Cervariæ nigræ*, s. *Gentianæ nigræ*) que es larga, gruesa, negruzca por fuera, blanca por dentro, de olor fuerte y agradable, y de sabor aromático y picante.

CATAPLASMA DE ZANAHORIA. (f.)

R. Zanahorias ralladas, . . . c. s. q.
Cocimiento de cicuta, ... c. s.
para hacer cataplasma.

JUGO DE ZANAHORIAS.

Succus Carottæ. (f.)

R. Zanahoria raspada, diez y seis pt.

Hágase pulpa con un rallo y dilúyase esta en

Agua comun, ... dos pt.

Esprímase el jugo y clarifiquese.

ESTRACTO DE ZANAHORIA.

Arrope de zanahoria; *Extractum*, s. *Rob dauci*, s. *dauci carottæ*, s. *dauci radicis*, *Succus dauci inspissatus.* (an. be. fu. han. li. o. po. pr. s. *sw.*)

R. Raiz de zanahoria raspada, dos lib.

Agua hirviendo, ... diez lib.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas en vasija tapada, cuézase durante una, decántese el líquido despues de frio, esprímase en seguida la raiz, reúnanse los dos líquidos, y despues de reposados evapórense hasta la consistencia conveniente. (be.)

R. Zanahorias lavadas, raspadas y partidas, ... c. s. q.

Agua, ... c. s.

esto es, una mitad poco mas ó menos. Cuézase hasta que se reblandezca la raiz, métase en un saco y esprímase con fuerza; cuélese el jugo por una manga, y evapórese á un fuego muy lento y despumándole hasta la consistencia de miel. (fu. li. s.)

han. o. po. pr. y *sw.* prescriben que se clarique el jugo, haciendole dar un hervor antes de evaporarle.

R. Jugo purificado de zanahorias, nueve lib.

Azúcar blanca, ... una lib.

Hiérvase meneándolo continuamente hasta que adquiera la consistencia de miel. (an.)

Es demulcente y béquico. — Se le alaba al esterior para calmar los dolores del cancer ulcerado.

ZANDIA.

Melon de la India; Cucurbita Citrullus, L.

Wassermelone, Al.; watter melon, In.; pasteque, F.; cocomero, I.

br. d. e. f. fe. g. w. *a. be. m. sp. z.*

Planta ánua del mediodia de Europa y de las Indias (monoecia monadelfia, L.; cucurbitaceas, J.).

Se usa la simiente (*semen citrulli*, s. *Anguriæ*) que es prolongada, comprimida, y con un reborde saliente. Contiene una almendra blanca y oleaginosa, cubierta de una película negruzca ó rojiza.

Es emoliente y refrigerante.

ZANTORRHIZE.

Zanthorrhiza apiifolia, L., Her.

Yellow root, parsley'd yellow root, shrub yellow root, In.; zantorrhize, F.

am. *c.*

Arbusto pequeño de Virginia (pentandria monogynia, L.; renonculaceas, J.).

La raiz es larga, del grueso del dedo pequeño, amarilla y con muchas raicillas. Tiene el sabor amargo.

ZANTOXILO.

Clava de Hercules; Zanthoxylum clavatum, L.

Zahnwehholz, Al; pricklyash, In.; clavalier, F.

am. *c.*

Arbol de las Antillas (dioecia pentandria, L.; terebintaceas, J.).

Se usa la corteza, que es obscura y acre, contra las afecciones de los dientes. En América se usa la tintura en los reumatismos crónicos.

ZARZA.

Cinco plantas corresponden á este artículo.

1.° *Zarza de montaña; Rubus Chamæmorus*, L.

Multbeere, Al.; ronce de montagne, F.; mountain bramble, In.

d. p. r. *be. m.*

Planta bienal del norte de Europa (icosandria poligynia, L.; rosaceas, J.).

Se usan los frutos (*fructus*, s. *baccæ Chamæmori*) que son bayas inodoras, de sabor ácido antes de madurar, y acuoso poco agradable despues de esta época.

2.° *Zarza, Zarza comun, Zarzamora; Rubus fructicosus*, L.

Strauchartige, Al.; common bramble, In.; Ponce noir, F.; rovo I.; sylva, Por.

an. br. e. f. w. *br. sp.*

Arbolito comun en toda Europa.

Se usan los frutos (*baccæ Rubi nigri*, s. *fructicosi*, s. *Mori rubri*) que son bayas inodoras y de sabor agradables.

3.° *Zarza septentrional; Rubus arcticus*, L.

Nordische Himbeere, Al.; dwart bramble, In; ronce septentrionale, F.

br. r. su. *be. m.*

Arbolillo del norte de Europa.

Se usan los frutos (*baccæ Norlandicæ*) que son bayas de olor agradable y de sabor grato y vinoso.

4.º *Rubus trivialis*, Mich.

Dewerry, In.

am. *c.*

5.º *Zarza vellosa; Rubus villosus.* Villd.

Blackberry, In.

am. *c.*

La corteza de estas dos últimas plantas (que son de la América septentrional) es astringente.

COCIMIENTO DE ZARZA VELIOSA.

Decoctio rubi villosi. (am. b.*)

R. Corteza de la raiz del *rubus villosus*, una onz.
Agua, ... c. s.
para ocho onz. de cocimiento colado.

Astringente usado en el norte de América.—Dósis; medio vaso varias veces al dia.

JARABE DE ZARZA.

Syrupus rubi arctici. (su.)

R. Zumo recien esprimido y depurado del *rubus arcticus*, una lib.
Azúcar blanca, ... dos lib.
Hágase jarabe á un calor suave.

ZARZAPARILLA.

Salsaparilla, Salsaparilla; Salsa, Zarza, Zarsaparilla.

Sasseparille, Al.; sarzaparilla, In.; salsepareille, solsa parilha, Por.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g han. li. lo. o. p. po pr. r. s. su. w. wu. *a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.*

Se da este nombre á la raiz del *smilax salsaparilla*, L., planta del Perú y del Brasil (dioecia hexandria, L. esparragos, J.).

Presenta cuatro variedades principales en el comercio:

1.º *Zarzaparrilla del Brasil ó de Portugal*, que se presenta en haces de seis á ocho pies de largo y ocho de circunferencia, formados de raices entrelazadas, del grueso de una pluma de escribir, flexibles, con estrias longitudinales, con la corteza muy fina y ordinariamente sin cepa ni raicillas. Es rojiza ó parda, negruzca esteriormente, y blanca y harinosa por dentro. Carece de olor, y el sabor es algo amargo. Es la mas apreciada y viene del Perú ó del Maraham.

2.º *Zarzaparrilla de Honduras.* Tiene la corteza de color moreno sucio, algunas veces blanquecino. Se encuentra con sus cepas y es mas larga y fibrosa que la anterior. La corteza, que es de un blanco rosado por lo interior, cubre un cge leñoso blanco, de sabor soso y amiláceo, siendo el suyo mucilaginoso y muchas veces amargo bastante manifiesto. Procede de la bahía de Honduras.

3.º *Zarzaparrilla roja ó de la Jamaica*, con sus cepas, de seis á siete pies de larga, redonda y comprimida por la desecacion, cubierta de un epidermis encarnado-naranjado, gris, rojizo ó blanquecino; su corteza algunas veces está húmeda, y su parte carnosa blanca. Se encuentra en corta cantidad en haces que los traen de

Honduras. Aunque es poco estimada, merece preferirse á las otras dos por tener un sabor mas amargo, mas fuerte y mas aromático, lo mismo que el olor mas pronunciado, perceptible al mas ligero frote.

Las propiedades medicinales de esta raiz son debidas, segun Pelotta, á un principio alcaloide particular llamado *Paraglina*. Folchi ha estraido tambien de la parte medular de la zarzaparrilla otro alcaloide denominado *smilacina*.

Esta sustancia, considerada en general como diurética y sobre todo como sudorífica, aunque su accion sea bastante débil bajo ambos respectos, es manifiestamente escitante, de cuya propiedad goza la paraglina en un grado mas marcado todavia. Se administra con particularidad en las afecciones venéreas, reumatismo crónico y diversas enfermedades de la piel.

La dósis en polvo es de media á una drac. No debe asociarse con la infusion de agallas, con el agua de cal, el acetato de plomo, ni el nitrato de mercurio, ya sea en polvo, infusion ó cocimiento.

Los ingleses establecidos en las Indias orientales designan con el nombre de *zarzaparrilla indígena ó de las Indias*, *Country sarsaparilla*, la raiz del *Periploca indica*, L., planta comun en aquellos sitios (pentandria monogynia, L.; apocyneas, J.). Esta raiz se prescribe en cocimiento á la dósis de tres ó cuatro onz. en las escrófulas, afecciones venéreas y enfermedades de la piel.

POLVOS SUDORIFICOS Y TONICOS. (*pie.*)

R. Zarzaparrilla,
Sasafras y
Raiz de rusco, a. . . . part. ig.

Dósis; una drac. todas las mañanas en vino blanco.

OPIATA ARABE. (*pie.*)

R. Zarzaparrilla,
Quina y
Avellanas tostadas, a. cuatro onz.
Clavos de especia, . . cinco onz.
Miel de Narbona, ... c. s.

Esta opiata se usa mucho en Provenza en las úlceras venéreas de la garganta y en las llamadas bubas crónicas ó degeneradas.

ESTRACTO DE ZARZAPARRILLA.

Extractum sarsaparillæ. (ams. b. e. lo. sa. w. *e.*)

R. Raiz de zarzaparrilla, . una lib.
Agua hirviendo, cuatro azumb.

Déjese en maceracion por veinte y cuatro horas, redúzcase despues á dos azumbres por la ebulicion, cuélese el líquido hirviendo y evapórese hasta la consistencia de estracto. (lo. e.)

Raiz de zarzaparrilla, . . una pt.
Agua hirviendo, ... diez pt.

Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues por dos y cuélese; hiérvase otra vez el residuo por el mismo espacio de tiempo con cuatro partes de nueva agua, reúnanse los dos líquidos y evapórense hasta la consistencia de estracto (b. e.).

ams. prescribe que se cueza la raiz primero con veinte y despues con quince partes de agua, reducidas cada vez á la mitad.

R. Raiz de zarzaparrilla, una lib.

Agua hirviendo , . . . seis lib.

Déjense en maceracion por tres dias , hiérvase despues un poco, cuélese por espresion y evapórese hasta la consistencia de estracto. (w.)

sa. prescribe se disminuya por la ebulicion una tercera parte del líquido antes de colarlo y de evaporarlo.

COCIMIENTO DE ZARZAPARRILLA.

Decoctum sarsaparillæ , s. *sarsæ* , s. *smilacis sarsaparillæ.* (am. b.* du. ed. lo. p. su. *br. c. ra. sa. sw. sy.*

R. Zarzaparrilla , ... seis onz.

Agua , ... ocho lib.

Déjese en digestion por dos horas á un calor moderado , sáquese despues la raiz , quebrántese esta y hágase hervir suavemente en la infusion hasta que el agua se haya reducido á la mitad.

am. du. y *c.* prescriben onz. y med. de zarzaparrilla , una azumbre de agua hirviendo , dos horas de digestion , y la coccion de la raiz quebrantada en seguida hasta que no quede mas que la mitad del líquido: — *sy.* tres onz. de zarzaparrilla , tres lib. de agua hirviendo, cuatro horas de infusion, que se quebrante despues la raiz , siete horas de infusion y la ebulicion hasta reducir el líquido á dos libras; ó simplemente tres onz. de raiz , tres lib. dé agua hirviendo y doce horas de digestion, y despues la ebulicion bastante prolongada hasta reducir el líquido á dos libras; — *br.* seis onz. de raiz, diez y seis lib. de agua , y despues de un cierto tiempo de digestion la decoccion hasta que el líquido se reduzca á la mitad ; — p. el mismo procedimiento pero con diez lib. de agua ; — b.* y *ra.* una onz. de zarzaparrilla y dos lib. de agua reducidas á un tercio ; — *ra.* en otra parte , una á dos onz. de zarzaparrilla y cuatro lib. de agua reducidas á dos ; — b.* y lo. cuatro onz. de zarzaparrilla , dos azumbres de agua , cuatro horas de infusion , dos horas de maceracion despues de quebrantada la raiz , y la coccion hasta que el líquido se reduzca á la mitad, — su. cuatro onz. de zarzaparrilla , sesenta y cuatro onz. de agua hirviendo, cuatro horas de maceracion , dos horas de digestion despues de haber quebrantado la raiz , y la ebulicion hasta que el líquido se reduzca á treinta y dos onz.

Es escitante, usado en las enfermedades venéreas y reumáticas. — Dósis; med. lib. tres ó cuatro veces al dia.

TISANA DE SANTA MARIA.

R. Zarzaparrilla partida, cuatro onz.

Agua , ... tres azumb.

Redúzcase á dos azumbres por la ebulicion , y retirado del fuego añádase

Raiz de regaliz quebrantada, med. onz.

Déjese en infusion lo suficiente, y despues de frio cuélese.

Es escitante recomendado en la curacion de las enfermedades venéreas. — Se toma la cantidad prescrita por la mañana en ayunas en diez y seis vasos tibios , separados por un cuarto de hora de intervalo.

LICOR ANTIVENEREO DE ROUEN.

R. Cocimiento de zarzaparrilla, treinta y dos onz.

Nitro, ... tres drac.
Eter hidroclórico, . . med. onz.
Espíritu de alcanfor, . dos drac.
Aceite esencial de anís, cinco got.

Dósis; una cuch. dos ó tres veces al dia.

JARABE DE ZARZAPARRILLA. (f.**)

R. Zarzaparrilla partida, . tres lib.
Agua hirviendo, . . treinta lib.

Déjese en infusion por veinte y cuatro horas; redúzcase despues á doce lib. por la ebulicion; cuélese por espresion; hiérvase otra vez el residuo en treinta lib. de agua hasta reducirlas á doce, y cuélese por espresion; reúnanse los dos cocimientos, redúzcanse á diez lib., déjense reposar, fíltrense y añádase

Jarabe simple y
Miel blanca, a. . . . . tres lib.

Cuézase prontamente hasta la consistencia necesaria.

TISANA ARABE. (*pie.*)

R. Zarzaparrilla, ... dos onz.
Quina, ... una onz.
Agua, ... ocho lib.

Redúzcase á cuatro lib. por la ebulicion.

Antivenéreo usado en Provenza, que se hace tomar con la opiata del mismo nombre.

COCIMIENTO DE ZARZAPARRILLA COMPUESTO.

Cocimiento de guayaco compuesto, *Cocimiento sudorífico*, *Apocema sudorífica*; *Decoctum sarsaparillæ compositum*, s. *sudoriferum*, s. *ligni guajaci compositum*. (c. f. sa. *ca. ra. sp. sw. vm.*)

R. Raiz de zarzaparrilla, onz. y med.
Agua comun, ... cinco lib.

Hiérvase por media hora y añádase

Raspaduras de leño de guayaco, onz. y med.

Retírese del fuego pasado un cuarto de hora y añádase

Regaliz raspado, . . . med. onz.
Leño de sasafras, . . . dos drac.

Tápese la vasija, cuélese el líquido despues de frio, déjese reposar y decántense tres lib. (*vm.*)

R. Raiz de zarzaparrilla y
Leño de guayaco raspado, a. onz. y med.
Agua tibia, ... cuatro lib.

Déjense en infusion por doce horas en vasija tapada; hiérvase despues hasta reducirlo á tres lib., y añádase á lo último

Leño de sasafras raspado, dos drac.
Regaliz quebrantado, . med. onz.

Cuélese despues de media hora de infusion. (f.)

e. prescribe dos onz. de zarzaparrilla, otro tanto de guayaco, ocho lib. de agua reducidas á cuatro, una onz. de sasafras y una drac. de regaliz.

R. Raiz de zarzaparrilla, . dos onz.
Raspaduras de leño de guayaco, una onz.
China, ... med. onz.
Agua, ... una azumb.

Redúzcase á la mitad é infúndase á lo último

Leño de sasafras, . . . dos drac.

Cuélese esprimiendo ligeramente. *(ca.)*

R. Raiz de zarzaparrilla,
treinta onz.
Agua hirviendo,
veinte y cuatro lib.

Déjese en infusion por veinte y cuatro horas, redúzcase por la ebulicion á ocho lib. el líquido colado, repítase otras dos veces la misma operacion sobre el residuo, tómense veinte lib. de la mezcla de los tres cocimientos y añádase

Flores de borraja,
Pétalos de rosas blancas,
Hojas de sen y
Simiente de anís, a. . . dos onz.

Redúzcase á doce lib. por la coccion y cuélese. *(sw.)*

R. Raiz de zarzaparrilla y
—— de china, a. . . . dos onz.
Raspaduras de leño de sándalo rojo, ... seis drac.
———— de c. c., onz. y med.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues hasta que se reduzca á la mitad y añádase á lo último

Raspaduras de leño de sándalo cetrino, ... seis drac.
Azúcar blanca, ... seis onz.

Cuélese. (c.)

R. Raiz de zarzaparrilla, . una onz.
Agua comun, ... tres lib.
Sulfuro de antimonio (en una muñequita) . . . . . dos drac.
Cola de pescado, . . . una drac.

Redúzcase á una tercera parte por la ebulicion. (*ra.*)

R. Raiz de zarzaparrilla y
—— de china, a. . . med. onz.
Raspaduras de leño de guayaco y
Antimonio crudo, a. . . dos onz.
Agua hirviendo, ... ocho lib.

Déjense en maceracion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues una hora en vasija tapada, y añádase en seguida

Raspaduras de leño de sasafras,
una onz.
Raiz de betónica, . . med. onz.
Enebro quebrantado, . . dos drac.

Hiérvase por un cuarto de hora y cuélese. *(sp.)*

Puede hacerse laxante esta tisana añadiendo á lo último una onz. de sen; entonces se diferencia poco de la tisana antivenérea purgante.

R. Raiz de zarzaparrilla, dos onz.
—— de china y
Raspaduras de leño de guayaco, a.
una onz.
Antimonio crudo (en un saquito)
onz. y med.
Agua comun, ... seis lib.

Déjese en digestion por doce horas sobre cenizas calientes, redúzcase despues lentamente á dos lib. por la ebulicion y añádase á lo último

Regaliz raspado, . . . seis drac.

Cuélese el cocimiento y échese hirviendo sobre

Leño de sasafras raspado,
tres drac.

Cúbrase la vasija hasta que se enfrie bien y cuélese. (sa.)

Aconsejado en las enfermedades venéreas, catarrales y exantemáticas. — Dósis; muchos vasos al dia.

TISANA SUDORIFICA. (*pie. ra. sm.*)

R. Zarzaparrilla, ... dos onz.

China y
Dulcamara, a. . . . . una onz.
Agua, ... seis cuartillos.
Cuézase hasta que se consuma una tercera parte. *(pie.)*

R. Zarzaparrilla y
Dulcamara, a. . . . . una onz.
Raiz de saponaria, . . dos drac.
Agua, ... seis vasos.
Redúzcase á una tercera parte por la coccion y añádase
Leche de vacas, . . . dos vasos.
Méz. ex. *(sm.)*
Para tomar todos los dias en seis vasos.

R. Zarzaparrilla,
China y
Guayaco, a. . . . . med. onz.
Sasafras, ... dos drac.
Agua, ... dos lib.
Cuézanse juntos. *(ra.)*
Los mismos usos que las precedentes.

TISANA SUDORIFICA ESCITANTE.

Decoctum diaphoreticum incitans. (b.)

R. Raiz de zarzaparrilla y
Leño de guayaco, a. . tres drac.
Dulcamara é
Hinojo, a. . . . . dos drac.
Agua, ... c. s.
para obtener una lib. de cocimiento.
Para tomar en dos ó muchas veces.

COCIMIENTO ANTIVENEREO NUTRITIVO.

Decoctum antisyphiliticum nutriens. (b.)

R. Zarzaparrilla, ... una onz.
Liquen islandico lavado,
onz. y med.
Agua, ... c. s.
para obtener catorce onzas de cocimiento. Añádase al líquido colado
Jarabe simple, ... una onz.
Para tomar en dos veces por mañana y tarde.

COCIMIENTO DE COLA DE PESCADO COMPUESTO. (b.*)

R. Raiz de zarzaparrilla, . tres onz.
Corteza de sasafras y
Leño de sasafras, a. . . una onz.
Agua hirviendo, . . . nueve lib.
Déjese en digestion por doce horas, hágase hervir despues y añádase
Cola de pescado, . . . tres onz.
Disuelta en c. s. de agua para que el líquido colado suba á ocho lib.
Aconsejado por Eimbke en las enfermedades venéreas.
Dósis; de veinte á cincuenta onz. al dia.

TISANA DE FELTZ. (*ba. ca. pie. ra.*)

R. Antimonio crudo (en un saquito)
cuatro onz.
Agua comun, ... doce lib.
Zarzaparrilla, ... dos onz.
China, ... una onz.
Cola de pescado,
Corteza de box y
——— de yedra, a. onza y med.
Redúzcase á la mitad por la coccion; cuélese por una estameña; déjese reposar; decántese y añádase
Sublimado corrosivo, . . tres gr.
Disuélvase *(bo. ca. pie.)*
Esta fórmula es la que se encuentra en Baume.

R. Antimonio crudo, pulverizado y en un saquito, . cuatro onz.

Póngase en un puchero barnizado, de modo que no toque al fondo, y échese encima

Agua, ... seis lib.

Hágase hervir por doce horas para reducirlo á la mitad y añádase

Zarzaparrilla, ... tres onz.
Cola de pescado, . . , med. onz.

Déjese el cocimiento sobre cenizas calientes por veinte y cuatro horas y cuélese por un lienzo fino. *(ra.)*

Esta última fórmula es la que únicamente se usa en el dia. El antimonio es inútil, y suprimiéndolo se hace la tisana semejante á la precedente.

Si se usa la cola de pescado blanca con el ácido sulfúrico, esta sustancia retiene siempre una cierta cantidad de ácido, que entrando en reaccion con el sulfuro, forma un poco de sulfuro de antimonio. Tal es la causa de los cólicos y vómitos que causa alguna vez esta tisana. Chevallier y Idt creen se originen estos accidentes de un poco de arsénico contenido en el sulfuro, y que el agua disuelve. Por esto debia renunciarse al sulfuro que sería lo mejor sin duda, ó si se quiere absolutamente conservarle, reemplazar la cola de pescado por la goma arábiga, á la dósis de una onza por cada tres cuartillos de tisana.

TISANA DEPURATIVA DE VIGAROUS.

(bo. pie.)

R. Zarzaparrilla, . , . . seis onz.
Hojas de sen mondado, tres onz.
Leño de guayaco ráspado,
—— de sasafras,
Raiz de china,
—— de lirio de Florencia,
Antimonio crudo,
Anís verde,
Cremor de tártaro,
Aristoloquia larga,
———— redonda,
Jalapa quebrantada y
Polipodio de china,
a. . . . . onza y med.
Nueces frescas con la cáscara quebrantada, ... n.° 12.
Vino blanco, ... una azumb.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas sobre cenizas calientes, y añádase despues

Agua de fuente, . . tres azumb.

Hágase disminuir un tercio á un fuego moderado, y cuélese por una manga.

El resíduo forma una tisana mas ligera con cuatro á seis cuartillos de vino blanco y doce á catorce de agua, que debe reducirse tambien á un tercio.

Se toman tres vasos del primer cocimiento en el dia, y el segundo como bebida ordinaria.

Santa María prepara con este cocimiento un *Rob antisyphilítico*, cuya fórmula es la siguiente.

R. Tisana de Vigarous,
media azumb.
Azúcar, ... una á dos lib.

Cuézase hasta la consistencia de arrope.

Este arrope es reputado antisifilítico. — Dósis; una cuch. cuatro veces al dia. Se toma despues de cada dósis un vaso grande de un cocimiento concentrado de zarzaparrilla, y aumentando poco á poco hasta que se consu-

man nueve á diez cucharadas cada dia.

COCIMIENTO CATOLICO. (sa.)

R. Raiz de grama, . . onza y med.
—— de zarzaparrilla, una onz.
Hojas de achicoria,
—— de agrimonia,
—— de betónica,
—— de culantrillo de Montpeller,
—— de borraja, a. . med. puñ.
—— de sen y
Cuscuta, a. . . . . media onz.
Raiz de regaliz, . . . dos drac.
Simiente de anís, . . una drac.
Agua comun, ... cuatro lib.

Cuézase la zarzaparrilla y la grama en agua, y redúzcase esta á la mitad; añádase el regaliz, despues las yerbas; hágase macerar el sen, la cuscuta y el anís en seis onz. de agua hirviendo por algunas horas, y cuélese despues. Mézclese esta infusion con la precedente.

TISANA ANTIVENÉREA PURGANTE.

Cocimiento de guayaco compuesto y purgante; Decoctum antivenereum laxans.

(f. *ca. sp.*)

R. Raiz de zarzaparrilla y
Raspaduras de leño de guayaco,
a . . . . . una onz.
Sub-carbonato de potasa,
veinte y cinco gr.
Agua comun, ... cuatro lib.

Déjense en maceracion por doce horas, menéndolo de tiempo en tiempo; redúzcase despues á tres lib. por la ebulicion, y póngase en infusion en el líquido por media hora

Hojas de sen,
Raspaduras de leño de sasafras y
Regaliz, a. . . . . dos drac.
Ruibarbo y
Cilantro, a. . . . . una drac.

Cuélese esprimiendo ligeramente y decántese despues de frio. (f. *ca.*)

R. Raiz de zarzaparrilla,
—— de china y
Raspaduras de leño de sasafras,
a. . . . . dos drac.
Antimonio crudo, . . . una onz.
Agua de fuente, dos lib. y med.

Redúzcase á dos lib. por la ebulicion y añádase entonces

Raiz de polipodio, . . . med. onz.
—— de ruibarbo, . med. drac.
—— de regaliz,
Hojas de sen mondadas y
Leño de sasafras, a. . una drac.
Sub-carbonato de potasa,
cuatro gr.
Cilantro, ... n ed. drac.

Déjese en infusion por doce horas; hágasele dar despues dos hervores y cuélese. (*sp.*)

Para beber durante el dia.

TISANA DE VINACHE. (*ca.*)

R. Antimonio crudo en un saquito,
dos onz.
Zarzaparrilla,
China y
Leño de guayaco,
a. . . . . onza y med.
Agua, ... azumbre y med.

Redúzcase á una azumbre por la coccion y añádase

Sasafras y
Sen, a, ... media onz.

Cuélese despues de la suficiente in-

fusion ; déjese reposar y decántese.

Usada en las enfermedades venéreas y cutáneas. — Dósis ; muchos vasos al dia.

TISANA DE JAUSSERAND. (*bo.*)

R. Raiz de zarzaparrilla,
——— de china y
Sulfuro de antimonio en un saquito, a. . . . . dos onz.
Sal de tártaro, . . . una drac.
Hojas de sen y
Leño de sasafras, a. . una onz.
Ruibarbo y
Quina quebrantada, a. med. onz.
Agua, ... c. s.

Hágase hervir por ocho horas á fuego manso, en vasija tapada, hasta que no queden mas que tres azumbres de líquido ; déjese en seguida en infusion por el mismo espacio de tiempo y cuélese.

Aconsejado principalmente en las escrófulas.

Dósis ; tres vasos al dia.

TISANA SUDORIFICA DE ASTRUC. (*pie.*)

R. Zarzaparrilla y
Sasafras, a. . . . . dos onz.
Guayaco y
China, a. . . . . onza y med.
Antimonio crudo en un saquito, dos drac.
Agua, ... doce lib.

Déjense en infusion cáliente por doce horas; hiérvase despues suavemente y añádase á lo último

Hojas de sen, ... med. onz.
Raiz de regaliz, . . . onza y med.

COCIMIENTO ANTIARTRITICO. (*ca.*)

R. Zarzaparrilla, . . . cuatro onz.
Antimonio crudo en un saquito, seis onz.
Agua, ... dos lib.

Redúzcase á la mitad por la ebulicion é infúndase en el resíduo

Raiz de regaliz, ... una onz.
Simiente de anís, . . . dos drac.

Aconsejado por Quarin. — Para tomar á vasos.

TISANA DE LISBOA.

Decoctum Lusitanicum, s. *antivenereum Ulssiponense*, s. *sarsaparillæ compositum*, s. *cum mecereo.* (am. b.* du. f.** lo. p. su. *c. sp. sw. sy.*)

R. Leño de sándalo rojo,
——————— blanco,
——— de guayaco,
——— de Rodas,
——— de sasafras, a. . una onz.
Zarzaparrilla, ... tres onz.
Sulfuro de antimonio en un saquito, ... dos onz.
Corteza de mecereon, . med. onz.
Agua hirviendo, ... diez lib.

Infúndanse; cuézase despues hasta que se consuma la mitad y añádase á lo último

Regaliz raspado, . . . med. onz.

Cuélese. (b.* f.** *sp.*)

R. Zarzaparrilla,
Leño de sasafras,
——— de sándalo rojo y
——— de guayaco, a. . tres onz.
Corteza de mecereon, . una onz.
Cilantro, de seis drac. á una onz.

Agua de fuente, . . . veinte lib.
Redúzcase á la mitad por la ebulicion. (*sy.*)

R. Zarzaparrilla, ... seis onz.
Sasafras y
Guayaco, a. . . . . una onz.
Agua, ... diez lib.

Déjense en maceracion por seis horas á un calor suave; redúzcase despues á la mitad por la ebulicion, y añádase á lo último
Regaliz raspado, . . . una onz.
Corteza de mecereon, . tres drac.
Cuélese. (*sw.*)

R. Raiz de zarzaparrilla, . tres onz.
Corteza de mecereon, . dos drac.
Agua de fuente, . . . tres lib.
Redúzcase á dos lib. por la ebulicion y añádase á lo último
Regaliz raspado, . . onza y med.
Cuélense dos lib. de líquido. (b.* *sy.*)

Aconsejado en las enfermedades venéreas, y las afecciones causadas por el abuso del mercurio. — Dósis; quince á cincuenta onz. cada dia, aumentando progresivamente. La última fórmula, preferible á las otras, es de Girtanner.

TISANA ANTIVENEREA. (*sm.*)

R. Zarzaparrilla partida, . dos onz.
Corteza de mecereon, med. drac.
Agua de fuente, . . . tres cuart.
Redúzcase á dos cuartillos por la ebulicion, y añádase al líquido colado una cuch. del licor de Van-Swieten.
Para tomarla en el dia. — Plenk la alaba mucho.

TISANA DE CALLAC.

Ptisana Callaci, Decoctum sarsaparillæ ex Callac. (b.* e.)

R. Zarzaparrilla, ... dos onz.
Mercurio dulce en un saquito, dos drac.
Agua, ... quince lib.
Cuézase hasta que se consuma una tercera parte y añádase en seguida
Hojas de sen mondadas, una onz.
Simiente de cilantro, . seis drac.
Alumbre, ... med. drac.
Háganse hervir todavía por un cuarto de hora y cuélese antes que se enfrie del todo. (e.)

b.* no prescribe mas que dos drac. de cilantro.

Usada en otro tiempo en la curacion de las enfermedades venéreas.

Dósis; seis onz. dos ó tres veces al dia, por un mes ó seis semanas.

TISANA SUDORIFICA Y PURGANTE. (*sm.*)

R. Zarzaparrilla. . . . . cuatro onz.
Agua pura, ... seis cuartillos.
Cuezase por tres horas á fuego manso y añádase á lo último
Sen mondado y
Sal de Epsom, a. . onz. y med.
Regaliz quebrantado, . med. onz.
Cuélese despues de veinte y cuatro horas de infusion.

Dósis; seis onz. tres veces al dia por tres semanas ó un mes. — Se dice ser muy útil en el reumatismo crónico. — Rast es el inventor.

COCIMIENTO DE ZITMANN. (b.*)

R. Zarzaparrilla, ... doce onz.

Agua de fuente, . . noventa lib.
Déjese en digestion por veinte y cuatro horas, y échese en seguida en el líquido un saquito que contenga
Polvos estipticos (ed.),
onz. y med.
Mercurio dulce, . . . med. onz.
Cinabrio de antimonio sublimado,
una drac.
Redúzcase á treinta lib. por la ebulicion y añádase á lo último
Simiente de anís y
——— de hinojo, a. med. onz.
Hojas de sen, ... tres onz.
Raiz de regaliz, . . onz. y med.
Póngase el líquido á parte bajo el nombre de *cocimiento fuerte*, y añádase al residuo
Zarzaparrilla, ... seis onz.
Agua, ... noventa lib.
Hiérvase y añádase á lo último
Corteza de cidra,
Canela,
Cardamomo menor y
Regaliz, a. . . . . tres drac.
Cuélese y póngase el líquido á parte bajo el nombre de *cocimiento flojo*.

Preparacion mas absurda todavía que algunas de las precedentes. — Theden la ha alabado en las enfermedades venéreas. Algunos ignorantes han introducido su uso entre nosotros recientemente como una cosa nueva.

ARROPE ANTISIFILITICO. (*vm.*)

R. Zarzaparrilla, ... quince pt.
Agua, ... ciento veinte pt.
Cuézase en tres veces diferentes reduciéndolo cada una á la mitad; mézclense los tres líquidos colados, clarifiquense, redúzcanse á diez y ocho partes y échese sobre
Hojas de sen,
Flores de borraja,
——— de rosas moscadas y
Simiente de cominos, a. . una pt.
Cuélese, déjese reposar, decántese y añádase
Azúcar blanca, . . . quince pt.
Lícuense á fuego manso y al momento que se enfrie añádase
Miel blanca, ... quince pt.

JARABE DE ZARZAPARRILLA Y DE GUAYACO. (*am. c.*)

R. Zarzaparrilla partida y
Guayaco raspado, a. . . una lib.
Agua, ... cinco azumb.
Hágase hervir por una hora y esprímase. Cuézase de nuevo el residuo con
Agua, ... cinco azumb.
por dos horas, añadiendo á lo último
Pétalos de rosas,
Goma arábiga y
Hojas de sen, a. . . . . una onz.
Gengibre, ... med. onz.
Cuélese y añádase
Miel despumada y
Azúcar, a. . . . . tres lib.
Hágase jarabe.

Este jarabe apenas se diferencia del siguiente mas que en el nombre.

Se puede aproximar este que se llama *Jarabe de Stevery* (b.*) y que se prepara así:

R. Zarzaparrilla y
Leño de guayaco a. . . una lib.
Pétalos de rosas rojas, una onz.
Agua, ... c. s.
Háganse hervir por una hora y decántese el líquido; cuézase el residuo con

igual cantidad de agua por dos horas, y añádase á lo último

Goma arábiga y

Hojas de sen, a. . . . . una onz.

Gengibre, ... med. onz.

Reúnanse los dos cocimientos y añádase

Miel y

Azúcar, a. . . . . tres lib.

Hágase jarabe.

En el hospital de enfermedades venéreas de París se usa la fórmula siguiente. *(ra.)*

R. Zarzaparrilla y

Guayaco, a. . . . . una lib.

Agua, ... doce lib.

Miel blanca y

Azúcar terciada, a. . lib. y med.

JARABE DEL COCINERO.

Jarabe de zarzaparrilla compuesto, *Jarabe de zarzaparrilla y de sen compuesto*, *Jarabe sudorífico y depurativo*; *Syrupus de sarsaparilla compositus*, s. *de sarsaparilla et senna compositus*, s. *sudorificus*, s. *cuisinieri*, s. *smilacis sarsaparillæ*. (am. an. b.* f. ff. *c. ca. sw.*)

R. Zarzaparrilla, ... dos lib.

Agua tibia, ... doce lib.

Déjese en infusion por veinte y cuatro horas, hiérvase despues por un cuarto de hora y cuélese por espresion; hiérvase el residuo con

Agua comun, ... diez lib.

y redúzcase á seis. Repítase la misma operacion dos ó tres veces, mézclense los cocimientos y hiérvanse ligeramente con

Flores de borraja,

—— de rosas blancas,

Hojas de sen y

Simiente de anís, a. . . dos onz.

Redúzcase á la mitad, cuélese y añádase al líquido

Miel blanca y

Azúcar blanca, a. . . . dos lib.

Cuézase hasta la consistencia de jarabe espeso. (b.* f. *ca.*)

Henry es de opinion que debe sufrir la zarzaparrilla una larga maceracion, seguida de una corta ebulicion, y que las flores, el sen y el anís necesitan solamente una infusion, ya sea aparte ó ya en el producto de la primera operacion (f.*); — ff. indica el mismo procedimiento que f., pero suprime las flores de borraja y de rosas, reemplazándolas con las hojas de borraja; — am. y *c.* suprimen tambien las flores de borraja y las reemplazan con una cantidad igual de regaliz, y conservan las rosas; — *sw.* prescribe se hiervan dos veces seguidas dos lib. de zarzaparrilla en nueve de agua reducidas á tres, y que se ponga en infusion en los dos líquidos reunidos onz. y med. de sen, de flores de borraja, de rosas moscadas y de cominos, que se cuele y se haga un jarabe clarificado con dos lib. de azúcar, y otro tanto de miel de buena calidad; — an. que se pongan en infusion dos lib. y med. de zarzaparrilla en veinte y cuatro de agua caliente por veinte y cuatro horas, que se cuezan despues hasta que solo queden ocho lib. de líquido colado, que se repita la operacion otras dos veces seguidas con el residuo, que se tomen veinte y cuatro lib. del cocimiento preparado así, que se reduzcan á la mitad por la evaporacion, añadiendo á lo último dos onz. de flores de

borraja, otras dos de rosas rojas, lo mismo de sen y otro tanto de anís, y que se haga el jarabe evaporando lentamente el líquido colado con dos lib. de azúcar y otro tanto de miel despumada.

Pelletan quiere que se hiervan muchas veces seguidas dos lib. de zarzaparrilla en c. s. de agua, que se reduzca el líquido á dos lib., que se hiervan tambien dos onz. de sen en dos lib. de agua por un cuarto de hora, que se deje en infusion en los dos líquidos reunidos dos onz. de flores de borraja, otras dos de las de buglosa, lo mismo de rosas blancas y otro tanto de anís, que se cuele, que se añadan dos lib. de miel y otro tanto de azúcar blanca, que se clarifique, y en fin que se cueza hasta la consistencia de jarabe.

Gesnouin aconseja el procedimiento siguiente:

R. Zarzaparrilla partida,
veinte y cuatro lib.
Agua hirviendo, ciento setenta lib.
Déjese en infusion por doce á quince horas, hiérvase despues por dos, añadiendo un cuarto de hora antes de retirarlo del fuego
Hojas de sen, una lib. y ocho onz.
Cuélese y échese sobre el residuo
Agua hirviendo, . . . quince lib.
Cuélese por espresion y añádase al líquido colado
Miel blanca, . . diez y ocho lib.
Azúcar terciada, . . . treinta lib.
Clarifíquese con clara de huevo y échese encima de
Cominos quebrantados,
una lib. y ocho onz.
Cuézase hasta la consistencia de jarabe, y añádase á este cuando esté aun hirviendo

Estracto de borraja, cuatro lib.

Keraudren ha reducido esta fórmula á una mas pequeña:

R. Jarabe de zarzaparrilla ó de borraja, ... doce lib.
——— de sen, ... ocho onz.
Caliéntese al B. M. y añádase
Estracto de borraja, . . . una lib.
Arrope de sauco, . . . tres onz.
Méz. hasta la perfecta disolucion y cuélese.

Lagneau la ha reducido todavía con ventaja:

R. Jarabe de zarzaparrilla,
cuatro lib.
——— de sen, ... tres onz.
Caliéntese y añádase
Estracto de borraja, . . cinco onz.
Arrope de sauco, . . . una onz.

JARABE VINOSO DE ZARZAPARRILLA.
(*bo. pie.*)

R. Raiz de zarzaparrilla, lib. y med.
——— de aristoloquia larga,
——————— redonda,
——— de jalapa,
——— de polipodio,
——— de china,
Leño de guayaco,
——— de sasafras,
Cremor de tártaro,
Sulfato de antimonio en un saquito y
Anís verde, a. . . . . seis onz.
Hojas de sen, ... doce onz.
Vino blanco, ... seis azumb.
Déjese en maceracion por seis horas en vasija tapada, y añádase en seguida

Agua, ... treinta cuartillos.

Hágase hervir por una hora á fuego manso, cuélese y échese sobre el residuo

Vino blanco, ... tres azumb.

Déjese en maceracion por tres horas y añádase en seguida

Agua, ... cuatro azumb.

Hiérvase por media hora, cuélese, méz. los dos líquidos, déjense reposar, decántense y añádase

Melaza y

Azúcar terciada, a. . . nueve lib.

Cuézase sin clarificar hasta la consistencia de jarabe.

ZARZAPARRILLA DE ALEMANIA.

Carex arenaria, L.

Sandsegge, Al.; laiche, F.; soa sedge, In.

an. ba. br. d. f. fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. ww. *g. m.*

Planta bienal de Alemania y del norte de Europa (monandria triandria, L.; cyperaceas, J.).

Se usa la raiz (*radix Graminis majoris*, s. *rubri*, s. *Caricis arenariæ*, s. *Salsaparillæ Germanicæ*) que es larga, cilíndrica, del grueso de una paja hasta el del cañon de una pluma de escribir, algo leñosa, ordinariamente simple, y entonces es articulada, con escamas morenas y raicillas en las articulaciones, de color moreno rojizo por fuera, y blanca y farinácea por dentro. Tiene un olor ligeramente aromático, y el sabor farinácco, suave y algo amargo.

Es ligeramente escitante; pasa por diurético, diaforético y depurativo, y se ha alabado mucho en la curacion de las enfermedades venéreas para sostituir á la zarzaparrilla.

ESPECIES SUDORIFICAS.

Species decocti lignorum. (fu.)

R. Zarzaparrilla germánica,

diez y seis onz.

Raspaduras de leño de guayaco,

ocho onz.

Pártanse y méz.

TISANA DIURETICA.

R. Raiz fresca de zarzaparrilla germánica, ... cuatro onz.

Agua, ... tres azumb.

Cuézase y añádase á lo último

Regaliz raspado, . . cuatro drac.

Cuélese despues de frio.

ARROPE ANTISIFILITICO. (b.*)

R. Raiz de grama, . . . lib. y med.

—— de zarzaparrilla germánica,

una lib.

Macérese, cuézase despues en agua hasta la consistencia de arrope y añádase

Hinojo y

Hojas de sen, a. . . . . dos onz.

Flores de rosas rojas, . una onz.

Miel y

Azúcar, a. . . . . una lib.

Méz. á un calor suave y cuélese.

Esta fórmula se ha creido que es la del *Rob de Laffecteur.*

ZEDOARIA.

Zetterwurzel, Al.; Zedoary, In.; Zedoaire, F.

ams. an. b. ba. be. br. du e f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. li. o. po. pr. r. s. su. w. wu. *a. bé. br. c. g. m. pid. sa. sp. z.*

Se distinguen dos especies de zedoaria.

1.ª La *larga*, *Zedoaria larga*, de algunas pulgadas de largo, del grueso de un dedo, rizada, nudosa, gris por fuera y morena por dentro.

2.ª La *redonda*, *Zedoaria rotunda*, de una pulgada de largo, áspera en su superficie, arrugada y cubierta de fibrillas.

Esta sustancia se presenta en pedazos duros, blanquecinos y despojados de la película esterior; es aromática, acre y picante.

Contiene mucho almidon y un aceite esencial alcanforado.

La Zedoaria larga se considera generalmente como una raiz del *Amomum Zedoaria*, Willd, planta bienal de las Indias Orientales. En cuanto á la redonda, algunos autores creen que proviene del *Kaempferia rotunda*, L., de cuya opinion son Ainslie y Guibourt. Otros con Merat creen que no son mas que variedades de la raiz de una misma planta, dependiente del lugar y del modo de crecer.

Es escitante, tónica y estomacal.—La dósis del polvo es de med. escrp. á una drac.

ESTRACTO DE ZEDOARIA.

Extractum Zedoariæ. (br. pa. sa. w.)

R. Raiz de zedoaria, . . . una lib.
Alcohol, ... cinco á seis lib.

Despues de la suficiente estraccion cuélese por espresion, digiérase, hiérvase despues un poco el residuo con tres lib. de agua, clarifíquese el cocimiento con clara de huevo, reúnanse los dos líquidos, estráigase el alcohol por la destilacion y evapórese lentamente el residuo (br. pa. w.)

R. Zedoaria, ... una lib.
Vino blanco generoso,
cinco á seis lib.

Déjese en digestion por tres dias al B. A., hiérvase despues el residuo con c. s. de nuevo vino y redúzcase á la mitad, méz. los los líquidos y evapórense lentamente hasta la consistencia de estracto. (sa.)

TINTURA DE ZEDOARIA.

Tinctura, s. *essentia Zedoariæ.* (ams. br. han.)

R. Raiz de zedoaria, ... una pt.
Alcohol (0,907). . . . ocho pt.

Téngase en digestion por ocho dias y filtrese. (ams.)

br. prescribe una parte de raiz y cinco de alcohol; — han. cinco onz. de raiz y dos lib. de alcohol.

Es escitante. — Dósis; sesenta got. dos veces al dia.

TINTURA DE ZEDOARIA COMPUESTA.

Esencia carminativa de Wedel: *Tinctura Zedoariæ composita*, *Essentia carminativa Wedelii* (b.* br. han. pa. s. w. *ca. sp.*)

R. Raiz de zedoaria, . . cuatro onz.
—— de carlina,
—— de cálamo aromático y
—— de galanga, a. . . dos onz.
Flores de manzanilla romana,
Simiente de anís y
——— de alcaravea, a. una onz.
Clavos de especia y
Bayas de laurel, a. . . seis drac.
Macias, ... med. onz.

Corteza de naranja, . . med. onz.
Espíritu de corteza de cidra,
cuatro lib. y med.
Espíritu de nitro dulce,
dos onz. y med.

Déjese en infusion por seis dias, esprímase y fíltrese (b.* br. han. s. w. *sp.*)

R. Raiz de zedoaria, . una onz.
——— de carlina y
——— de galanga, a. med. onz.
Corteza de naranja,
Simiente de anís,
——— de alcaravea,
Flores de manzanilla romana,
Clavos de especia,
Bayas de laurel y
Acor verdadero, a. drac. y med.
Macias, ... una drac.
Espíritu de corteza de cidra,
dos lib.
Acido nítrico, ... med. onz.

Déjese en digestion lo suficiente y fíltrese. (b.* pa.)

R. Raiz de zedoaria, . . . una onz.
——— de carlina,
——— de cálamo aromático y
——— de galanga, a. . med. onz.
Flores de manzanilla,
Simiente de anís,
——— de alcaravea y
Corteza seca de naranja,
a. . . . . dos drac.
Bayas de laurel y
Clavos de especia, a. drac. y med.
Macias, ... una drac.
Espíritu de cidra, . . . una lib.
Acido nítrico, . . . cinco drac.

Es escitante reputado estomacal, carminativo, emenagogo y diurético.—Dósis, de med. á una drac.

TINTURA BEZOARDICA.

Tinctura bezoardica. (pa. w. *sp.*)

R. Raiz de zedoaria,
——— de serpentaria de Virginia,
——— de angélica,
——— de borraja,
Yerba de escordio,
——— de dictamo de Creta,
Enebro,
Corteza de cidra y
Mirra, a. . . . . seis drac.
Espíritu rectificado de flores de sauco, ... una lib.

Despues de la digestion suficiente cuélese por espresion, y añádase al líquido

Espíritu de tártaro, . . seis onz.
——— de vitriolo, . . dos onz.
Alcanfor, ... med. onz.

Dejése en digestion, fíltrese y consérvese. (pa. w.)

R. Raiz de zedoaria, . . dos onz.
——— de angélica,
——— de borraja,
——— de valeriana,
de vencetosigo y
——— de cálamo aromatico,
a. . . . . una onz.
——— de costo arábigo,
Corteza fresca de cidra y
Enebro, a. . . . . dos onz.
Mirra, ... tres onz.
Yerba de escordio, onz. y med.
——— de torongil,
——— de miel en rama y
——— de ruda,
a. . . . . setenta y dos onz.
Alcanfor, ... una onz.
Triaca, ... una lib.

Alcohol, ... seis lib.
Déjese en digestion por ocho dias y añádase
Agua de fuente, ... dos lib.
y destílese. Entonces
R. de este espíritu, ... dos lib.
Espíritu de tártaro, . med. lib.
Acido sulfúrico, ... tres onz.
Méz., coloreese con zumo de bayas de yerba paris y fíltrese. (w. *sp.*)

Es escitante aconsejado en otro tiempo en las calenturas pútridas. — Dósis; med. drac.

ACEITE ESENCIAL DE ZEDOARIA.

Oleum Zedoaria œthœreum, œthœroleum Zedoariœ. (br. pa. w.)

R. Zedoaria, ... seis pt.
Agua, ... treinta y seis pt.
Sal comun, ... una pt.
Déjese en maceracion por cuatro ó cinco dias, destílese y recójase el aceite del fondo del recipiente.

AGUA DE ZEDOARIA VINOSA.

Aqua Zedoariœ vinosa. (br. w.)

R. Zedoaria, ... una pt.
Vino generoso, ... doce pt.
Destílese la mitad. (w.)

R. Zedoaria, ... seis onz.
Vino, ... tres lib.
Alcohol y
Agua, a. . . . . lib. y med.
Destílense cuatro lib. (br.)

AGUA DE ZEDOARIA ANISADA.

Aqua Zedoariœ anisata. (pa. sa. w. *pid.*)

R. Zedoaria, ... seis onz.
Anís, ... tres onz.
Corteza de cidra, . . . dos onz.
Alcohol, ... seis lib.
Destílese la mitad. (*pid.*)

pa. sa. y w. prescriben seis onz. de zedoaria, tres onz. de anís, una onza de corteza de cidra y ocho lib. de vino blanco, y que despues de ocho dias de digestion se destile la mitad.

ZINC.

Zincum, Stannum indicum.

Zink, Al.; zinc, F.; zinco, I. Por.

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. su. wu. *a. c. pid. sp.*

Metal sólido de color blanco azulado, laminar, muy ductil; pero mas fácil de estenderse en hojas que en hilo, poco duro, que se funde á menos calor que el rojo, volatilizable, que arde en llama de las mas vivas y que egerce una accion muy débil sobre el aire húmedo. Su peso específico es de 7,1.

CLORURO DE ZINC.

R. Acido hidroclórico puro, tres onz.
Echese poco á poco en el zinc en granos hasta que no disuelva mas, dilátese la solucion en tres onz. de agua, fíltrese el líquido y evapórese hasta la sequedad.

Astringente y vomitivo.

SOLUCION ETÉREA DE HIDROCLORATO DE ZINC.

Æther zinci. (b.* *om.*)

R. Hidroclorato de zinc seco, med. onz.
Alcohol concentrado, . . una onz.

Eter sulfúrico , ... dos onz.
Decántese despues de algunos dias.
Antiespasmódico.—Dósis ; cuatro á ocho got. dos veces al dia.

CIANURO DE ZINC.

Hydrocyanas zinci. (b.* *ma.*)

R. Hidrocianato de potasa , . c. s. q.
Echese en la solucion de esta sal sulfato de zinc hasta que no forme precipitado ; séquese y calcínese este al rojo obscuro.

El producto es una mezcla de cianuro de zinc y de potasio.—Se ha alabado en la cardialgia nerviosa. — Dósis ; de un cuarto de gr. hasta gr. y med. en una pocion , tomándolo á cuch.

POLVOS ANTIESPASMODICOS. (*ma.*)

R. Cianuro de zinc , . . med. gr.
Magnesia calcinada , , cuatro gr.
Canela , ... tres gr.
Para tomar cada cuatro horas.

PROTOXIDO DE ZINC.

Oxydum , s. *Oxodes zinci* , s. *zincicum* , *zincicum oxidatum.*

A. *Como se encuentra en el comercio.*

1.° *Nihil album.*

b. br. fi. pp. s. su. w. wu. *pa. sp.*

Se presenta en copos muy blancos y muy ligeros, insípidos , inodoros é insolubles en el agua, que se forman mientras la combustion del zinc al aire libre.

2.° *Tucia* , *Cadmia de los hornos; Tutia* , *Tuthia* , *Tutia Alexandrina, Botrytis* , *Nihilum griseum* , *Oxydum Zincicum griseum.*

am. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. han. he. lo. o. p. s. su. wu. ww. *c. sp.*

En escamas gruesas, compactas, pesadas, de un gris ceniciento , duras, difíciles de romper , manchadas y llenas de aspereza , de que se forman en las chimeneas de los hornos.

Es protóxido mezclado con sustancias estrañas.

3.° *Calamina* , *Cadmia fosil, Piedra calaminar, Zinc oxidado calaminar* (H.) ; *Hydrosilicato de zinc* (B.); *Calamina , calaminaris lapis , Carbonas zinci impurus , Carbonas zinci terrestre, Oxydum zinci nativum , zincum terrestre.*

am. ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. ham. he. li. lo. o. p. s. su. w. ww. *c. g. pid. sp.*

Se presenta en masas irregulares, pesadas , blanquecinas , agrisadas ó rojizas.

El nombre con que designa Beudant esta sustancia , espresa perfectamente su naturaleza. Es un silicato hidratado de zinc, que accidentalmente contiene óxido de hierro , alumbre y carbonato de cal.

B. *Preparado.*

1.° Sin humedad : *Flores de zinc; Flores zinci , Nihil album , Pompholix, Lana philosofica , Oxidum zincicum* , s. *zinci album* , s. *zinci per se, Oxodes zinci album, Calx zinci, Zincum oxidatum album.*

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. han. he. li. lo. p. pa. po. r. s. su. w. wu. *br. c. pid. sp. sw. vm.*

R. Zinc, ... c. s. q.

Echese en un crisol ancho y profundo; colóquese este en medio de carbon y aplíquese el fuego hasta que el metal entre en infusion y arda; tápese entonces el crisol con otro crisol boca á bajo, y recójanse los copos que se reunen en este último.

2.º Mediante la humedad: *Magisterio de zinc; Magisterium zinci, zincum precipitatum.*

ams. d. f. fe. han. li. o. pr. s. *um.*

R. Sulfato de zinc, ... c. s. q.

Disuélvase en cantidad suficiente de agua, y échese poco á poco en la solucion sub-carbonato de potasa ó de sosa hasta que no se forme precipitado; lávese y séquese este.

El producto es sub-carbonato de zinc: f. le nombra dos veces con los títulos de óxido de zinc por precipitacion, y carbonato de zinc.

El óxido de zinc se usa al esterior como astringente, y al interior como antiespasmódico y vomitivo. Se ha preconizado en la epilepsía, el histerismo y las nevralgias. — Dósis; de seis granos á med. drac. — Se da en forma de píldoras.

POLVOS ANTIESPASMODICOS.

Pulvis zinci oxidati albi. (fu. *au.*)

R. Flores de zinc, ... doce gr.
Azúcar, ... una drac.

Divídase en seis papeles. — Dósis; uno por la mañana y tarde en la coqueluche y las enfermedades convulsivas de los niños. (*au.*)

R. Flores de zinc, . . . una drac.
Opio, ... diez gr.
Quina é
Hinojo, a. . . . . una onz.

Divídase en cincuenta papeles. — Dósis; uno cada dos horas en la coqueluche. (*au.*)

R. Flores de zinc, ... tres gr.
Escila en polvo y
Azufre dorado de antimonio,
a. . . . . drac. y med.
Sub-carbonato de magnesia,
una drac.

Divídase en seis papeles. — Dósis; uno cada dos horas en el asma reumatismal espasmódica. (*au.*)

R. Flores de zinc, , . . . doce gr.
Opio, ... tres gr.
Estracto acuoso de quina amarilla,
una drac.
Oleosácaro de anís, . . dos drac.

Divídase el polvo en doce papeles. (fu.)

POLVOS ESTOMACALES. (*b.*)

R. Flores de zinc, ... un gr.
Magnesia calcinada, . un escrp.

Para tomar de dos en dos horas en la dispepsia.

R. Flores de zinc, . . . cuatro gr.
Colombo, ... treinta gr.

Divídase en cuatro papeles. — Dósis; uno cada tres horas.

COLIRIO SECO. (*ca. ra.*)

R. Tucia y
Azúcar cande, a. . . med. drac.

Háganse polvos muy finos. (*ra.*)

R. Tucia,
Lirio de Florencia y
Azúcar cande, a. . . . part. ig.
Háganse polvos muy finos. (*ca.*)

POLVOS CEFALICOS NEGROS.

Pulvis cephalicus niger. (li.)

R. Flores de zinc, . . . una drac.
Polvos de carbon, a. . . una onz.
Dósis; quince á veinte gr. para un niño de un año.

POLVOS ANTISTRUMOSOS. (*au. sm.*)

R. Oxido de zinc, . . cuatro onz.
Huesos de gibia y
Cáscaras de huevo, a. . dos onz.
Paño de escarlata, . onz. y med.
Quémense juntos en vasija tapada y pulvericese el residuo. (*sm.*)

au. prescribe med. onz. de oxido, dos drac. de cáscaras de huevo y drac. y med. de paño.

Dósis; diez y ocho gr. dos veces al dia para un adulto. — Este remedio es recomendado por Dehaem.

BOLOS CALMANTES Y DIAFORETICOS.

Boli diaphoretici sedantes. (*b.*)

R. Flores de zinc y
Estracto de acónito,
a. . . . . cuatro gr.
Azufre dorado de antimonio,
dos gr.
Regaliz en polvo y
Miel, a. . . . . c. s.
Háganse cuatro bolos. — Dósis; uno cada dos horas en la ciática, la coréa, el histerismo, los reumatismos y la gota crónica.

PÍLDORAS CALMANTES. (g. *b. e.*)

R. Flores de zinc, . . . dos escrp.
Conserva de cinorrhodon, . c. s.
Háganse veinte y cuatro píldoras. (g *e.*)

R. Flores de zinc, ... ocho gr.
Estracto de acónito, . . seis gr.
Háganse seis píldoras. — Dósis; una cada cuatro horas. (*b.*)

Estas píldoras han sido recomendadas en la epilepsía, la coréa y los exantemas crónicos.

COLIRIO ASTRINGENTE. (*sw.*)

R. Flores de zinc, . . . una drac.
Mucílago de simiente de membrillo preparado con agua de rosas,
diez onz.
Tritúrense juntos.

LOCION ASTRINGENTE.

Lotio è zinco et cupro composita.

(*au. e. sw. sp.*)

R. Flores de zinc, ... doce gr.
Sulfato de cobre, tres ó cuatro gr.
Miel rosada, ... una drac.
Agua de cal, ... dos onz.
Aconsejada para la curacion de las úlceras venéreas. (*e. sw. sp.*)

R. Flores de zinc, ... una onz.
Agua de flores de sauco,
onz. y med.
Thuessink alababa esta preparacion en la erisipela postulosa. (*au.*)

COLIRIO RESOLUTIVO. (*pie. sp.*)

R. Tucia, ... med. drac.
Aloes, ... una drac.
Agua de rosas,
—— de hinojo y
—— de eufrasia, a. . . una onz.
Méz. (*pie.*)

Es probable que la idea de esta fórmula se haya formado por la siguiente que *sp.* trae con el nombre de *Aqua opthalmica*, y cuyo producto no contiene ciertamente ningun átomo de zinc.

R. Tucia pp.,
Clavos de especia y
Azúcar cande, a. . . . una onz.
Alcanfor y
Acibar, a. . . . . drac. y med.
Vino de España,
cuarenta y ocho onz.
Agua de rosas blancas, seis onz.
—— de celedonia,
—— de hinojo,
—— de eufrasia y
—— de ruda, a. . . . dos onz.
Déjense en maceracion al sol por quince dias y decántese.

Se encuentra en br. con el título de *Aqua ophthalmica usualis* una fórmula que se parece un poco á la de *pie.* y es la siguiente:

R. Agua de rosas y
—— de hinojo, a. . . cinco onz.
Tucia pp., ... seis drac.
Acetato de plomo, drac. y med.
Alcanfor, ... una drac.
Sulfato de zinc, . . . dos escrp.
Méz. ex. y consérvese.

POMADA DE OXIDO DE ZINC.

Ungüento gris, *Ungüento oftálmico*, *Ungüento de tucia*, *Cerato calaminar ó de Turner*; *Ceratum calaminæ*, s. *calaminare*, s. *spuloticum*, s. *è zinco*, *Unguentum calaminare*, s. *lapidis calaminaris*, s. *è lapide calaminare*, s. *carbonatis zinci impuri*, s. *oxidi zinci*, s. *oxidi zinci impuri*, s. *natibi*, s. *nihilo*, s. *tutiæ*, s. *zinci*, s. *griseum*, s. *nihili ad oculos*, s. *ophthalmicum album*, s. *diapompholigos*. (am. ams. b. du. ed. f. fi. fu. g. ham. han. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. *au. br. c. ca. e. hp. pie. sp. sw.*)

R. Aceite comun, ... dos pt.
Cera amarilla, ... una pt.
Añádase á la mezcla licuada
Calamina en polvo, . . . una pt.
Menéese hasta que se enfrie. (am. b.* han. lo. p. *e. sw.*)

fu. prescribe doce partes de aceite, seis de cera y cuatro y med. de calamina; — ams. dos de aceite, una de cera y una y med. de calamina; — *ca.* seis de aceite, una de cera blanca y una de calamina.

R. Manteca de puerco,
treinta y dos pt.
Cera blanca, ... una pt.
Lícuese y añádase
Tucia, ... ocho pt.
Méz. ex. (p.)

R. Cerato, ... ocho pt.
Oxido de zinc, ... una pt.
Tritúrense y mézclense ex. (b. han, o. po. pr. s.)

du. prescribe doce partes de cerato

y una y media de óxido de zinc; — du. cd. y *c.* cinco de cerato y una de óxido; — g. doce de cerato y una de óxido; — *au.* dos dracmas de óxido y una onza de pomada de rosas.

R. Manteca de puerco, . . seis pt.
Oxido de zinc, ... una pt.
Méz. por trituracion. (fi. lo. *c.*)

pie. prescribe dos partes de manteca y una de óxido; — pa. dos de grasa de ganso y una de óxido; — ham. tres de manteca y una de óxido; — fu. tres de manteca de vacas y una de óxido; — *br.* y *sw.* cuatro de manteca y una de óxido; — *pie.* cuatro de manteca de vacas y una de óxido; — am. *br.* y *c.* cinco de manteca de puerco y una de vacas; — an. y be. ocho de manteca y una de óxido; — li. tres de manteca de puerco, seis de vacas fresca y una de óxido; — *hp.* ocho de manteca y una de óxido; — e. seis de manteca de vacas y una de óxido.

R. Oxido de zinc, ... una pt.
Manteca de vacas lavada con agua de rosas y
Ungüento rosado, a. . . . dos pt.
Méz. ex. (f.)

R. Manteca de puerco,
veinte y cuatro pt.
Madre de perlas y
Coral rojo, ... una pt.
Tucia y
Nihil album, a. . . . . dos pt.
Méz. ex. *(sp.)*

POMADA DE ÓXIDO DE ZINC ALCANFORADA.

Ungüento ocular; Unguentum nihili, s. *nihili ad oculos*, s. *ophthalmicum*, s. *zinci.* (br. d. pa. w. *sw. vm.*)

R. Oxido de zinc, ... una onz.
Alcanfor, ... un escrp.
Manteca de puerco, . . seis onz.
Méz. por trituracion. (d.)

R. Manteca, ... seis onz.
Aceite de almendras dulces, tres onz.
Cera blanca, ... dos onz.
Lícuese y añádase
Oxido de zinc, ... tres onz.
Alcanfor triturado con aceite, tres drac.
Méz. ex. *(sw.)*

vm. prescribe una onz. de aceite de almendras dulces, med. onz. de manteca, otro tanto de cera, onz. y med. de calamina, dos drac. de tucia y med. drac. de alcanfor.

R. Tucia pp. y
Nihil album, a. . . . . una onz.
Coral rojo y
Madre perlas, a. . . . med. onz.
Alcanfor, ... una drac.
Manteca de puerco, . . una lib.
Méz. por trituracion. (br. pa. w.)

POMADA ANTIHEMORROIDAL.

Ungüento desicativo, Cerato de Hufeland. (b.* *au. ca. pie.*)

R. Flores de zinc y
Polvos de licopodio, a. una drac.
Cerato, ... med. onz.
Tritúrense juntos. *(au. pie.)*

b.* prescribe una dracma de óxido, otra de licopodio y cuatro onzas de ungüento rosado; — y *ca.* treinta y

seis granos de óxido, otro tanto de licopodio y una onza de cerato de esperma de ballena.

R. Flores de zinc y
Polvos de licopodio, a. quince gr.
Manteca de puerco, . med. onz.
Agua de rosas y
—— de llanten, a. . . . . c. s.
Tritúrese y méz. ex. *(pie.)*

CERATO DESECANTE.

Ceratum, s. *Unguentum exicans*, s. *ophthalmicum*, s. *ad ambusta.* (b.* han. *bo. ca.*)

R. Aceite comun, ... ocho onz.
Cera amarilla, . . . onz. y med.
Lícuense y añádase
Bol arménico, ... una onz.
Flores de zinc, . . . med. onz.
Méz. ex. (han.)

R. Aceite comun, . . . cuatro onz.
Cera blanca y
Calamina, a. . . . . una onz.
Acetato de plomo, . . dos drac.
Hágase un cerato. *(bo.)*

R. Tucia,
Acetato de plomo y
Calamina, a. . . . . dos escrp.
Alcanfor, ... cuatro gr.
Ungüento rosado, ... c. s.
Tritúrense juntos. (b.*)

UNGUENTO OFTALMICO ROJO.

Unguentum ophthalmicum Sloani. (sp.)

R. Tucia, ... una onz.
Hematites, ... dos escrp.
Aloes, ... doce gr.
Perlas pp, ... cuatro gr.
Grasa de víbora, ... c. s.
para hacer ungüento.

UNGUENTO OFTALMICO VERDE.

Unguentum oculare Keiseri. (ams.)

R. Tucia, ... med. onz.
Alcanfor, ... una drac.
Verde gris, ... doce gr.
Manteca de puerco, . . dos onz.
Méz.

UNGUENTO OFTALMICO BLANCO.

Unguento ocular blanco. (vm.)

R. Oxido de zinc, ... tres drac.
Mercurio dulce, . . . med. drac.
Alcanfor, ... un escrp.
Cera blanca, ... dos drac.
Manteca de cacao y
Aceite de almendras dulces, a. una onz.
Méz. por trituracion.

EMPLASTO GRIS.

Emplastrum griseum, s. *de lapide calaminari*, s. *consolidans*, *Pamphilus chirurgorum.* (ams. b.* br. d. dd. fu. han. li. pa. s. su. w. wu. *sp. vm.*)

R. Calamina, ... una lib.
Litargirio, ... med. lib.
Aceite comun, . . . lib. y med.
Cuézase meneando sin cesar. (b.* fu.)

R. Emplasto simple, . lib. y med.
Cera amarilla y
Aceite comun, a. . . nueve onz.
Lícuense y añádase
Calamina en polvo, lib. y med.
Méz. ex. (ams.)

R. Emplasto simple y

Calamina en polvo, a. . una lib.
Cera amarilla, ... seis onz.
Sebo de macho cabrío y
Trementina, a. . . onz. y med.
Lícuense y méz. ex. (d.)

su. y *vm.* prescriben dos lib. de emplasto simple, otro tanto de calamina, cinco onz. de cera, onz. y med. de sebo y otro tanto de trementina.

R. Emplasto simple, . . . seis onz.
Lícuese y añádase
Calamina en polvo, . . dos onz.
Polvos de almáciga y
——— de incienso, a. una drac.
Méz. ex. (s.)

R. Emplasto simple, . . . una lib.
Aceite comun, ... cinco onz.
Lícuese y añádase
Polvos de calamina, cuatro onz.
——— de mirra y
——— de incienso, a. . dos drac.
Méz. ex. (han.)

li. prescribe diez onz. de emplasto simple, ocho onz. de aceite comun, seis de calamina, una de almáciga y med. de incienso.

R. Aceite de nabos, diez y ocho onz.
Calamina, ... doce onz.
Litargirio, ... seis onz.
Cera amarilla, ... una onz.
Lícuense y méz. ex. (dd.)

R. Calamina,
Litargirio y
Albayalde, a. . . . . med. lib.
Incienso, ... med. onz.
Almáciga, ... una onz.
Aceite comun, ... c. s.
Hágase emplasto. (wu.)

R. Cera, ... tres onz.
Sebo de ciervo, . . , cuatro onz.
Trementina, ... onz. y med.
Lícuense y añádase
Polvos de calamina,
——— de litargirio,
a. . . . . onza y med.
——— de tucia,
——— de almáciga y
——— de incienso, a. med. onz.
Alcanfor triturado con un poco de
aceite, ... una drac.
Méz. con cuidado. *(sp.)*

br. y w. prescriben tres onz. de cera, cuatro de sebo, una y med. de trementina, una de calamina, dos de litargirio, med. de tucia, otro tanto de almáciga, lo mismo de incienso, dos drac. de mirra y drac. y med. de alcanfor; — pa. ocho onz. de cera, otro tanto de sebo, seis onz. de trementina, cuatro de calamina, tres de litargirio, lo mismo de albayalde, med. onz. de tucia, y otra med. de almáciga, de incienso, de mirra y de alcanfor.

EMPLASTO DIAPONFOLIGOS.

Emplastrum diapompholigos, s. *zinzicoplumbicum.* (ams. b. br. fi. han. s. su. w. *sp. vm.*)

R. Emplasto gris, . diez y seis pt.
Plomo quemado, ... una pt.
Lícuense y méz. ex. (s.)

R. Aceite de yerba mora,
treinta y cuatro pt.
Albayalde, ... diez pt.
Cuézase y añádase
Cera, . . . treinta y cuatro pt.
Plomo quemado, . . . seis pt.
Pomfolix é
Incienso, a. . . . . cuatro pt.
Méz. ex. *(sp.)*

br. y w. prescriben dos lib. y med.

de aceite de yerba mora, onz. y med. de albayalde, treinta onz. de cera blanca, onz. y med. de plomo quemado, cuatro de pomfolix, y otras cuatro de incienso; — *vm.* seis partes de aceite comun, diez de albayalde, ocho de cera, una de resina comun, dos de plomo quemado, dos de pomfolix y dos de tucia.

R. Aceite comun, ... med. lib.
Cera amarilla, ... una lib.
Lícuense y añádase
Plomo quemado, . . . med. lib.
Albayalde, ... cuatro onz.
Pomfolix, ... tres onz.
Incienso, ... onza y med.
Méz. ex. (fi. su.)

b. prescribe siete partes de aceite, doce de cera, seis de plomo quemado, cuatro de albayalde, tres de pomfolix y una y med. de incienso; — ams. treinta de aceite, treinta y seis de cera, doce de plomo quemado, ocho de albayalde, seis de pomfolix y dos y med. de incienso; — han. quince de aceite, diez y seis de cera, tres de plomo quemado, tres de albayalde, dos de pomfolix y dos de incienso.

EMPLASTO SATURNINO.

Emplastrum saturninum Mynsichti. (pa. w.)

R. Sebo de macho cabrío y
Cera blanca, a. . . onza y med.
Trementina, ... seis drac.
Lícuense y añádase
Polvos de plomo quemado, dos onz.
——— de calamina,
——— de albayalde, a. med. onz.
——— de pomfolix,
Polvos de tucia, a. . . dos drac.
——— de mirra,
——— de almáciga y
——— de incienso, a. una drac.
——— de acibar,
——— de alcanfor y
——— de nitro, a. . med. drac.
Méz. (pa.)

w. prescribe cinco onz. de sebo, otro tanto de cera amarilla, dos onz. de trementina, otro tanto de plomo quemado, med. onz. de calamina, otro tanto de albayalde, dos drac. de pomfolix, otras dos de tucia, una drac. de mirra, otra de almáciga, otra de incienso, otra de acibar, otra de nitro, y med. drac. de alcanfor.

UNGUENTO DIAPONFOLIGOS.

Ungüento de piedra calaminar; Unguentum diapompholigos, s. *pompholigis*, s. *exsicans*, s. *ad ambusta.* (br. o. pa. sa. w. *sp. vm.*)

R. Ungüento de plomo,
treinta y dos onz.
Calamina en polvo, . cuatro onz.
Méz. ex. (o.)

R. Alcanfor, ... una drac.
Albayalde, ... med. onz.
Cera amarilla y
Calamina, a. . . . . dos onz.
Aceite comun, ... cinco onz.
Tritúrese el albayalde y la calamina con un poco de aceite; añádase lo restante del aceite mezclado con la cera disuelta; despues el alcanfor triturado con un poco de aceite, meneándolo hasta que se enfrie. (*vm.*)

R. Aceite de yerba mora,
diez y seis onz.

Cera, ... cinco onz.
Lícuese suavemente y añádase
Polvos de albayalde, . . dos onz.
——— de pomfolix,
——— de plomo quemado y
——— de incienso, a. . una onz.
Méz. *(sp.)*

R. Aceite rosado, ... dos lib.
Zumo de bayas de yerba mora, cuatro onz.
Cuézase hasta que se consuma la humedad y añádase
Cera blanca, ... seis onz.
Polvos de albayalde, . . dos onz.
——— de plomo quemado,
——— de tucia y
——— de incienso, a. . una onz.
Méz. ex. (sa.)

br. y w. prescriben seis onz. de aceite rosado, cuatro de zumo de yerba mora, otro tanto de cera, una onz. de plomo quemado, otra de pomfolix y lo mismo de incienso; — pa. indica las mismas proporciones, pero reduce la cera á tres onz. y reemplaza el plomo quemado con dos onz. de albayalde.

UNGUENTO DE CALAMINA COMPUESTO.

Unguentum calaminæ compositum, s. *exsicans rubrum Acrelii.* (fi. su.)

R. Calamina,
Litargirio y
Albayalde, a. . . . . med. lib.
Minio y
Acetato de plomo, a. . tres onz.
Sebo de macho, ... una lib.
Aceite de lino, ... ocho onz.

Lícuese el sebo, añádase el aceite, despues los polvos, y cuando la masa esté un poco fria
Alcanfor pulverizado, tres drac.

AMONIURO DE ZINC. *(vm.)*

R. Acetato de zinc líquido, . c. s. q.
Echese poco á poco amoniaco líquido hasta que deje de formar precipitado; lávese y séquese este y disuélvase en la menor cantidad posible de amoniaco líquido; fíltrese, evapórese lentamente y cristalícese.

SULFATO DE ZINC.

Vitriolo blanco, Vitriolo de Zinc, Blanco de Gostar, Caparrosa blanca; Vitriolum album, s. *Goslariense*, s. *Zinci, Sulphas zínci*, s. *zincicum, Zincum sulphuricum, Gilla vitrioli*, s. *Theophrasti, Sal vomitorium vitrioli, Chalcantum album.*

1.° Como se encuentra en el comercio.

am. ams. b. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. he. li. ρ. pp r. su. w. wu. ww. *c. pa pid. sa. sp.*

2.° Purificacion del de comercio.

R. Vitriolo blanco, ... c. s. q.
Calcínese, disuélvase en seguida en agua, y hágase cristalizar muchas veces seguidas. (f.)

w. indica el mismo procedimiento, pero omite la calcinacion; — fu. li. y wu. prescriben se disuelva una lib. de sal en dos lib. de agua hirviendo, que se deje el líquido en digestion por seis horas con seis drac. de zinc en granos,

que se evapore en seguida y se haga cristalizar.

3.º Preparado.

a. an b. ba. be. du. e. ed. f. fe. fi. hau. lo. o. po. pr. s. su. *br. c. sw. vm.*

R. Acido sulfúrico (20.º), . c. s. q.

Póngase al B. A. en una retorta de vidrio; hágase calentar ligeramente, añádase poco á poco zinc en granos, dilátese el líquido con un poco de agua, satúrese, evapórese y cristalícese.

Se usa esta sal al esterior como astringente, y al interior como tónica y astringente, á la dósis de uno á cinco gr. dos ó tres veces al dia, y como vomitivo á la de diez á veinte gr. en agua destilada.

PÍLDORAS ESPECTORANTES. (*e. pa.*)

R. Sulfato de zinc, . . med. escrp.
Conserva de rosas, ... c. s.
Háganse veinte píldoras. — Dósis; una tres veces al dia en la coqueluche y tísis pulmonal. *(e.)*

R. Sulfato de zinc, ... diez gr.
Mirra, ... drac. y med.
Confeccion de rosas, ... c. s.
Háganse veinte píldoras. Son útiles como las precedentes en la coqueluche. *(e. pa.)*

DISOLUCION ACUOSA SIMPLE DE SULFATO DE ZINC. (am. b.* *c.*)

1.º Para uso interno.

R. Sulfato de zinc, ... dos gr.
Agua de manzanilla, . tres onz.
Disuélvase.

Dósis; una cuch. dos ó tres veces al dia.

Wylie administra en las calenturas malignas cada dos ó tres horas una cuch. de una solucion de nueve gr. de sulfato de zinc en seis onz. de agua de flor de sauco. Mosseley tambien recomienda contra la disenteria crónica sin fiebre una disolucion de tres gr. de sulfato de zinc y dos drac. de alumbre en media onz. de espíritu de espliego y media azumbre de agua, á la dósis de cuatro á seis drac. en agua, repetida algunas veces despues de tres horas.

En am. y *c.* se encuentra una preparacion semejante, cuya fórmula es la siguiente:

R. Leño de quasia, ... una drac.
Sulfato de zinc, ... ocho gr.
Agua, ... un cuartillo.
Despues de doce horas de maceracion cuélese.

2.º Para uso esterno.

A. En forma de colutorio. (b.* *au.*)

R. Sulfato de zinc, ... una drac.
Agua destilada, ... seis onz.
Disuélvase y añádase
Miel, ... una onz.
Méz. (b.*)

R. Sulfato de zinc, . . . quince gr.
Infusion de salvia, . . . seis onz.
Disuélvase. *(au.)*

B. En forma de colirio. *Colirio astringente ó detersivo; Aqua ophthalmica*, s. *ophthalmica adstringens*, s. *vitriolica*, s. *è vitriolo zinci*, *Aqua vitrioli alba*, *Solutio sulphatis cinci*, *Collirium*

vitriolicum, s. *è zinco sulphurico*, s. *è vitriolo albo*, s. *zinci.* (am. b.* dd. ed. f. ff. han. p. pp. sa. su. ww. *au. bo. c. ca. fp. ra. sa. sp. sw.)*

R. Sulfato de zinc, ... una pt.
Agua, . . doscientas cuarenta pt.
Disuélvase. (dd. pp. ww.)

ff. prescribe una parte de sal y doscientas de agua; — p. su. y *sp.* una de sal y noventa y seis de agua; — dd. una de sal y sesenta y cuatro de agua; — am. y *c.* doce gr. de sulfato y un cuartillo de agua; — y *fp.* cuatro á seis gr. de sulfato y seis onz. de agua.

R. Sulfato de zinc, ... una pt.
Agua, . . doscientas cuarenta pt.
Disuélvase. (b.*)

Puede duplicarse la cantidad de agua, y añadirse, si fuese necesario, dos drac. de mucílago de la simiente de membrillo.

ham. prescribe una parte de sal y trescientas veinte de agua; — *ra.* una de sal y ciento veinte de agua; — *sw.* y *ra.* una de sal y noventa y seis de agua; — *sa.* y *sw.* una de sal y cuarenta y ocho de agua; — y *au.* un gr. de sal, una onz. de agua de rosas, y una drac. de mucílago de la simiente de membrillo.

R. Sulfato de zinc, . . . un escrp.
Infusion de sauco, . . . una lib.
Disuélvase. *(ra.)*

En otra parte prescribe *ra.* un gr. de sulfato y una onz. de agua de llanten; — am. y *c.* dos drac. de sulfato, dos onz. de espíritu de espliego y seis onz. de agua; — sa. que despues de haber quitado la yema de un huevo que se haya puesto duro al fuego, se llene el espacio que ocupaba con sulfato de zinc, y que se añadan al líquido que fluya despues de cierto tiempo seis onz. de agua de rosas y otras seis de la de llanten; — y *au.* que se disuelvan tres gr. de sulfato en onz. y med. de agua de rosas, batida con una clara de huevo.

R. Sulfato de zinc, ... cinco gr.
Agua de llanten, . . . cuatro onz.
Mucílago de simiente de membrillo, ... med. onz.
Disuélvase. *(ca.)*

R. Sulfato de zinc, . diez y seis gr.
Agua, ... ocho onz.
Acido sulfúrico diluido en agua, diez y seis got.
Disuélvase la sal en el agua y añádase despues el ácido. (ed. *c.)*

R. Sulfato de zinc, ... una drac.
Agua de rosas, ... dos lib.
Alcohol (de 22.°) . . una onz.
Disuélvase. (f.)

R. Sulfato de zinc, ... seis gr.
Alcanfor, ... cuatro gr.
Agua de eufrasia,
—— de rosas y
—— de llanten, a. . . . una onz.
Disuélvase. *(bo.)*

R. Sulfato de zinc, ... seis gr.
Agua destilada, ... seis onz.
Mucílago de membrillo, una onz.
Aguardiente alcanforado, doce got.
Méz. *(sw.)*

C. En forma de fomento ó locion. (b.* *au. sw. sy.*)

R. Sulfato de zinc, ... dos gr.
Agua destilada, . . . cuatro onz.
Disuélvase. *(sy.)*

b.* prescribe una drac. de sulfato y

una onz. de agua; — y *au.* tres drac. de sulfato y una onz. de agua.

R. Sulfato de zinc y
Aguardiente alcanforado,
a. . . . . med. onz.
Agua hirviendo, ... dos lib.
Disuélvase. (*sw. sy.*)
D. Para inyeccion. (b.* dd. e. *sw. sy.*)

R. Sulfato de zinc, ... un gr.
Agua, ... med. onz.
Disuélvase. (b.*)

b.* prescribe tambien treinta y cinco gr. de sal y cuatro onz. de agua, ó un escrp. á med. drac. de sal y una onz. de agua.

R. Sulfato de zinc, ... una drac.
Agua alcanforada, . . . dos onz.
—— pura, ... dos lib.
Disuélvase. (*sw. sy.*)

Con el nombre de *Injectio sulphatis zinci*, s. *adstringens*, prescribe e. seis gr. de sulfato de zinc disueltos en seis onz. de agua destilada.

INJECCION ASTRINGENTE.

Injectio adstringens. (*b.*)

R. Agua de llanten, . . . seis onz.
Láudano de Sydenham,
treinta got.
Sulfato de zinc . . . . . un escrp.
Mucílago de goma arábiga,
una onz.
Para la blenorrea. (*b.*)

R. Sulfato de zinc, ... un escrp.
Bol arménico, ... dos escrp.
Agua, ... ocho onz.
Goma arábiga, ... dos onz.
Para la blenorrea. (*e.*)

R. Sulfato de zinc, ... diez gr.
Goma arábiga, ... dos drac.
Tintura de opio, . . . una drac.
Agua, ... ocho onz.
Para la gonorrea. (*e.*)

GARGARISMO ASTRINGENTE. (*e.*)

R. Sulfato de zinc, . . . una drac.
Miel, ... med. onz.
Tintura de mirra y
Aguardiente, a. . . . . una onz.
Agua de rosas, . . . cuatro onz.

FOMENTO ASTRINGENTE.

Fomentum tonico-adstringens. (*b.*)

R. Cocimiento de corteza de granada,
cuatro lib.
———— de quina, , . dos lib.
Sulfato de zinc, . . . drac. y med.
Tintura de opio, ... una onz.
En las hemorroides esternas y en la blenorrea vaginal.

COLIRIO RESOLUTIVO.

Licor oftalmico detersivo. (pa. *ca. sm.*)

R. Raiz de lirio de Florencia en polvo,
tres drac.
Sulfato de zinc, . . . drac. y med.
Agua de rosas y
——— de llanten, a. lib. y med.
Déjense en digestion por dos dias y cuélese. (*pa.*)

R. Lirio de Florencia y
Sulfato de zinc, a. . . med. drac.
Azúcar cande, ... dos escrp.
Agua de rosas, ... una lib.
Déjense en digestion por tres dias y cuélese. (*ca. sm.*)

R. Yemas de huevo frescas, . n.° 2.
Agua de rosas, ... una lib.
Tritúrense juntos y añádase

:

Sulfato de zinc,
doce á veinte y cuatro gr.
Disuélvase. *(sm.)*

INYECCION SEDATIVA ASTRINGENTE.
(ca. sy.)

R. Sulfato de zinc, ... seis gr.
Oxido gris de plomo, veinte gr.
Agua de rosas, . . . cuatro onz.
Méz. agitándolo. *(ca.)*

sy. prescribe diez y ocho gr. de sulfato de zinc, sesenta gr. de polvos de albayalde compuesto, y doce onz. de agua de tilo ó de rosas.

COLIRIO ASTRINGENTE.

Colyrium adstringens. (au. b. c. pie.)

R. Sulfato de zinc, . . . veinte gr.
Tucia, ... med. drac.
Agua de rosas y
—— de llanten, a. . . tres onz.
Méz. *(pie.)*

R. Agua de rosas, ... tres onz.
Sulfato de zinc, ... tres gr.
Láudano de Sydenham, un escrp.
Méz. *(b.)*

R. Sulfato de zinc y
Bol arménico, a. . . . . dos onz.
Alcanfor, ... med. onz.
Se diluye una drac. de estos polvos en cuatro onz. de agua de rosas. *(au. c.)*

AGUA OFTALMICA.

Aqua ophthalmica. (sp.)

R. Azúcar cande, ... una onz.
Raiz de lirio de Florencia,
tres drac.
Tucia pp., ... dos drac.
Sarcocola,
Sulfato de zinc y
Acibar, ... una drac.
Clavos, ... un escrp.
Agua de eufrasia,
—— de hinojo y
—— de rosas, a. . . . ocho onz.
Vino de España, . . . dos lib.
Déjense en infusion por quince dias al sol y decántese.

Esta agua se parece mucho á otra del mismo nombre, indicada tambien por Spielmann, y cuya fórmula se halla mas arriba; pero contiene zinc.

AGUA ESTIPTICA.

Errino hemastático; *Aqua*, s. *Liquor*, s. *Injectio adstringens*, s. *Sulphatis zinci aluminosa*, *Liquor aluminis compositus*, *Solutio zinci aluminosa*, *Injectio ad leucorrhœam*, *Aqua aluminosa Bateana*, *Solutio vitriolica.* (dd. e. fe. lo. p. *au. b. e. ca. l. pie. sa. sx.**)

R. Sulfato de zinc y
Alumbre calcinado, a. . med. onz.
Agua pura, ... lib.
Disuélvanse. *(au. ca. sx.*)*

En otra parte *ca.* reduce á la mitad la proporcion de cada una de estas sales, fórmula seguida tambien por dd. lo. y *e.*; — fe. y p. prescriben media onz. de cada sal y dos lib. y med. de agua hirviendo; — *sa.* una drac. de cada sal y una lib. de agua; — *e.* drac. y med. de sulfato, med. drac. de alumbre y un cuartillo de agua hirviendo.

R. Sulfato de zinc y
Alumbre, a. . . . . med. onz.
Agua de rosas, ... una lib.
Filtrese la solucion. (e.)

R. Sulfato de zinc y

Alumbre, a. . . . . una drac.
Zumo de ortigas, . . cuatro onz.
Disuélvase. (*pie.*)

R. Sulfato de zinc, . . . med. drac.
Alumbre, ... una drac.
Borax, ... cuatro gr.
Agua de rosas, ... seis onz.
Disuélvanse. (*pie.*)

R. Cocimiento de corteza de encina, diez onz.
——— de cinorrhodon, seis onz.
Sulfato de zinc, . . . una drac.
Alumbre, ... drac. y med.
Añádase á la solucion
Alcohol, ... dos drac.
Tintura acuosa de opio, media drac.

Méz. (*b.*)

Astringente que se ha usado al esterior contra las equimosis, las hemorragias ligeras y los flujos mucosos crónicos. — Dósis; una cuch. por la mañana en ayunas para un adulto.

COLIRIO TONICO. (*bo.*)

R. Ruda fresca y
Flores de arnica, a. . med. puñ.
Enebro, ... dos drac.
Ipecacuana, ... treinta gr.
Vino blanco, ... doce onz.

Déjense en infusion por veinte y cuatro horas sobre rescoldo y añádase al líquido colado
Sulfato de zinc, . . . veinte gr.
Sal amoniaco, ... treinta gr.

AGUA DE ALIBOUR. (*ca. sm. vm.*)

R. Sulfato de zinc, dos onzas y drac. y med.
——— de cobre, . . cinco drac.
Alcanfor, . . . dos drac. y med.
Azafran, ... una drac.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas y filtrese. (*ca.*)

En otra parte *ca.* prescribe con el nombre de *Agua para los ojos de Ibel*, tres drac. de sulfato de zinc, una drac. de sulfato de cobre, dos escrp. de alcanfor, veinte gr. de azafran y med. azumbre de agua.

R. Agua, ... una azumb.
Sulfato de zinc, ... dos onz.
——— de cobre, . cuatro drac.
Alcanfor, ... una drac.
Disuélvase. (*sm.*)

R. Hojas de ruda, ... seis pt.
Agua caliente, . . . catorce pt.

Déjese en infusion por med. hora y añádase al líquido colado
Sulfato de zinc, . . . cuatro pt.
——— de cobre, ... una pt.
Aguardiente alcanforado, una cuarta pt.
Disuélvase. (*vm.*)

Van-Mons trae esta fórmula con el título de *Colirio de Saint-Jerneron*; — b.* y su. con el de *Collyrium Sterncronense*, s. *Decoctum rutæ zincatum*, s. *Aqua ophthalmica Odhelii*, con las proporciones siguientes: dos partes de ruda, treinta y seis de agua reducidas á la mitad, y por cada doce onz. de líquido colado una onz. de sulfato de zinc, tres drac. de sulfato de cobre y med. drac. de aguardiente alcanforado.

PIEDRA VULNERARIA ESTERNA.

Lapis vulnerarius externus. (fu.)

R. Alumbre y
Sulfato de zinc, a. . . . seis onz.

Acetato de cobre y
Sal amoniaco, a. . . . una drac.
Mézclense por trituracion; lícuense juntos; déjense al fuego hasta la perfecta desecacion y añádase á lo último
Azafran, ... media drac.
Esta preparacion se ha aconsejado para limpiar, secar y consolidar las úlceras.

UNGUENTO OFTALMICO.

Colirio blando; Unguentum ophthalmicum, s. *ad oculi de fluxiones catarrosas ex relaxatione.* (br. fu. *pie.*)

R. Sulfato de zinc, ... una pt.
Manteca de vacas fresca, siete pt.
Tritúrense juntos. (fu.)

br. prescribe una parte de sulfato y seis de manteca de vacas; — *pie.* una de sulfato y cuatro de la manteca.

POMADA VIRGINAL.

Pomada de la Condesa. (ca.)

R. Sulfato de zinc, . . cuatro drac.
Hojas de mirto y
Zumaque, a. . . . . tres drac.
Nueces de agalla,
——— de ciprés y
Corteza de granada, a. dos drac.
Ungüento rosado, ... c. s.
Méz por trituracion.

POLVOS CONTRA LAS MANCHAS DE LA CORNEA. (*pie.*)

R. Tucia pp.,
Azucar cande,
Sulfato de zinc,
Sulfato de cobre,
Acetato de cobre y
Mercurio dulce, a. . . una drac.
Háganse polvos.

POLVOS ASTRINGENTES.

Pulbis cupresi restrictivus. (e.)

R. Bol arménico, ... dos drac.
Raiz de bistorta,
Pétalos de rosas rojas,
Bayas de mirto,
Nueces de ciprés,
Sulfato de zinc y
Tucia pp., a. . . . . una onz.
Háganse polvos muy finos.

ACETATO DE ZINC.

Acetas, s. *Acetis zinci, zincum acetatum.*

1.º *En estado sólido.*

vm.

R. Flores de zinc, ... c. s. q.
Vinagre destilado, ... c. s.
para disolver el óxido al calor.
Fíltrese y concéntrese para cristalizarle.

2.º *En estado líquido.*

am. be.* *d. br.** *c. e. sw. sy. vm.*

R. Sulfato de zinc y
Acetato de plomo, a. . una drac.
Mézclense en un mortero de vidrio y añádase
Agua hirviendo, . . . tres onz.
Fíltrese despues de frio. (*sw.*)

br.* prescribe se mezclen dos disoluciones: la una de veinte gr. de sulfato de zinc en tres onz. de agua, y la

otra de veinte gr. de acetato de plomo en una igual cantidad de agua y que se filtre; — am. y b.* doce gr. de sulfato de zinc, diez y seis gr. de acetato de plomo y un cuartillo de agua; — b.* ed. y *c.* una drac. de sulfato de zinc, cuatro escrp. de acetato de plomo, diez onz. de agua para disolver cada sal aparte, la mezcla de las dos soluciones, y que se filtre despues de aposado el precipitado.

R. Oxido de zinc, ... c. s. q.
Acido acético, ... c. s.
para disolver el óxido. Tómense veinte got. de la solucion y añádasela cuatro onz. de agua. *(sy.)*

Se ha usado el acetato de zinc líquido en forma de colirio, ó como inyeccion, en la blenorrea.

Van-Mons propone se trituren juntos doce gr. de sulfato de zinc y med. drac. de acetato de plomo, y que se añadan seis onz. de agua de rosas, de lo que resulta un líquido filtrado que se llama *Agua oftálmica*; — *e.* trae tambien con el nombre de *Colirio astringente* una disolucion de seis gr. de sulfato de zinc y otro tanto de sub-acetato de plomo en cuatro onz. de agua de rosas.

Sería mejor se disolviese directamente el acetato seco en agua de rosas; por egemplo, un escrp. de sal en ocho onz. de agua.

Se encuentra en Ellis una inyeccion astringente contra la gonorrea, que se compone de ocho gr. de acetato de zinc y cuatro onz. de agua de rosas; — Agustin cita una inyeccion semejante, que él preconiza en los mismos casos, segun los ingleses, y consiste en una disolucion de ocho á diez gr. de acetato de zinc en cuatro á seis onz. de agua destilada.

Pierquin indica tambien un colirio preparado con drac. y med. de sulfato de zinc, dos escrp. de acetato de plomo, cuatro onz. de agua de llanten, y otro tanto de agua de rosas.

AGUA ANTIOFTALMICA.

Aqua ophthalmica alba Danica. (au. sp.)

R. Sulfato de zinc, . . . una drac.
Acetato de plomo, . med. drac.
Alcanfor, ... un escrp.
Agua de rosas, ... doce onz.
Disuélvanse y filtrense. *(sp.)*

au. prescribe un escrp. de sulfato de zinc, med. drac. de sub-acetato de plomo, dos drac. de aguardiente alcanforado y diez onz. de agua destilada.

COLUTORIO ASTRINGENTE.

Collutorium adstringens, s. è zinco compositum. (sp. sw.)

R. Trociscos blancos de Rhazes, una drac.
Sulfato de zinc, . . . med. drac.
Acetato de plomo, . med. escrp.
Agua de rosas, . . . cuatro onz.
Méz. *(sp.)*

R. Sulfato de zinc, ... ocho gr.
Acetato de plomo líquido, ocho got.
Agua de rosas, . . . cuatro onz.
Mézclese y añádase, si es necesario, una onz. de agua alcanforada. *(sw.)*

INYECCION ASTRINGENTE.

Injectio ad blennorrhœam. (bo. sy.)

R. Sulfato de zinc, ... dos drac

Acetato de plomo, . cuatro escrp.
Alcanfor, ... escrp. y med.
Estracto acuoso de opio,
un escrp.
Agua de rosas, . dos á cuatro lib.
Disuélvase. *(sy.)*

R. Sulfato de zinc,
Acetato de plomo y
Alumbre, a. . . . . una drac.
Alcanfor, ... diez gr.
Agua de rosas y
—— comun, a. . . . ocho onz.
Disuélvase. *(bo.)*

Se repite la inyeccion dos ó tres veces al dia.

TINTURA DE ACETATO DE ZINC.

Tinctura acetatis zinci, Acetas zinci diluta. (b.* du. *c.)*

R. Sulfato de zinc y
Acetato de potasa, a. . una onz.
Tritúrense juntos y añádase
Alcohol, ... una lib.

Déjense en maceracion por una semana, meneando de tiempo en tiempo, y filtrese.

Usada en colirios y en inyecciones en la blenorrea.

ZIRCONA.

Sustancia que se considera como un óxido metálico, del cual solo se usa en medicina el compuesto siguiente:

SILICATO DE CIRCONA.

Jacinto; Hyacinthus.

Hiacint, Al.; hyacinte, F.

e. w. *g. sp.*

Piedra muy dura, vidriosa, infusible y de color naranjado.

CINCO PIEDRAS PRECIOSAS. (w.)

R. Granates,
Jacintos,
Zafiros,
Cornalina y
Esmeralda, a. . . . . pt. ig.

Méz. y pulverícense. — Es una mezcla absolutamente inerte, desterrada hace mucho tiempo de todas las fórmulas racionales.

ZOSTERA MARINA.

Pila marina, Sphæra marina, Sphæra thalasia, Halcyonium rotundum.

w. *sp.*

Se designan con este nombre unas masas ligeras, redondeadas, comprimidas ú oblongas, inodoras é insípidas, en las que se distinguen juncos, pelos, y muchas veces restos de conchas, y las cueles se hallan en las orillas del Océano y del mar Báltico.

Segun Spielmann son una reunion de raices del *Zostera marina*, L., muy comun en nuestros mares (monoecia monandria, L.; arosdeas, J.).

Cavola asegura que ha encontrado iodo en las cenizas del zostera, lo que manifiesta por qué se ha colocado la zostera marina entre las sustancias útiles contra el bocio.

ZUMAQUE.

Dos especies de este género de plantas se usan en medicina:

1.º *Zumaque de tenerías, de zurradores; Rhus coriaria*, L.

Sumach, Al.; coriar's sumach, In.; sumac des corroyeurs, F.; summaco, I.; sumágro, Por.

br. e. f. fe. w. wu. *a. be. br. g. m. sp.*

Planta del mediodia de Europa (pentandria digynia, L.; terebintaceas, J.).

Se usan las hojas y los frutos.

Las hojas *(folia Sumac)* son aladas y compuestas de quince á diez y siete hojuelas ovales, sentadas, vellosas por encima, con dientes obtusos en los bordes, y de un sabor muy astringente.

Las bayas de un color rojo hermoso, del grueso de una lenteja y de sabor astringente y ácido.

Es astringente poco usado.

2.º *Zumaque venenoso; Rhus Toxicodendrum et radicans*, L.

Gifthaum, Al.; common upricht sumac, In.; sumac vènèneux, F.; sommaco radicanto, I.

am. an. ba. be. ed. f. fe. lo. s. *br. c. g. pa.*

Arbusto del norte de América (pentandria digynia, L.; terebintaceas, J.).

Se usan las hojas *(folia Rhuris*, s. *Rhois toxicodendris*, s. *radicantis)* que son dentadas en ángulos ó enteras, borrosas y con hojuelas pecioladas. Disfrutan de una acritud tan grande, que su contacto, y aun segun dicen, sus emanaciones, bastan para irritar violentamente la piel.

Es escitante y venenoso, aconsejado en los herpes y en la paralisis.

ESTRACTO DE ZUMAQUE VENENOSO.

Extractum rhois radicantis. (an. b.* be. f. han. s. *sw. vm.)*

R. Hojas frescas de zumaque venenoso, ... c. s. q.

Macháquense en un mortero de mármol con un poco de agua, esprímase el zumo, y en seguida evapórese al B. M. meneándolo sin cesar, particularmente á lo último, con una espátula. (b.* f. han.)

R. Hojas frescas de zumaque venenoso, ... c. s. q.

Macháquense rápidamente en un mortero de mármol, añadiendo la mitad de su peso de agua; cuélese el zumo por espresion, déjese reposar un instante, decántese por un cedazo de cerda y evapórese hasta la consistencia de estracto meneándolo sin cesar. *(vm.)*

R. Hojas frescas de zumaque venenoso y

Agua fria, a. . . . . una pt.

Déjese en maceracion por doce horas y añádase despues

Agua hirviendo, ... el doble del peso de la masa total; cuélese despues de frio, clarifíquese con clara de huevo, póngase al fuego, y cuando el líquido principie á espesarse cuélese por una estameña, y evapórese despues lo conveniente meneándolo sin cesar. *(an. vm.)*

R. Hojas de zumaque venenoso, dos lib.

Agua hirviendo, ... diez lib.

Déjense en digestion por veinte y cuatro horas en vasija tapada y hiér-

vase despues por una, decántese despues de frio, esprímanse en seguida las hojas, reúnanse los dos líquidos, y despues de depurados por el reposo evapórense hasta la consistencia conveniente (be.); — *sw.** prescribe se hiervan dos veces seguidas una parte de hojas secas en diez de agua, que se cuele por un tamiz de seda, y que se evapore el líquido; — s. que se hierva una parte de hojas secas en treinta de agua, reducidas á quince, que se tamice y se evapore el líquido.

Dósis; med. drac. cuatro veces al dia, aumentando hasta seis drac. y lo mismo hasta once en agua de azúcar. Se da hasta muchas onzas cada dia.

POCION ESCITANTE.

Mixtura extracti rhois radicantis. (b.)

R. Estracto de zumaque venenoso, una drac.
Agua, ... una onz.

Dósis; diez gotas, aumentando poco á poco hasta una cucharadita dos veces al dia en la paralísis de las estremidades.

PILDORAS DE ZUMAQUE VENENOSO.

R. Cloruro de bario, . . . una pt.
Estracto de zumaque venenoso, seis pt.
Hojas de zumaque venenoso en polvo, ... c. s.

Háganse píldoras de cuatro gr. — Dósis; tres, dos ó tres veces al dia en los herpes. *(sw.* vm.)*

R. Hojas de zumaque venenoso, un gr.
Polvos de regaliz, . . . un escrp.
Arrope de sauco, ... c. s.

Háganse cuatro píldoras para tomar en el dia en las paralísis consecutivas á la apoplegía. (fe. *b.*)

TINTURA DE ZUMAQUE VENENOSO.

Tinctura rhois radicantis. (s. hp.)

R. Zumo de zumaque venenoso, recientemente esprimido, y
Alcohol concentrado, a. una pt.

Déjense en infusion fria por muchos dias y fíltrese. (s.)

hp. prescribe dos onzas de hojas de zumaque, una libra de alcohol y tres dias de infusion.

TABLA ALFABÉTICA (1).

A.

Abedul, I, 1.
Abelmosco, id.
Abeto, I, 2.
id. plateado, id.
Abies balsamea, I, 408.
id. pectinata, IV, 279.
id. picea, I, 2.
Abrótano, I, 5.
id. de jardin, id.
id. silvestre, id.
Abrotanum fœmineum, IV, 166.
id. hortense, I, 5.
id. mas, id.
id. montanum, IV, 166.
Absinthium alpinum, II, 371.
id. ponticum, I, 121.
id. romanum, id.
id. vulgare, id.
Acacia, I, 5.
id. bastarda, id.
id. falsa, id.
id. verdadera, id.
id. Ægyptiaca, id.
id. Germánica, I, 5; II, 111.
id. nostras, id.
id. vera, I, 5.
id. vulgaris, II, 111.
Acajú, I, 6.
Acanthus mollis, id.
Acanto, id.
Acebo comun, id.
id. espinoso, id.
Acedera comun, I, 6.
id. hortense, id.
Acederilla, I, 7.
Aceite de acibar, I, 14.
id. acústico, I, 441; II, 74.
id. de adormideras, I, 108.
id. de ajedrea, I, 137.
id. de agenjos, I, 130.
id. de albahaca, I, 143.
id. de alcanfor, I, 155.
id. alcanforado, I, 156.
id. de alcaparro, I, 158.
id. de alcaravea, I, 160.
id. de alhelí amarillo, I, 172.
id. de alfónsigos, id.
id. de almáciga, I, 177.
id. de almendras, I, 178.
id. aloético bátavo, I, 14.
id. de althea, III, 71.
id. amoniacal, I, 231.
id. de anagalide, I, 269.
id. de angélica, I, 274.
id. animal de Dippel, II, 355.
id. de anís, I, 287.
id. de anserina antelmíntico, I, 291.
id. antelmíntico, IV, 302.
id. antireumático, IV, 259.
id. de arrayan, I, 354.
id. de artanita compuesto, II, 166.
Aceite de artemisa esencial, I, 366.
id. artrítico, II, 425.
id. de asfalto, I, 382.
id. de avellanas, I, 384.
id. de azafran, I, 388.
id. de azucenas, I, 395.
id. de azufre, I, 99.
id. de bayas de enebro, II, 222.
id. de bayas de laurel, III, 7.
id. de hojas de beleño, I, 437.
id. de simiente de beleño, I, 433.
id. verde de beleño, I. 437.
id. de been, I, 431.
id. de benjui, I, 451.
id. de bergamota, III, 263.
id. bezoardico de Wedel, I, 156.
id. de box, I, 469.
id. de brionia compuesto, II, 262.
id. de cacao, I, 476.
id. concreto de cacao, id.
id. de cachorros, II, 505.
id. de cajeput, I, 9.
id. de cálamo aromático, I, 482.
id. esencial de canela, I, 521.
id. de cantáridas, II, 9.
id. de cañamones, II, 19.

(1) Los números romanos indican el tomo, y los arábigos las páginas á que corresponden del mismo.

Aceite esencial de cardamomo, II, 27.
id. carminativo, III, 93.
id. carminativo etéreo, III, 85.
id. de cascarilla, II, 37.
id. de castoreo, II, 49.
id. de catapucia, II, 58.
id. de cera, II, 83.
id. de cicuta, II, 94.
id. esencial de cidra II, 99.
id. esencial de cilantro II, 107.
id. de clavos de especia, III, 45.
id. de cohombro, I, 150.
id. de cohombro silvestre, II, 151.
id. de cohombro silvestre compuesto, II, 152.
id. de coloquíntidas, II, 166.
id. esencial de cominos, II, 168.
id. comun, I, 9.
id. esencial de corteza de naranja, III, 261.
id. de cubebas, II, 185.
id. de croton tiglio, II, 183.
id. de cuerno de ciervo, II, 355.
id. de cuerno de ciervo rectificado, id.
id. de cuerno de ciervo rectificado succinado, id.
id. de dictamo de Creta, II, 200.
id. de enebro, II, 222.
id. de eneldo, II, 226.
id. de énula compuesto, II, 234.
id. de escarabajos, II, 36.
id. de escorpiones, II, 353.
id. de escorpiones compuesto, II, 354.
Aceite esencial de agenjos, I, 122.
id. esencial de albahaca, I, 142.
id. esencial de alcaravea, I, 160.
id. esencial de almendras amargas, I, 77.
id. esencial de anís, I, 287.
id. esencial de espliego, II, 280.
id. esencial de eneldo, II, 227.
id. esencial de hinojo, II, 499.
id. esencial de mejorana, III, 102.
id. esencial de menta, IV, 363.
id. esencial de romero, IV, 91.
id. esencial de ruda, IV, 112.
id. esencial de yerbabuena, IV, 364.
id. de escrofularia, II, 268.
id. estomacal, I, 131.
id. de estramonio, II, 293.
id. de euforbio, II, 308.
id. etéreo, II, 304.
id. de flores, II, 504.
id. fosforado, II, 317.
id. fosforado aromático, id.
id. de freza de ranas, II, 354.
id. esencial de gálbano, II, 326.
id. esencial compuesto de gálbano, II, 326.
id. de gaulteria, II, 338.
id. de gengibre, II, 370.
id. de goma amoniaco, II, 378.
id. de gordolobo blanco, II, 403.
Aceite de grasa, II, 413.
id. de gaulteria II, 416.
id. de guayaco, II, 417.
id. de guayaco compuesto, id.
id. de hinojo, II, 499.
id. de hipericon compuesto, II, 506.
id. de hipericon por infusion, II, 503.
id. de la simiente de hipericon, II, 502.
id. de hisopo, II, 509.
id. de hormigas, II, 512.
id. de jabon, III, 523, 526.
id. de ladrillos, I, 10.
id. de lagartos, II, 354.
id. de leño de enebro, II, 223.
id. esencial de leño de Rodas, III, 16.
id. de simiente de lino, III, 23.
id. de lirio, III, 34.
id. de lombrices de tierra, II, 353.
id. esencial de macias, III, 257.
id. de malvavisco, III, 71.
id. de manzanilla por decoccion, III, 92.
id. esencial de manzanilla, III, 84.
id. esencial de manzanilla compuesto, III, 85.
id. de mejorana por infusion, III, 103.
id. de meliloto, III, 104.
id. de melisa, IV, 273.
id de mil en rama, III, 233.
id. de mirra, III, 244.

Aceite de monarda III, 245.
id. de mostaza por infusion, II, 253.
id. de mucílago, I, 174; III, 22.
id. narcótico, I, 439.
id. esencial de corteza de naranja, III, 261.
id. esencial de naranja, id.
id. de nueces, III, 279.
id. de nuez moscada por espresion, III, 256.
id. de nuez moscada esencial, III, 257.
id. de orégano, III. 356.
id. oxigenado, II, 119.
id de palma oleosa, I, 10.
id. paregórico, I, 433.
id. de peregil, III, 381.
id. de perifollo, III, 384.
id. de petroleo esencial, III, 385.
id. de peucedan, III, 386.
id. de pimienta de la Jamaica, III, 392.
id. de poleo, III, 448.
id. purgante, II, 242.
id. pyroanimal depurado, II, 356.
id. pyrogenado, id.
id. de ricino, IV, 83.
id. de ricino artificial, II, 183, 539.
id. de romero por infusion, IV, 91.
id. rosado, IV, 110.
id. de rosas, id.
id. de ruda por infusion, IV, 112.
id. de sabina, IV, 146.
id. de salvia, IV, 155.
id. de sándalo cetrino, IV, 161.
id. de sasafras, IV, 170.
id. de saturno, III, 423.
id. de sauco, IV, 177.
id. de serpol, IV, 210.
id. de siete flores, III, 93.
Aceite de simiente de adormideras, I, 108.
id. de simiente de beleño I, 433.
id. de succino, IV, 238.
id. de succino succinado I, 403.
id. de tabaco, IV, 246.
id. de tacamaca, IV, 249.
id. de tanaceto, IV, 257.
id. de tártaro por delicuescencia, III, 468.
id. de tomillo, IV, 268.
id. de torongil, IV, 273.
id. de trementina, IV, 294.
id. de trementina sulfurado, I, 403.
id. de tribus, IV, 302.
id. de valeriana, IV, 336.
id. verde, II, 137.
id. de vino dulce, II, 304.
id. de vino volátil, id.
id. de violeta, IV, 352.
id. de vitriolo, I, 94.
id. de yatropha curcas, IV, 356.
id. de yerba buena por infusion, IV, 364.
id. de yerba mora, IV, 369.
id. de cedoaria, IV, 391.
id. de zorro, II, 205.
Acelga, I, 10.
id. blanca, id.
id. roja, id.
Acetabularia mediterranea, II, 177.
Acetato de alumina, I, 212.
id. amoniacal, I, 256.
id. de amoniaco, id.
id. de amoniaco líquido, id.
id. de barita, I, 429.
id. de cal, I, 507.
Acetato de calcio protoxidado, I, 507.
id. de cinconina, II, 110.
id. de cobre, II, 138.
id. de cobre con esceso de base, II, 134.
id. de cobre bruto, id.
id. de cobre deutoxidado, II, 138.
id. de cobre neutro, id.
id. de hierro, II, 480.
id. de morfina, III, 449.
id. de plomo, III, 421.
id. de plomo con esceso de base, III, 411.
id. de plomo líquido con alcohol, III, 415.
id. de plomo neutro, III, 421.
id. de plomo protoxidado, id.
id. de potasa, III, 494.
id. de potasa líquida, III, 495.
id. de potasio protoxidado, III, 494.
id. de sosa, IV, 234.
id. de tritóxido de hierro, II, 480.
id. de zinc, IV, 406.
Acetas aluminæ, I, 212.
id. ammoniæ, I, 256.
id. de ammoniæ aquosum, id.
id. ammoniæ dilutum, id.
id. ammoniæ liquidum, id.
id. ammoniæ solutum, id.
id. barytæ, I, 429.
id. calcis, I, 507.
id. cupri, II, 138.
id. cupri crudum, II, 134.
id. cupri imperfectum, id.
id. cupricum, II, 136.
id. ferri, II, 480.
id. ferri liquidum, II, 481.

Acetas hydrargyri, III, 284.
id. kalicum, III, 494.
id. lixiviæ, id.
id. lixiviæ solutum, III, 495.
id. morphei, III, 449.
id, morphinæ, id.
id. plumbi, III, 421.
id. plumbi acidulum siccum, id.
id. plumbi dilutum alcoholisatum, III, 415.
id. plumbi liquidum, III, 411, 425.
id. plumbi solutum, id.
id. plumbicum crystallisatum III, 421.
id. potassæ, III, 494.
id. potassæ aquosum, III, 495.
id. potassæ liquidum, id.
id. sodæ, III, 234.
id. super plumbicum aquosum, III, 421.
id. zinci, IV, 406.
Acetosa nostras, I, 6.
id. officinalis, id.
id. pratensis, id.
id. rotundifolia, I, 7.
Acetosella, id.
Acetum, I, 46.
id. alliatum, I, 138.
id. allii, id.
id. antisepticum, I, 281.
id. armoraciæ, IV, 61.
id. aromaticum, I, 281.
id. belladonæ, I, 446.
id. bezoardicum, I, 276, 281; IV, 278.
id. calendulæ, I, 510.
id. camphoratum, I, 154.
id. capsici spirituosum, III, 291.
id. caryophylli, II, 114.
id. chalybeatum, II, 481.
id. coffeanum extemporaneum, I, 478.
id. colchici, II, 154.
id. colchiticum, id.
Acetum concentratum, I, 50.
id. crudum, I, 46.
id. cyperi longi, II, 545.
id. destillatum concentratum, I, 50.
id. dracunculi, II, 290.
id. dulcicatum, II, 295.
id. gelu concentratum, I, 46.
id. glaciale, I, 50.
id. hellebori nigri, II, 213.
id. hystericum, II, 57.
id. lavandulæ, II, 279.
id. lythargyri, III, 413.
id. lythargyrites, id.
id. medicatum, I, 281.
id. myrrhæ, III, 244.
id. nicotianæ, IV, 246.
id. odoratum, IV, 90. 278.
id. odoriferum, IV, 278.
id. opii, III, 289.
id. papaveris erratici, I, 214.
id. plumbi, III, 413.
id. plumbi concentratum, id.
id. primulæ veris, III, 527.
id. prophylacticum, I, 281.
id. pseudonarcisi, III, 275.
id. purificatum, I, 47.
id. purum concentratum, I, 47.
id. radicatum, I, 49.
id. rorismarini, IV, 90.
id. rosæ, IV, 109.
id. rosarum, id.
id. rosarum compositum, IV, 110.
id. rubi idæi, II, 319.
id. rufaceum, IV, 121.
id. rutæ, id.
id. rutæ camphoratum, IV, 122.
id. rutæ compositum, II, 57.
id. salviæ, IV, 155.
Acetum sambuci, IV, 175.
id. sambucinum, id.
id. saturni, III, 413.
id. saturninum, id.
id. scillæ, II, 257.
id. scilliticum, id.
id. terebinthinæ, I, 49.
id. theriacale, II, 232.
id. tunicæ, II, 114.
id. veratri, II, 213.
id. vini camphoratum, I, 46, 154.
id. vini concentratum, I, 47, 50.
id. vini destillatum, I, 47.
id. vini radicale, I, 50.
Achicoria, I, 10.
id. amarga, id.
id. oficinal, id.
Achillea ageratum, I, 344.
id. atrata, id.
id. mellifolium, III, 231.
id. moschata, I, 344.
id. nana, id.
id. ptarmica, IV, 262.
id. vulgaris, III, 231.
Achiote, I, 12.
Achras mammosa, IV, 7.
Aciano, I, 12.
Acibar, I, 13.
id. caballino, id.
id. del cabo, id.
id. ácido, id.
id. hepatico, id.
id. sucotrino, id.
Acido acetico, I, 46.
id. acetico alcanforado, I, 154.
id. acetico aromático, II, 280.
id. acetico concentrado, I, 49.
id. acetico puro, id.
id. aereo, I, 59.
id. anemónico, I, 373.
id. antimónico, I, 302.
id. antimonioso, I, 296.
id. arsenical, I, 362.
id. arsénico, id.
id. arsenioso, I, 359.
id. arsenioso líquido, id.

Acido atmosférico, I, 59.
id. azoótico, I, 87.
id. benzóico, I, 56.
id. borácico, I, 58.
id. bórico, id.
id. carbónico, I, 59.
id. carbónico líquido alcanforado, I, 148.
id. catarmico, I, 142.
id. carbonoso, I, 59, 92.
id. cebadico, II, 71.
id. citrico, I, 62.
id. elágico, I, 115.
id. formico, I, 49.
id. fosfático, I, 65.
id. fosforico, id.
id. fosforoso, id.
id. gredoso, I, 59.
id. hidriodico, II, 516.
id. hidroclórico, I, 78.
id. hidroclórico alcoholizado, I, 81.
id. hidrocloro nítrico, I, 82.
id. hidrocyánico, I, 67.
id. hidrocyánico alcoholizado, I, 69.
id. hidrocyánico de Harles, I, 70.
id. hidrocyánico de Keller, I, 69.
id. hidrocyánico en proporcion de una cuarta parte, id.
id. hidrocyánico vegetal, I, 77.
id. hidromuriático, I, 78.
id. hidrosulfúrico, I, 83.
id. hidrosulfúrico líquido, id.
id. hidrothiómico, I, 83.
id. hidrothiómico líquido, id.
id. iódico, II, 516.
id. cramérico, IV, 68.
id. lácico, II, 396.
id. manganésico, III, 81.
id. marino, I, 78.
id. marino deflogisticado, II, 116.
id. fumante, I, 78.
Acido mecónico, III, 81.
id. menispérmico, II, 140.
id. muriático, I, 78.
id. muriático oxigenado, II, 116.
id. nitroso, I, 91.
id. nitroso deflogisticado, I, 87.
id. nitrico, id.
id. nitrico alcoholizado, I, 90.
id. nitrico aromatizado, id.
id. nitro muriático, I, 82.
id. oleo-ricinico, IV, 84.
id. oxálico, I, 92.
id. poligálico, III, 450.
id. prúsico, I, 67.
id. prúsico medicinal, I, 69.
id. pyro acético, I, 48.
id. pyro leñoso, id.
id. pyro-lígnico, id.
id. pyro tartrítico, I, 93.
id. rheumico, IV, 125.
id. ricínico, IV, 84.
id. sacarino, I, 92.
id. de sal marina, I. 78.
id. sórbico, IV, 209.
id. stearo-ricínico, IV, 84.
id. succínico, I, 100.
id. sulfo-sinápico, II, 141; III, 251.
id. sulfuroso, I, 99.
id. sulfuroso etereo, II, 304.
id. sulfúrico, I, 94.
id. sulfúrico alcoholizado, I, 98.
id. sulfúrico debilitado, I, 94.
id. puro, id.
id. tartaroso, I, 101.
id. tartárico, id.
id. de tártaro, id.
id. úrico, I, 103.
id. vitriólico, I, 94.
id. deflogisticado, I, 99.
Acidum aceti, I, 46.
id. aceticum, id.
id. aceticum aromaticum, IV, 90.
id. aceticum tenue, I, 47.
id. acetosum, id.
id. acetosellæ, I, 92.
id. æreum, I, 59.
id. antimonicum, I, 302.
id. arsenicale, I, 362.
id. arsenicosum, I, 358.
id. bonzoes, I, 56.
id. benzoicum, id.
id. boracicum, I, 58.
id. boracis, id.
id. borussicum, I, 67, 69.
id. borussicum alcoholicum, I, 69.
id. citricum, I, 62.
id. cretaceum I, 50.
id. hydriodicum, II, 516.
id. hydro-carbonicum, I, 92.
id. hydrochloricum, I, 78.
id. hydrocyanicum, I, 67.
id. hydrocyanicum alcoholicum, I, 69.
id. hydrocyanicum dilutum, I, 70.
id. hydro sulphuricum, I, 83.
id. hydrothionicum, id.
id. liquidum, id.
id. iodicum, II, 516.
id. ligni pyro oleosum, I, 48.
id. limonorum, I, 62.
id. muriaticum, I, 78.
id. muriaticum dephlogisticatum, II, 116.
id. muriaticum nitroso-oxygenatum, I, 82.
id. muriaticum oxygenatum, II, 116.

Acidum ad contagia, id.
id. nitri, I. 87, 88.
id. nitri concentratum, id.
id. nitri fumans, id.
id. nitricum, I, 87, 91.
id. nitricum alcoholicum, II, 298.
id. nitricum dilutum, I, 91.
id. nitroso nitricum, I, 88.
id. nitrosum, id.
id. nitrosum dilutum, I, 89.
id. oxalicum, I, 92.
id. oxalinum, id.
id. phosphori, I, 65.
id. phosphoricum, id.
id. sacchari, I, 92.
id. saccharinum, id.
id. salis culinaris, I, 78.
id. salis marini, id.
id. succini, I, 100.
id. succinicum, id.
id. sulphuricum, I, 94, 98.
id. sulphuricum aquosum, I, 94.
id. sulphuricum concentratum, I, 94.
id. sulphuricum tenue, id.
id. sulphuris volatile, I, 99.
id. sulphurosicum, id.
id. tartari, I, 101.
id. tartaricum, id.
id. tartarosum, id.
id. vitrioli, I, 94.
id. vitrioli cum alcohole aromatico, I, 535.
id. vitrioli alcoholisatum, I, 98.
id. vitrioli aromaticum, I, 535.
id. vitrioli defœcatum, I, 94.
id. vitrioli dephlogisticatum, id.
id. vitrioli depuratum, id.
Acidum vitrioli dilutum, I, 94.
id. vitrioli purissimum, id.
id. vitrioli rectificatum, id.
id. vitrioli vinosum, I, 98.
id. vitrioli zooticum, I, 67.
id. zootinicum, id.
Acipenser huso, II, 340.
id. stellatus, id.
id. sturio, id.
Acinella, I, 103.
Aconita, I, 104.
Aconitina, id.
Aconito, I, id.
id. de flores grandes, id.
id. napelo, id.
id. salutífero, id.
Aconitinum, I, 104.
Aconitum anthora, id.
id. cammarum, id.
id. napellus, id.
id. neomontanum, id.
id. racemosum, I, 107.
id. strictum, I, 104.
id. tauricum, id.
Acor aceticus crystallinus, I, 50.
id. benzoicus, I, 56.
id. boracicus, I, 58.
id. succineus, I, 100.
id. sulphuris condensatus, I, 94.
id. sulphuris merus, id.
id. tartaricus, I, 101.
Acorus adulterinus, III, 35.
id. calamus, I, 480.
id. palustris, III, 35.
id. vulgaris, id.
Actæa, I, 107.
id. racemosa, id.
id. spicata, I, 107.
Actea, id.
id. de los Alpes, id.
id. racemosa, id.
Acus veneris, II, 28.
Adelfa, I, 107.
Adeps, II, 410.
Adeps nitrate hydrargyri medicatus, III, 215.
id. tartare stibii medicatus, I, 333.
id. suillus, II, 411.
Adhatoda, I, 107.
Adianthum, II, 185.
Adianthum album, II, 185.
id. canadense, id.
id. capillus veneris, id.
id. nigrum, id.
id. pedantum, id.
id. rubrum, II, 186.
Adipocera cetosa, II, 270.
Adormidera, I, 108.
id. blanca, id.
id. marina, I, 115.
Ægagropilus, I, 461.
Aer dephlogisticatus, III, 363.
id. fixus, I, 59.
id. mephiticus, id.
id. purus, III, 363.
id. vitalis, id.
Ærugo, II, 134.
id. crystallisata, II, 138.
id. præparata, II, 134.
Æs ustum, II, 122; III, 402.
id. viride crystallisatum, II, 138.
Æsculus hippocastanum, II, 44.
Æther aceticus, II, 294.
id. aceticus martialis, II, 482.
id. cypriacus, II, 131.
id. martialis, II. 474.
id. muriaticus, II, 296.
id. muriaticus spurius, II, 298.
id. nitricus, id.
id. nitrosus, id.
id. phosphoricus, II, 296, 315.
id. phosphoro phosphoricus, II, 315.
id. spirituosus, II, 303.

Æther sulfurico-ferratus, II, 474.
id. sulfurico nitricus, II, 299.
id. sulphuricus, II, 301.
id. sulphuricus acidus, I, 98.
id. sulphuricus cum alcohole, II, 303.
id. sulphuricus aromaticus, I, 535.
id. sulphuricus alcoholicus, II, 303.
id. sulphuricus alcoholisatus, id.
id. sulphuricus camphoratus aquosus, I. 152.
id. sulphuricus ferratus, II, 474.
id. sulphuricus phosphoratus, II, 316.
id. vitriolicus, II, 301.
id. zinci, IV, 391.
Ætheroleum anethi, II, 226.
id. anisi, I, 287.
id. anthos, IV, 91.
id. aurantii, III, 261.
id. calami, I, 482.
id. cardamomi, II, 26.
id. carvi, I, 160.
id. caryophyllorum aromaticorum, III, 45.
id. chærophylli, III, 384.
id. chamœmelli, III, 84.
id. chenopodii anthelmintici, I, 291.
id. cinnamomi, II, 521.
id. coriandri, II, 107.
id. cubebarum, II, 185.
id. cumini, II, 168.
id. dictamni, II, 200.
id. fœniculi, II, 499.
id. hyssopi, II, 509.
id. juniperi baccarum, II, 222.
Ætheroleum juniperi ligni, II, 223.
id. lavandulæ, II, 280.
id. macidis, III, 257.
id. majoranæ, III, 102.
id. melissæ, IV, 273.
id. menthæ, IV, 364.
id. millefolii, III, 233.
id. monardæ, III, 245.
id. nucistæ, III, 257.
id. oregani, III, 356.
id. petroselini, III, 381.
id. peucedani, III, 386.
id. pimentæ, III, 392.
id. pulegii, III, 448.
id. rorismarini, IV, 91.
id. rosarum, IV, 110.
id. rutæ, IV, 112.
id. sabinæ, IV, 146.
id. salviæ, IV, 155.
id. santali citrini, IV, 161.
id. sasafras, IV, 170.
id. saturejæ, I, 137.
id. serpylli, IV, 210.
id. succini, IV, 238.
id. tanacethi, IV, 257.
id. terebinthinæ, IV, 294.
id. thymi, IV, 268.
id. valerianæ, IV, 336.
id. zedoariæ, IV, 391.
id. zingiberis, II, 370.
Æthiops alcalisatus, III, 118.
id. antimonialis, III, 136.
id. auripigmentalis, III, 129.
id. graphiticus, id.
id. martialis, II, 448.
id. mineralis, III, 133.
id. narcoticus, id.
id. saccharatus, III, 117.
vegetabilis, II, 21.
Æthusa cinapium, II. 89.
Æthites, II. 453.
Agalla, I. 115.
Agarico, I. 118.
id. blanco, id.
id. de los cirujanos, I. 119.
id. de encina, id.
id. muscario, I. 120.
id. de sauce, 119.
Agaricus muscarius, I. 120.
id. trochiscatus, I. 118.
Agatofilo aromatico, I. 120.
Agatophyllum aromaticum, id.
Agave, I. 120.
id. de América, id.
id. americana, id.
Agedoide, IV. 71.
Agenjo, I. 121.
id. comun, id.
id. marítimo, id.
id. mayor, id.
id. menor, id.
id. pontico, id.
id. romano, id.
id. romano oficinal, id.
Ageratum, I. 344.
Agno casto, I. 135.
Agnus castus, id.
Agracejo, id.
Agresta, IV. 345.
Agrimonia, I. 136.
Agrimonia eupatoria, id.
Agripalma, II. 27.
Agua de abedul artificial, I. 169.
id. de abeto, I. 2.
id. de acedera, I. 7.
id. de acederilla, I. 8.
id. de aciano, I. 12.
id. acidula alcanforada, I. 148.
id. acidula hidrosulfurosa, I. 86.
id. acidula simple, I. 60.
id. acústica, I. 247.
id. de agrimonia, I. 136.
id. de Aix-la-Chapelle, I. 86.
id. de agenjos, I. 122.

Agua de achicorias, I. 11.
id. alcalina gaseosa, IV. 226.
id. alcalina oximuriatada, III. 493.
id. alcanforada, I. 148.
id. de alcaravea, I. 160.
id. alexiterea, I. 274.
id. alexiterea espirituosa, id.
id. alexiterea vinagrada, I. 275.
id. de Alibour, IV, 405.
Id. de aligustre, I. 174.
id. de almáciga, I. 176.
id. de almendras amargas, I. 76.
id. aloetica mercurial, III, 143.
id. aluminada, I. 207.
id. aluminosa, id.; III, 196.
id. aluminosa de Falopio, id.
id. de amapolas, I. 213.
id. amarga, III, 55.
id. de amoniaco debilitado, I. 222.
id. de anemone, I, 272.
id. de angélica, I. 274.
id. de Anhalt, IV. 297.
id. de anís, I. 288.
id. anodina, I. 226.
id. antiasmática, II. 229.
id. antiherpética de Luynes, III. 201.
id. antihistérica, II. 50.
id. antimelancólica, I. 388.
id. antimiasmática, II. 133.
id. antimiasmática completa, id.
id. antinefrítica, IV. 224.
Agua antioftálmica, IV. 407.
id. antipsórica, IV. 220.
id. antiescorbútica, II, 144.
id. apoplética, IV. 99.
id. de arcabuzazo, I, 55; IV, 156.
id. de Armagnac, I. 532.
id. aromática espirituosa, III. 256.
id. aromática de aceite esencial de cidra, II. 101.
id. aromática compuesta, III. 95; IV. 154.
id. aromática, I. 525; IV, 275.
id. de arroz, I. 356.
id. de artemisa, I. 367.
id. artrítica, I. 82.
id. de azucenas, I. 395.
id. de Balaruc, IV. 223.
id. de Bareges, I. 86.
id. de barita, I. 426.
id. de becabunga, I. 430.
id. bendita, I. 329; IV. 169, 211.
id. bendita compuesta, IV. 169.
id. de berros, I, 458.
id. de bola marcial, II, 495.
id. de Bonferme, I. 532.
id. de Bonnes, I. 86.
id. de borraja, I. 467.
id. de Bourbonne, IV. 223.
id. de brionia compuesta, II. 51.
id. de buglosa, I. 473.
id. de cal, I. 485.
id. de cal con cera, II, 87.
id. de cal compuesta, IV. 169.
id. de cal potasada, I. 486.
id. primera de cal, id.
Agua de cal con quina, I. 487.
id. segunda de cal, I, 486.
id. de cálamo aromático, I. 482.
id. calibeada, II. 462.
id. de canela buglosada, I. 523.
id. de canela cidoniada, I. 525.
id. de canela cordial, I. 523.
id. de canela hordeada, id.
id. de canela simple, I. 522.
id. de canela vinosa, I. 524.
id. de carbonato acídulo de cal, I. 500.
id. de carbonato acídulo de hierro, II, 462.
id. de castoreo espirituoso, II. 49.
id. contra el carbunclo, I. 528.
id. de cardo santo, II, 32.
id. carmelitana, IV. 275.
id. carminativa, III. 86, 263.
id. carminativa espirituosa, III. 87.
id. carminativa simple, id.
id. de cascarilla, II. 37.
id. de castoreo espirituosa, II, 49.
id. catarral, I, 526.
id. caterética de Plenk, III, 201.
id. cáustica, id.
id. cefálica de Carlos quinto, I. 527.
id. celeste, II, 140.
id. de celidonia, II, 76.
id. de centaura menor, II. 77.
id. de cerezo aliso, I, 76.

Agua de cerezas, I. 75.
id. de cicuta, II, 94.
id. de cidra, II. 99.
id. de cilantro, II, 107.
id. de flores de ciruelo silvestre, II, 113.
id. de clavos de especia, III. 45.
id. de cloro, II. 116.
id. de coclearia, II. 144.
id. de Colonia, II. 101.
id. confortante, I. 76, 524.
id. cordial de Coladon, II. 102.
id. cordial fria, I. 523.
id. cordial temperante, I. 527.
id. de corteza de naranja, III. 262.
id. cosmética, I. 77, 182, 449, 463; III. 143; IV. 228.
id. de cuerno de ciervo compuesta, I. 247.
id. dentrifica, IV. 278.
id. de detiene buey, III. 287.
id. diurética, I. 78; IV. 60.
id. diurética alcanforada, III. 488.
id. divina, II. 100.
id. emética, I. 329, IV. 60.
id. de enebro, II. 223.
id. de eneldo, II. 227.
id. de énula, II. 229.
id. epidémica, I. 277.
id. epiléptica, III. 38.
id. de escabiosa, II. 239.
id. de escordio, II. 263.
id. esplénica, II 54.
id. de espliego, II. 280.
id. estíptica, II. 128; III. 383; IV. 404.
id. estíptica de Looff, II. 472.
id. estíptica de Marta la piadosa, II. 467.
Agua estíptica de Weber, II, 467.
id. estomacal, IV. 226. 368.
id. etérea alcanforada, I. 152.
id. de eufrasia, II. 310.
id. fagedénica, III. 187.
id. fagedénica amarilla, III. 142.
id. fagedénica blanca, III. 222.
id. fagedénica blanca compuesta, III, 222.
id. fagedénica compuesta, III. 190.
id. fagedénica de Grindel, III. 192.
id. fagedénica negra, III. 140.
id. fagedénica de Piderit, III. 190.
id. ferruginosa, II. 495.
id. ferruginosa gomada, II. 466.
id. ferruginosa salina, II. 463.
id. fétida, I. 377; II, 327.
id. fisagoga, I. 289.
id. de flores de ciruelo silvestre, II. 113.
id. de flores de naranjo, III. 262.
id. fortificante, III. 417.
id. de frambuesas, II, 319.
id. de fresas, II. 320.
id. de freza de ranas, II. 557.
id. fuerte, I 89.
id. fuerte doble, id.
id. fuerte simple, id.
id. de fumaria, II. 324.
id. fundente, IV. 233.
id. fundente de Lassone, III. 512.
id. contra la gangrena, III. 213.
id. gaseosa simple, I, 60.
Agua de golondrinas simple, I. 247.
id. gelatinosa, II. 346.
id. gomosa con c. c., II. 389.
id. de Goulard, III. 415.
id. gris, III. 214.
id. de hierro, II. 457.
id. de hinojo, II. 499.
id. de hojas de naranjo, III. 261.
id. de hollin, I. 263.
id. hidro-sulfurada, I, 83.
id. de hierro, II. 457.
id. histérica, II. 55; III. 87.
id. de Hungría, IV. 98.
id. incomparable, II, 100.
id. para la jaqueca, I. 226.
id. de Javelle, IV. 220.
id. de laurel cerezo, I. 74.
id. de Lanfranc, I. 357.
id. laxante, III. 511; IV. 200.
id. destilada de leño de Rodas, III. 17.
id. de lirio de los valles, III. 37.
id. de lirio de los valles vinosa, id.
id. de looch sani et experti, I. 524.
id. de Luce, I. 235.
id. de lupulo, III. 41.
id. de llanten, III. 43.
id. de Madama Lavrilliere, II. 147.
id. madre de sal marina, I. 505.
id. de magnanimidad, II, 511.
id. de magnesia, III. 51.
id. magnesiana gaseosa III, 55.
id. de malvas, III. 58.

Agua de manzanilla, III, 85.
id. de manzanilla anisada, III, 87.
id. de manzanilla vinosa, III. 86.
id. de mar artificial, IV. 222.
id. marcial, II. 495.
id. de marrubio, III. 97.
id. medicinal de Husson, II. 153.
id. mefítica alcalina, III. 474.
id. de mejorana, III. 102.
id. de membrillo, III. 108.
id. mercurial, III. 213, 221.
id. mercurial simple, III. 122.
id. mercurial balsámica de Plenk, III. 180.
id. mercurial compuesta, III. 219.
id. de miel, II. 107; III. 230.
id. milagrosa, II. 128.
id. de mil en rama, III. 233.
id. de mil flores, I. 466.
id. mineral, IV. 233.
id. de mirra, III. 244.
id. de mostaza, III. 253.
id. de Nápoles, I. 86.
id. de ninfea, III. 278.
id. oftálmica, I. 208, 253, 478; II. 128; III. 410, 413, 426.
id. oftálmica azul, II. 134.
id. oftálmica comun, I. 208.
id. oftálmica de Conrad, III. 199.
id. oftálmica mercurial, III. 188, 191.
Agua oftálmica resolutiva, III. 459.
id. olorosa, II. 283.
id. de opio, III. 288.
id. de orégano, III. 357.
id. oxigenada, I. 90; III. 363.
id. de pan ó panada, III. 366, 369.
id. de parietaria, III. 369.
id. de peonía, III. 375.
id. de peregil, III. 381.
id. de pez líquida, III. 386.
id. de perifollo, III. 384.
id. de pimienta de la Jamaica, III. 391.
id. de pimienta de la Jamaica vinosa, III. 392.
id. de pimienta negra, III. 391.
id. de poleo, III. 448.
id. de pollo, II. 344.
id. pontifical, III. 234.
id. de Praga, I. 377.
id. profiláctica, I. 278.
id. de prímula, III. 526.
id. purgante emetizada, IV. 233.
id. de Pyrmont, IV. 222.
id. de Pyrmont artificial, III. 51.
id. de Rabel, I. 98.
id. de rábano silvestre, IV. 58.
id. real, I. 82.
id. de la Reina de Hungría, IV. 98.
id. roja, III. 188; IV. 154.
id. de romero, IV. 97.
id. de romero compuesta, IV. 98.
id. de rosas, IV. 110.
id. de ruda, IV. 123.
id. de sabina, IV. 147.
id. safirina, II. 134.
Agua salina, III. 512.
id. de salvia, IV. 155.
id. de salvia compuesta, id.
id. de sasafras, IV. 171.
id. de sasafras compuesta, id.
id. saturnina, III. 425.
id. de sauco, IV. 177.
id. de Sedlitz artificial, III. 54.
id. de Selter, IV. 222.
id. de Seltz, id.
id. de serpol, IV. 210.
id. de Stettin, III. 202.
id. de sulfuro de potasa, III. 462.
id. sulfuro-ácida, I. 84.
id. sulfurosa, I. 86.
id. sulfurosa compuesta, id.
id. teriacal caliente, I. 276.
id. teriacal compuesta, III. 345.
id. teriacal romana, id.
id. teriacal simple, id.
id. de ternera, II. 344.
id. de torongil, IV. 274.
id. de torongil antihistérica, id.
id. de torongil espirituosa, id.
id. de Trevez, III. 54.
id. vegeto-mineral, III. 415.
id. vegeto mineral de Bell, III. 427.
id. verde, II, 139.
id. de violetas, III. 34.
id. visceral, II. 506.
id. vulneraria, I. 99; II. 279; III. 44; IV. 156.
id. vulneraria ácida, I. 54.
id. vulneraria alcanforada, III. 428.
id. vulneraria espirituosa, IV. 154.
id. de Theden, I. 55.
id. de vulvaria, IV. 353.

Agua de yerba mora, IV. 370.
id. de yezgo, IV. 179.
id. de Ivel, para los ojos, IV. 405.
id. de zedoaria anisada, IV. 391.
id. de zedoaria vinosa, id.
Aguardiente, I. 161.
id. alcanforado, I. 153.
id. aleman, II. 543.
id. amoniacal, I. 254.
id. doble, I. 161.
id. de mugeres, I. 526.
id. de guayaco, II. 421, 422.
id. purgante, II. 544.
Aire deflogisticado, I. 392.
id. fijo, I. 59.
id. vital, III. 363.
Ajedrea, I. 137.
id. de Creta, id.
id. de jardin, id.
Ajo, id.
id. ascalonia, I. 140.
id. cultivado, II. 137.
id. escorodopraso, I. 140.
Ajuga genevensis, I. 473.
id. pyramidalis, id.
id. reptans, id.
Alabastrites, I. 501.
Alabastro, I. 504.
id. yesoso, id.
Alabastrum, I. 501.
Alacranes, II, 342.
Alamo negro, I. 141.
id. temblon, I, 142.
Alazor, id.
id. leñoso, id.
Albahaca, id.
id. comun, id.
id. de hojas pequeñas, I. 143.
Albarraz, II. 284.
Albedo corticum citri, II, 98.
Albérchigo, I. 143.
Album græcum, I. 502.
Albumen aluminosum, I. 208.
Albumina aluminosa, id.
Alcahest Glauberi, III, 468.
Alcachofa, I. 145.
id. cultivada, id.
Alcali fijo mineral, IV. 223.
id. volátil, I. 218.
id. volátil cáustico, id.
id. volátil concreto, I. 238.
id. volátil fluor, I. 218.
id. ammoniacale, I. 238.
id. ammoniacum acetatum, I. 256.
id. ammoniacum causticum, I. 218.
id. ammoniacum fluidum, id.
id. ammoniacum spirituosum, I. 223.
id. ammoniacum succinatum, I. 265.
id. causticum, III. 457.
id. fixum tartarisatum, III. 502.
id. lignorum depuratum, III. 465.
id. minerale, IV, 223.
id. minerale acetatum, IV. 234.
id. minerale phosphoratum, IV. 230.
id. minerale sulfuricum, id.
id. minerale tartarisatum, III. 513.
id. minerale vitriolatum, IV. 230.
id. tartari, III. 466.
id. vegetabile cum aceto, III. 494.
id. vegetabile fixum impurum, III. 465.
id. vegetabile salito-dephlogisticatum, III, 492.
id. vegetabile tartarisatum, III. 502.
id. vegetabile vitriolatum, III. 476.
id. volatile acetatum, I. 256.
Alcali volatile æreatum, I. 238.
id. volatile anissatum, I, 225.
id. volatile aquossum I. 239.
id. volatile causticum, I. 218.
id. volatile concretum, I. 238.
id. volatile fluor, I. 218.
id. volatile nitratum, I. 250.
id. volatile purum, I. 218.
id. volatile ex sale ammoniaco, I. 238.
id. volatile tartarisatum, III. 502.
Alcaligeno, I. 145.
Alcana oriental, id.
Alcanfor, id.
Alcanforada, I. 157.
Alcanna, I. 370.
id. orientalis, I. 145.
id. spuria, I. 370.
id. vera, I. 145.
Alcaparras, I. 157.
Alcaparro, id.
Alcaravea, I. 159.
Alcea, I. 161.
id. ægyptiaca, I. 1.
Alchornia latifolia, I. 171.
Alcohol, I. 161.
id. absolutum, I. 164.
id. aceti, I. 50.
id. æthereum ferratum, II. 474.
id. alcalisatum, I. 163.
id. cum aleo perfoliata, I. 14.
id. albuminosum, II. 513.
id. ammoniæ et guaiaci, II. 423.
id. ammoniatum, I. 223.
id. ammoniatum anisatum, I. 225.
id. ammoniatum aromatisatum, I. 227.

Alcohol ammoniatum fœtidum, I. 376.
id. ammoniatum cum guaiaco, II. 423.
id. angelicæ compositum, I. 275.
id. anisi, I. 288.
id. anisi compositum, I. 289.
id. anthos compositum, IV. 98.
id. cum aromatibus compositum, I. 532.
id. cum aromatibus sulphuricatum, I. 535.
id. aromaticum, I. 525.
id. aromaticum ammoniatum, I. 227.
id. aromaticum sulphuricum, I, 535.
id. aromatizatum Coloniense, II, 101.
id. cum aurantio, III. 272.
id. cum balsamo peruviano, I. 416.
id cum benzoate ammonie, III. 306.
id. camphoræ saponaceum, III. 521.
id. camphoratum, I. 153.
id. camphoratum crocatum, I. 154.
id. castoriatum, II, 52.
id. commune, I. 164.
id. concentratissimum, I. 167.
id. concentratum, id.
id. cocratum, I. 154.
id. cum crotone cascarilla, II, 37.
id dilutum, I, 163.
id. ferratum, II. 473.
id. formicarum destillatum, II. 511.
id. fortius, I. 163.
id. helenii, IV. 98.
id. iodii, II. 515.
Alcohol juniperi compositum, II. 224.
id. cum lavandula compositum, II. 282.
id. nitrico-æthereum, II. 298.
id. nitricum æthereum, id.
id. odontalgicum, I 155.
id. opii dilutum, III. 301.
id. cum opio, III. 297.
id. potassæ, III. 459,
id. cum rheo, IV. 141.
id. salviæ vulnerarium, IV, 156.
id. saponatum, III. 519.
id. serpylli compositum, I. 226.
id. cum succino, IV. 237.
id. cum sulphate ferri tartarisatum, II. 490
id. sulphuratum, I. 98.
id. sulphuricatum, id.
id. sulfurico æthereum ferri, II. 474.
id. sulfuricum cum ferro, id.
id. cum tartrate potassæ ferratum, II. 489.
id. terebinthinæ, IV. 294.
id. Thymi, IV. 268.
id. con acibar y mirra, I. 29.
id. con los ácidos acético y sulfúrico, I. 55.
id. albuminoso, II. 513.
id. alcanforado, I. 153.
id. azafranado, I. 153, 154.
id. amoniacal, I. 223.
id. amoniacal alcanforado, I. 226.
id. de alcanfor nítrico, I. 155.
Alcohol alcanforado, I. 153.
id. amoniacal anisado, I. 225.
id. amoniacal aromático, III. 14.
id. amoniacal fétido, I. 376.
id. amoniacal con guayaco, II. 413.
id. amoniacal succinado, I. 235.
id. aromático amoniacal, I. 227.
id. de azufre, I. 397.
id. de bálsamo de copaiba, I. 410.
id. de brucina, I. 470.
id. de cidra compuesto, II. 101.
id. etéreo, II. 303.
id. fosforado, II. 315.
id. jabonoso, III, 519.
id. con ópio, III, 297.
id. polyaromatico, IV. 156.
id. puro, I. 162.
id. sobre-alcanforado, I. 153.
id. de torongil compuesto, IV. 275.
id. de trementina compuesto, IV. 296.
id. vulnerario, IV. 156.
Alcornoque, I. 171.
id. comun, id.
Alhelí, id.
id. amarillo, id.
Aletris, I. 172.
id. farinosa, id.
Alexiterio acético, I. 51.
id. amoniacal, I. 239.
id. clorico, II, 116.
id. desinfectante doble, I. 82.
id. nitrico, I. 89.
id. nitro-muriatico, I. 82.
Alfónsigo, I. 172.
Algalia, id.
Algarrobas, I. 173.
Algarrobo, I, 132.

Algodon, I, 173.
id. herbaceo, id.
id. de Malta, id.
Algourion, II, 149.
Alholba, I, 173.
Alhucema, I, 278.
Alcheted, II, 149.
Aliaria, I, 174.
id. comun, id.
Aligustre, id.
Alimento antiescorbútico, IV, 20.
Alisma plantago, IV, 42.
Aliso, I, 174.
Alkekengi, id.
Alkermes líquido, I, 534.
Alliaria, I, 174.
Allium alpinum, IV, 344.
id. ascalonicum, I, 140.
id. cepa, II, 72.
id. montanum latifolium, IV, 344.
id. sativum, I, 137.
id. scorodoprasum, I, 140.
id. victoriale, IV, 344.
Almaciga, I, 175.
Almazarron, I, 198.
Almendras, I, 178.
id. amargas, id.
id. dulces, id.
Almendro, id.
id. comun, id.
id. enano, id.
Almidon, I, 188.
Almizcle, I, 190.
id. artificial, IV, 239.
Alnus glutinosa, I, 174.
Aloe, I, 13.
id. barbadensis, id.
id. capensis, id.
id. depurata, I, 14.
id. hepatica, I, 13.
id. insuccata, I, 14.
id. linguæ formis, I, 13.
id. lota, I, 14.
id. lucida, I, 13.
id. pellucida, id.
id. perfoliata, id.
id. præparata, I, 14.
id. purificata, I, 15.
id. rosata, I, 14.
Aloe socotrina, I, 13.
id. socoterina, id.
id. socotorina, id.
id. succotrina, id.
id. violata, I, 14.
id. vulgaris, I, 13.
Aloes, véase *Acibar*.
Aloysia, IV, 341.
Alpinia galanga, II, 324.
Alquimila, I, 197.
Alsine, I, id.
id. media, id.
Althæa, III, 59.
id. officinalis, id.
id. rosea, id.
Altramuz, I, 197.
id. blanco, id.
Alumbre, I, 201.
id. calcinado, I, 202.
id. dragonizado, I, 203.
id. quemado, I, 202.
id. de roca, id.
id. de Roma, id.
id. sacarino, I, 204.
Alumen, I, 201.
id. calcinatum, I, 202.
id. draconisatum, I, 203.
id. exiccatum, I, 202.
id. kinosatum, I, 204.
id. plumosum, I, 217.
id. à roca, I, 202.
id. rupei, id.
id. rupeum, id.
id. saccharinum, I, 204.
id. scissile, I, 504.
id. tinctum, I, 203.
id. ustum, I, 202.
Alumina, I, 197.
id. facticia, I, 198.
id. natural, I, 197.
id. ocreosa encarnada, I, 198.
id. silicea ferruginosa, id.
Aliminio, I, 197.
Amalgama de estaño, II, 287.
Amanita muscaria, I, 119.
Amapola, I, 212.
Amara dulcis, II, 202.
Amaranthus luteus, II, 17.
Amaryllis zeylanica, II, 244.
Ambar, I, 215.
id. amarillo, IV, 236.
id. gris, I, 215.
id. negro, I, 386.
Ambarum cineritium, I, 215.
Ambarvalis, III, 450.
Ambra ambrosaica, I, 215.
id. flava, IV, 236.
id. grisea, I, 215.
id. vera, id.
Ambutua, I, 474.
Amianthus, I, 217.
Amianto, id.
Ammi creticum, IV, 218.
id. verum, id.
Ammonia caustica, I, 218.
id. caustica líquida, id.
id. líquida, id.
id. muriatica, I, 251.
id. præparata, I, 238.
id. pura, I, 218.
id. pura liquida, id.
Ammoniaca alcoholisata, I, 223.
Ammoniacum, I, 218.
id. causticum, id.
Ammoniacum succinarum, I, 236.
id. volatile mite, I, 238.
Ammonium carbonicum, I, 240.
id. carbonicum pyro-oleosum, id.
id. muriaticum, I, 251.
id. muriaticum depuratum, id.
id. muriaticum martiale, II, 477.
id. muriaticum martiatum, id.
id. subcarboneum, I, 238.
id. subcarbonicum pyro-oleosum, I, 240.
id. sulphuricum, I, 250.
id. tartaricum, III, 514.

Ammoníuretum cupri , II, 129.
Amomo falso , IV , 218.
id. zerumbet, I , 217.
Amomum , III, 390.
id. racemosum, II , 26.
id. repens, id.
id. zedoaria, IV, 389.
id. zerumbet, I , 217.
id. zingiber, II, 368.
Amoniaco, I, 218.
id. alcoholico succinado , I , 236.
id. anisado , I , 225.
id. liquido, I , 218.
id. succinado , I, 236.
Amoniuro de cobre , II, 122 , 131.
id. de cobre compuesto, II, 129.
id. de mercurio , III , 205.
id. de oro , III, 361.
id. de zinc , IV, 400.
Amoracum , III, 102.
Amygdalæ, I, 178.
id. amaræ, id.
id. dulces, id.
Amygdalus communis , id.
id. nana , id.
Amylum , I , 188.
id. hordei , II , 67.
Amyris elemifera , II , 214.
id. gileadensis , I , 415.
id. opobalsamum , I , 268, 415.
id. opobalsamo , I , 268.
Anacardium longifolium , I, 269.
Anacardo , id.
Anagalide , id.
id. rojo, id.
Anagallis , id.
id. maris , id.
id. phœnicea , id.
Anatron, III , 479.
Anchusa officinalis, I, 472.
Ancas de rana , II , 341.
Ancusa , I, 270.
id. amarilla , id.
id. de tintoreros , id.
Andropogon nardus , III , 276.
Andropogon schenathus, II, 545.
Androsemo , I, 270.
Anemone , id.
id. de los bosques , id.
id. de los prados , I , 271.
id. nemorosa , id.
id. pratensis, id.
id. pulsatila , id.
Anemoneum , I, 371.
Anemonino , id.
Anethum feniculum , II, 498.
id. graveolens, II, 226.
id. hortense , id.
id. ursinum, III , 110.
Angelica archangelica, I , 273.
id. hortensis , id.
id. sativa , id.
id. sylvestris , id.
id. espinosa , I , 345.
id. de jardines , I , 373.
id. silvestre , id.
Anguis odoratus , I , 492.
Angustura ferruginea , I, 283.
id. spuria , id.
id. vera , id.
id. falsa , id.
id. ferruginosa , id.
id. verdadera , id.
Anima rhabarbari , IV, 136.
id. rhei , id.
Anime (goma), I , 285.
Anis, id.
id. cultivado , id.
id. estrellado , I , 290.
id. de la China , id.
id. falso , II , 168.
Anisum sinense , I , 290.
id. stellatum , id.
Anserina antihelmintica , I , 290.
id. vermifuga, id.
id. vulgar , id.
Antennaria dioica , III , 338.
Anthemis cotula , III , 82.
Anthemis nobilis, III , 82.
id. pyretrum, III, 371.
id. tinctoria , III , 83.
Anthora, I, 104.
Anthos, IV, 88.
Antidotus mitrhidatica Damocrates, III , 329.
Antihectico de Potier , II, 288.
Antihecticum Poterii , II, 288.
Antimonio , I , 291.
id. catartico de Wilson, I, 295.
id. crudo , I , 304.
id. diaforético de Keup, I , 296.
id. diaforético lavado , id.
id. diaforético no lavado , I , 302.
id. diaforético marcial, I , 296.
id. preparado, I, 304.
id. sulfurado , id.
Antimonii minera , id.
Antimonium , I , 291.
id. calcinatum cum nitro, I, 302.
id. crudum , I , 304.
id. crudum preparatum, id.
id. diaphoreticum ablutum , I, 296.
id. diaphoreticum lotum, id.
id. diaphoreticum nitratum , I , 302.
id. diaphoreticum non ablutum , id.
id. diaphoreticum rubrum , I , 293.
id. muriaticum , I , 323.
id. nativum , I , 304.
id. salitum , I , 323.
id. tartarisatum , I , 324.
id. ustum cum nitro , I , 302.
id. vitrificatum , I , 295.

Antirrino, I, 340.
id. mayor, id.
Antirrhinum, I, 295.
id. majus, id.
Añil, id.
Aparines, I, 341.
Apatito, I, 501.
Apio, I, 341.
Apis mellifica, III, 229, 527.
Apium graveolens, I, 341.
id. montanum, III, 357.
id. pætreum, III, 379.
id. petroselinum, id.
id. saxatile, id.
Apocema amargo, II, 362.
id. antiherpético y tónico, II, 320.
id. antiescorbútico, II, 143; IV, 65.
id. anti-ictérico, IV, 44.
id. aperitivo, I, 352; II, 269.
id. aperitivo ferruginoso, I, 343, 352.
id. aperitivo tónico, III, 287.
id. de las cinco raices, II, 270.
id. depurativo y diurético, II, 269.
id. depurativo y tónico, IV, 232.
id. diurético, II, 74; IV, 66.
id. febrífugo y pectoral, IV, 39.
id. febrífugo y purgante, IV, 44.
id. hidragogo, I, 138.
id. laxante, IV, 232.
id. pectoral é incisivo, II, 251.
id. refrigerante, II, 71.
id. sudorífico, IV, 378.
id. temperante, II, 71.
id. tónico, IV, 119.
id. tónico y demulcente, IV, 43.
Apocino, I, 344.
Apocynum androsæmifolium, I, 344.
Aqua absinthii, I, 122.
id. acaciæ florum, II, 113.
id. acetatis superplumbici, III, 415.
id. acetosellæ è succo, I, 8.
id. acidi carbonici, I, 60.
id. acidi carbonici camphorata, I, 148.
id. acidulata, I, 60.
id. acustica, I, 247.
id. Ludovici, IV, 335.
id. ærata, I, 60.
id. ærata alcalina, III, 474.
id. aeris fixi, I, 60.
id. alcalina oxymuriatica, III, 493.
id. alexiteria simplex, I, 274.
id. aloetica mercurialis, III, 143.
id. aluminis vitriolata, I, 210.
id. aluminosa, I, 207.
id. aluminosa Bateana, IV, 404.
id. amara, III, 55.
id. ammoniæ, I, 218, 239.
id. ammoniæ acetatæ, I, 256.
id. ammoniæ causticæ, I, 218.
id. ammoniæ diluta, I, 222.
id. ammoniæ puræ, I, 218.
id. amygdalarum amarum, I, 76.
id. anemones, I, 272.
id. angelicæ Viennensis, III, 78.
id. anhaltina, IV, 297.
id. anisi, I, 288.
id. anthemidis destillata, III, 85.
id. anthos, IV, 97.
id. anthos composita, IV, 98.
Aqua antimelancholica, I, 388.
id. antimiasmática, II, 133.
id. antiescorbútica, II, 144.
id. apoplectica, IV, 99.
id. aromática, I, 525; IV, 159.
id. aromatica cum opio, III, 296.
id. armoraciæ, IV, 59.
id. adstringens, IV, 404.
id. atriplicis fœtidæ, IV, 353.
id. aurantii florum, III, 262.
id. aurantiorum corticorum, id.
id. aurantiorum corticorum alcoholica, III, 263.
id. aurantiorum corticorum spirituosa, id.
id. aurantiorum corticorum vinosa, id.
id. barytæ, I, 428.
id. baryticæ, I, 426.
id. benedicta Rulandi, I, 328.
id. benedicta serpylli, IV, 210.
id. benzoica, I, 449.
id. betulæ artificialis, I, 169.
id. ad botium, II, 25.
id. brioniæ albæ composita, II, 51.
id. cœlestis, II, 140.
id. calami radicis, I, 482.
id. calcariæ acidula, I, 500.
id. calcariæ sulphureto-stibiata, I, 322.
id. calcariæ ustæ, I, 485.
id. calcis, id.
id. calcis cum cera, II, 87.
id. calcis cerata, id.

Aqua calcis cum china, IV. 32.
id. calcis vivæ, I, 485.
id. calcis vulneraria, III, 44.
id. camphoræ, I, 148.
id. camphorata Batea—na, II, 126.
id. caponis, II, 344.
id. carbonatis ammo—niæ, I, 218.
id. carbonatis calcis aci—duli, I, 500.
id. carbonatis potassæ aciduli, III, 474.
id. carbonatis sodæ aci—duli, IV, 226.
id. carbonica, I, 60.
id. carbunculi, I, 528.
id. Carmelitana, IV, 275.
id. carminativa, II, 108.
id. seminis carvi desti—llata, I, 160.
id. cariophyllorom aro—maticorum, III, 45.
id. castorei vinosa, II, 49.
id. catapultarum, IV, 156.
id. caustica ad condylo—mata, III, 192, 220.
id. celestis, II, 140.
id. cerasorum nigro—rum, I, 75.
id. cerasorum nigro—rum alcoholica, I, 76.
id. chamæmeli, III, 85.
id. chamomillæ, id.
id. chamomillæ vinosa, III, 86.
id. cinnamomi buglossa—ta, I, 523.
id. cinnamomi cordialis, id.
id. cinnamomi cydonia—ta, I, 525.
id. cinnamomi hordea—ta, I, 523.
Aqua cinnamomi simplex, I, 522.
id. cinnamomi spirituo—sa, I, 524.
id. cinnamomi sine vino, I, 522.
id. cinnamomi vinosa, I, 524.
id. citreorum corticum, II, 99.
id. citri totius, II, 100.
id. cochleariæ, I, 144.
id. Coloniensis, II, 101.
id. confortativa, I, 76, 524.
id. cornu cervi citrata, II, 348.
id. cosmetica, I, 449.
id. cupri ammoniacalis, II, 134, 140.
id. cupri ammoniaci, II, 134.
id. cupri ammonio-muriatici, II, 133.
id. cupri vitriolati com—posita, II, 128.
id. cydoniorum, III, 108.
id. diatron, I, 93.
id. diuretica ex nucleis, I, 78.
id. divina Fernelii, III, 187.
id. divina mirabilis, II, 100.
id. ebuli, IV, 179.
id. embryonum, IV, 159.
id. emetica, I, 329.
id. epidemica Londinen—sis, I, 277.
id. epileptica Langii, III, 38.
id. exiccans, III, 414.
id. florum omnium, I, 466.
id. fæniculi, II, 499.
id. fœtida, I, 327; II, 327.
id. fortis, I, 89.
id. fragariæ, II, 320.
id. fragorum, id.
id. ad gingivas, I, 209.
id. Goulardi, III, 415.
Aqua grisea, III, 214.
id. grisea Gohlii, id.
id. hepatica, I, 83.
id. hepatica accidulata, I, 84.
id. hordeata cum gum—mi, II, 69.
id. hordei, II, 67.
id. Hungarica, IV, 98.
id. hydrargyri muriati—ci corrosivi cum opio, III, 199.
id. hydrargyri muriati—ci corrosivi nigra, III, 140.
id. hydrocyanica vege—tabilis, I, 77.
id. hydrosulphurata, I, 83.
id. hydrosulphurica a—cida, I, 84.
id. hydrosulphurica a—cidula, id.
id. hysterica, II, 50.
id. immortalis, II, 108.
id. irundinum cum cas—toreo, II, 50.
id. juniperi, II, 223.
id. kali, III, 468.
id. kali puri, III, 454.
id. kali sulphurati, III, 463.
id. kalino-ætherea, III, 470.
id. laurocerasi, I, 74.
id. laurocerasi cum be—lladona, I, 447.
id. laxativa, IV, 200.
id. ligustri, I, 174.
id. liliorum convallium, III, 37.
id. liliorum convallium, vinosa, id.
id. lithargyrii acetatis, III, 411.
id. lithargyrii composi—ta, III, 415.
id. lithontriptica, III, 474.
id. Luciæ, I, 235.
id. lupuli, III, 41.
id. magnanimitatis, II, 511.

Aqua magnanimitatis simplex, id.
id. magnesiæ, III, 51.
id. marina, IV, 222.
id. mastichina, I, 176.
id. melisæ composita, IV, 275.
id. melisæ spirituosa composita, id.
id. menthæ alcoholica, IV, 367.
id. menthæ spirituosa, id.
id. menthæ vinosa, id.
id. mellis Andernaci, III, 230.
id. mellis odorata regia, II, 104.
id. mercurialis, III, 202, 221.
id. mercurialis composita, III, 219.
id. mercurialis nigra, III, 140.
id. mercurii vivi cocta, III, 113.
id. mercurii vitriolati, III, 196.
id. mineralis cathartica, III, 53.
id. mineralis ferrata, II, 463.
id. miraculosa, II, 128.
id. mulsa, III, 230.
id. muriatico mercurialis rubra, III, 140.
id. naphæ, III, 262.
id. naphæ florum, id.
id. nephritica, IV, 224.
id. odorifera, II, 283.
id. ononidis, III, 287.
id. ophtalmica, III, 413; IV, 401, 404.
id. ophtalmica alumi—nosa, I, 208.
id. ophtalmica adstringens, IV, 401.
id. ophtalmica alba danica, IV, 46, 407.
Aqua ophtalmica cœrulea, II, 134, 140.
id. ophtalmica Conradi, III, 199.
id. ophtalmica mercurialis, III, 189, 199.
id. ophtalmica odhelii, IV, 405.
id. ophtalmica usualis, IV, 395.
id. ophtalmica vitriolica, IV, 401.
id. ophtalmica è vitriolo zinci, id.
id. opii, III, 288.
id. oxygenata, II, 116; III, 363.
id. oxygeno—muriatica, id.
id. oxymuriatica, II, 117.
id. papaveris erratici, I, 213.
id. paralyseos, III, 526.
id. perlata, I, 76.
id. pestilentialis, I, 154.
id. phagædenica, III, 187.
id. pimentæ, III, 391.
id. pimentæ vinosa, III, 392.
id. pini turionum, I, 2.
id. picea s. picis, III, 386.
id. plumbi acetosi, III, 415.
id. pontificalis, III, 234.
id. portulacæ, IV, 342.
id. potassæ, III, 454.
id. potassæ puræ, id.
id. Pragensis, I, 377.
id. prophilactica, I, 278.
id. prophilactica lauro-cerasi, I, 60.
id. prophilactica padi, I, 76.
id. pulegii, III, 448.
Aqua pulsatillæ nigricantis, I, 272.
id. Rabelii, I, 98.
id. ranunculi albi, I, 272.
id. regia, I, 82.
id. regis, id.
id. reginæ Hungariæ, IV, 98.
id. rosæ, IV, 110.
id. rosarum, id.
id. rubi Idæi, II, 319.
id. rutæ, IV, 123.
id. sabinæ, IV, 147.
id. cum saccharo saturni, III, 425.
id. salviæ, IV, 155.
id. salviæ spirituosa, id.
id. sambuci, IV, 177.
id. sine pari, II, 100.
id. saphirina, II, 134, 140.
id. sasafras, IV, 171.
id. sasafras composita, id.
id. saturni, III, 415.
id. saturnina, III, 413, 415.
id. scabiosæ, II, 239.
id. sclopetaria, I, 55; IV, 156.
id. sclopetaria aromática, IV, 156.
id. scordii, II, 263.
id. scordii composita, III, 345.
id. serpyllii, IV, 210.
id. serpyllii composita, id.
id. ad sinoviam, III, 214.
id. sodæ, IV, 226.
id. spermatis ranarum, II, 357.
id. sperniolæ, id.
id. splenetica, II, 54.
id. Stettinensis, III, 202.
id. stibiata, I, 329.
id. styptica, II, 128, 467.
id. styptica Clementina, 99.

Aqua sulphatis aluminæ, I, 207.
id. sulphatis magnesii carbonici, III, 55.
id. sulphureti ammoniæ, I, 255.
id. sulphureti kali, III, 462.
id. supercarbonatis kalici, III, 474.
id. supercarbonatis potassæ, id.
id. supercarbonatis sodæ, IV, 226.
id. ad synoviam, III, 214.
id. tanaceti, IV, 258.
id. tenellorum cornu cervi composita, I, 247.
id. Thediana, I, 55.
id. theriacalis frigida, III, 345.
id. theriacalis romana, id.
id. theriacalis simplex, id.
id. thymi, IV, 262.
id. thyliæ, IV, 365.
id. tormentilæ, IV, 270.
id. ad tormina infantum, IV, 369.
id. traumática, IV, 156.
id. traumatica Thedenii, I, 55.
id. de tribus, I, 93.
id. typhori cervi composita, I, 247.
id. valerianæ, IV, 337.
id. valerianæ composita, id.
id. vanillæ, IV, 339.
id. vegetabilis mineralis Goulardi, III, 415.
id. vegeto-mineralis Goulardi, id.
id. veronicæ, IV, 343.
id. veronicæ vinosa, id.
Aqua violacea, III, 34.
id. violarum, id.
id. vitæ, I, 161.
id. vitæ mulierum, I, 526.
id. vitæ rectificata, I, 163.
id. vitæ saponacea, III, 521.
id. vitrioli alba, IV, 401.
id. vitrioli cærulea, II, 128, 134.
id. vulneraria, I, 55; III, 95; IV, 156.
id. vulneraria calcis, III, 44.
id. vulneraria romana, III, 234.
id. vulneraria spirituosa, IV, 154, 156.
id. vulneraria succorum vegetabilium, III, 234.
id. vulneraria vinosa, IV, 156.
id. zedoariæ anisata, IV, 391.
id. zedoariæ vinosa, id.
Aquila alba, III, 157.
id. mitigata, id.
Aquilaria ovata, III, 365.
Aquilea, I, 344.
id. enana, id.
id. moscada, id.
id. negra, id.
id. viscosa, id.
Aquilegia, I, 345.
id. vulgaris, id.
Aralia, id.
id. espinosa, id.
id. de tallo desnudo, id.
Aralia nudicaulis, id.
id. espinosa, id.
Arandano, id.
id. agrio, id.
Aranea doméstica, I, 346.
Araña, id.
id. de las cuebas, id.
id. doméstica, id.
Arapabaca, II, 274.
Arbol de la vida americano, I, 347.
id. de la vida del Canadá, id.
Arbor vitæ, id.
Arbutus uva ursi, II, 338.
Arcano cosmético, III, 56.
Arcanson, IV, 308.
Arcanum Archiedati, I, 490.
id. bechicum Willisii, III, 464.
id. corallinum, III, 143.
id. cosmeticum, III, 56.
id. duplicatum Mynsichti, III, 476.
id. tartari, III, 494.
Arcilla calcarea, I, 198.
Argel, IV, 180.
Argentaria, I, 290.
Argentina, id.
Argentum, III, 398.
id. nitratum, id.
id. nitricum, id.
id. nitricum cristallisatum, id.
id. nitricum fusum, III, 399.
id. vivum, III, 111.
Argilla ferruginea rubra I, 198.
id. pura, id.
id. sulphurica, I, 201.
id. sulphurica alcalisata, id.
id. sulphurica usta, I, 202.
Arguet, IV, 180.
Aristolochia cava, II, 321.
id. clematites, I, 347.
id. cretica, id.
id. tabacea, II, 321.
id. longa, I, 347.
id. pistolachia, id.
id. polyrrhiza, id.
id. rotunda, id.
id. serpentaria, I, 348.
id. tenuis, I, 347.
id. trilobata, I, 348.
id. vulgaris, I, 347.

Aristolochia rotunda, I, 347.
Aristoloquia, id.
id. clematitis, id.
id. comun, id.
id. larga, id.
id. prima, id.
id. redonda, id.
id. tenue, id.
id. vulgar, id.
Armoracia, IV, 59.
Arnica, I, 350.
id. montana, id.
id. Planensis, id.
id. spuria, II, 227.
id. Suedensis, id.
Arnoglossum, III, 42.
Arrayan, I, 354.
id. bastardo, I, 355.
id. brabantico, id.
id. comun, I, 354.
Aroph Paracelsi, II, 477.
Arseniato de amoniaco, I, 365.
id. de hierro, I, 366.
id. de potasa, I, 365.
id. de sosa, I, 364.
Arsenias ammoniæ, id.
id. kali, id.
id. sodæ, I, 365.
Arsenico, I, 356.
id. blanco, I, 359.
id. sulfurado amarillo, I, 356.
id. sulfurado rojo, I, 357.
Arsenicum antimoniatum, I, 359.
id. crudum, id.
id. flavum, I, 357.
id. arsenicum rubrum, id.
Arsenidum sodæ liquidum, I, 364.
Arsenis potassæ aquosus, I, 362.
id. potassæ liquidus, id.
Arsenito de potasa, I, 362.
id. de sosa, I, 364.
id. de sosa líquido, id.
id. de sosa líquido compuesto, id.
Artanita, I, 366.
Artemisa, I, 366.
id. de la China, id.
id. vulgar, id.
Artemisia alba, I, 366.
id. abrotanum, I, 5.
id. campestris, id.
id. Chinensis, I, 366.
id. contra, IV, 215.
id. dracunculus, II, 290.
id. glacialis, II, 371.
id. judaica, IV, 215.
id. maderapatana, I, 121.
id. maritina, id.
id. pontica, id.
id. rubra, I, 366.
id. rupestris, II, 370.
id. vallesiana, II, 371.
id. vulgaris, I, 366.
Arthanita, id.
Arum, IV, 353.
id. arisarum, id.
id. dracunculus, IV, 354.
id. maculatum, id.
id. triphyllum, id.
Arundo donax, II, 19.
id. phragmites, id.
id. saccharifera, I, 395.
Arrach, I, 161.
Arrayan, I, 354.
id. bastardo, I, 355.
id. comun, I, 354.
id. brabantico, I, 355.
id. brabantico oloroso, id.
Arrope, véase *Rob.*
Arrowroot, I, 355.
Arróz, id.
Asa, I, 368.
id. dulcis, I, 448.
id. fœtida, I, 368.
Asafetida, id.
Asaro, I, 379.
id. del Canadá, id.
id. de Europa, I, 380.
Asarum Canadense, I, 379.
id. Europeum, I, 380.
Asbestus, I, 217.
Asclepias incarnata, I, 382.
id. syriaca, id.
id. tuberosa, id.
id. vincetoxicum, IV, 339.
Asclepias, II, 382.
id. encarnada, id.
id. de la Siria, id.
id. tuberosa, id.
id. vencetosigo, IV, 339.
Asfalto, I, 382.
Asfodelo, I, 383.
id. ramoso, id.
Asparaginum, II, 268.
Asparagus hortensis, II, 268.
id. officinalis, id.
id. sativus, id.
Asperula odorata, I, 383.
Asperula, id.
id. olorosa, id.
Asphaltum, I, 382.
Asphaltus, id.
Asphodelus albus, I, 383.
id. maris, id.
id. ramosus, id.
Aspidium coriaceum, I, 479
id. Rhæticum, II, 185.
Asplenium, id.
id. adianthum nigrum, id.
id. ruta muraria, IV, 124.
id. trichomanes, II, 185.
Astacus fluviatilis, I, 495.
Astragalo, I, 383, 501.
Astragalus creticus, II, 398.
id. ex scapus, I, 383.
id. gummifer, II, 398.
id. verus, id.
Atamanta cretensis, II, 189.
id. de Creta, id.
Athanasiæ, IV, 255.
Athyrium filix mas, II, 436.
Atriplex, I, 384.
id. angustifolia, id.

Atriplex fœtida, IV, 353.
id. glauca, I, 384.
id. hortensis, id.
id. olida, IV, 353.
id. sativa, I, 382.
Atropa belladona, I, 444.
id. mandragora, III, 81.
Atropia, I, 444.
Atropina, id.
Atmella, I, 103.
Aurantium, III, 258.
id. curassavicum, III, 259.
id. hispalense, id.
Auricula Judæ, III, 357.
id. muris majoris, III, 438.
Auridum ammoniacæ, III, 361.
Auripigmentum, I, 357.
Auris ceti, I, 502.
Aurum, III, 357.
id. fulminans, III, 361.
id. horizontale Zwingeri, III, 360.
id. oxydatum, III, 359.
id. mosaicum, II, 288.
id. muriaticum, III, 358.
id. potabile, III, 359.
Avellana, I, 384.
Avellanas, id.
Avellano, id.
Avena, I, 385.
id. cultivada, id.
id. desnuda, id.
id de Oriente, id.
id. ex corticata, id.
id. nuda, id.
id. orientalis, id.
id. sativa, id.
Avicula margaritifera, I, 494.
Axungia anatis, II, 411.
id. anguillæ, II, 412.
id. anseris, id.
id. ardeæ, id.
id. canis, II, 411.
id. caponis, id.
id. castoris, II, 410.
id. cati sylvestris, id.
Axungia ciconiæ, II, 11.
id. coturnis, id.
id. cuniculi, id.
id. equi è collo, II, 410.
id. equi è juba, id.
id. erinacei, II, 411.
id. gallinæ, II, 412.
id. hominis, II, 411.
id. leporis, id.
id. lucis piscis, II, 412.
id. lupi, II, 411.
id muris alpini, id.
id. muris montani, id.
id. nitrica, I, 91.
id. oxygenata, id.
id. phoci, II, 411.
id. porci, id.
id. porcina, id.
id. serpentum, II, 412.
id. sui scrophæ, II, 411.
id. suillæ, id.
id. pedum tauri, II, 410.
id. taxi, id.
id. ursi, II, 411.
id. viperarum, II, 412.
id. vulpis, II, 411.
Azabache, I, 386.
Azaderac, II, 108.
Azafran, I, 386.
id. de antimonio, I, 303.
id. bastardo, I, 142; II, 152.
id. de los indios, II, 187.
id. de marte, II, 456.
id. de marte aperitivo, id.
id. de marte aperitivo antimoniado de Sthal, II, 454.
id. de marte por el azufre, id.
id. de metales, I, 303.
id. de los prados, II, 152.
Azoe, I, 392.
Azofaifas, id.
Azofaifo, id.
Azucar, I, 395.
Azucar antelmintica, III, 116.
id. de cebada, II, 67.
id. de leche, III, 15.
id. de mercurio, III, 117.
id. mercurial, III, 116.
id. mercurial compuesta, III, 130.
id. naranjada purgante, II, 529.
id. de plomo, III, 421.
id. de quina, IV, 31.
id. de saturno, III, 421.
Azucena blanca, I, 394.
id. comun, id.
Azufre, I, 397.
id. de antimonio, I, 315.
id. de antimonio dorado, id.
id. de antimonio dorado líquido, I, 319.
id. de antimonio hidrogenado, I, 315.
id. en cilindros, I, 397.
id estibiado, I, 333.
id. precipitado, I, 397.
id. sublimado, id.

B.

Baccæ Norlandicæ, IV, 374
Baculi liquiritiæ albi, IV, 76.
id. liquiritiæ citrini, IV, 77.
Badiana, I, 290.
Bahos balsamicos, I, 421.
Balaustia, II, 408.
Balaustias, id.
Balsamina, I, 408.
Balsamita, id.
Balsamita mas, id.
id. odorata, id.
Balsamo de acero, II, 470.

Bálsamo acético alcanforado, III, 523.
id. acústico, I, 418, 441, 463; II, 74.
id. de agujas, II, 470.
id. anodino, II, 74; III, 304, 522.
id. antiartrítico, III, 523.
id. anticanceroso, III, 324.
id. antihistérico, I, 21.
id. antiodontalgico, III, 323.
id. antipleurítico, I, 478.
id. apopléctico, IV, 92.
id. de Arceo, IV, 285.
id. de Arceo líquido, IV, 286.
id. aromático, I, 249; III, 47; IV, 92.
id. aromático etéreo, II, 49.
id. artrítico, III, 304.
id. astringente, IV, 302.
id. de azufre anisado, I, 403.
id. de azufre simple, id.
id. de azufre succinado, id.
id. de azufre trementinado, id.
id. de Basville, IV, 307.
id. blanco, I, 415, 420.
id. del Brasil, I, 409.
id. del Cairo, I, 415.
id. de Calaba, IV, 248.
id. del Canadá, I, 408.
id. de canela, I, 521.
id. de Cartagena, I, 420.
id. cefálico, IV, 92.
id. Chiron, IV, 290.
id. del Comendador de Perne, I, 449.
id. de Condom, I, 196.
Bálsamo de Constantinopla, I, 415.
id. de Copaiba, I, 409.
id. dulcificante, III, 75.
id. de Egipto, I, 415.
id. de espliego, II, 281.
id. etéreo, I, 404.
id. de Feuillet, II, 137.
id. de Fioravanti, IV, 296.
id. de Fioravanti espirituoso, IV, 296.
id. de Fioravanti oleoso, id.
id. de Fioravanti negro, id.
id. focot, IV, 248.
id. de Fourcroy, IV. 310.
id. de Frahm, IV, 284.
id. de Galaad, I, 415.
id. de Genoveve, IV, 289.
id. de Gilead, I, 408.
id. de Gilead falso, id.
id. de Goulard, III, 423.
id. del gran Cairo, I, 415.
id. de guayaco, II, 429.
id. de guayaco jabonoso, id.
id. de Indias, I, 416.
id. de jabon, III, 521; IV, 305.
id. de Judea, I, 415.
id. de Leictour, I, 196.
id. de Liboschitz, II, 8.
id. Locatelli, IV, 288.
id. Maria, IV, 248.
id. de la Meca, I, 415.
id. de mejorana, III, 102.
id. mercurial, III, 149.
id. mercurial de Plenk, III, 123.
id. de Metz, II, 137.
id. de mirra, III, 241.
id. narcótico, IV, 302.
id. nerval, IV, 92.
id. nervino, III, 8.
id. de nuez moscada, III, 257.
Bálsamo oftálmico, III, 148; IV, 96.
id. oftálmico amarillo, III, 146.
id. oftálmico de St-Ives, III, 149.
id. opodeldoch, I, 233.
id. de oro, III, 361.
id. pectoral, IV, 90.
id. del Perú, I, 416.
id. del Perú blanco, id.
id. del Perú negro, I, 416.
id. del Perú seco, id.
id. de plomo, III, 411.
id. rakasyra, I, 420.
id. resolutivo, I, 419.
id. de ruda, IV, 123.
id. de Salazar, I, 28.
id. contra los sabañones, IV, 304.
id. de saturno, III, 423.
id. de saturno de Geulard, III, 420.
id. samaritano, IV, 348.
id. sajon, IV, 92.
id. de Schauer, IV, 298.
id. somnífero, III, 305.
id. de succino, III, 524; IV, 239.
id. de Siria, I, 415.
id. de trementina, IV, 315.
id. de Tolú, I, 420.
id. tranquilo, I, 439.
id. traumático, I, 449.
id. universal, III, 417.
id. verde, II, 134; IV, 248, 291.
id. de vida, I, 522.
id. de vida de Leliebre, I, 43.
id. de vida blanco, IV, 298.
id. de vida esterno, IV, 305.
id. de vida de Hoffman, IV, 95.
id. de vida de Ruland, I, 403.

Bálsamo de Vinceguere, I, 196.
id. vulnerario, IV, 286, 295.
id. vulnerario comun, IV, 280.
id. vulnerario de Dippel, II, 491.
id. vulnerario vegetal, III, 234.
Balsamum adstringens, IV, 302.
id. ægyptiacum, I, 415.
id. æthereum, I, 404.
id. anodynum, III, 304, 522.
id. apoplecticum, IV, 92.
id. Aparitii, II, 506.
id. Arcæi, IV, 285.
id. aromaticum, IV, 92.
id. aromaticum æthereum, II, 49.
id. Basvillianum, IV, 307.
id. è benzoe, I, 149.
id. Brasiliense, I, 409.
id. Calaba, IV, 248.
id. Canadense, I, 408.
id. catholicum, I, 449.
id. ex vino, II, 502.
id. cum spiritu vini, II, 503.
id. cephalicum saxonicum, IV, 92.
id. chalibeatum, II, 470.
id. cinnamomii, I, 521.
id. Commendatoris, I, 449.
id. Copaivai, I, 409.
id. Copaivæ, id.
id. ad dentitionem, III, 75.
id. embryonum, IV, 159.
id. Fioravanti, IV, 296.
id. Fioravanti nigrum, id.
Balsamum Fioravanti oleosum, IV, 296.
id. Fioravanti spirituosum, id.
id. Frahmii, IV, 284.
id. Gileadense, I, 415.
id. guajacinum, II, 423.
id. Hungaricum, IV, 279.
id. Indicum, I, 416.
id. Indicum album, id.
id. Indicum nigrum, id.
id. Indicum siccum, id.
id. inocentianum, II, 502.
id. ischæmaticum, IV, 302.
id. italicum, IV, 288.
id. italicum rubrum, id.
id. judaicum, I, 415.
id. lectorense, I, 196.
id. Locatelli, IV, 288.
id. Mariæ, IV, 248.
id. de Mecca, I, 415.
id. Meccanesis, id.
id. mercuriale, III, 215.
id. mercuriale Plenkii, III, 123.
id. nativum, IV, 279.
id. nervinum, IV, 92.
id. nucistæ, III, 257.
id. nucistæ expressum, III, 256.
id. olei, II, 398.
id. ophtalmicum rubrum, III, 146.
id. opthalmicum Yveanum, III, 149.
id. ophtalmicum Richeri, III, 147.
id. orientale, I, 415.
id. palustre, IV, 359.
id. persicum, I, 449.
id. peruvianum, I, 416.
id. peruvianum album, id.
id. peruvianum nigrum, id.
Balsamum peruvianum siccum, id.
id. pini nativum, IV, 279.
id. pleuriticum, I, 478.
id. Rakasyra, I, 420.
id. rutæ, IV, 123.
id. saponaceum, III, 521.
id. saponaceum compositum, id.
id. saponaceum terebinthinatum, IV, 305.
id. saponis, I, 233; III, 521.
id. saponis compositum, III, 521.
id. saturni, III, 411, 413, 423.
id. saturninum, III, 417.
id. Schauerianum, IV, 298.
id. Scherceri, IV, 92.
id. stochycum, id.
id. styracis, II, 289.
id. succini, III, 324; IV, 239.
id. sulphuris anisatum, I, 403.
id. sulphuris simplex, id.
id. sulphuris succinatum, id.
id. sulphuris terebinthinatum, id.
id. Syriacum, I, 415.
id. terebinthinatum, IV, 287,
id. thebaicum, III, 304.
id. tolutanum, I, 420.
id. tranquillans, I, 439.
id. tranquillum, id.
id traumaticum, I, 449.
id. universale, III, 417.
id. verum, I, 415.

Balsamum viride, IV, 248.
id. viride Metensium, II, 137.
id. vitæ album, IV, 298.
id. vitæ externum, IV, 305.
id. vitæ Hoffmanni, IV, 95.
id. vitæ Rulandi, I, 403.
id. vulnerarium, I, 449.
id. vulnerarium minerale Dippelii, II, 491.
id. vulnerarium vegetabile, III, 234.
Bamia moschata, I, 1.
Banilla, IV, 337.
Baño antisifilítico, III, 189.
id. aromático, IV, 90.
id. emoliente, III, 22.
id. emoliente y antiséptico, III, 521.
id. estimulante, I, 56.
id. de pies alcalino, III, 469.
id. resolutivo, I, 253; III, 464.
id. sulfuroso, I, 86; III, 464; IV, 234.
id. sulfuroso y gelatinoso, III, 464.
Barba Aronis, IV, 354.
id. caprina, IV, 83.
Barbarea, IV, 371.
Barbula caprina, IV, 83.
Bardana, I, 423.
id. menor, I, 425.
Bardana, I, 423.
id. minor, I, 424.
Barilla, IV, 223.
Bario, I, 425.
Barita, I, 427.
id. carbonatada, I, 428.
id. fundida, id.
id. sulfatada, id.
Barotes sallitus, I, 425.
Baryta, I, 427.
id. carbónica, I, 428.
id. muriática, I, 425.
Barytes sallitus, id.
Basilicum citratum, I, 143.
id. majus, id.
Batrachites, I, 501.
Bebida con el ácido tartárico, I, 103.
id. analéptica, I, 169.
id. anticatarral, I, 290.
id. antiescrofulosa, IV, 35.
id. antiespasmódica, III, 91; IV, 330.
id. antiflogística, III, 485.
id. antinarcótica, I, 478.
id. antiraquítica, IV, 119.
id. astringente, II, 171.
id. escitante, I, 169.
id. ferruginosa, II, 466.
id. laxante, III, 504; IV, 251.
id. purgante, III, 504.
id. tártaro boratada, III, 512.
Becabunga, I, 429.
id. mayor, id.
id. menor, I, 430.
Becetta, IV, 271.
Bechium, IV, 324.
Bedegar, I, 430.
Bedelio, id.
Been, I, 431.
id. oloroso, id.
Beleño, I, 431.
id. blanco, id.
id. negro, id.
Belis, I, 444.
Belzoinum, I, 448.
Belladona, I, 444.
Belliculus marinus, I, 493.
Bellis hortensis, I, 444.
id. major, II, 182.
Bellis minor, I, 444.
id. perennis, id.
id. pratensis, II, 182.
Bellotas, II, 216.
id. tostadas, II, 219.
Benedicta sylvestris, II, 32.
Benjuí, I, 448.
id. amigdalino, id.
id. en suerte, id.
Benzoe, I, 448.
id. amygdoloides, id.
id. in sortis, id.
Benzoinum, id.
Berberis, I, 135.
id. vulgaris, id.
Berengena, I, 455.
Berza, id.
id. oruga, II, 238.
Berra ó berraza, I, 456.
Berraza de hojas anchas, id.
id. de hojas estrechas, id.
Berrera ó berrazas, id.
Berro, I, 453.
id. de agua, id.
id. de fuente, id.
id. de jardin, id.
id. de la India, I, 103.
id. de Para, I, 457.
id. de los prados, id.
Beta cycla, I, 10.
id. rubra, id.
id. vulgaris, id.
Betel, I, 459.
Betónica, id.
id. oficinal, id.
id. acuática, II, 267.
id. officinalis, I, 459.
id. purpurea, id.
Betula, I, 1.
id. alba, id.
id. alnus, I, 174.
Betun de Judea, I, 382.
id. asfalto, id.
id. sólido, id.
Bezoar, I, 460.
id. de Alemania, I, 461.
id. de Coromandel, id.
id. mineral, I, 296.
id. occidental, I, 461.

Bezoar oriental, I, 461.
Bezoar (piedra de), I, 460.
Bezoardicum animale, II, 340.
id. Curvi completum, II, 267.
id. Curvi incompletum, id.
id. Curvi purgans, id.
id. joviale, II, 288.
id. martiale, I, 297.
Bicarbonato de potasa, III, 474.
id. de sosa, IV, 226.
Bicloruro de cal, I, 490.
id. de mercurio, III, 185.
Bidente, I, 461.
Bidens, id.
id. cernua, id.
id. tripartitum, I, 104.
Bignonia del Japon, I, 461.
Bilis, id.
id. de vaca, id.
id. de vaca espesada, id.
Binoxalato de potasa, III, 501.
Biscochos purgantes, II, 532.
id. purgantes y vermífugos, III, 179.
Bismalva, III, 59.
Bismuto, I, 464.
Bismuthum, id.
id. nitricum, id.
id. oxydulatum, I, 464.
id. subnitricum, id.
Bistorta, I, 465.
id. comun, id.
Bisulfato de cobre, II, 124.
id. de potasa, III, 479.
Bitartrato de potasa, III, 506.
Bitumen Judaicum, I, 382.
Bixa orellana, I, 12.
Blanco de albayalde, III, 406.
id. de España, I, 492.
id. de Gostar, IV, 400.
Blanco de Krems, III, 406.
id. de perla, I, 464.
id. de plomo, III, 406.
Blatta byzantina, I, 492.
Boetica sylvestris, I, 354.
Bol de Armenia, I, 198.
id. blanco, id.
id. oriental, id.
id. rojo, id.
id. rojo artificial, I, 199.
Bolas de acero, II, 488.
id. bezoardicas, I, 348.
id. desinfectantes, II. 117.
id. contra la erisipela, III, 407.
id. de marte, II, 488.
id. marciales, id.
id. de Molsheim, II, 489.
id. moscadas, I, 193.
id. de Nancy, II, 488.
Boletus cervinus, III, 18.
id. igniarius, I, 119.
id. salicis, id.
Boli adstringentes, I, 203.
id. alba anthelmintici et antispasmodici, III, 171.
id. anthelmintico-laxantes, III, 183.
id. anthelmintico nervini, III, 162.
id. anthelmintico tonici, II, 188; III, 162.
id. antichlorotici—emmenagogi incitantes, II, 451.
id. antichlorotici emmenagogi tonici, II, 440.
id. anticonvulsivi, I, 372, 465.
id. antifebriles, II, 110; IV, 58.
id. anthysterici, I, 372.
id. antispasmodici, I, 372.
Boli antisyphilitici resolventes, III, 140.
id. antisyphilitici stomachici, id.
id. cinnabarini, III, 156.
id. cærulei, III, 117.
id. contra stimulantes, I, 70, 74.
id. in cystitide lenta, I, 400.
id. deprimentes ac nauseantes, II, 192.
id. deprimentes ac resolventes, II, 192.
id. diaphoretici, I, 301; III, 322.
id. diaphoretici nauseantes, I, 313.
id. diaphoretici sedantes, IV, 394.
id. diaphoretici ad diarrhœam, IV, 127.
id. diuretici et antispasmodici, II, 192.
id. de digitale, II, 191.
id. drastici, II, 394.
id. emmenagogi irritantes, I, 19, 37.
id. emmenagogi resolventes, I, 507; II, 516.
id. ad epilepticos, IV, 327.
id. excitantes, I, 147.
id. è ferro compositi, II, 452.
id. ex hydrargyro, III, 211.
id. ex hydrargyro oxydato rubro, III, 145.
id. incitantes, diaphoretici et expectorantes, I, 313.
id. incitantes emmenagogi, II, 451; IV, 58.
id. incitantes stomachici, IV, 496.

Boli kermetico—ammoniacales, I, 313.
id. lithontriptici, III, 517.
id. martiales emmenagogi, II, 444, 451.
id. martis, II, 488.
id. è mercurio glizirrizati, III, 117.
id. è murgate hydrargyri, III, 162.
id. narcotici, I, 434.
id. è narcotina, III, 276.
id. in necrosi syphylitica, III, 138.
id. nervini, I, 373; II, 47.
id. ad paralysin, III, 252.
id. in pertusin, III, 164.
id. in ptyalismo mercuriali, III, 465.
id. purgantes irritantes, II, 394.
id. in quartanam, IV, 14.
id. resolventes, I, 44; III, 139.
id. resolventes deprimentes, II, 516.
id. resolventes diaphoretici, I, 313.
id. resolventes et incitantes, III, 170.
id. resolventes et purgantes, IV, 127.
id. è rheo, id.
id. è rheo sedativi, id.
id. ex rore marino, II, 444.
id. rubri, I, 198; III, 156.
id. ex sabina, III, 163.
id. sedativi, III, 322.
id. è spongia, II, 24.
id. è stanno, II, 286.
id. stibiati, I, 305.
id. stomachici, IV, 224.
id. contra strumas, II, 24.
Boli tonici adstringentes balsamici, II, 358.
id. tonico—antiseptici, I, 373.
id. tonico diaphoretici, I, 147.
id. è valeriana, IV, 327.
Bolo alcanforado con kermes, I, 147.
Bolos alcanforados, I, 146.
id. de alcanfor y nitro, I, 147.
id. alterantes, II, 419.
id. amargos, II, 360.
id. antelminticos antispasmodicos, III, 171.
id. antelminticos y purgantes, III, 183.
id. antiartriticos, IV, 301.
id. antiasmaticos, I, 400.
id. anticatarrales, IV, 250.
id. antidiarreicos, III, 313.
id. antidisentericos, II, 521.
id. antiescrofulosos, II, 24.
id. antiespasmódicos, I, 147, 190, 372, 465; II, 460.
id. antigonorraicos, I, 414; IV, 292.
id. antihelmínticos, IV, 216.
id. antihelmínticos purgantes, III, 183.
id. antihemorroidales, I, 400.
id. antilácteos, III, 496.
id. antimoniales, I, 305.
id. antisépticos, I, 373.
id. antisifilíticos, III, 358.
id. antivenéreos, III, 138.
id. antivenéreos fundentes, III, 139.
Bolos antivenéreos estomacales, III, 140.
id. aromáticos, III, 255.
id. astringentes, I, 203, 414; II, 455, 521.
id. de azufre, I, 400.
id. de azufre compuestos, id.
id. atemperantes, I, 147.
id. azules, III, 117.
id. calibeados, II, 460.
id. calmantes, I, 146; IV, 249.
id. cardiacos, II, 175.
id. carminativos, I, 286.
id. catárticos, II, 532.
id. contra la cistitis, I, 400.
id. contra la coqueluche, III, 164.
id. contra estimulantes, I, 70, 74.
id. contra el edema del pulmon, II, 246.
id. diaforéticos, I, 301, 313, 400; III, 156.
id. digestivos, II, 521.
id. de digital, II, 191.
id. diuréticos, II, 192.
id. drásticos, III, 165.
id. eméticos, II, 522.
id. emenagogos, I, 19, 37, 507; II, 444, 451, 516; III, 163; IV, 58, 144.
id. de escamonea compuestos, III, 183.
id. escilíticos, III, 246.
id. escitantes, I, 147; III, 371.
id. espectorantes, I, 313.
id. estibiados, I, 305.
id. estimulantes, III, 252.
id. estimulantes y tónicos, I, 351.
id. estomacales, I, 44, 389; II, 43, 451, 460, 496; IV, 224.

Bolos febrífuges, II, 110, 466; III, 392; IV, 14, 58.
id. ferruginosos, II, 452, 478.
id. contra la fiebre cuartana, IV, 14.
id. fortificantes, I, 414.
id. fundentes, I, 44; II, 192, 516; III, 139; IV, 127.
id. fundentes y escitantes, III, 170.
id. jabonosos, III, 517.
id. hidragogos, II, 532.
id. laxantes de Chausier, III, 180.
id. litontrípticos, III, 517.
id. de magnesia azafranados, III, 50.
id. de mercurio dulce, III, 162.
id. mercuriales, III, 211.
id. de mirra, III, 239.
id. narcóticos, I, 434.
id. de narcotina, III, 276.
id. nauseosos, II, 192.
id. nervinos, I, 373; II, 47.
id. pectorales, II, 401.
id. pectorales astringentes, id.
id. de precipitado rojo, III, 145.
id. purgantes, II, 163, 394, 532; III, 179; IV, 182.
id. purgantes y tónicos, III, 173.
id. de quina, IV, 14.
id. de quina aromatizados, id.
id. de quina opiados, id.
id. de quina opiados y aromatizados, id.
id. de quina y de ruibarbo, IV, 14.
id. resolutivos, I, 313.
id. rojos, III, 156.
Bolos rojos artificiales, I, 199.
id. de ruibarbo, IV, 127.
id. contra la salivacion, III, 465.
id. sedantes, I, 59, 427.
id. solutivos, II, 532.
id. sudoríficos, III, 322.
id. de tártaro calibeado, II, 495.
id. temperantes, I, 147.
id. tónicos, I, 147; II, 358; IV, 14.
id. tónicos y antiperiódicos, IV, 16.
id. tónicos y diaforéticos, I, 147.
id. contra la tos, III, 489.
id. vermífugos, II, 178, 286, 437; III, 182.
Bolsa de pastor, I, 466.
Bonetero, id.
id. europeo, id.
Boñiga de vaca, id.
Boras hidrargyri, III, 206.
id. sodæ, IV, 227.
id. sodæ alcalescens, id.
id. sodæ alcalinum, id.
id. supersodicum, id.
Borassus flamelliformis, I, 431.
Borato de mercurio, III, 206.
id. de sosa, IV, 227.
id. de sosa con esceso de base, id.
id. de sosa saturado, id.
Borax, id.
id. bruto, id.
id. venetus, IV, 227.
Borrago, I, 467.
id. officinalis, id.
Borraja, id.
Botris, I, 468.
Botrychium lunaria, III, 39.
Botrys ambrosioïdes, I, 468.
id. mexicana, IV, 263.
Botrytis, IV, 392.
Bovista, III, 371.
Bowdichia virgilioides, I, 171.
Box, I, 469.
Branca ursina, I, 6; II, 268.
id. ursina alemana, II, 268.
Brassica capitata alba, I, 455.
id. capitata rubra, id.
id. eruca, II, 238.
id. marina, IV, 235.
id. napus, III, 258.
id. oleracea, I, 455.
id. rubra, id.
Brezo, I, 469.
id. comun, id.
Brionia, I, 470.
id. blanca, id.
Brodium rosarum, IV, 103.
Brucea ferruginea, I, 283.
Brucia, id.
Brucina, I, 469.
Brucium, id.
Brunela, I, 470.
id. comun, id.
id. oficinal, id.
Bruscus, IV, 143.
Bryonia, I, 470.
id. alba, id.
Buban galbanum, II, 325.
id. macedonicum, III, 379.
Buen Enrique, I, 472.
Bufones exsiccati, II, 341.
Bofonita, I, 501.
Bufonites, id.
Bugias, véase *Candelillas*.
Buglosa, I, 472.
Buglosum, id.
id. latifolium, I, 467.
id. urbanum, id.
id. verum, id.
Bugula, I, 473.

Bugula de Ginebra, id.
id. piramidal, id.
id. rastrera, id.
Bulbulus thrasus, II, 545.
Bunias, III, 258.
Buphthalmum, III, 83.
Buplevrum rotundifolium, III, 382.
Bursa pastoris, I, 466.
Butua, I, 474.
Butyrum, III, 15.
id. amygdalarum, I, 179.
id. antimonii, I, 323.
id. cacao, I, 476.
id. ceræ, II, 83.
id. majoranæ, III, 102.
id. rutæ, IV, 112.
id. saturni, III, 417.
id. stibii, I, 323.
Buxus sempervirens, I, 469.

C.

Caapeba, I, 475.
Caballation, II, 110.
Cacao, I, 475.
id. præparata, id.
id. tabulata, id.
Cactus opuntia, II, 499.
Cadmia fosil, IV, 392.
id. de hornillos, id.
Cadmio, I, 477.
Cadmium, id.
Cæruleum berolinense, II, 496.
id. borussicum, id.
id. montanum, II, 123.
Café, I, 478.
id. de bellotas, II, 216.
Cachorros, II, 340.
Cal, I, 485.
id. apagada, id.
id. de antimonio, I, 294.
id. de antimonio sulfurada, I, 321.
id. carbonatada, I, 491.
id. fosforada, I, 489.
Cal sulfatada compacta, I, 505.
id. sulfatada lenticular, I, 504.
id. sulfurada antimoniada, I, 321.
id. viva, I, 485.
Cala antelmíntica, I, 19, 24.
id. antihemorroidal, II, 22.
id. calmante, III, 319.
id. comun, III, 231.
id. emoliente, I, 477.
id. fortificante, II, 216.
id. irritante, II, 160.
id. laxante, III, 518.
Calabaza, I, 479.
id. blanca, I, 478.
id. blanca larga, id.
id. comun, I, 479.
id. de pierna de pobre, I, 478.
iid. vinatera, id.
Calaguala, I, 479.
Calamina, IV, 392.
Calaminta, I, 479.
id. menor, id.
id. de montaña, id.
id. oficinal, id.
Calamintha, id.
id. agrestis, I, 480.
id. humilior, IV, 356.
id. montana, I, 479.
id. pulegii odore, I, 480.
Calamita, II, 289.
Cálamo aromático, I, 480.
Calamus aromaticus, id.
id. asiaticus, id.
id. odoratus, id.
id. rotang, IV, 163.
id. verus, I, 480.
id. vulgaris, id.
Calcareus lactiformis, I, 492.
Calcaria carbónica, I, 491, 492.
id. muriatica, I, 505.
id. phosphorica, I, 501.
id. pura, I, 485.
id. pura líquida, id.
id. sulphurata, I, 489.
Calcaria sulphurato stibiata, I, 321.
id. sulphurica, I, 504.
Calcio, I, 485.
Calcitis, II, 453.
Calcitrapa, II, 29.
id. stellata, II, 28.
Caldo antiepiléptico, III, 376.
id. antiespasmódico, id.
id. antiherpético, II, 321.
id. aperitivo, II, 270; IV, 119.
id. astringente, II, 171.
id. calmante, II, 349.
id. de cangrejos, II, 344.
id. de caracoles, II, 345.
id. depurativo, I, 424; II, 232; IV, 232.
id. diurético, II, 261, 270.
id. dulcificante ó demulcente, II, 349.
id. de huesos, II, 343.
id. de lagarto, II, 344.
id. lienterico, II, 350.
id. de mil pies, III, 235.
id. pectoral, I, 110, 394; II, 345, 349; III, 31.
id. de pulmones de ternera, II, 344.
id. de ranas, id.
id. de ternera, id.
id. de tortuga, id.
id. de vívora, II, 345.
Caléndula, I, 509.
id. del campo, id.
id. de jardin, id.
id. silvestre, id.
Calendula alpina, I, 350.
id. arvensis, I, 509.
id. officinalis, id.
Calendulæ minerales, II, 477.
Calluna vulgaris, I, 469.
Calmontaua, I, 479.

Calomelanos, III, 157.
id. ferruginosos, III, 174.
Caltha alpina, I, 350.
Calumba, II, 155.
Calx, I, 485.
id. acetata, I, 507.
id. antimonii, I, 294.
id. antimonii elota, I, 296.
id. antimonii Hoffmanni, I, 321.
id. antimonii nitrata, I, 296, 302.
id. antimonii sulphurata, I, 321.
id. antimonii cum sulphure, id.
id. arsenici alba, I, 358.
id. citrata, I, 508.
id. cupri viridis, II, 123.
id. extincta, I, 485.
id. hydrargyri alba, III, 218.
id. mercurii, III, 212.
id. cinerea, III, 209.
id. vitriolata, III, 207.
id. salita, I, 505.
id. stibii cum sulphure, I, 321.
id. sulfurica, I, 504.
id. usta, I, 485.
id. vismuti, I, 464.
id. viva, I, 485.
id. zinci, IV, 392.
Calyculæ glandium quercus, II, 216.
Calyptrantes caryophyllata, I, 515.
Calystegia soldanella, IV, 235.
Cambogium, II, 393.
Camedrio acuatico, II, 263.
Camedrios, I, 510.
Camepitcos, I, 511.
Camepitio oficinal, id.
Camisa de culebra ó de serpiente, II, 342.
Campanilla, II, 176.
Campeche (leño de) I, 512.
Camphora, I, 145.
Camphorasma monspeliaca, I, 157.
Cancanum, I, 282.
Cancer pagurus, I, 494.
Canchalagua, I, 513.
id. de Chile, id.
Candelæ cereæ, III, 431.
id. chirurgicæ, III, 417.
id. fumales, I, 453.
id. mercuriales, III, 182.
id. mitigantes, III, 417.
id. resolventes, id.
Candelillas de acetato de plomo, id.
id. comunes, id.
id. de Falck, III, 151.
id. fundentes, III, 417.
id. mercuriales, III, 126, 182, 216.
id. mercuriales disolubles, III, 300.
id. de plomo, III, 417.
id. de potasa cáustica, III, 459.
id. resolutivas, III, 417.
id. saturninas, III, 417, 421, 431.
id. simples, II, 87.
Canela, I, 513.
id. aclavillada, I, 515.
id. blanca, I, 513.
id. de Ceylan, I, 514.
id. de la China, id.
id. de Indias, id.
id. de Magellan, II, 118.
id. Winteriana, id.
Canelina, I, 514.
Cannabina aquatica, II, 310.
Cannabis, II, 19.
id. sativa, id.
Canuella, I, 513.
id. alba, I, 514.
id. Cubana, I, 515.
Canella Malabarica, I, 514.
id. Zeylanica, id.
Cantaridas, II, 1.
id. de las boticas, id.
id. con manchas, id.
Cantaridina, id.
Cantharis vexicatoria, II, 1.
id. vittata, id.
Cantueso, II, 17.
id. de Arabia, id.
id. cetrino, id.
id. de Nápoles, II, 18.
Cáñamo, II, 19.
Cañamon, id.
Caña comun, id.
Cañavera ó carrizo, id.
Caparrosa blanca, IV, 400.
id. azul, II, 124.
id. verde, II, 463.
Caphopicrito, IV, 125.
Capillus veneris, II, 185.
id. veneris Canadensis, id.
Capparis, I, 153.
id. spinosa, I, 157.
Capsicum annuum, III, 380.
id. frutescens, id.
Capsinium, id.
Capsino, id.
Capuchina, II, 20.
Capullo de seda, id.
Caracoles, I, 492; II, 341.
id. de viña, id.
Caraña, II, 20.
Carbo, id.
id. animalis, id.
id. pilæ marinæ, id.
id. spongiæ marinæ, II, 21.
id. è vegetabilibus, II, 20.
Carbon, id.
id. animal, id.
id. de esponja, II, 21.
id. vegetal, II, 20.
id. de zostera marina, id.
Carbonas ammoniacæ, I, 238.

Carbonas ammoniacæ alcalinus liquidus, I, 239.
id. ammoniacæ alcalinus solutus, I, 239.
id. ammoniacæ cornu cervi crystallisatus, I, 240.
id. ammoniacæ viperarum crystallisatus, id.
id. ammoniæ, I, 238.
id. ammoniæ alcalinus, id.
id. ammoniæ alcalinus pyro-animalis, I, 240.
id. ammoniæ crystallisatus, I, 238.
id. ammoniæ incompletus, id.
id. ammoniæ pyro—animalis, I, 240.
id. ammoniæ pyro—animalis liquidus, I, 241, 242.
id. ammoniæ solidus, I, 238.
id. baryticus, I, 428.
id. calcareus, I, 491.
id. calcicus bituminatus, I, 492.
id. calcis, I, 491.
id. calcis nativus pulverulentus, id.
id. ferri oxidati, II, 456.
id. ferri præcipitatus, id.
id. lixiviæ alcalinus solutus, III, 468.
id. magnesiæ, III, 48.
id. magnesicus, id.
id. natricus, IV, 223.
id. natricus impurus, id.
id. plumbi, III, 406.
id. plumbicus, id.
id. potassæ alcalescens liquidus, III, 468.
Carbonas potassæ et ferri liquidus, II, 457.
id. potassæ purissimus, III, 466.
id. potassæ venalis, III, 465.
id. sodæ, IV, 223, 226.
id. sodæ alcalinus, id.
id. sodæ impurus, III, 465.
id. sodæ incompletus, IV, 223.
id. superammoniacus, I, 238,
id. superammoniacus aquosus, I, 239.
id. superammoniacus pyro oleosus, I, 238, 241.
id. superammoniacus pyro—aquosus, I, 240.
id. superpotassicus depuratus, III, 465.
id. superpotassicus purus, id.
id. zinci impurus, IV, 392.
id. zincicus terrestris, id.
Carbonato amoniacal I, 238.
id. de amoniaco, id.
id. de amoniaco alcalino, id.
id. de amoniaco líquido, I, 239.
id. de amoniaco piro—oleoso, I, 240.
id. de amoniaco piro—oleoso líquido, I, 241.
id. de barita, I, 428.
id. de cal, I, 491.
id. calcareo, id.
id. de magnesia, III, 48.
id. de magnesia alcalino, id.
id. de mercurio, III, 206.
id. de potasa, III, 474.
Carbonato de potasa y de amoniaco, III, 475.
id. de potasio y de amoniaco, id.
id. de potasio protoxidado, III, 474.
id. de sodio protoxidado, IV, 226.
id. de sosa, id.
id. de sosa neutro, id.
Carbunculus, I, 197.
Carburo de azufre, I, 397.
id. de hierro, II, 446.
Cardamine, I, 457.
id. pratensis, id.
Cardamomo, II, 25.
id. largo, II, 26.
id. mayor, id.
id. menor, II, 25.
id. redondo ó mediano, II, 26.
Cardamomum javanicum, id.
id. longum, II, 26.
id. majus, id.
id. Malabaricum, II, 25.
id. medius, II, 26.
id. minus, II, 25.
id. rotundum, II, 26.
Cardencha, II, 201.
Cardiaca farmaceutica, II, 27.
Cardo, id.
id. acuatico, id.
id. bendito, II, 29.
id. de comer, II, 28.
id. corredor, id.
id. estrellado, id.
id. estrellado corredor, id.
id. lechero, II, 29.
id. mariano, id.
id. marítimo, II, 28.
id. santo, II, 29.
id. setéro, II, 28.
Cardopatia, II, 34.
Cardopatium, id.
Carduus benedictus, II, 29.
id. lacteus, id.
id. Mariæ, id.
id. Marianus, id.

Carduus sanctus, II, 29.
id. stellatus, id.
id. veneris, II, 28.
id. volutans aculeatus, id.
Carica, II, 498.
id. pinguis, id.
Cariofilata, II, 32.
id. de los arroyuelos, id.
id. islera, id.
id. oficinal, id.
Carlina, II, 34.
id. con tallo ó vulgar, id.
id. sin tallo, id.
Carmina, II, 149.
Carne de tortuga, II, 340.
id. de víbora, id.
id. de zorra, id.
Caro testudinum, id.
id. viperæ, id.
id. vulpis, id.
Carpobalsamum, I, 269.
Carquesia, II, 34.
id. angulosa, II, 35.
id. comun, id.
id. de España, id.
id. fructicosa, II, 34.
id. de tintoreros, id.
Cartamita, I, 142.
Carthamus, id.
id. lanatus, id.
id. sativus, id.
id. tinctorius, id.
Carum carvi, I, 159.
Caryophyllata, II, 32.
id. acuática, id.
Caryophyllus aromaticus, III, 44.
id. ruber, II, 113.
Carralejas, II, 35.
Cáscaras de huevo, I, 492.
id de huevo de avestruz, I, 493.
id. de huevo de gallina, id.
Cascarilla, II, 36.
Casia, II, 40.
id. en cilindros, id.
id. fístula, id.
Cassia, II, 40.
id. caryophyllata, I, 515.
Cassia cinnamomea, I, 514.
id. pro clysteribus, II, 40.
id. fistula, id.
id. fistularis, id.
id. lanceolata, IV, 180.
id. lignea, I, 514.
id. cum manna, III, 78.
id. Marylandica, IV, 208.
id. obovata, IV, 180.
Cassuvium occidentale, I, 6.
Castanea equina, II, 44.
id. pumita, II, 43.
id. vesca, id.
Castaña, id.
id. de agua, II, 44.
id. de caballo, id.
Castaño, II, 43.
id. de agua, II, 44.
id. comun, II, 43.
id. enano, id.
id. de Indias, II, 44.
Castor fiber, II, 46.
Castoreo, id.
Castoreum, id.
Castorina, II, 47,
Castrangula, II, 267.
Catalpa arborea, I, 461.
Cataplasma acetatum, I, 52.
id. althææ, III, 70.
id. antisepticum, II, 23.
id. ad blennorrhagiam, I, 188.
id. ex bryonia, II, 90.
id. ad cancrum, II, 90; III, 293.
id. cantharidum, II, 11.
id. è conio, II, 90.
id. crustæ panis acetosum, I, 52.
id. è dauco, II, 90.
id. discutiens, II, 378.
id. emolliens, I, 390; III, 368, 390.
Cataplasma epispasticum, III, 252.
id. fermenti, III, 18.
id. limi cum galbano, II, 73.
id. maturans, II, 73, 325; III, 83.
id. medullæ panis, III, 70.
id. medullæ panis cum cicuta, II, 90.
id. de mica panis, III, 368.
id. micæ panis anodynum, I, 390.
id. nidi hirundinis, id.
id. cum opio, III, 313.
id. pomaceum, I, 390.
id. resolvens, III, 83.
id. resolvens ad scirros, II, 90.
id. sinapeos, III, 252.
id. sinapis, id.
id. ad singultum, III, 346.
id. stypticum, II, 470.
id. theriacale, III, 346.
id. de agua de mar, I, 507.
id. de almidon, I, 189.
id. amoniacal, I, 248.
id. anodina, I, 390. 432; III, 313, 390.
id. anticancerosa, I, 361; III, 293.
id. antiespasmódica, III, 323.
id. antihermíntica, I, 20.
id. antioftálmica, I, 390.
id. antipleurítica, III, 394.
id. antiséptica, I, 113; II, 23, 216; IV, 172.
id. antiséptica alcanforada, II, 226.

Cataplasma antiséptica de Reuss, IV, 16.
id. aromática, IV, 272.
id. astringente, II, 455, 470.
id. de cantáridas, II, 11,
id. contra la ceática, I, 488.
id. desecante, IV, 347.
id. discuciente, III, 81.
id. emética, IV, 245.
id. emoliente, I, 188; III, 21, 368.
id. fortificante, II, 496.
id. fundente, II, 90, 378.
id. contra la iscuria, II, 72.
id. jabonosa, III, 518.
id. madurativa, II, 73, 325; III, 18, 83, 518.
id. de mostaza, III, 252.
id. narcótica, I, 432, 436.
id. de Pradier, I, 415, 436.
id. resolutiva, I, 463; II, 73, 90; III, 414, 518.
id. rubefaciente, III, 394.
id. saturnina, III, 73, 414.
id. sedante, III, 299.
id. supurativa, II, 325.
id. tanina, II, 216.
id. tanina alcanforada, id.
id. teriacal, III, 346.
id. vinagrada, I, 52.
id. virosa, I, 432.
Cataputia ad catharros, III, 325.
id. minor, II, 58.
Catapucia menor, id.
Catartina, IV, 180.
Catecú, II, 58.
Catecú desigual y rojizo, id.
id. en masas, II, 59.
id. pardo y plano, id.
id. purificado, id.
Catelli, II, 340.
Catolicon doble, IV, 188.
Cáustico amoniacal, I, 323.
Causticum alcalinum, III, 28, 456.
id. antimoniale, I, 323.
id. arsenicale, I, 359.
id. commune, III, 456.
id. commune fortius, id.
id. commune mitius, III, 458.
id. lunare, III, 399.
id. potentiale, III, 456.
id. salitum, id.
id. vegetabile, III, 454.
Ceanothus, II, 66.
id. americana, id.
Ceanoto americano, id.
Cebada, id.
id. mondada, id.
id. perlada, II, 67.
Cebadilla, II, 71.
Cebolla, II, 72.
id. albarrana, II, 244.
Cedro blanco, I, 347.
id. rojo, II, 220.
Cedronella, IV, 272.
Celebro de ballena, II, 270.
Celidonia, II, 74.
id. comun, id.
id. mayor, id.
id. menor, II, 75.
Ceniza azul, II, 123.
id. de erizo, I, 495; II, 21.
id. de golondrina, id. id.
id. de liebre, id. id.
id. de plomo, III, 403.
id. de reyezuelo, II, 22.
id. de seda cruda, II, 21.
Ceniza de topo, I, 495; II, 22.
id. verde, II, 123.
Ceniza de estaño, II, 288.
id. graveladas, III, 466.
Centaura, II, 76.
id. mayor, id.
id. menor, II, 77.
Centaurium majus, id.
id. minus, id.
id. officinale, II, 76.
Centeno, id.
Cera, II, 81.
id. blanca, id.
id. vírgen, id.
id. alba, id.
id. arborea, IV, 311.
id. inaurata, II, 136.
id. ad labia, II, 272.
id. viridis, II, 136.
Ceramium ægagropilum, II, 177.
id. albinum, id.
id. cancellatum, id.
id. catenatum, id.
id. forcipatum, id.
id. gracile, id.
id. incurvum, id.
id. scoparium, id.
Cerasus avium, II, 87.
id. lauro cerasus, III, 14.
id. mahaleb, II, 432.
id. padus, id.
id. racemosa sylvestris, id.
id. ruber acidus, id.
id. virginiana, II, 433.
id. vulgaris, II, 432.
Cerato de acetato de plomo, III, 417, 424.
id. adhesivo, IV, 311.
id. alcanforado, I, 156.
id. amarillo, II, 84.
id. antipsórico, id.
id. arsenical, I, 361.
id. de betónica, I, 460.
id. blanco, II, 84.
id. calaminar, IV, 395.

Cerato de cantáridas, II, 14.
id. de cantáridas alcanforado, II, 15.
id. de cerusa compuesto, III, 447.
id. cosmético, I, 477.
id. desecante, III, 182; IV, 397.
id. desecante de Kirkland, III, 419.
id. dorado, II, 136.
id. emoliente, II, 73.
id. de enebro, II, 226.
id. de esperma de ballena, II, 271.
id. de Galeno, II, 84.
id. gomado, II, 328.
id. de Goulard, III, 417.
id. de Hufeland, IV, 396.
id. labial, I, 477; II, 85, 272.
id. para los labios, I, 270, 477.
id. de manteca, II, 84.
id. mercurial, III, 123, 146, 147.
id. mercurial de Falck, III, 150.
id. de minio, III, 404.
id. mundificante y balsámico, II, 273.
id. negro, IV, 311.
id. oleo-resinoso, IV, 310.
id. opiado, III, 293, 318.
id. pardo, III, 406.
id. de Pott, III, 424.
id. preparado con agua, II, 84.
id. de quina, IV, 30.
id. de quina alcanforado, IV, 36.
id. de Rechoux, I, 243.
id. de resina, IV, 311.
id. resinoso, IV, 316.
id. rojo, III, 156, 404.
Cerato rojo alcanforado, III, 136, 404.
id. de sabina, IV, 146.
id. saturnino, III, 417, 431.
id. de saturno, III, 417.
id. simple, II, 83.
id. de sub carbonato de plomo, III, 408.
id. sulfurado, I, 404.
id. de tabaco, IV, 247.
id. para el tacto, III, 516.
id. de Furner, IV, 395.
id. verde, II, 136.
Ceratonia, I, 173.
id. siliqua, id.
Ceratum æruginis, II, 136.
id. album ceti, II, 271.
id. album simplex, id.
id. de althæa, III, 71.
id. betonicæ, I, 460.
id. calaminæ, IV, 395.
id. calaminare, id.
id. cantharidis, II, 9.
id. de cerussa, III, 408.
id. cetacei, II, 271.
id. cetacei rubium, II, 272.
id. citrinum, IV, 311.
id. cosmeticum, II, 272.
id. detergens, III, 150.
id. exsiccans, IV, 397.
id. fuscum, III, 432.
id. Galeni, II, 84.
id. Goulardi, III, 417.
id. juniperi virginiani, II, 226.
id. ad labia, II, 85, 272.
id. labiale, id. id.
id. lithargyrii, III, 417.
id. mercuriale Falckii, III, 150.
id. minii, III, 404.
id. minii adustum, III, 443.
id. Noribergense, id.
id. plumbi, III, 417.
id. plumbi super acetatis, id.
Ceratum è plumbo, III, 417.
id. refrigerans Galeni, II, 84.
id. resinæ, IV, 314.
id. resinæ pini, IV, 311,
id. resinosum, id.
id. sabinæ, IV, 146.
id. saponaceum, III, 424.
id. saponis, III, 524.
id. saturni, III, 417.
id. saturni Goulardi, id.
id. saturninum, id.
id. simplex, II, 83, 271.
id. spermatis ceti, II, 271.
id. spuloticum, IV, 395.
id. è sulphure, I, 404.
id. tabacinum, IV, 247.
id. viride, II, 136.
id. è zinco, IV, 395.
Cerberus triceps, I, 300.
Cerbeza, II, 87.
id. de abeto, I, 4.
id. de abeto compuesta, id.
id. de agenjos, I, 126.
idi amarga, I, 4.
id. antihidrópica, II, 541.
id. antiictérica, IV, 192.
id. antiescorbútica, I, 4; II, 144; IV, 61, 212.
id. antiespasmódica, IV, 332.
id. aperitiva, III, 254.
id. aromática, I, 529.
id. astringente, II, 218.
id. cefálica, IV, 332.
id. diurética, III, 254.
id. estimulante, id.
id. marcial, II, 482.
id. profiláctica, IV, 45.
id. purgante, II, 165, 541; IV, 191.
id. de quina, IV, 45.

Cerefolium, III, 382.
id. hispanum, id.
Cereoli demulcentes, II, 87.
Cereoli emolientes, id.
id. exploratori, II, 87; III, 431.
id. cum kali caustico, III, 459.
id. medicati, III, 417.
id. mercuriales, III, 182.
id. plumbici, III, 417.
id. saturnini, id.
id. simplices, II, 87.
Cerevisia, id.
id. cochleariæ, II, 144.
id. colocynthidis, II, 165.
id. quercina, II, 218.
Cereza, II, 87.
Cerezo, id.
Cerina, II, 81.
Ceromel, III, 230.
Cerusa, III, 403.
id. amarilla, id.
id. de antimonio, I, 296.
Cerussa acetata, III, 421.
id. alba hollandica, III, 406.
id. alba norica, id.
id. antimonii, I, 296.
id. citrina, III, 403.
Cervaria nigra, I, 373.
Cervus elaphus, I, 501.
Cerraja oficinal, II, 87.
Cerrajas, id.
Cetaceum, II, 270.
Cetina, id.
Chacarilla, II, 37.
Chærefolium, III, 382.
Chærophyllum, id.
id. odoratum, id.
id. sativum, id.
id. sylvestre, id.
Chalcitis, II, 453.
Chalcantum, IV, 400.
Chalybs præparatus, II, 440.
id. tartarisatus, II, 486.
Chamædris, I, 510.
id. aquatica, II, 263.
Chamæclema, IV, 356.
Chamæmelum nobile, III, 82.
id. romanum, id.
id. vulgare, id.
Chamæmorus, I, 511.
Chamæpythis, id.
id. monspeliaca, id.
Chamærops humilis, I, 431.
Chamomila fœtida, III, 82.
id. nobilis, id.
id. nostras, id.
id. romana, id.
id. vulgaris, id.
Cheirantus cheiri, I, 171.
Chelæ cancrorum, I, 494.
Chelidonium majus, II, 74.
id. minus, II, 75.
Chelonites, I, 501.
Chenopodium, IV, 263.
id. ambrosiacum, id.
id. anthelminticum, I, 291.
id. bonus Henricus, I, 472.
id. botrys, I, 468.
id. vulvaria, IV, 353.
Chimaphila corymbosa, III, 398.
China, II, 88.
id. orientalis, id.
id. ponderosa, id.
Chinsange, id.
Chlorum, II, 116.
Chloruretum auri, III, 358.
id. ferri, II, 471.
id. platinæ, III, 411.
id. potassæ oxidatum, III, 493.
id. sodii, IV, 221.
Chocolate blanco, IV, 149.
id. de castañas, II, 43.
id. de liquen, III, 25.
id. purgante, III, 179.
id. de salud, I, 475.
id. de vainilla, id.
id. de dos vainillas, I, 476.
id. de una vainilla, id.
Chocolata aromatica, id.
id. lichenis islandici, III, 25.
id. medica, I, 475.
id. simplex, id.
Chorro aromatico, I, 254.
Chrysanthemum leucanthemum, II, 182.
Cianuro de hierro hidratado, II, 496.
id. de mercurio, III, 204.
id. de potasio, I, 72.
Cicer, II, 338.
id. arietinum, id.
Chichorium, I, 10.
id. endivia, II, 243.
id. intybus, I, 10.
Cicuta aquatica, II, 89.
id. major, id.
id. terrestris, id.
id. virosa, id.
id. vulgaris, id.
Cicuta, id.
id. acuatica, id.
id. comun, id.
id. de jardin, id.
id. mayor, id.
id. menor, id.
Cicutaria aquatica, id.
Cicutina, id.
Cidra, II, 98.
Cidra calibeada, II, 483.
Cidro cidrero, II, 98.
Cilantro, II, 107.
Cimbalaria, II, 108.
Cina, IV, 214.
Cinabrio, III, 152.
id. artificial, id.
id. nativo, id.
id. natural, id.
id. preparado, III, 153.
Cinamomo, II, 108.
Cinanque, II, 109.
Cinchona caribæa, IV, 6.
id. condamina, IV, 7.
id. lanceolata, id.
id. lancifolia, id.
id. nitida, id.
id. oblongifolia, IV, 8.
id. ovata, IV, 7.
Cinchonia, II, 109.
Cinchonium, id.

Cinconina , II , 109.
Cinnabaris, III , 152.
id. facticia , id.
id. nativa , id.
Cinnamomum acutum , I , 514.
id. indicum , id.
id. magellanicum , II , 181.
id. sinense, I, 514.
id. verum , id.
Cinoglosa , II, 110.
id. oficinal , id.
Cipres , id.
id. comun , id.
Ciruela , II , 111.
Ciruelo , id.
id. silvestre, id.
Cissampelos caapeba , I , 475.
id. pareira , I , 474.
Cistus creticus , III, 4.
Citras calcariæ animalis , I, 508.
id. calcis , id.
id. kalicus , 501.
id. kalinus, id.
id. potassæ , id.
id. potassæ aquosus , III , 502.
Citrato de amoniaco , I , 268.
id. de cal , I , 508.
id. de calcio protoxidado , id.
id. de morfina, III , 251.
id. de potasa , III , 501.
id. de potasio protoxidado, id.
Citrus aurantium , III, 259.
id. medica, II, 98.
Clara de huevo aluminosa, I, 208.
Claretum aromaticum, I, 290.
id. fructuum, II, 434.
id. ex sex seminibus , II , 108.
Clavel , II, 113.
id. comun , id.
Clavos de especia , III , 44.
id. matrices, id.
Clematida, II, 114.
id. recta , id.
id. rizada , II, 115.
Clematis , IV, 347.
id. crispa , II , 115.
id. erecta , II, 114.
id. vitalba , II, 115.
Clinopodium montanum, IV , 267.
Clorato de cal , I , 490.
Clorina ó clorino , II , 116.
Cloro , id.
id. líquido , id.
Cloruro de antimonio , I, 323.
id. de bario , I , 425.
id. de calcio, I , 506.
id. de calcio oxidado, I, 490.
id. de estaño , II , 289.
id. de oro, III, 358.
id. de oro y de sodio, III, 359.
id. de oro y de sodio preparado, id.
id. de platina , III , 401.
id. de plomo , III , 402.
id. de potasa , III , 492.
id. de potasio , III , 494.
id. de potasio protoxidado, III , 492.
id. de sodio, IV , 220.
id. de sodio protoxidado, id.
id. de sosa , id.
id. de zinc , IV , 391.
Clysma antispasmodicum resolvens, IV , 221.
id. ad ascaridas , id.
id. emolliens anthelminticum , IV, 85.
id. excitans, IV, 38.
id. incitans, I , 151.
id. incitans et sedans, I , 374.
id. involvens , III , 23.
id. nutriens , II , 344.
id. oleosum , I , 10 ; III, 23.
id. purgans, IV, 221.
id. resolvens, III, 519.
Clysma sedans et adstringens , III, 351.
id. sedans et emolliens, I , 187 ; II , 512.
id. ad soporosos affectus, I , 339.
id. tonicum et antispasmodicum , I , 374.
id. vini antimonialis irritans , I, 339.
Clyssus antimonii , I , 99.
id. sulphuris , id.
Cnicus benedictus , II, 29.
Cobalto, II, 118.
Cobaltum , id.
Cobre , II , 119.
id. amoniacal , II , 129.
id. carbonatado verde, II, 123.
id. muriato amoniacal, II , 132.
Coca , II , 140.
id. de Levante, id.
Cocculus , II, 140.
id. indicus , id.
id. palmatus, II , 155.
id. tuberosus, II, 140.
Coccus baphica , III , 1.
id. cacti , II , 149.
id. cnidius , III , 98.
id. ilicis , III , 1.
id. lacca , II , 395.
Cochlearia , II , 141.
id. armoracial, IV, 58.
id. hortensis , II, 141.
id. officinalis, id.
id. vulgaris , id.
Cocimiento de acibar compuesto , I , 35.
id. de abeto jabonoso, I , 4.
id. de abeto vinoso, id.
id. de agallas, I , 117.
id. achicorias , I , 12.
id. de alcornoque , I , 171.
id. de almaciga , I, 76.
id. amargo , II , 362.
id. amargo alcoholizado , II, 363.
id. amargo etéreo , id.

Cocimiento de angustura, I, 284.
id. antiartritico, IV, 383.
id. antiasmático, I, 461.
id. anticaquectico, IV, 208.
id. antidisentérico, II, 412.
id. antiescorbútico, II, 70; IV, 65.
id. antiescrofuloso, II, 25.
id. antihelmintico, I, 21.
id. antihelmintico de Rosenstein, III, 113.
id. antihemorroidal, IV, 199.
id. antihistérico, II, 320.
id. antiperiódico y pectoral, IV, 39.
id. antitisico, II, 93.
id. antiséptico, II, 264.
id. antivenereo nutritivo, IV, 380.
id. aperitivo, II, 269.
id. aperitivo nitrado, id.
id. de flores de aralia, I, 345.
id. de arnica, I, 352.
id. aromático, IV, 154.
id. de arroz, I, 356.
id. de arroz acídulo, id.
id. de astragalo, I, 384.
id. astringente, IV, 270.
id. de avena, I, 385.
id. de acederas, id
id. de bardana, I, 424.
id. de bistorta, I, 466.
id. blanco de Sydenham, III, 367.
id. blanco de Trommsdorf, II, 348.
id. de borraja, I, 467.
Cocimiento de brionia, I, 471.
id. de cabezas de adormideras, I, 110.
id. de camedrios, I, 511.
id. de cañafistula, II, 41.
id. de cariofilata, II, 33.
id. de cariofilata con cascarilla, id.
id. de cariofilata etéreo, id.
id. de cariofilata con ruibarbo, II, 34.
id. carminativo, II, 226.
id. de catecú, II, 64.
id. católico, IV, 378.
id. de cebada, II, 67.
id. de cebada acidulado, II, 69.
id. de cebada compuesto, II, 70.
id. de cebada compuesto gomado, II, 69.
id. de centaura menor, II, 78.
id. de centeno atizonado, IV, 266.
id. de cerezo aliso, II, 434.
id. de cinamomo, II, 108.
id. de china, II, 88.
id. de cidras, II, 104.
id. de ciruelas con sen, IV, 199.
id. de cisampelos pareira, I, 474.
id. de cola de pescado compuesto, IV, 388.
id. de colombo, II, 157.
id. de colombo compuesto, id.
id. de coloquintidas, II, 165.
id. de consuelda mayor, II, 170.
Cocimiento de coralina, II, 178.
id. de cornejo de hojas grandes, II, 181.
id. de corteza de castaño de Indias, II, 46.
id. de corteza de naranja, III, 265.
id. de corteza de sauce, IV, 172.
id. de corteza de sauco, IV, 176.
id. de corteza verde de nuez, III, 281.
id. de corteza verde de nuez compuesto, id.
id. de cuerno de ciervo, II, 348.
id. de cuerno de ciervo acidulado, id.
id. diaforetico, III, 286.
id. de digital, II, 193.
id. diuretico, II, 251, 427; III, 381, 452.
id. diuretico alcalino, II, 407.
id. de dulcamara, II, 204.
id. de dulcamara compuesto, id.
id. de eleboro blanco, II, 211.
id. de eleboro fetido, id.
id. emenagogo, III, 453.
id. emoliente, III, 66.
id. emoliente y carminativo, id.
id. de enula compuesto, II, 231.
id. de enula, id.
id. de emina, II, 217.
id. de emina aluminoso, II, 218.
id. de emina avinagrado, id.
id. de escila, II, 251.
id. de escorzonera bezoardico, II, 267.

Cocimiento de escorzonera, solutivo, id.
id. contra las escrófulas, II, 25.
id. de espárragos, II, 269.
id. de espigelia, II, 275.
id. de esponja quemada, II, 25.
id. de estafisagria, II, 285.
id. de estramonio, II, 290.
id. febrífugo, III, 470.
id. febrífugo magistral, IV, 43.
id. febrífugo salino, II, 78.
id. de Foresto, II, 71.
id. fuerte, II, 385.
id. de hojas de gayuba, II, 339.
id. de genciana compuesto, II, 362.
id. de gordolobo compuesto, II, 403.
id. de geofrea de la Jamaica, I, 372.
id. de geofrea de Surinam, id.
id. de graciola, II, 405.
id. de grama, II, 407.
id. de grama compuesto, id.
id. de corteza de raiz de granado, II, 408.
id. de corteza de granada, id.
id. de guayaco, II, 425.
id. de guayaco compuesto, id.; IV, 378.
id. de guayaco compuesto y purgante, IV, 382.
id. de guindas secas, II, 434.
id. de Heister, III, 427.
Cocimiento de helecho, II, 437.
id. hidragogo, II, 251.
id. de higos, II, 498.
id. de hojas de enebro, II, 225.
id. de hojas de melocotonero, I, 144.
id. de hojas de naranjo, III, 265.
id. de china, II, 88.
id. de ictiocola compuesto, IV, 380.
id. inerasante, II, 388.
id. de ipecacuana, II, 524.
id. de kalmia, III, 1.
id. laxante, II, 112.
id. de leño de campeche, I, 512.
id. de leño de enebro, II, 225.
id. de leño de sandalo, IV, 161.
id. de leños, II, 425.
id. de liquen islandico amargo, III, 27.
id. de liquen islandico lacteo, id.
id. de liquen islandico mucilaginoso, III, 26.
id. de lobelia sifilitica, III, 39.
id. de Malta, III, 56.
id. de malvas compuesto, III, 58.
id. de malvavisco, III, 65.
id. de manzanas, III, 95.
id. de manzanilla, III, 92.
id. de mecereon, III, 98.
id. de mecereon compuesto, III, 99.
id. de simiente de membrillo, id.
id. de mercurio, III, 113.
id. de mercurial, III, 110.
Cocimiento narcótico, IV, 369.
id. negro de Allen, IV, 43.
id. nervino, III, 266.
id. de olmo, III, 280.
id. de pan, III, 367.
id. de parietaria, III, 369.
id. de pasas, IV, 345.
id. pectoral, I, 356, 394; II, 70, 312; III, 28, 66, 452.
id. pectoral escitante, III, 28.
id. pectoral solutivo, IV, 208.
id. de pensamiento acuoso, III, 374.
id. de pensamiento lacteo, id.
id. de poligala amarga, III, 451.
id. de poligala de Virginia, id.
id. de Pollini, III, 281.
id. de quasia, IV, 5.
id. de quasia compuesto, id.
id. de quina, IV, 34.
id. de quina acidulo, IV, 38.
id. de quina alcalino, IV, 43.
id. de quina alcanforado, IV, 36.
id. de quina aluminoso, id.
id. de quina con arnica, IV, 37.
id. de quina con cariofilata y opio, IV, 38.
id. de quina con cascarilla, IV, 39.
id. de quina compuesto y laxante, IV, 34, 44.
id. de quina facticio, II, 44.
id. de quina con liquen, IV, 39.

Cocimiento de quina nitrado, IV, 35.
id. de quina opiado, id.
id. de quina con la poligala, IV, 40.
id. de quina con ruibarbo, IV, 41.
id. de quina con polvos de quina, id.
id. de quina con serpentaria, IV, 42.
id. de quina con valeriana, id.
id. de ratania, IV, 69.
id. de renuevos de pino, III, 397.
id. de romaza, IV, 87.
id. de rubia, IV, 118.
id. de rubia compuesto, IV, 119.
id. de ruibarbo, IV, 133.
id. de sabina, IV, 146.
id. de salep, IV, 149.
id. de salicaria, IV, 150.
id. de salvado, IV, 151.
id. de saponaria, IV, 168.
id. de serpentaria de Virginia, I, 349.
id. de simaruba, IV, 214.
id. de simiente de Alejandría, id.
id. de simiente de membrillo, III, 109.
id. sudorifico, II, 425; IV, 378.
id. de taraxacon, IV, 259.
id. de taraxacon compuesto, id.
id. de tabaco, IV, 244.
id. de tamarindos, IV, 251.
id. de tamarindos compuesto, IV, 252.
Cocimiento de tormentila, IV, 270.
id vermifugo, II, 178.
id. de visco, IV, 553.
id. vomitivo, I, 382.
id. de yemas de abeto, I, 4.
id, de zarza vellosa, IV, 375.
id. de zarzaparrilla, IV, 377.
id. de zarzaparrilla compuesto, IV, 378.
id. de Zittmann, IV, 384.
Coclearia, II, 141.
id. hortense, id.
id. oficinal, id.
Cocos butyracea, I, 10.
Codagapala, II, 149.
Coffea arabica, I, 478.
id. cum cortice peruviano, IV, 9.
id. glandium, II, 219.
Coix lacryma, III, 6.
Cohombrillo, II, 150.
id. amargo, id.
Cohombro, II, 149.
id. silvestre, II, 150.
Cochinilla, II, 149.
Cola de caballo, II, 235.
id. fuerte, II, 340.
id. de pescado, id.
Colcotar, II, 454.
Colcothar vitrioli, id.
Colchico, II, 152.
Colirio aluminoso, I, 208.
id. anodino, I, 390; III, 300, 317.
id. astringente, II, 378; III, 413; IV, 112, 394, 401, 404.
id. azafranado, I, 390.
id. de beleño, I, 435.
id. boratado, IV, 229.
id. de Brun, I, 17.
id. calmante, III, 317.
id. detersivo, II, 128; IV, 401.
id. emoliente, III, 67.
Colirio de Fernandez, III, 185.
id. ferruginoso, II, 465.
id. fortificante, I, 332.
id. de Gimbernat, III, 458.
id. de Saint Jerneron, IV, 405.
id. de Lanfranc, I, 357.
id. mercurial, III, 189.
id. narcótico, III, 316.
id. de Newmann, I, 260.
id. oftálmico, I, 36.
id. opiado, III, 314.
id. resolutivo, I, 208, 253, 390; II, 128, 135, 139; III, 413; IV, 395, 403.
id. rojo, I, 17; III, 472.
id. de sales fundidas al fuego, II, 127.
id. saturnino opiado, III, 414.
id. seco, III, 145, 180, 197; IV, 393.
id. seco amoniacal, I, 218.
id. sedante, I, 390.
id. simple, II, 29.
id. de Tenque, III, 428.
id. tónico, IV, 405.
Colocintina, II, 159.
Colofonia, IV, 308.
Colombo, II, 155.
id. de Africa, id.
id. de América, id.
Colubrina, I, 348, 465.
Colutea arborescens, IV, 208.
Coloquintidas, II, 158.
id. preparadas, II, 159.
Colutorio acídulo, I, 81.
id. alcalino, III, 469.
id. aluminoso, I, 209.

Colutorio antiescorbútico, I, 491; II, 103, 149, 285.
id. antiodontalgico, III, 372.
id. astringente, I, 95; III, 426.
id. boratado, IV, 229.
id. de catecú, II, 65.
id. detersivo, I, 91; II, 128; IV, 109.
id. escitante, III, 254, 373.
id. humectante, II, 104.
id. mercurial, III, 199.
id. odontálgico, I, 436.
id. opiado, III, 300.
id. resolutivo, II, 128. 139.
id. saturnino, III, 414.
id. sialagago, III, 372.
id. tónico, I, 209.
Colla, II, 340.
id. piscium id.
Collutorium adstringens, I, 209; IV, 229, 407.
id. aluminosum, id.
id. antiscorbuticum, II, 103.
id. catechu saturninum, III, 426.
id. detergens, I, 91; IV, 109.
id. gingivale, II, 147.
id. sinapi, III, 253.
id. è zinco compositum, IV, 407.
Collyrium adstringens, II, 378; IV, 404.
id. aluminosum, I, 208.
id. boracicum, IV, 229.
id. cærulcum, II, 134.
id. cupratum, I, 126.
id. exiccans, II, 134.
id. ex hydrargyro muriatico corrosivo, III, 199.
Collyrium hyoscyani, I, 435.
id. Lanfranci, I, 357.
id. ex muriate hydrargyri oxigenato, III, 188.
id. nihili, IV, 395.
id. plumbatum, IV, 413.
id. de salibus igne fusis, II, 127.
id. saphirinum, II, 134.
id. stiercronense, IV, 405.
id. vitriolicum, IV, 402.
id. è vitriolo albo, id.
id. zinci, id.
id. è zinco sulphurico, id.
Comino, II, 168.
id. de los prados, I, 159; II, 168.
Conchas de ostras, I, 492.
Conchæ citratæ, I, 508.
id. ostrearum, I, 492.
Concrementa astaci, I, 494.
Conditum antiepilepticum, III, 318.
id. calami, I, 481.
id. catechucicum, III, 349.
id. corroborans, IV, 308.
id. cydoniorum, III, 106.
id. epilepticum, IV, 338.
id. febrifugum, IV, 301.
id. hydrargyro unguinosum, III, 114.
id. iridis saccharatum, III, 33.
id. muscarium, I, 120.
id. nephriticum, IV, 283.
id. pectorale, I, 401.
id. purgativum, IV, 128.
id. satyrii, IV, 148.
Conditum tamarindinaceum, IV, 187.
id. ad vermes, II, 534.
Coneina, II, 90.
Confeccion al kermes, III, 4,
id. de almendras, I, 179.
id. aromática, I, 520, 521; II, 369.
id. de cálamo aromático, I, 481.
id. aromático comun, I, 520.
id. de cálamo de Hamech, II, 161.
id. de hinojo, II, 499.
id. laxante, II, 534.
id. comun, I, 520.
id. hamech, II, 161.
id. de hinojo, II, 249.
id. jabonosa, III, 349.
id. de jacintos, I, 389,
id. laxante, II, 534.
id. de lirio, III, 33.
id. de ruda, IV, 120.
id. vermifuga, IV, 216.
Conium maculatum, II, 89.
Coniza, II, 169.
id. mayor, id.
id. media, II, 227.
Conserva de acedera, I, 7.
id. de acederilla, I, 8.
id. de achicorias, I, 11.
id. de agenjos, I, 132.
id. de amapolas, I, 213.
id. de angélica, I, 273.
id. de apio, I, 341.
id. antiescorbútica, I, 458; II, 141.
id. de azucenas, I, 394.
id. de becabunga, I, 430.
id. de betónica, I, 459.
id. de berros, I, 457.
id. de borraja, I, 467.
id. de botris, I, 468.
id. de buglosa, I, 472.

Conserva de cálamo aromático, I, 481.
id. de caléndula, I, 509.
id. de cañafistula, II, 41.
id. de cardo, II, 28.
id. de cardo santo, II, 29.
id. de centaura menor, II, 77.
id. de cicuta, II, 90.
id. de cidra, II, 98.
id. de cinorrodon, IV, 102.
id. de ciruelas silvestres, II, 112.
id. de claveles encarnados, II, 113.
id. de coclearia, II, 141.
id. de consuelda mayor, II, 170.
id. de cornejo, II, 181.
id. de culantrillo, II, 186.
id. de enebro, II, 220.
id. de énula, II, 228.
id. de eruca, II, 238.
id. de escordio, II, 263.
id. de erisimo, II, 236.
id. espagirica, III, 478.
id. de flores de melocoton, I, 143.
id. de fumaria, II, 322.
id. fundente y aperitiva, III, 497.
id. de grosellero negro, II, 415.
id. de hisopo, II, 508.
id. de laurel cerezo ó real, III, 14.
id. de lepidio, III, 17.
id. de lirio de los valles, III, 35.
id. de llanten, III, 43.
id. de malvas, III, 58.
id. de manzanilla, III, 83.
Conserva de margarita menor, I, 444.
id. de marrubio blanco, III, 96.
id. de mejorana, III, 102.
id. de melisa, IV, 272.
id. de membrillos, III, 106.
id. de menta, IV, 360.
id. de mil pies, III, 235.
id. de naranja, III, 260.
id. de flores de naranjo, III, 259.
id. de corteza de naranja, III, 260.
id. de nimfea, III, 278.
id. de orquis, IV, 148.
id. pectoral, I, 304.
id. de peonía, III, 375.
id. de perifollo, III, 383.
id. de primula, III, 526.
id. de Roccamore, III, 260.
id. de rododendro, IV, 86.
id. de romero, IV, 89.
id. de rosas, IV, 102.
id. de rosas secas, id.
id. de rosas vitriolada, id.
id. de ruda, IV, 120.
id. de tamarindos, IV, 251.
id. de tanaceto, IV, 255.
id. de tilo, IV, 264.
id. de trifolio acuático, IV, 318.
id. de tusílago, IV, 324.
id de verdolaga, IV, 342.
id. de verónica, IV, 343.
id. de violeta, IV, 349.
id. de yaro, IV, 354.
Conserva de yedra terrestre, IV, 357.
id. de yerba de la plata, IV, 371.
id. de yerba buena, IV, 360.
Conserba anthos, IV, 89.
id. aurantii, III, 260.
id. aurantiorum corticum, id.
id. aurantiorum florum, III, 259.
id. bellidis minoris, I, 444.
id. calendulæ florum, I, 509.
id. capilli veneris, II, 186.
id. cassiæ, II, 41.
id. chamœmelli florum, III, 83.
id. citri, II, 98.
id. cochleariæ, II, 141.
id. cornorum, II, 181.
id. cydoniorum, III, 106.
id. cynosbatos, IV, 102.
id. depectorans, I, 304.
id. erucæ, II, 238.
id. eryngii, II, 28.
id. erysimi, II, 236.
id. farfaræ, IV, 324.
id. florum persicorum, I, 143.
id. lepidii, III, 17.
id. lilii convallium florum, III, 35.
id. liliorum alborum florum, I, 394.
id. portulacæ, IV, 342.
id. mille pedum, III, 235.
id. peoniæ, III, 375.
id. primullæ veris, III, 526.
id. rhododendri chrysanthi, IV, 86.
id. rosarum, IV, 101.
id. rosarum adstringens, IV, 103.
id. rosarum sicca, IV, 102.

Conserva rosarum vitriolata, id.
id. rutæ, IV, 120.
id. sabinæ, IV, 144.
id. salviæ, IV, 152.
id. scordii, II, 263.
id. symphyti, II, 170.
id. tamarindorum, IV, 251.
id. tanaceti, IV, 264.
id. tiliæ, id.
id. trifoli fibrini, IV, 318.
id. veronicæ, IV, 343.
id. violata, IV, 349.
Consolida major, II, 170.
id. media, I, 473.
id. regalis, II, 198.
Consuelda, II, 169.
id. medicinal, id.
id. menor, II, 170.
id. turinosa, id.
Contrayerba, II, 174.
id. de Mégico, id.
id. del Perú, id.
Contrayerva alba, II, 174.
id. germanica, IV, 339.
id. major, II, 174.
id. Mexicana, id.
id. nova, id.
id. Virginiana, I, 348.
Convallaria majalis, III, 35.
Convolvulo, II, 176.
id. blanco, id.
id. mayor, id.
id. menor, id.
id. de vallados, id.
Convolvulus arvensis, II, 176.
id. jalappa, II, 529.
id. major, II, 176.
id. Mechoacana, III, 101.
id. minor, II, 176.
id. scammonia, II, 239.
id. scoparius, III, 16.
id. sepium, II, 176.
id. turpethum, IV, 323.
Conyza media, II, 227.
id. squarrosa, II, 169.
Conyza vulgaris, II, 169.
Copaifera oficinalis, I, 409.
Copal, II, 177.
id. resina, id.
Coptis, id.
id. de tres hojuelas, id.
Coptis trifoliata, id.
Coral blanco, I, 493.
id. rojo, id.
Coralina, II, 177.
id. blanca, id.
id. de Córcega, id.
id. de mar, id.
Corallina corsica, id.
id. officinarum, id.
id. rubens, id.
id rubra, id.
Corallium album, I, 492.
id. rubrum, id.
Cordial nervino, I, 43.
Coreopsis bidens, I, 104.
Coriandrum, II, 107.
id. sativum, id.
Cornejo, II, 180.
id. de hojas grandes, id.
id. de hojas redondas, id.
id. sedoso, id.
id. silvestre, id.
Cornina, II, 181.
Cornizo, véase *Cornejo*.
Cornu cervi, I, 501.
id. cervi auratum, III, 360.
id. cervi præparatum sine igne, I, 503.
id. cervi philosophice, id.
id. cervi ustum, id.
id. cervi ustum præparatum, id.
id. rhinoceros, I, 501; II, 342.
Cornus circinnata, II, 180.
id. florida, id.
id. mas, id.
id. sevicea, id.
Coronopo, II, 181.
Coronopus Ruellii, id.
Corpus pro balsamo saponis, IV, 306.
Corrector opii, IV, 304.
id. Starkeyi, id.
Cortex citri, II, 98.
id. conessi, II, 149.
id. magellanicus, II, 181.
id. peruvianus, IV, 6.
id. peruvianus fuscus, id.
id. peruvianus flavus, IV, 7.
id. peruvianus oficinalis, IV, 6.
id. profluvii, II, 149.
id. Winteranus, II, 181.
id. Winteranus spurius, I, 514.
Corteza culilaban, II, 187.
id. de Winter, II, 181.
Corylus avellana, I, 384.
Correguela mayor, II, 176.
id. menor, id.
Costo acre, II, 181.
id. acre blanco, id.
Costo arábigo, II, 182.
id. arábigo verdadero, id.
Costus amarus, id.
id. arabicus, id.
id. corticosus, I, 514; II, 182.
id. dulcis, II, 182.
id. hortorum, I, 408.
Cotiledon, II, 182.
id. amarillo, id.
Cotula fœtida, III, 82.
Cotyledon lutea, II, 182.
id. umbilicus, III, 286.
Coumarona odorata, II, 435.
Craneo humano, I, 501.
Cranium humanum, id.
Crassula, IV, 213.
id. mayor, id.
Crema, III, 15.
id. de cinabrio, II, 153.
id. cosmetica, II, 272.
id. pectoral, I, 72, 477.

Crema de tartaro soluble, III, 512.
Cremor de tartaro, III, 506.
id. de azufre, I, 397.
id. tartari, III, 506.
id. tartari solubilis, III, 512.
Crepanella, II, 199.
Crepitus lupi, III, 371.
Creta, I, 492.
id. alba, id.
id. gallica, III, 55.
id. præcipitata, I, 495.
Crysantemo, II, 182.
id. de flor blanca, id.
Cristal mineral, III, 482.
Cristales de Venus, II, 138.
Crithmum, II, 501.
id. maritimum, id.
Crocus antimonii, I, 303.
id. ferri, II, 456.
id. martis adstringens, II, 454.
id. martis aperiens, II, 456.
id. martis aperitivus, id.
id. martis aperitivus antimoniatus, II, 454.
id. martis rore majali paratus, II, 456.
id. martis sulphuratus, II, 454.
id. martis vitriolatus, id.
id. metallorum, I, 303.
id. sativus, I, 384.
id. solis, III, 360.
id. veneris, II, 122.
Croton tiglio, II, 182.
id. cascarilla, II, 36.
id. castaneifolium, II, 396.
id. eleutheria, II, 36.
id. tiglium, II, 182.
id. tinctorium, IV, 271.
Crystalli lunæ, III, 398.
Crystalli veneris, II, 138.
Crystallum minerale, III, 482.
Cubebas, II, 184.
Cuculus, I, 457.
Cucumis, II, 150.
id. agrestis, id.
id. asininus, id.
id. colocynthis, II, 158.
id. melo, III, 106.
id. sativus, II, 149.
Cucurbita, I, 479.
id. citrullus, IV, 373.
id. lagenaria, I, 478.
id. pepo, I, 479.
Cuerno de ciervo, I, 501.
id. de ciervo calcinado, I, 503.
id. de ciervo dorado, III, 360.
id. de ciervo preparado por el fuego, I, 503.
id. de ciervo sin fuego, id.
id. de ciervo sin fuego filosoficamente, id.
id. del rinoceronte, I, 503.
Culantrillo, II, 185.
id. blanco, id.
id. de Canadá, id.
id. de Montpeller ó comun, id.
id. negro, id.
id. rojo, II, 186.
Culilaban, II, 187.
Cuminum, II, 168.
id. cyminum, id.
id. nigrum, III, 277.
Cunila bulbula, III, 356.
id. sativa, I, 137.
Cupressinus officinalis, II, 307.
Cupressus, II, 110.
id. sempervivens, id.
Cupridum ammoniacæ liquidum, II, 140.
Cuprum aceticum, II, 119, 138.
Cuprum aceto corrosivum, II, 134.
id. aluminatum II, 127.
id. ammoniacale, II, 129.
id. ammoniaco sulphuricum, id.
id. ammoniacum, id.
id. ammoniatum, id.
id. armenus, II, 123.
id. calcinatum, id.
id. sulphurico ammoniatum, II, 129.
id. sulphuricum, II, 124.
id. vitriolatum, id.
Cupula glandium quercus, 216.
Curcuma, II, 187.
Curcuma, id.
id. augustifolia, I, 355.
id. longa, II, 187.
id. rotunda, id.
Cuscuta, II, 188.
id. epitimo, id.
Cuscuta epithimum, id.
id. Europea, id.
Cyanuretum ferri, II, 496.
id. hydrargyri, III, 204.
Cyanus, I, 12.
id. segetum, id.
Cyclamen æuropeum, I, 366.
id. officinale, id.
Cydonia, III, 106.
id. communis, id.
id. cotonea, id.
Cymbalaria, II, 108.
Cymimum, II, 168.
Cyna, IV, 214.
Cynanchum, II, 109.
id. arghel, IV, 180.
id. monspeliacum, II, 109, 239.
Cynara cardunculus, II, 28.
id. scolymus, I, 145.
Cynipy gallæ tinctoriæ, I, 115.

Cynips quercus folii, I, 115.
id. rosæ, I, 430.
Cynoglossa major, II, 110.
id. vulgaris, id.
Cynoglossum, id.
id. officinale, id.
Cynomorium, II, 510.
id. coccineum, id.
Cynorrhodum, IV, 100.
Cynosbatos, id.
Cyperus esculentus, II, 545.
id. longus, id.
id. rotundus, id.
id. odoratus, id.
id. orientalis major, id.
id. romanus, id.
Cytinus hypocistis, II, 507.

D.

Dactyli, III, 364.
Dactylus idæus, I, 494.
Dalbergia monetaria, IV, 163.
Daphne gnidium, III, 98.
id. laureola, id.
id. mezereum, id.
id. thymelea, id.
Datiles, III, 364.
Datura, II, 189.
Datura fastuosa, II, 290.
id. metel, II, 189.
id. stramonium, II, 290.
Daturina, id.
Daturinum, id.
Dauco cretico, II, 189.
Daucus candianus, id.
id. carotta, IV, 372.
id. creticus, II, 189.
id. sativus, IV, 372.
id. sylvestris, IV, 373.
id. vulgaris, IV, 372.
Decoctum adstringens, IV, 270.
id. album, II, 367, 389.
Decoctum album cum gummi mimossæ, II, 349.
id. album cum gummi Sydenhami, III, 367.
id. aloes compositum, I, 35.
id. alphææ, III, 65.
idi alphææ cum ammoniaco muriatico, I, 253; III, 66.
id. emolliens, III, 65.
id. amaro—aromaticum laxativum, IV, 132.
id. amarum, II, 362; IV, 5.
id. amarum æthereum, II, 363.
id. amarum alcoholisatum, id.
id. amarum anthelminticum, II, 372.
id. amarum anthelminticum Rosensteinii, III, 113.
id. antifebrile, IV, 42.
id. antiphthisicum, II, 93.
id. antipsoricum, II, 428.
id. antiscorbuticum, IV, 65.
id. antisyphiliticum nutriens, IV, 380.
id. antivenereum laxans, IV, 382.
id. antivenereum Ullysiponense, IV, 383.
id. araliæ nudicaulis, I, 345.
id. arnicæ florum, I, 352.
id. astragali exscapi, I, 384.
id. aurantii foliorum, III, 265.
id. avenaceum Lowerianum, I, 385.
id. azedarach corticis, II, 108.
Decoctum bardanæ, I, 424.
id. bignoniæ catalpæ, I, 461.
id. bryoniæ, I, 471.
id. carbonatis potassæ absinthii, III, 470.
id. carminativum, III, 78.
id. caricarum, II, 498.
id. caryophyllatæ (radicis) II, 33.
id. caryophyllatæ cum cascarilla, id.
id. caryophyllatæ cum rheo, II, 34.
id. cassiæ fistulæ, II, 41.
id. cathechu, II, 64.
id. cerasorum acidorum sicorum, II, 434.
id. chamædrios amarum, III, 92.
id. chamæmeli compositum, id.
id. chinæ (radicis) II, 88.
id. chinæ acidum, IV, 38.
id. chinæ cum alumine, IV, 36.
id. chinæ antisepticum, IV, 34.
id. chinæ antisepticum purgans, IV, 44.
id. chinæ cum arnica, IV, 37.
id. chinæ cum caryophyllata et opio, IV, 38.
id. chinæ cum cascarilla, IV, 39.
id. chinæ cum china pulverata, IV, 41.
id. chinæ compositum, IV, 42.
id. chinæ compositum et laxans, IV, 44.

Decoctum chinæ cum licheno, IV, 39.
id. chinæ opiatum, IV, 35.
id. chinæ cum rheo, IV, 41.
id. chinæ cum senega, IV, 40.
id. chinæ cum valeriana, IV, 42.
id. cinchonæ, IV, 34.
id. cinchonæ cardiacum, IV, 42.
id. citri Minsichti, II, 104.
id. colombæ, II, 157.
id. colombæ compositum, id.
id. colocynthidis, II, 165.
id. consolidæ radicis, II, 170.
id. cornu cervi, II, 349.
id. cornu cervi citratum, II, 348.
id. cornu cervi compositum, III, 367.
id. cornu cervi gummosum, II, 389.
id. cornu cervi cum mica panis, III, 367.
id. crystallorum tartari, III, 510.
id. cucumerum cum extracto nucis vomicæ, III, 285.
id. cydoniæ, III, 109.
id. daphnes mezerei, III, 98.
id. diaphoreticum, II, 425; III, 286.
id. diaphoreticum incitans, IV, 380.
id. digitalis, II, 193.
id. diureticum alcalinum, II, 407.
id. diureticum Hufelandi, II, 251.
id. dulcamaræ, II, 204.
Decoctum emoliens et carminans, III, 66.
id. febrifugum, IV, 35.
id. febrifugum laxans, IV, 44.
id. febrifugum salsum, III, 470.
id. febrifugum salinum, II, 78.
id. febrifugum simplex, II, 46.
id. foliorum amygdali, Persicæ, I, 144.
id. Foresti, II, 71.
id. ad fungos articulorum, III, 427.
id. furfuris tritici, IV, 151.
id. gallarum, I, 117.
id. gei urbani, II, 33.
id. geoffrææ inermis, II, 372.
id. geoffrææ Jamaicensis, id.
id. geofrææ Surinanensis, id.
id. graminis, II, 407.
id. graminis compositum, id.
id. gratiolæ, II, 405.
id. guajaci, II, 425.
id. guajaci compositum, II, 225; V, 378.
id. gummi arabici, II, 388.
id. hæmatoxyli, I, 512.
id. helenii, II, 231.
id. hellebori fœtidi foliorum, II, 211.
id. helminthocorti, II, 178.
id. hippocastani corticis, II, 46.
id. hordeatum amygdalinum, I, 180.
id. hordei, II, 67.
id. hordei acidulatum, II, 69.
id. hordei citratum, id.
id. hordei compositum, II, 70.
id. hydrargyri, III, 113.
ecoctum incitans aromaticum, IV, 154.
id. incitans nutriens diaforeticum et antisyphiliticum, II, 427.
id. incrassans Fulleri, II, 388.
id. ipecacuanhæ, II, 524.
id. juglandis drupæ regiæ, III, 281.
id. juglandis drupæ regiæ compositum, id.
id. juniperi, II, 225.
id. juniperi fructuum carminativum, II, 226.
id. juniperi ligni, II, 225.
id. kalmiæ latifoliæ, III, 1.
id. lapathi, IV, 87.
id. laxativum, III, 78.
id. laxativum Viennense, IV, 200.
id. leontodinis taraxaci, IV, 259.
id. lichenis islandici, III, 26.
id. lichenis islandici compositum, III, 28.
id. lichenis islandici lacteum, III, 27.
id. ligni campecheusis, I, 512.
id. ligni campechiani, id.
id. lignorum, II, 425.
id. lobeliæ syphiliticæ, III, 39.
id. ad lupias sinoviales Heisteri, III, 427.
id. Lusitanicum, IV, 383.
id. malti, III, 56.
id. malvæ compositum, III, 58.
id. mannæ carminativum, III, 79.

Decoctum mannæ purgans, III, 78.
id. mannæ laxativum, III, 79.
id. mastichinum, I, 176.
id. mercurialis, III, 110.
id. ad metrorrhagiam, III, 265.
id. mezerei, III, 98.
id. mezerei compositum, III, 99.
id. ex myrtilis, II, 348.
id. nervinum, III, 266.
id. nicotianæ, IV, 244.
id. nucum corticis viridis, III, 281.
id. nigrum alenii, IV, 43.
id. ophthalmicum mucilaginosum, III, 65.
id. orizæ, I, 357.
id. papaveris, I, 110.
id. passularum, IV, 345.
id. pectorale, I, 394.
id. pectorale in phtisi, II, 312.
id. pectorale corroborans, III, 453.
id. pectorale nutriens, III, 28.
id. pectorale nutriens et incitans, id.
id. persicæ foliorum, I, 144.
id. pini turionum, I, 4.
id. pini turionum saponatum, id.
id. polygalæ amaræ, III, 451.
id. polygalæ senegæ, id.
id. prunorum cum senna, IV, 199
id. prunus padi, II, 434.
id. purgans antiphlogisticum, II, 112.
Decoctum quassiæ, IV, 5.
id. quassiæ compositum, id.
id. quercus corticis, II, 217.
id. quercus cum aceto, II, 218.
id. quercus cum alumine, id.
id. quercus roboris, II, 217.
id. rathaniæ, IV, 69.
id. resolvens, IV, 259.
id. resolvens et diureticum, III, 490, 498.
id. rhabarbari, IV, 133.
id. rubi villosi, IV, 375.
id. rubiæ tinctoriæ, IV, 118.
id. rubiæ compositum, IV, 119.
id. rutæ zincatum, IV, 405.
id. sabinæ, IV, 146.
id. de salep radice, IV, 149.
id. salicariæ, IV, 150.
id. salicis, IV, 172.
id. sambuci corticis, IV, 176.
id. santali citrini, IV, 161.
id. saponariæ, IV, 168.
id. sarcæ, IV, 377.
id. sarsæparillæ, id.
id. sarsæparillæ ex Callac, IV, 384.
id. sarsæparillæ compositum, IV, 378, 383.
id. sarsæparillæ cum mezereo, IV, 383.
id. saturninum, III, 411.
id. scillæ, II, 251.
id. scorzonere bezoardicum, II, 267.
Decoctum scorzonere solutivum, II, 267.
id. secalis cornuti, IV, 266.
id. senegæ, III, 451.
id. simarubæ, IV, 214.
id. smilacis sarsaparillæ, IV, 377.
id. spigeliæ, II, 275.
id. spongiæ ustæ, II, 25.
id. seminum staphisagriæ, II, 285.
id. stomachicum resolvens, III, 486.
id. strumale, II, 25.
id. contra strumas, id.
id. sudoriferum, IV, 378.
id. sudorificum, IV, 425.
id. sulphureti calcis Hoffmanni, I, 322.
id. syphiliticum roborans, III, 282.
id. syphiliticum Ivo Gaukes, II, 428.
id. tabaci, II, 244.
id. tamarindorum, IV, 251.
id. tamarindorum compositum, IV, 252.
id. tartari citratum, III, 510.
id. tartari crystallorum, id.
id. tormentilæ, IV, 270.
id. velmi campestris, III, 286.
id. foliorum uvæ ursi, II, 339.
id. veratri, II, 211.
id. verbasci anodynum, II, 403.
id. violæ tricoloris cum aqua, III, 374.
id. violæ tricoloris cum lacte, id.
id. visci albi, IV, 353.

Dedalera, II, 189.
id. encarnada, id.
id. ferruginosa, id.
Delfina, II, 285.
Delfinio, II, 198.
Delphia, II, 285.
Delphinium, id.
id. consolida, II, 198.
id. staphisagria, II, 284.
Dens leonis, IV, 258.
Dentalia, I, 493.
Dentalium dentalis, id.
id. entalis, id.
Dentaria, II, 199.
id. pequeña, id.
Dentaria III, 371.
id. digitata, II, 199.
id. major, id.
id. minor, id.
id. pinnata, id.
Dentes apri, I, 501.
id. equi marini, id.
id. hippopotami, id.
Dentilaria, II, 199.
Desmarestia aculeata, II, 177.
Desvanexia fluitans, II, 312.
Deuto-acetato de cobre, II, 138.
id. acetato de mercurio, III, 226.
id. cloruro de mercurio, III, 185.
id. fosfato de cobre, II, 123.
id. hidroclorato de antimonio, I, 323.
id. hidroclorato de cobre, II, 131.
id. hidroclorato de cobre y de amoniaco, II, 132.
id. hidroclorato de estaño, II, 289.
id. hidroclorato de mercurio, III, 185, 187.
id. iodato de mercurio, III, 217.
id. ioduro de mercurio, III, 203.
Deuto-muriato de antimonio, I, 323.
id. muriato de estaño, I, 289.
id. muriato de mercurio, III, 185.
id. nitrato de cobre, II, 131.
id. sulfuro de antimonio, I, 315.
Deuto-murias stibii, I, 323.
id. sulphas cupri et ammoniæ, II, 129.
id. sulphuretum hydrargyri rubrum, III, 152.
Deutoxicianuro de hierro hidratado, II, 496.
Deutoxido de antimonio, I, 296.
id. de hidrogeno, III, 360.
id. de hierro, II, 448.
id. de mercurio, III, 142.
id. de plomo, IV, 403.
Deutoxidum plumbi, id.
Diacaryon, III, 280.
Diacodium liquidum Montani, I, 111.
Diacrydium, II, 239.
id. cydoniatum, II, 240.
id. glycirrhyzatum, II, 239.
id. rosatum, II, 240.
Diacydonium aromaticum, III, 107.
id. jalappinum, II, 539.
id. lucidum, III, 106.
id. lucidum jalappinum, II, 539.
id. simplex, III, 106.
id. speciebus, III, 107.
id. solutivum pellucidum, II, 539.
Diagridio cidoniado, II, 240.
id. glicirrizado, II, 239.
Diagridio rosado, II, 240.
id. sulfurado, II, 239.
Dianthus caryophyllus, II, 113.
Diapensia, IV, 166.
Dictamo, II, 199.
id. blanco, II, 200.
id. de Creta, II, 199.
id. real, II, 200.
Dictamus albus, id.
id. creticus, II, 199.
Diente de hierro, II, 238.
id. de hipopotamo, I, 501.
id. de jabalí, id.
id. de leon (véase *Taraxacon*), IV, 258.
id. de unicornio, I, 501.
Diervila, II, 200.
id. del Canadá, id.
Diervilla, id.
id. Tourneforbi, II, 200.
Digestivo líquido, IV, 285.
id. de Plenk, id.
Digestivum liquefactum, id.
Digital, II, 189.
Digitalina, id.
Digitalinum, id.
Digitalis, id.
id. ferruginea, II, 189.
id. purpurea, id.
Diospiros de Virginia, II, 200.
Diospyros virginiana, id.
id. ebenum, II, 205.
Dipsaco, II, 201.
id. de cardadores, id.
id. vulgar, id.
Dipsacus fullonum, id.
id. sylvestris, id.
Diptamnus officinalis, II, 200.
Doradilla, II, 201.
Doronico, id.
id. fétido, II, 202.
id. de hojas de llanten, id.
id. oficinal, II, 201.
Doronicum germanicum, I, 350.

Doronicum latifolium, II, 201.
id. officinale, id.
id. pardalianches, id.
id. plantagineum, II, 202.
id. romanum, II, 201.
Dorstenia contrayerba, II, 174.
Dracæna draco, IV, 163.
Dracocephalum moldavicum, IV, 272.
Draconcio fétido, II, 202.
Dracontium fœtidum, id.
Dracunculo, II, 290.
Dracumculus exculentus, id.
id. hortensis, id.
Dragoncillo, II, 290.
Dropax antiparalyticum, III, 394.
Drymis Winteri, II, 181.
Dryobalanops camphora, I, 146.
Dulcamara, II, 202.
Dulcichinum, II, 545.

E.

Ebano, II, 205.
id. fosil, I, 386.
Ebur, I, 502.
id. fossile, id.
id. ustum album, I, 503.
Echalote, I, 140.
Eclegma album, I, 184.
id. gummoso—oleosum, id.
Elœocarpus copallifera, II, 177.
Elaterino, II, 150.
Elaterinum, id.
Elaterium, id.
Eleboro, II, 205.
id. blanco, id.
id. fétido, II, 206.
id. negro, id.
id. oriental, id.
id. verde, id.
Electuario de acibar, de mercurio y de hierro, II, 426.
Electuario afrodisiaco, III, 5; IV, 149.
id. de agarico de sauce, I, 119.
id. alterante, III, 135.
id. anthelmintico, II, 534; III, 379; IV, 217, 328.
id. anthelmintico de Heister, III, 133.
id. anthelmintico de Vogler, III, 185.
id. antiacido, III, 50.
id. antiartritico, III, 157; IV, 145.
id. anticaquectico, III, 393.
id. anticardialgico, IV, 17.
id. antidisenterico, I, 285; IV, 128.
id. antiemotipsico, I, 432.
id. antiepileptico, III, 14; IV, 20.
id. antihelmintico, II, 534; IV, 328.
id. antiescorbútico, II, 142; III, 252.
id. antiescrofuloso, III, 498, 499.
id. antifebril, IV, 17.
id. antiflatulento, II, 62.
id. antihemorroidal, III, 77; IV, 188.
id. antiherpético, I, 335, 340; III, 138, 196.
id. antiespasmódico, IV, 328.
id. antihidrofobico, III, 279.
id. antitisico, II, 35.
id. antireumático, I, 402.
id. antisifilitico, III, 198.
id. aperitivo, II, 249.
id. de arnica, I, 351.
id. aromático, I, 519; III, 83.
Electuario astringente, II, 62, 126; III, 347, 351; IV, 17, 18, 66, 70, 102.
id. astringente y tónico, I, 352.
id. astringente de Dubaume, I, 207.
id. atemperante, III, 484.
id. de bayas de laure, III, 13.
id. bequico, III, 77.
id. de cálamo aromático, I, 48.
id. calibeado, II, 445, 461.
id. de carbon, II, 23.
id. cariocostino, II, 241.
id. de casia fistula, II, 41.
id. de catecú compuesto, III, 349.
id. católico, IV, 188.
id. de cera, II, 82.
id. contra la diarrea, II, 62.
id. contra la estomacace, I, 206.
id. cordial, I, 389.
id. de cremor tártaro, III, 507.
id. dentrífico, I, 500; III, 508.
id. depurativo, II, 431; III, 138.
id. detersivo, III, 240.
id. diafenis, II, 242.
id. diatartáreo, IV, 187.
id. diurético, II, 222, 250.
id. emético, II, 522.
id. para las encías, II, 61; III, 241.
id. de escamonea y de turbit compuesto, II, 242.
id. escitante, III, 372.
id. de escordio opiado, III, 349.

Electuario estomacal, I, 481; III, 260, 393; IV, 128.
id. febrífugo, I, 132, 350; II, 45; IV, 16.
id. febrífugo y aperitivo, III, 500.
id. febrífugo de Senac, IV, 19.
id. ferruginoso alcalino, II, 452.
id. fortificante, IV, 17.
id. fundente, II, 453.
id. de goma tragacanto, II, 399.
id. de grafito, I, 447.
id. hidragogo, II, 241, 533, 539
id. de hiera picra, I, 28.
id. incrasante, I, 109; III, 31.
id. laxante, I, 20; IV, 253
id. lenitivo, IV, 133.
id. lenitivo sulfurado, IV, 188.
id. de magnesia, III, 50.
id. de maná, III, 77.
id. mundificante, IV, 188.
id. mundificante de pobres, II, 432.
id. mundificante de Werlhof, II, 431.
id. de mirra compuesto, II, 61.
id. opiado polifarmaco, III, 332.
id. pectoral, I, 401; III, 450.
id. pectoral laxante, II, 539.
id. purgante, I, 401; II, 241, 533; III, 157, 510; IV, 188.
id. de quina, IV, 19.
id. de quina alcalino, IV, 17.
Electuario de quina antimoniado, IV, 19.
id. refrigerante, III, 509.
id. requies Nicolai, III, 354.
id. resuntivo, IV, 324.
id. de ruibarbo compuesto, IV, 188.
id. de sen, IV, 183.
id. de sen y de carbon, IV, 188.
id. de sen y de pulpas de frutos compuesto, IV, 183.
id. tónico, II, 452; IV, 17.
id. traumático, I, 451; IV, 103.
id. vermífugo, II, 287; III, 185, 388.
Electuarium de acoro, I, 481.
id. adstringens, II, 62.
id. adstringens Fulleri, IV, 102.
id. alcalino—ferratum, II, 452.
id. aloes compositum, I, 28.
id. anodynum pro infantibus, III, 50.
id. antacidum, id.
id. anthelminticum, IV, 328.
id. antiepilepticum, IV, 20.
id. antispasmodicum, id.
id. aperiens, IV, 184.
id. arnicæ florum, I, 351.
id. aromatico opiatum, III, 332.
id. aromaticum, I, 519.
id. boleti suaveolens, I, 119.
id. cardiacum, I, 520.
id. cassiæ lenitivum, II, 41.
Electuarium cassiæ tamarindatum, II, 41.
id. catechu compositum, III, 349.
id. catholicon commune, IV, 184.
id. catholicum, IV, 188.
id. catholicum duplicatum, id.
id. ceratum, II, 82.
id. è chamæmelo, III, 83.
id. cochleariæ cum calamo aromatico, II, 142.
id. cordiale, I, 389.
id. demulcens, II, 82.
id. dentrificum, III, 508.
id. desobstruens, II, 249.
id. diacatholicon, IV, 188.
id. diaphænicum, II, 242.
id. diaprunum, IV, 184.
id. diasatyrion, IV, 149.
id. diascordium, III, 349.
id. diatragacanthe, II, 399.
id. eccoproticum, IV, 184.
id. Fracastoris, III, 349.
id. gingivale, II, 61; III, 508.
id. ad gingivas, III, 241.
id. hieræ picræ, I, 28.
id. hydragogum, II, 533.
id. hyoscyami opiatum III, 353.
id. pro infantibus, III, 50.
id. ipecacuanhæ moschatum, II, 522.

Electuarium joviale ad tæniam, II, 287.
id. de junipero, II, 222.
id. laxans et emmenagogum, I, 20.
id. laxativum, II, 41; IV, 253.
id. lenitivum, III, 509; IV, 184.
id. lenitivum cum sulphure, IV, 188.
id. de manna, III, 77.
id. mithridaticum, III, 50, 329.
id. mundificans, II, 431; IV, 188.
id. mirrhæ compositum, II, 61.
id. opiatum, III, 332.
id. opii compositum, id.
id. pro pecoribus, III, 240.
id. piperinum, III, 393.
id. polygalæ amaræ, III, 450.
id. purgans, II, 241, 533.
id. requies Nicolai, III, 354.
id. resolvens antherpeticum, III, 130.
id. resolvens martiale diureticum, II, 250, 453.
id. resumptivum, IV, 324.
id. de rhabarbaro, IV, 188.
id. sanans, II, 82.
id. scamonii, II, 241.
id. scordii, III, 349.
id. scordii opiatum, id.
id. è senna, IV, 184.
id. è senna cum carbone, IV, 188.
id. sennæ, IV, 184.
id. sennæ compositum, id.
Electuarium stomachicum, IV, 128.
id. stomachicum alterans, III, 393.
id. tamarindorum, IV, 253.
id. terebinthinatum, IV, 301.
id. thebaicum, III, 332.
id. theriacale magnum, id.
id tónico—resolvens, II, 452.
id. ad vermes, II, 534.
Elemi, II, 214.
id. de Etiopia, id.
id. de Occidente, id.
id. de Oriente, id.
Elemi, id.
id. Occidentale, id.
id. Orientale, id.
Eleminthochortou, II, 177.
Eleuteria, II, 36.
Elichrysum montanum, III, 388.
Elixir de acibar jabonoso, I, 34.
id. ácido, I, 97.
id. ácido aromático, I, 290.
id. ácido de Dippel, I, 98.
id. ácido fortificante, II, 39.
id. ácido de Haller, I, 98.
id. alcalino de goma guta, II, 394.
id. al kermes, I, 534.
id. de almaciga, I, 177.
id. amargo, I, 41, 130; II, 332, 366; III, 264, 274, 505.
id. amargo vinoso, IV, 321.
id. americano de Courcelles, II, 234.
Elixir amoniaco—opiado, IV, 82.
id. antiacido, I, 487; IV, 4.
id. antiapopletico, I, 524.
id. antiartritico, I, 29, 106, 368; II, 423.
id. antiasmatico, III, 305.
id. antiasmatico de Lemort, III, 307.
id. antiescorbútico, II, 148; IV, 321.
id. antiescrofuloso, II, 147.
id. antiescrofuloso de Perhile, II, 366.
id. antiespasmodico, I, 435; IV, 336.
id. antifebril, IV, 54.
id. antiherpetico, III, 130.
id. antihisterico, II, 55, 233.
id. antiodontalgico, III, 373.
id. antiseptico, IV, 54.
id. antivenereo, I, 410.
id. aperitivo, III, 505; IV, 262.
id. aperitivo de Clauder, I, 35.
id. aromatico, I, 483, 532.
id. aromatico de canela, I, 534.
id. aromatico astringente, IV, 299.
id. astringente, I, 513.
id. de azafran compuesto, I, 30.
id. balsamico, III, 267.
id. balsamico espirituoso, II, 266.
id. balsamico espirituoso de Hoffman, II, 266; III, 269.
id. balsamico pectoral de Tolú, I, 422.

Elixir balsamico de Werlhof, IV, 49.
id. de cidra, II, 102.
id. colagogo, I, 33.
id. de Daffi, IV, 196.
id. de droga amargo, I, 34.
id. de enebro, II, 222.
id. estomacal, I, 280, 417; II, 364; III, 269; IV, 52.
id. de Whit, IV, 53.
id. febrífugo, II, 46.
id. febrífugo de Whit, IV, 53.
id. fétido, II, 53.
id. fortificante, II, 477.
id. fuerte, II, 366.
id. de Garo, I, 30.
id. de jalapa compuesto, II, 543.
id. de larga vida, I, 40.
id. de mirra, III, 244.
id. de Mittié, II, 370.
id. de naranja compuesto, III, 273.
id. odontálgico y antiescorbútico, I, 458.
id. de oro, II, 474.
id. paregórico, III, 303, 305, 306.
id. pectoral, I, 416; IV, 81.
id. pectoral de Elsner, II, 234.
id. pectoral inglés, II, 257.
id. pectoral simple, IV, 80.
id. pectoral de Wedel, II, 256.
id. policreste, II, 242.
id. policreste purgante, IV, 196.
id. de propiedad, I, 29.
id. de propiedad ácido de Boerhaave, I, 32.
Elixir de propiedad ácido de Paracelso, I, 33.
id. de propiedad antiescorbútico, id.
id. de propiedad blanco, I, 30.
id. de propiedad con ruibarbo, I, 41.
id. de propiedad sin ácido, I, 31.
id. de propiedad de Stahl, I, 34.
id. de Radeliff, I, 41.
id. de Raulin, IV, 196.
id. de regaliz, IV, 81.
id. del rey de Dinamarca, id.
id. resolutivo, III, 501, 505.
id. de Ringelmann, IV, 81.
id. sagrado, I, 40.
id. de salud, IV, 193.
id. de Spina, I, 43.
id. de Stoughton, I, 42.
id. sudorífico de Lettson, III, 307.
id. sudorífico de Willis, II, 528.
id. tónico, I, 40.
id. uterino, I, 379.
id. uterino de Crollius, II, 54.
id. vermífugo de Regimbeau, I, 43.
id. de vida, I, 527.
id. de vida de mugeres, IV, 159.
id. de vida de Lelievre, I, 43.
id. vinoso de Hoffmann, III, 269.
id. de Rosenstein, id.
id. visceral, I, 126; III, 267, 274.
id. visceral de Hoffmann, III, 269.
id. visceral de Rosenstein, IV, 138.
id. vitriólico ácido, I, 534.
Elixir vitriólico de Mynsicht, I, 534.
id. de Wryght, III, 200.
id. de zumo de regaliz, IV, 81.
Elixir acido-aromaticum, I, 535.
id. a cidum Dippelii, I, 98.
id. acidum Halleri, id.
id. aloes saponaceum, I, 34.
id. amarum, III, 505.
id. amarum aquosum, I, 130; III, 264, 274.
id. amarum vinosum, II, 365.
id. ammoniato-opiatum, IV, 82.
id. anthelminticum succorum, II, 543.
id. antiarthriticum caribæum, II, 422.
id. anticolicum crocatum, I, 30.
id. antihipocondriacum, IV, 53.
id. antinephriticum, I, 98.
id. antipodagricum, id.
id. antiscorbuticum amarum, II, 148.
id. aperiens, III, 505.
id. aperitivum, I, 29.
id. aperitivum Clauderi, I, 35.
id. cum aqua calcariæ, ustæ, IV, 4.
id. aromaticum acidum, I, 534.
id. aurantiorum compositum, III, 269, 273.
id. balsamicum, III, 267, 269.
id. balsamicum Hoffmanni, III, 269.
id. balsamicum purificans, III, 197.
id. balsamicum spirituosum Hoffmanni, II, 266.

Elixir citri purgans, II, 543.
id. cordiale et stomachicum, I, 30.
id. croci cum castoreo, II, 54.
id. Daffyi, IV, 196.
id. fœtidum, II, 53.
id. gambogiæ alcalinum, I, 394.
id. glycirrhyzæ, IV, 81.
id. guajacinum, II, 423.
id. guajacinum volatile, id.
id. extracti hippocastani, II, 46.
id. jalappæ compositum, II, 543.
id. Fernitzii, I, 40.
id. juniperinum, II, 222.
id. juniperinum malvaticum, id.
id. mastichinum, I, 177.
id. mirrhæ, III, 244.
id. papaveris, III, 291.
id. paregoricum, III, 305.
id. pectorale dulce, IV, 81.
id. pectorale regis danorum, id.
id. Wedelii, II, 256.
id. polychrestum Halense, II, 242.
id. polychrestum purgativum, IV, 196.
id. propietatis, I, 29.
id. propietatis cum acido, I, 32, 33.
id. propietatis sine acido, I, 31.
id. propietatis album, I, 30.
id. propietatis aquosum, I, 35.
id. propietatis dulce, I, 31.
Elixir propietatis rhabarbarinum, I, 41.
id. propietatis cum rhabarbaro, id.
id. propietatis cum rheo, id.
id. propietatis Stahlii, I, 34.
id. resolvens, III, 505.
id. rhei amarum, IV, 140.
id. rhei compositum, IV, 139.
id. rhei dulce, id.
id. Ringelmanni, IV, 81.
id. roborans acidum, II, 39.
id. roborans Whyttii, IV, 53.
id. salutis, IV, 193.
id. scorbuticum, II, 148.
id. sennæ, IV, 192.
id. de spina, I, 43.
id. stomachicum, II, 364; III, 269.
id. stomachicum spirituosum, IV, 53.
id. stomachicum temperatum Hoffmanni, III, 269.
id. è succo glycyrrizæ, IV, 81.
id. è succo liquiritiæ, id.
id. sudoriferum, III, 307.
id. suecicum, I, 40.
id. sulphurico-acidum, I, 98.
id. traumaticum, I, 449.
id. uterinum, I, 379.
id. uterinum Crollii, II, 54.
id. viscerale, III, 269.
id. viscerale Hoffmanni, id.
id. viscerale Rosensteinii, IV, 138.
id. vitæ Matthioli, I, 527.
Elixir vitæ mulierum, IV, 159
id. vitrioli, I, 534.
id. vitrioli aromaticum, id.
id. vitrioli dulce, I, 535.
id. vitrioli Edimburgensium, id.
id. vitrioli Mynsichti, id.
id. vitrioli cum tinctura aromatica, id.
Elleborus, II, 205.
Embrocacion amoniacal, I, 227, 244.
id. refrigerante, II, 306.
id. resolutiva, I, 263, 264.
Emético, I, 324.
Emetina, II, 214.
Emetinum, id.
Emplasto adhesivo, IV, 311, 316.
id. adhesivo ingles, II, 354.
id. aglutinante, IV, 316.
id. alcanforado de Sthal, III, 444.
id. de albayalde, III, 445.
id. de almizcle, I, 191.
id. de albayalde compuesto, III, 447.
id. amarillo, II, 513.
id. amoniacal alcanforado, I, 249.
id. amoniaco-mercurial, III, 126.
id. de Andres de la Cruz, IV, 313.
id. anglo-sajon, III, 444.
id. anodino, III, 325, 327, 431.
id. antiartritico, III, 444.
id. antiespasmódico, III, 323.

Emplasto antihemorroidal, III, 346.
id. antihisterico, II, 334.
id. contra la apoplegia, IV, 291.
id. aromático, I, 520; II, 385; III, 45.
id. astringente, III, 432.
id. balsámico, I, 418; III, 445, 526.
id. de bayas de laurel, III, 13.
id. de beleño, I, 437.
id. de bella dona, I, 447.
id. bendito, III, 447.
id. de betónica, I, 460.
id. blanco cocido, III, 445.
id. contra el bocio, I, 334.
id. contra los bubones venéreos, III, 128.
id. contra los callos, II, 137.
id. contra los callos de Pajot Laforet, I, 238.
id. de cantáridas, II, 11.
id. de cantáridas alcanforado, II, 12.
id. de cantáridas y de euforbio, II, 15.
id. de Canet, III, 434.
id. de los capuchinos, II, 308.
id. cefálico, III, 327.
id. de cera, II, 85; IV, 311.
id. de cerusa, III, 445.
id. de cerusa compuesto, III, 447.
id. cetrino, IV, 311.
id. de cicuta, II, 95.
id. de cicuta compuesto, II, 96.
id. de cicuta con goma amoniaco, id.
Emplasto contra el cólico, II, 335; III, 327.
id. de cominos, II, 169.
id. de cominos compuesto, id.
id. de cominos jabonoso, III, 524.
id. comun, III, 429, 430; IV, 311.
id. consolidante vegetal, II, 62.
id. corrosivo, III, 193.
id. defensivo, II, 455.
id. defensivo encarnado, III, 404, 434.
id. defensivo verde, IV, 313.
id. defensivo verde de Wepfer, III, 404.
id. diabotano, III, 440.
id. diaforético, II, 331.
id. diapalma, III, 433.
id. diapompholigos, IV, 398.
id. diaquilon gomado, II, 328.
id. diaquilon simple, III, 430.
id. de digital, II, 198.
id. divino, III, 439.
id. de Doyen, III, 444.
id. de emético, I, 334.
id. emoliente de esperma de ballena, II, 271.
id. encarnado, II, 332.
id. epispástico, II, 11.
id. epispástico alcanforado, II, 10.
id. epulótico, III, 431.
id. de esperma de ballena, II, 271.
id. de esperma de ballena compuesto, II, 327.
id. esplenético, II, 385.
id. estimulante, III, 394.
Emplasto estíptico, II, 455; III, 434.
id. estomacal, III, 6, 346; IV, 249.
id. fortificante, II, 455; IV, 317.
id. contra las fracturas, II, 173.
id. de freza de ranas, III, 446.
id. fundente, I, 255; II, 97, 138, 382, 385; III, 405, 425.
id. fundente opiado, III, 443.
id. fundente y anticanceroso, III, 463.
id. de Rustaing, III, 437.
id. de gálbano, II, 327, 328.
id. de gálbano alcanforado, id.
id. de gálbano azafranado, II, 332.
id. de gálbano con las gomo-resinas, II, 328.
id. de goma elástica, II, 393.
id. de goma amoniaco, II, 382.
id. de goma amoniaco compuesto, id.
id. de gomo-resinas, II, 328.
id. gomoso compuesto, II, 331.
id. de grafito, II, 447.
id. gratia Dei, IV, 284.
id. gris, IV, 397.
id. gris cocido, III, 445.
id. contra las hernias, II, 172.
id. de Hierne, III, 433.
id. de ictiocola, II, 354.
id. imperial, III, 437.

Emplasto isciático, II, 308, 336.
id. de jabon, III, 524.
id. de jabon alcanforado, 325.
id. jabonoso amoniacal, I, 255.
id. jabonoso de Barbette, III, 445.
id. de Janin, II, 15.
id. de Juch, III, 124.
id. labial, II, 272.
id. de ládano, III, 6.
id. de bayas de laurel, III, 13.
id. de litargirio, III, 429.
id. de litargirio compuesto, II, 328.
id. magnético, I, 359.
id mamilar, III, 444.
id. madurativo, IV, 314.
id. de meliloto, III, 104.
id. de meliloto alcanforado, III, 105.
id. de mercurio con cicuta compuesto, III, 128.
id. de mercurio y de goma amoniaco, III, 126.
id. de mercurio, de opio y cicuta, III, 128.
id. mercurial, III, 125.
id. mercurial gomado, III, 126.
id. milagroso, II, 445.
id. de minio, III, 404.
id. moreno, I, 432.
id. moreno de protóxido de plomo fundido, id.
id. de mucilagos, II, 383.
id. negro de Becholtz, I, 336.
id. de Nuremberg, III, 443.
id. odontálgico, I, 12, 177; III, 327.
Emplasto de opio, III, 319.
id. opodeldoc, III, 437.
id. de óxido de plomo rojo alcanforado, III, 443.
id. para los pechos, II, 273.
id. de pelitre, III, 372.
id. de pez, III, 387.
id. de pez compuesto, IV, 313.
id. de pez negra, IV, 311.
id. de pez y de resina, IV, 313.
id. de plomo III, 429.
id. de plomo negro, III, 402.
id. de protóxido de plomo fundido, III, 429.
id. de puerros, III, 444.
id. contra el raquitismo, IV, 313.
id. real, III, 328.
id. de resina, IV, 316.
id. resolutivo, I, 249; II, 382; III, 128, 405.
id. resolutivo de cuatro fundentes, III, 128.
id. rubefaciente, II, 12.
id. de ruibarbo compuesto, I, 45.
id. saturnino, IV, 399.
id. simple, III, 429, 430.
id. sulfurado, I, 407; II, 336; III, 241.
id. supurativo, I, 472.
id. de tabaco, IV, 247.
id. vegigatorio, II, 11.
id. vegigatorio estemporáneo, II, 12.
id. vegigatorio de Mejean, II, 16.
Emplasto vegigatorio de Montpeller, II, 16.
id. verde, II, 135.
id. verde compuesto, II, 136.
id. de Vigo, III, 439.
id. volátil, I, 249.
id. de Woodstoock, II, 354.
Emplastrum adhæsivum, II, 354; IV, 311, 316.
id. adhæsivum Woodstrocki, II, 354.
id. adstringens, III, 432.
id. album coctum, III, 445.
id. de althæa, III, 71.
id. ammoniaci, II, 328, 382; III, 126.
id. ammoniaci cum mercurio, id.
id. ammoniaco galbanicum, II, 328.
id. de ammoniaco cum mercurio, III, 126.
id. ammonii cum camphora, I, 249.
id. Andreæ à Cruce, IV, 313.
id. anglicanum, II, 354.
id. anticolicum, II, 335.
id. authystericum, II, 334, 382.
id. aromaticum, I, 520.
id. asæ fœtidæ, II, 382.
id. asæ fœtidæ compositum, id.
id. asæ fœtidæ matricale, II, 334.
id. attrahens, IV, 311.
id. Becholzi, II, 336.
id. benedictum, II, 447.
id. betónicæ, I, 460.

Emplastrum ad bubones venereos, III, 128.
id. calefaciens, II, 12.
id. cantharidis, II, 11.
id. cantharidis resinosum, II, 15.
id. cantharidis vesicatoriæ, id.
id. cantharidis vesicatorium compositum, II, 16.
id. cantharidum, II, 11.
id. cantharidum cum euphorbio, II, 15.
id. cantharidum perpetuum, id.
id. cantharidum resinosum, II, 11.
id. carbonatis plumbi ustum, III, 447.
id. catagmaticum, II, 173.
id. cæphalicum, III, 327.
id. ceræ, IV, 311, 313.
id. ceræ terebinthinatum, id. id.
id. cereum, IV, 311.
id. cerussæ, III, 445.
id. cetacei rubrum, II, 272.
id. de cicuta, II, 95.
id. de cicuta cum ammoniaco, II, 96.
id. de cicuta compositum, id.
id. cicutæ, II, 95.
id. citrinum, II, 71, 73; IV, 311, 312.
id. ad clavos pedum, II, 137.
id. collæ ad herniam, III, 437.
id. commune, III, 429, 430.
id. commune adhæsivum, IV, 316.
id. commune gummatum, II, 328.
Emplastrum commune cum resina, IV, 316.
id. confortativum Vigonis, III, 434.
id. conii, II, 95.
id. conii maculati, id.
id. è conio, id.
id. consolidans, IV, 397,
id. consolidans vegetabile, II, 62.
id. corrosivum, III, 193.
id. croci compositum, II, 332.
id. de crusta panis, IV, 249.
id. cumini, II, 169.
id. è cumino, id.
id. defensivum, II, 455.
id. defensivum rubrum, II, 455; III, 434.
id. ad dolores dentium, I, 177.
id. diachalciteos, III, 434.
id. diachylum, III, 429.
id. diachylum compositum, II, 328.
id. diachylum cum gummatibus, id.
id. diachylum gummatum, id.
id. diachylum simplex, III, 430.
id. diapalmæ, III, 433.
id. diaphœnicum, id.
id. diaphoreticum Mynsichti, II, 331.
id. diapompholigos, IV, 398.
id. diasulphurii Rulandi, III, 241.
id. divinum, III, 439.
id. emolliens, III, 71.
id. epispasticum, I, 11.
id. de euforbio, II, 308.
Emplastrum è fenu græco, II, 383.
id. ferri, III, 434.
id. filii, II, 327.
id. filii Zachariæ, II, 84.
id. flavum, II, 513; III, 71.
id. fœtidum, II, 334, 382.
id. ad fonticulos, II, 84; III, 405.
id. ad fracturas, II, 173.
id. ad fracturas et luxaciones, id.
id. frigidum Riedlini, III, 74.
id. ad fungos articulorum, II, 308.
id. galbani, II, 327.
id. galbani camphoratum, id
id. galbani saturninum, II, 328.
id. galbani simplex, II, 327.
id. galbani è gummi resinis, II, 328.
id. galbani crocatum, II, 332.
id. galbani roborans, II, 334.
id. ad ganglia, II, 385.
id. glutinosum, II, 354.
id. griseum, IV, 397.
id. gummi resinosum, II, 382.
id. è gummis resinosis, II, 328.
id. gummosum, II, 328, 382.
id. ad hernias, II, 172.
id. pro herniosis, id.
id. Hierneri, III, 433.
id. hydrargyri, III, 125.
id. hydrargyri cum conio, III, 128.

Emplastrum hydrargyri cum conio et opio, III, 128.
id. hydrargyricum, III, 125.
id. ex hydrargyro, id.
id. hyosciami, I, 437.
id. de hyosciamo, id.
id. ichthiocollæ tella inductum, II, 354.
id. incognitum, IV, 162.
id. irritans, II, 11.
id. ischiadicum, II, 308, 336.
id. ad labia, II, 272.
id. ladani, III, 6.
id. de lapide calaminari, IV, 397.
id. lithargyri, III, 429.
id. lithargyri compositum, II, 328.
id. lithargyri cum resina, IV, 316.
id. lithargyri simplex, III, 429.
id. litargyricum cum resina, IV, 316.
id. ad lupiam, II, 138.
id. lythæ vesicatoriæ, II, 11.
id. malacticum cum gummi, III, 74.
id. malacticum sine gummi, id.
id. mamillaræ, II, 273; III, 524.
id. ad mamillas, id.
id. mastichinum, I, 177.
id. matricale, II, 334.
id. maturans, IV, 314.
id. meliloti, III, 104.
id. mercuriale, III, 125.
id. mercuriale resolvens, id.
id. minii ad ustum, III, 443.
Emplastrum minii camphoratum, III, 443.
id. moschatum, I, 191.
id. de mucilaginibus, II, 383.
id. mucilaginosum, III, 71.
id. de nicotiana, IV, 247.
id. nigrum Becholzii, II, 336.
id. nigrum sulphuratum, id.
id. Norimbergense, III, 443.
id. Noricum, id.
id. opiatum, III, 327.
id. oxycroceum, II, 332.
id. oxydi ferri rubri, II, 455; III, 435.
id. oxydi plumbi diabotanum, III, 440
id. oxydi plumbi epuloticum, III, 431.
id. oxydi plumbi mucilagineum, III, 430.
id. oxydi plumbi nigrum, III, 402.
id. oxydi plumbi rubrum, III, 434.
id. oxydi plumbi semivitrei, III, 430, 434.
id. oxydi plumbi gummosum, II, 328.
id. oxydi plumbi cum sulphate ferri calcinato, III, 434.
id. oxydi plumbici, III, 430.
id. oxyduli plumbi semivitrei gummosum, II, 328.
id. perpetuum, II, 15.
id. peruvianum, I, 418.
id. piceum, IV, 311.
id. picis nigræ regium, II, 172; IV, 311.
Emplastrum picis compositum, IV, 313.
id. picis liquidæ, III, 387.
id. picis navalis, IV, 311.
id. picis nigræ regium, II, 172.
id. piperitum, III, 394.
id. plumbi, III, 430.
id. plumbi nigrum, III, 402.
id. è plumbo compositum, III, 445.
id. polychrestum, IV, 316.
id. ranarum simplex, III, 439.
id. de ranis sine mercurio, id.
id. è resina elastica, II, 393.
id. resinæ, IV, 316.
id. resinarum glutinans, IV, 313.
id. resinosum, IV, 316.
id. resinosum sulphuratum, I, 407.
id. resolutivum, III, 440.
id. resolvens, II, 97, 382.
id. resolvens ammoniacatum, I, 249.
id. resolvens compositum, III, 128.
id. resolvens cum mercurio, id.
id. cum sapone et camphora, III, 525.
id. rhei compositum, I, 45.
id. roborans, II, 495; III, 432, 435; IV, 311, 317.
id. rubefaciens, II, 308.
id. rubefians, II, 11.
id. contra rupturam, II, 172.
id. santalinum, IV, 162.

Emplastrum saponaceo-plumbicum, III, 433.
id. saponaceum, III, 524.
id. saponatum, id.
id. saponatum camphoratum, id.
id. de sapone, id.
id. saponis, id.
id. saponis ammonici, I, 255.
id. saponis camphoratum, III, 525.
id. saturninum Minsichti, IV, 399.
id. de scrofularia, II, 136.
id. sebi anodinum, III, 431.
id. siliquarum, III, 435.
id. siliquarum imperiale, III, 437.
id. simplex, III, 430; IV, 311.
id. de spermate ceti compositum, II, 327.
id. de spermate simplex, II, 271.
id. de spermate ranarum, III, 446.
id. stibiatum, I, 334.
id. sticticum, IV, 311, 317.
id. stomachicum, III, 6, 346; IV, 249.
id. stypticum, II, 455; III, 435.
id. styracis stomachicum, id.
id. subcarbonatis plumbi, III, 445.
id. subcarbonatis plumbi compositum, III, 447.
id. sulphuratum, I, 407; II, 336; III, 241.
id. de tacamahaca, IV, 249.
id. tacamahacinum, id.
Emplastrum ad tempora, III, 327.
id. ad tormina ventris, id.
id. tripharmacum, III, 443.
id. ad verrucas, II, 137.
id. vesicatorium, II, 11.
id. vesicatorium perpetuum, II, 15.
id. vigonis sine mercurio, III, 439.
id. zincico-plumbicum, IV, 398.
Emulsio acaciæ arabicæ, I, 180.
id. ammoniaci, II, 375.
id. amygdalarum, I, 180.
id. amygdalarum composita, III, 51.
id. amygdali communis, I, 180.
id. amygdalina, id.
id. amygdalina hordeata, id.
id. antihisterica, I, 374.
id. arabica, I, 180.
id. balsami copaivæ, I, 411.
id. balsamica, I, 420.
id. cajeputi, I, 109.
id. camphoræ, I, 150.
id. camphorata, id.
id. cannabina, II, 19.
id. cantharidum, II, 17.
id. cerea, II, 81.
id. cornu cervi usti, II, 389.
id. externa è nucleis, I, 145.
id. ferri composita, II, 458.
id. guaiaci resinæ, II, 428.
id. guaiacina, id.
id. gummi arabicæ, I, 180.
Emulsio gummi-resinæ-ammoniaci, II, 375.
id. gummosa, I, 187.
id. kermetica, I, 314.
id. leniens, I, 182, 186.
id. cum nuce vomica, III, 284.
id. oleosa, I, 9, 186.
id. oleosa volatilis, I, 245.
id. phosphorata, II, 315.
id. pini, I, 4.
id. sedativa, I, 435.
id. sedativa simplex, III, 251.
id. terebinthinacea, IV, 280.
id. violata, IV, 349.
Emulsion de abeto, I, 4.
id. aceitosa, I, 9, 186.
id. alcanforada, I, 150.
id. alcanforada y nitrada, I, 152.
id. de alfonsigos, I, 172.
id. de almendras comunes, I, 180.
id. amoniacal, I, 245; II, 375.
id. anticatarral, II, 312.
id. antihelmintica, III, 356.
id. antihisterica, I, 374.
id. antimonial alcanforada, I, 334.
id. antireumatica, II, 393.
id. astringente, I, 200; II, 218.
id. atemperante, I, 109, 182.
id. balsamica, I, 420.
id. de bálsamo de azufre anisado, I, 403.
id. de Barthez, III, 486.
id. béquica, I, 114; II, 375.

Emulsion de Brunnero, II, 378.
id. de Cadet, I, 411.
id. calmante, I, 145; II, 301; III, 106.
id. de cantáridas, II, 9, 17.
id. de cañamones, II, 19.
id. de cera, II, 81.
id. de simiente de cidra, II, 104.
id. comun, I, 180.
id. cosmética, I, 416.
id. diurética, II, 3, 378.
id. dulcificante, I, 187.
id. emética, I, 314.
id. escitante, I, 9.
id. febrífuga, II, 81.
id. fosforada, II, 315.
id. gomosa, II, 392.
id. de guayaco, II, 428.
id. de jalapa, II, 540.
id. kermetizada, I, 314.
id. laxante, II, 540.
id. contra el lumbago, III, 472.
id. narcótica, I, 435; III, 296.
id. nitrada, III, 486.
id. oleosa, I, 186.
id. de piñones dulces, III, 397.
id. purgante, II, 243, 534, 540; III, 79.
id. de quina, IV, 31.
id. refrigerante, III, 479, 488.
id. salina, III, 604.
id. sedante, III, 251.
id. simple, I, 180.
id. de sublimado corrosivo, III, 193.
id. de trementina, IV, 280.
id. trementinada, id.
id. vermífuga, I, 78; II, 243.
Emulsion de violeta, IV, 349.
Emys lutaria, II, 340.
Encina, II, 215.
id. blanca, id.
id. comun, II, 216.
id. marina, II, 219.
Endivia, II, 243.
Enebro, II, 220.
id. comun, id.
id. de Virginia, id.
Eneldo, II, 226.
id. oloroso, id.
Enema cum acido sulphurico, I, 95.
id. amylaceum, I, 189.
id. antispasticum, I, 435.
id. ad ascarides, IV, 257.
id. camphoratum, I, 154.
id. camphoratum chinæ cum asa, I, 374.
id. catharticum, I, 14; IV, 54.
id. chamomillæ, III, 91.
id. chinæ cum opio, IV, 27.
id. emolliens, III, 67.
id. fœtidum, I, 374.
id. hyoscyami, I, 435.
id. mannatum, III, 176.
id. mercuriale, III, 161, 176.
id. purgans, IV, 54, 221.
id. sabadillæ, II, 72.
id. tanaceti, I, 374.
Enema acetoso, I, 52.
id. acido, I, 66.
id. de adormideras, I, 110.
id. alcanforado, I, 151, 154.
id. de almidon, I, 189.
id. aloético, I, 14.
Enema anodino, I, 110, III, 299.
id. antiespasmódico, I, 195, 374; III, 300; IV, 221.
id. antihelmintico, IV. 330.
id. antimoniado, I, 339.
id. antiperiódico, IV, 35.
id. antiséptico, IV, 36.
id. antisifilítico, III, 189.
id. de asafétida, I, 374.
id. contra las ascárides, II, 72.
id. astringente, I, 95, 117, 466; II, 63, 409; IV, 282.
id. astringente y tónico, I, 352.
id. balsámico astringente, IV, 282.
id. de belladona, I, 446.
id. calmante, I, 110, 435; III, 315; IV, 282.
id. carminativo, I, 289; III, 8.
id. dulcificante, II, 512.
id. emoliente, I, 188; III, 23, 58, 67.
id. escitante, IV, 38.
id. fétido, I, 374.
id. fortificante, IV, 38.
id. graso, II, 412.
id. irritante, IV, 245.
id. jabonoso, III, 519.
id. laxante, IV, 206.
id. de manzanilla, III, 91.
id. mercurial, III, 161, 176, 188.
id. nutritivo, II, 344.
id. con ogimiel, I, 54.
id. oleoso, III, 23.
id. opiado, III, 314.
id. pectoral, I, 422.

Enema purgaute, I, 330, 339; II, 405; IV, 206, 221.
id. refrigerante, I, 478; III, 486.
id. resolutivo, III, 91.
id. sedante, III, 263, 295, 299, 313.
id. tónico, IV, 27.
id. trementinado, IV, 281, 299.
id. vermifugo, I, 156; IV, 221, 257.
Enredadera, II, 176.
Ens martis, II, 477.
id. veneris Boylei, id.
Entales, I, 493.
Entalia, id.
Enula, II, 227.
id. antidisentérica, id.
id. campana, id.
Epirelo animal, II, 356.
id. de succino amoniacal, I, 236.
id. trementinado, IV, 294.
Epitema antigotoso, IV, 307.
id. antihisterico, I, 287.
id. rubefaciente, I, 248; III, 393.
id. vermífugo, I, 17.
Episthymum creticum, II, 188.
id. officinarum, id.
Equiseto, II, 235.
id. fluvial, id.
id. de invierno, id.
id. palustre, id.
Equisetum, id.
id. arvense, id.
id. fluviatile, id.
id. hyemale, id.
id. majus, id.
id. minus, id.
id. palustre, id.
Erinaceus combustus, I, 495; II, 21.
id. Europeus, id.
Erisimo oficinal, II, 235.
Eritrodamino, IV, 117.
Eritronio, II, 238.
Eritronio de flores amarillas, II, 238.
Erodium moschatum, II, 373.
Eruca, II, 238; III, 251.
id. nigra, III, 251.
Ervum, III, 361.
id. lens, III, 16.
Eryngium, II, 28.
id. aquaticum, II, 27.
id. campestre, II, 28.
id. marinum, id.
id. maritimum, II, 28.
Erysimum alliaria, I, 174.
id. barbarea, IV, 371.
id. officinale, II, 235.
id. vulgare, II, 236.
Erythæa centaurium, II, 77.
id. chilense, I, 513.
Erithronium flavescens, II, 238.
id. Indicum, II, 244.
Errino astringente, III, 404.
id. hemastatico, IV, 404.
id. contra la ozena, I, 273.
Escabiosa, II, 239.
id. oficinal, id.
Escamonea, id.
id. de Alepo, id.
id. de América, III, 101.
id. de Esmirnæ, II, 239.
id. de Montpeller, id.
Escarola, II, 243.
Escila, II, 244.
Escilitina, id.
Escolopendra, II, 262.
Escordio, II, 263.
id. falso, id.
Escorpion, II, 342.
Escorpiones de Europa, id.
Escorzonera, II, 266.
id. de Alemania, id.
id. de Bohemia, id.
id. de España, id.
id. negra, id.
id. oficinal, id.
Escrementos de pavo real, I, 103.
id. de pollo ó gallina, id.
Escrofularia, II, 267.
id. acuosa, id.
id. fétida, id.
id. mayor, id.
id. nudosa, id.
Escudo antiespasmódico, III, 346.
id. estomacal, id.
Esencia de acibar, I, 16.
id. de acibar compuesta, I, 34.
id. de adormideras, III, 291.
id. de álamo negro vulneraria, I, 141.
id. alexifarmaca de Stahl, II, 265.
id. alexifarmaca de Stahl temperante, id.
id. de ambar de Hoffmann, I, 216.
id. de ambar líquida, I, 217.
id. de ambar de Minderero, I, 216.
id. de ambar seca, I, 215.
id. amarga, II, 79, 366.
id. de angélica, I, 279.
id. anodina de Ludwig, III, 303.
id. anodina oficinal, III, 202.
id. antiartrítica, II, 53.
id. antiartrítica opiada, II, 54.
id. antiescorbútica, I, 538.
id. antihidrópica, I, 24.
id. antihistérica, I, 379; II, 50, 55.
id. aromática, I, 532.
id. de asafétida, I, 378.
id. balsámica, I, 449; II, 102.

Esencia balsámica compuesta, I, 439.
id. bezoardica de Hallé, I, 280.
id. bezoardica de Ludwig, id.
id. carminativa, I, 533; III, 274.
id. carminativa de Wedel, IV, 389.
id. de castoreo carminativa, II, 57.
id. cefálica, I, 484.
id. de cidra, II, 99.
id. dulce, III, 499.
id. emética de Helvecio, I, 296.
id. escilítica de Keup, III, 500.
id. de escordio compuesta, II, 265.
id. esplénica de Stahl, II, 503.
id. estomacal, III, 269.
id. de hollin, I, 263.
id. de lechuga, id.
id. de leños, II, 421.
id. de ligústico, III, 19.
id. de Malta, III, 56.
id. de marte aperitivo, II, 469.
id. moscada, I, 196.
id. de naranja seca, III, 261.
id. de nardo de Indias, III, 276.
id. negra inglesa, III, 289.
id. policresta de Gundelsheimer, III, 390.
id. de quina de Hellwig, IV, 51.
id. de quina de Huxham, IV, 52.
id. de regaliz, IV, 81.
id. de romero, IV, 91.
id. teriacal, III, 345.
id. traumática, IV, 270.
id. de trementina, IV, 294.
id. vermífuga, IV, 257.
Esencia vulneraria, IV, 295.
id. de yedra terrestre, IV, 358.
Esfondilio, II, 268.
Esparadrapo adhesivo, IV, 310.
id. aromático, III, 250.
id. blanco, III, 409, 434.
id. compuesto con emplastos, III, 434.
id. comun, II, 86; IV, 283.
id. desecante, III, 409.
id. de emplastos, IV, 290.
id. encarnado, III, 405.
id. epulótico, III, 431.
id. de esperma de ballena, II, 274.
id. de Goulard, III, 420.
id. ordinario, IV, 283.
id. resinoso, IV, 313.
id. resolutivo, III, 425.
id. vegigatorio, II, 14.
id. verde, II, 136.
Espárrago, II, 268.
Esparraguera, id.
Espato calcáreo, I, 491.
id. pesado, I, 428.
Especies amargas, I, 109; II, 72.
id. anodinas, I, 108, 158.
id. antiescorbúticas, IV, 59.
id. antiespasmódicas, IV, 326.
id. antihelmínticas, I, 348.
id. antihemorroidales, I, 137; II, 408.
id. antinefríticas, III, 380.
id. antipsoricas, II, 404.
id. aperitivas mayores, III, 380.
Especies aperitivas menores, id.
id. aperitivas con ruibarbo, III, 381.
id. contra la apoplegía, III, 376.
id. aromáticas, II, 278; IV, 89, 152, 272.
id. astringentes, II, 408; III, 231.
id. béquicas, I, 392; II, 498; III, 63, 450; IV, 71, 324, 346.
id. de brionia, I, 471.
id. carminativas, I, 159; III, 83.
id. cariocostinas, II, 240.
id. catárticas y sudoríficas, I, 338.
id. cefálicas, I, 252, 279; IV, 360.
id. cefálicas para saquillo, III, 33.
id. para el cocimiento antiartrítico, II, 431.
id. para el cocimiento de avena, I, 385.
id. para el cocimiento de leños, II, 429.
id. para el cocimiento negro, I, 115.
id. depurativas, I, 2.
id. detersivas, II, 431.
id. diaboraceas, IV, 227.
id. diacretæ, I, 497.
id. diaireos, III, 32.
id. diamargaritæ calientes, II, 368.
id. diamargaritæ frias, III, 277.
id. dianisi, I, 286.
id. dianthos, IV, 89.
id. diarrhodon, IV, 115.
id. diascordio, III, 349.
id. diatragacantos frias, II, 400.

Especies diaturbit con ruibarbo, IV, 125.
id. diuréticas, I, 341; II, 269; III, 380, 384.
id. dulcificantes, II, 386.
id. emenagogas, I, 472.
id. emolientes, III, 21, 58, 59, 83.
id. para epitema, IV, 116.
id. fumigatorias, I, 51, 80, 100, 451; II, 514; III, 451.
id. contra la gangrena, IV, 116. (véase polvos).
id. de hiera picra, I, 27.
id. de jacintos, IV, 114.
id. nervinas, III, 259; IV, 256.
id. pectorales, II, 343; III, 25; IV, 71, 343.
id. para perfume, III, 32.
id. de piedras preciosas frias, III, 278.
id. contra la pleuresía, I, 109.
id. purgantes, IV, 181.
id. resolutivas, III, 83, 370; IV, 168.
id. de los tres sándalos, IV, 162.
id. sudoríficas, I, 423; IV, 388.
id. para tisanas, II, 405.
id. vermífugas (véase polvos).
id. vulnerarias, II, 78; IV, 272.
Específico antiatrófico, II, 510.
id. antifebril de Coll, I, 485.
Específico de Zobel, I, 205.
Esperma de ballena, II, 270.
Esperma ceti, id.
Esperniola, de Crollius, III, 239.
Espigelia, II, 274.
id. de Maryland, id.
Espinaca, II, 276.
id. comun, id.
id. de huerta, id.
Espino albar, II, 276.
id. blanco, id.
id. serval, id.
Espinos, id.
Espíritu de abeto, I, 2.
id. de agenjos, I, 122.
id. de alcaravea, I, 160.
id. de almáciga, I, 176.
id. de alumbre, I, 94.
id. amoniacal con cantáridas, I, 226.
id. amoniacal tremen—tinado, id.
id. de angélica, I, 274.
id. de angélica compuesto, I, 275.
id. de anís, I, 188.
id. de anís compuesto, I, 289.
id. antiescorbútico, II, 145.
id. antiescorbútico de Drawitz, II, 147.
id. antihistérico, I, 376; II, 50.
id. antiictérico, IV, 295.
id. aperitivo, I, 93.
id. aromático, I, 525; IV, 268.
id. aromático acetoso, II, 280.
id. aromático amoniacal, I, 227.
id. artrítico, IV, 303.
id. de azafran, I, 30, 388.
Espíritu de azufre, I, 99.
id. de azufre por campana, id.
id. de bálsamo del Perú, I, 417.
id. de berros de fuente, I, 458.
id. bezoardico de Bu—sius, I, 266.
id. carminativo, IV, 98.
id. carminativo de Silvio, I, 276.
id. carminativo de tri—bus, I, 94.
id. de cerezas, I, 76.
id. de clavos de espe—cia, III, 45.
id. de coclearia, II, 145.
id. de corteza de naranja, III, 263.
id. de corteza de cidra, II, 100.
id. de cuerno de cier—vo, I, 241.
id. de cuerno de cier—vo vinoso, I, 223.
id. de enebro, II, 224.
id. de enebro compuesto, id.
id. de espliego, II, 281.
id. de espliego compuesto, II, 282.
id. de fumaria, II, 324.
id. de grano, I, 161.
id. de grosellas negras, II, 416.
id. hidro-prussurico, I, 69.
id. de hinojo alcalino, II, 500.
id. de hollin, I, 49; II, 510.
id. de hormigas, II, 511.
id. de jabon, IV, 520.
id. de jazmin, II, 544.
id. de laurel cerezo, I, 74.

Espíritu de leño de guayaco, II, 417.
id. de lirio de los valles, III, 37.
id. de lombrices, I, 241.
id. de marfil, id.
id. de masirico, I, 272.
id. de menta, IV, 367.
id. de menta piperita, IV, 368.
id. de menta rizada, id.
id. de menta verde, id.
id. de mil en rama acetoso, III, 234.
id. de mil en rama compuesto, id.
id. de Minderero, I, 256, 258.
id. nervino de Riemer, I, 246.
id. de nitro, I, 87.
id. de nitro dulce, II, 298.
id. de nuez moscada, III, 255.
id. de nuez moscada compuesto, id.
id. oftálmico, I, 418.
id. oloroso, II, 99.
id. de pan, III, 369.
id. de pelitre, III, 373.
id. de pelitre compuesto, III, 374.
id. de poleo, III, 449.
id. de rábano compuesto, IV, 60.
id. de rábano silvestre, id.
id. rectificado, I, 162.
id. resolutivo de Schmucker, I, 255.
id. de romero, IV, 97.
id. de rosas, IV, 111.
id. de sabina, IV, 147.
id. de sal amoniaco, I, 218, 259.
id. de sal amoniaco anisado, I, 225.
Espíritu de sal amoniaco por la sal de tártaro, I, 239.
id. de sal de tártaro vinoso, I, 223.
id. de sal dulcificado, II, 296.
id. de sal marina, I, 78.
id. de sal volátil aceitoso, I, 227.
id. de salvia, IV, 185.
id. de saturno, I, 51.
id. de sauco, IV, 178.
id. de serpol, IV, 210.
id. de tártaro, I, 93.
id. de teriacal, I, 275; III, 345.
id. teriacal reformado, I, 275.
id. de torongil, IV, 274.
id. de torongil compuesto, IV, 275.
id. de trifolio acuático, IV, 322.
id. de vainilla, IV, 339.
id. de valeriana compuesto, IV, 337.
id. de verónica, IV, 343.
id. de vino, I, 161.
id. de vitriolo, I, 94.
id. de víboras, I, 241.
Espliego, II, 278.
Esponja, II, 284.
id. de mar, id.
id. preparada, id.
id. quemada, II, 21.
Essentia absinthii, I, 127.
id. absinthii amara, I, 128.
id. absinthii composita, id.
id. absinthii totius, id.
id. aconiti, I, 105.
id. alexipharmaca Stahlii, II, 265.
id. alexipharmaca temperata, id.
Essentia aloes, I, 16.
id. amara, II, 366; IV, 322.
id. amara Halensis, I, 180.
id. ambræ Hoffmanni, I, 216.
id. ambræ liquida, I, 217.
id. ambræ Mindereri, I, 216.
id. ambræ sicca, I, 215.
id. amomi repentis, II, 26.
id. angelicæ, I, 279.
id. angusturæ, I, 284.
id. anodyna Ludovici, III, 303.
id. anodyna officinalis, III, 302.
id. antarthritica Hoffmanni cum opio, II, 54.
id. antarthritica Hoffmanni sine opio, II, 53.
id. antihydropica Hoffmanni, I, 24.
id. antihysterica, I, 379.
id. antiscorbutica, I, 538.
id. antimonii, 328.
id. antiseptica Huxhami, IV, 52.
id. aristolochiæ serpentariæ, I, 350.
id. aromatica, I, 532.
id. asæ fœtidæ, III, 78.
id. asæ fœtidæ ætherea, id.
id. aurantii, III, 272.
id. aurantii dulcis, III, 273.
id. aurantii inmaturi, id.
id. aurantiorum corticum, III, 272.
id. aurantiorum vinosa, III, 266.
id. balsami Canadensis roborans, I, 409.

Essentia balsami Canadensis mundificans, III, 197.
id. balsami Peruviani, I, 416.
id. balsami copaivæ kalica, I, 410.
id. belladonæ, I, 446.
id. benzoinis, I, 448.
id. calami aromatici, I, 483.
id. cannellæ albæ, I, 531.
id. cantharidis, II, 4.
id. cardamomi, II, 26.
id. cardui benedicti, II, 31.
id. carminativa Trilleri, III, 274.
id. carminativa Wedelii, IV, 389.
id. caryophyllatæ, II, 33.
id. cascarillæ (corticis) II, 39.
id. castorei, II, 52.
id. castorei carminativa, II, 57.
id. castorei thebaica, II, 53.
id. catechu, II, 65.
id. catechu terræ, id.
id. catholico—purgans Rothii, II, 543.
id. de cedro, II, 99.
id. centaurii minoris, II, 78.
id. cephalica, I, 484.
id. chinæ alexipharmaca, IV, 52.
id. cicutæ, II, 94.
id. cinchonæ, IV, 50.
id. cinnamomi, I, 531.
id. cinnamomi composita, I, 532.
id. cochleariæ, II, 144.
id. corticis Peruviani alexipharmaca, IV, 52.
id. corticis Peruviani composita, id.
Essentia corticum Winteranorum, II, 181.
id. cosmética, 449.
id. croci, I, 380.
id. culilaban, II, 187.
id. digitalis, II, 196.
id. digitalis purpureæ, id.
id. dulcis, III, 499.
id. fuliginis Clauderi, I, 263.
id. galbani, II, 327.
id. gei urbani, II, 33.
id. gentianæ, II, 364.
id. glechomæ hederacæ, IV, 358.
id. gummi ammoniaci, II, 377.
id. gummi ammoniaci kalina, id.
id. hemato—cathartica, I, 263.
id. hyoscyami, I, 436.
id. hyperici, II, 503.
id. hysterica, II, 55.
id. lactucæ virosæ, id.
id. levistici, III, 19.
id. ligni aloes, III, 366.
id. ligni guaiaci, II, 421.
id. lignorum, id.
id. liquiritiæ, IV, 81.
id. macidis, III, 256.
id. malti, III, 56.
id. martiata aperitiva, II, 467.
id. mastiches, I, 177.
id. menthæ piperitæ, IV, 363.
id. menyanthis, IV, 322.
id. millefolii, III, 233.
id. millepedum, III, 236.
id. moschi, I, 196.
id. mirrhæ alcalisata, III, 242, 244.
id. mirrhæ alcoholica, id.
id. nucum corticis viridis, III, 281.
Essentia pareiræ bravæ, I, 474.
id. pimpinellæ albæ, III, 395.
id. pimpinellæ albæ kalica, id.
id. pini, I, 3.
id. piperis, III, 390.
id. pomorum aurantiorum inmaturorum, III, 273.
id. populi, I, 141.
id. populi oculorum, id.
id. populi vulneraria, id.
id. rorismarini, IV, 91.
id. sabinæ, IV, 140.
id. sasafras, IV, 170.
id. sasafras composita, id.
id. scordii, II, 264.
id. de scordio composita, II, 265.
id. senegæ, III, 451.
id. senegæ serpentariæ virginianæ, I, 350.
id. spicæ indicæ, III, 276.
id. splenetica Sthalii, II, 503.
id. stibii, I, 328.
id. stomachica, III, 269.
id. stomachica polycresta Gundelsheimeri, III, 390.
id. stramonii, II, 292.
id. succini, IV, 237.
id. succini alcalisata, id.
id. terebinthinæ, IV, 294.
id. theriacalis, I, 275; III, 345.
id. traumática, IV, 270.
id. trifolii fibrini, IV, 322.
id. valerianæ, IV, 332.
id. valerianæ ammoniata, IV, 334.

Essentia valerianæ compo—sita, IV, 333.
id. valerianæ volatilis, IV, 334.
id. contra vermes, IV, 257.
id. vincetoxici, IV, 340.
id. vulneraria Stahlii, IV, 295.
id. vulneraria simplex, I, 177.
id. zedoariæ, IV, 389.
Estafisagria, II, 284.
Estannato de oro, id.
Estaño, II, 286.
id. de glas, I, 464.
id. gris, id.
id. pulverizado, II, 286.
Estoraque, II, 289.
id. almendrado, id.
id. blanco, id.
id. calamita, id.
id. en granos, id.
id. en lágrimas, id.
id. eu panes, id.
id. rojo pardo, id.
id. sólido, id.
Estracto de abedul, I, 1.
id. de acederilla, I, 8.
id. de acibar acuoso, I, 15.
id. de acibar gomoso, id.
id. de acibar de Poer—ner, id.
id. de acibar resinoso, I, 16.
id. de acónito, I, 105.
id. de adormideras, I, 109.
id. de agarico alcohóli-co, I, 119.
id. de agarico acuoso, I, 118.
id. de agrimonia, I, 136.
id. de achicorias, I, 11.
id. de agenjos alcohó-lico, I, 128.
id. acuoso, I, 124.
Estracto de algarrobas, I, 173.
id. de amapolas, I, 213.
id. de angélica, I, 278.
id. de angustura, I, 284.
id. anodino, III, 311.
id. de aristoloquia, I, 349.
id. de árnica alcohólico, I, 353.
id. de árnica acuoso, I, 352.
id. de artemisa, I, 367.
id. de asaro, I, 381.
id. de azafran acuoso, I, 386.
id. de azafran alcohó—lico, id.
id. de bardana, I, 424.
id. de becabunga, I, 430.
id. de beleño acuoso, I, 433.
id. de beleño alcohóli—co, I, 436.
id. de belladona, I, 445.
id. de berros, I, 458.
id. bezoardico, I, 279.
id. de bistorta, I, 465.
id. de borraja, I, 468.
id. de brionia, I, 471.
id. de cálamo aromáti—co alcohólico, I, 483.
id. cálamo vinoso, id.
id. de caléndula, I, 509.
id. de camedrios, I, 510.
id. de camepíteos, I, 511.
id. de cantáridas, II, 20.
id. de cardo santo, II, 30.
id. de cariofilata, II, 33.
Estracto de carquesia, II, 35.
id. de cascarilla alcohó-lica, II, 38.
id. de cascarilla acuoso, II, 37.
id. de cañafístula, IV, 41.
id. de castaño de In—dias alcohólico, II, 45.
id. de castaño de In—dias acuoso, id.
id. de castoreo, II, 52.
id. de catecú, II, 59.
id. de celidonia mayor, II, 75.
id. de centaura menor alcohólico, I, 80.
id. de centaura menor acuoso, II, 79.
id. de cicuta, II, 92.
id. de clemátida, II, 115.
id. de coca de Levante, II, 141.
id. de coclearia, II, 142.
id. de cohombro silves-tre, II, 151.
id. de colchico, II, 153.
id. de colombo, II, 158.
id. de coloquíntida, II, 162.
id. de coloquíntida com-puesto, II, 163.
id. de contrayerba, II, 175.
id. de corteza de enci—na, II, 217.
id. de corteza de naran-ja alcohólico, III, 273.
id. de corteza de na—ranja acuoso, III, 264.
id. de corteza verde de nuez, id.
id. de diente de leon, IV, 260.
id. de digital purpúrea, II, 193.

Estracto de dulcamara, II, 202.
id. de eléboro negro acuoso, II, 208.
id. de eléboro negro alcohólico, id.
id. de eléboro negro de Bacher, II, 209.
id. de enebro, II, 220.
id. de énula acuoso, II, 230.
id. de énula alcohólico, II, 233.
id. de escila, II, 250.
id. de escordio, II, 263.
id. de escorzonera, I, 267.
id. de estramonio, II, 291.
id. de estramonio de simiente, id.
id. de flores de sauco, IV, 175.
id. de fumaria, II, 322.
id. de genciana alcohólico, II, 360.
id. de genciana acuoso, II, 359.
id. de geofrea, II, 372.
id. de gordolobo blanco, II, 403.
id. de Goulard, III, 413.
id. de graciola alcohólico, II, 406.
id. de graciola acuoso, id.
id. de grama, id.
id. de guayaco alcohólico, II, 418.
id. de guayaco acuoso, II, 417.
id. de guayaco resinoso, II, 418.
id. de guayaco vinoso, id.
id. de hiel de vaca, I, 462.
id. de hierro, II, 488.
id. de hipericon, II, 502.
Estracto de ipecacuana, II, 524.
id. de jalapa alcohólico, II, 536.
id. de jalapa acuoso, II, 535.
id. de jalapa gomoso, id.
id. de jalapa resinoso, id.
id. de laurel cerezo ó real, III, 15.
id. de leño de aloes, III, 366.
id. de leño de campeche, I, 512.
id. de ligústico, III, 19.
id. de liquen islándico, III, 26.
id. de lirio de Florencia, III, 33.
id. de lirio de los valles, III, 37.
id. de lúpulo alcohólico, III, 40.
id. de lúpulo acuoso, id.
id. de llanten, III, 43.
id. macrocostino, I, 24.
id. de manzanilla, III, 88.
id. de marrubio blanco alcohólico, III, 97.
id. de marrubio acuoso, III, 96.
id. de marte, II, 480, 488.
id. de marte acético, II, 481.
id. de marte cidoniado, id.
id. de marte y de zumo de manzanas, II, 482.
id. de mil en rama alcohólico, III, 232.
id. de mil en rama acuoso, II, 231.
Estracto de mirra acuoso, II, 237.
id. de mirra compuesto, III, 238.
id. de mirra gomosa, III, 237.
id. de mirra resinoso, III, 238.
id. de corteza de naranja acuoso, III, 264.
id. de corteza de naranja alcohólico, III, 273.
id. de hojas de naranjo, III, 264.
id. de narciso silvestre, III, 275.
id. de nueces verdes, III, 280.
id. de la corteza de nueces, id.
id. de nuez vómica alcohólico, III, 283.
id. de nuez vómica acuoso, id.
id. de nuez vómica seco, III, 284.
id. de olmo, III, 286.
id. de opio, III, 310.
id. de opio acetoso, III, 289.
id. de opio alcohólico, III, 298.
id. de opio acuoso, III, 308.
id. de opio acuoso sin narcotina, III, 310.
id. de opio azafranado, III, 311.
id. de opio cidoniado, id.
id. de opio cinabrino, III, 157.
id. de opio por fermentacion, III, 310.
id. de opio glicirrizado, III, 312.
id. de opio gomoso, III, 308.

Estracto de opio seco, III, 310.
id. de opio vinoso, III, 290.
id. de ortigas, III, 362.
id. de pensamiento, III, 374.
id. de peonía, III, 375.
id. de perifollo, III, 383.
id. de perifollo oloroso, III, 384.
id. de peucedan, III, 385.
id. de pimpinela, III, 395.
id. de padafilo, III, 447.
id. de poleo, III, 448.
id. de polígala amarga, III, 450.
id. de polígala de virginia, id.
id. de pulsatila alcohólico, I, 272.
id. de pulsatila acuoso, I, 271.
id. de quasia alcohólico, IV, 4.
id. de quasia acuoso, IV, 1.
id. de quina alcohólico, IV, 25.
id. de quina alcohólico aquoso, IV, 24.
id. de quina acuoso, IV, 21.
id. de quina emulsivo, IV, 23.
id. de quina vinoso, id.
id. de rapóntico, IV, 68.
id. de ratania, IV, 69.
id. de regaliz, IV, 73.
id. de romaza, IV, 87.
id. de romero, IV, 89.
id. de rubia acuoso, IV, 118.
id. de rubia alcohólico, id.
Estracto de ruda alcohólico, IV, 121.
id. de ruda acuoso, IV, 120.
id. de ruibarbo alcohólico, IV, 131.
id. de ruibarbo acuoso, IV, 130.
id. de ruibarbo compuesto, IV, 131.
id. de sabina acuoso, IV, 145.
id. de sabina alcohólico, id.
id. de salvia, IV, 153.
id. de saponaria, IV, 167.
id. de sasafras, IV, 169.
id. de saturno, III, 411, 413, 425.
id. de sauce alcohólico, IV, 172.
id. de sauce acuoso, id.
id. de sen alcohólico, IV, 191.
id. de sen acuoso, IV, 190.
id. de simiente de estramonio, II, 271.
id. solutivo, IV, 191.
id. de tabaco, IV, 243.
id. de tabaco mitigado, IV, 244.
id. de tanaceto alcohólico, IV, 257.
id. de tanaceto acuoso, IV, 256.
id. tebaico, III, 308
id. teriacal, III, 344.
id. de tormentila IV, 269.
id. de torongil, IV, 272.
id. de trifolio acuático alcohólico, IV, 320.
id de trifolio acuático acuoso, IV, 319.
id. de turbit, IV, 323.
id. de valeriana alcohólico, IV, 332.
id. de valeriana acuoso, IV, 331.
Estracto de vara de oro, IV, 339.
id. de vincetósigo, IV, 340.
id. de verónica. IV, 344.
id. de yedra terrestre, IV, 357.
id. de yemas de abeto alcohólico, I, 2.
id. de yemas de abeto acuoso, id.
id. de zanahorias, IV, 373.
id. de zarzaparrilla, IV, 376.
id. de zedoaria, IV, 389.
id. de zumaque venenoso, IV, 409.
id. de zumo de regaliz, IV, 72.
Estragon, II, 290.
Estramonio, id.
id. comun, id.
Estricnina, II, 293.
Ether acético, II, 294.
id. acético alcoholizado, II, 295.
id. acético de cantáridas, II, 8.
id. acético de hierro de Klaproth, II, 482.
id. acético marcial, id.
id. acetoso, II, 294.
id. amoniacal, I, 230.
id. antiodontálgico, I, 155.
id. cúprico, II, 131.
id. fosforado, II, 315.
id. fosfórico, II, 296.
id. hidroclórico, id.
id. hidroclórico alcoholizado, II, 298.
id. iodurado, II, 415.
id. marcial, II, 474.
id. marino, II, 296.
id. mercurial, III, 192.
id. muriático, II, 296.
id. nítrico, II, 298.

Eter nítrico alcoholizado, II, 301.
id, nitroso, II, 298.
id. sulfúrico, II, 301.
id. sulfúrico alcoholizado, id.
id. trementinado, IV, 294.
id. vitriólico, II, 301.
id. vitriólico de vino, id.
Etíope antimonial, III, 136, 152.
id. grafitico, III, 129.
id. marcial, II, 448.
id. mineral, III, 133.
id. mineral de Harris, III, 134.
id. mineral oxidulado, id.
id. mineral precipitado, III, 151.
id. mineral triturado doble, III, 134.
id. mineral triturado de mercurio, id.
id. de oro pimente, III, 129.
id. vegetal, II, 21; III, 289.
Euforbia emética, II, 307.
Euforbio (gomo-resina), II, 307.
id. de flores grandes, id.
id. de pantanos, id.
Eufrasia, II, 310.
id. oficinal, id.
Eupatorio, id.
id. de los árabes, id.
id. de Avicena, id.
id. comun, id.
id. perfiolado, id.
id. purpúreo, II, 311.
Eupatorium, II, 310.
id. aya-pana, II, 311.
id. cannavinum, II, 310.
id. perfoliatum, id.
id. purpureum, II, 311.
id. tenerifolium, II, 310.
Eupatorium veterum, I, 136.
Euphorbia antiquorum, II, 308.
id. canariensis, id.
id. corollata, II, 307.
id. cyparissias, II, 58, 307.
id. helioscopias, II, 307.
id. ipecacuanha, id.
id. lathyris, II, 58.
id. officinarum, II, 308.
id. palustris, II, 307.
id. peplus, id.
id. sylvatica, id.
Euphorbium, II, 307.
Euphragia, II, 310.
Euphrasia, id.
id. officinalis, id.
Evonimus, I, 466.
id. europæus, id.
Extractum absintii, I, 124.
id. acetosellæ, I, 8.
id. aconiti, I, 105.
id. agarici aloeticum, II, 163.
id. aloes aquosum, I, 15.
id. aloes gummosum, id.
id. aloes resinosum, I, 16.
id. angelicæ, I, 278.
id. anthemidis, III, 88.
id. aurantii foliorum, III, 264.
id. bardanæ, I, 424.
id. belladonæ, I, 445.
id. bezoardicum camerarii, I, 279.
id. bilis, I, 462.
id. bistortæ, I, 465.
id. borraginis, I, 468.
id. calami aromatici gummoso-resinosum, I, 483.
id. calendulæ, I, 509.
id. cardui benedicti, II, 30.
id. cardui tomentosi, id.
Extractum caryophyllatæ, II, 33.
id. cascarillæ aquosum, II, 37.
id. cascarillæ gummosum, id.
id. cascarillæ resinoso-gummosum, II, 38.
id. cascarillæ alcoholicum, id.
id. cassiæ, II, 41.
id. cassiæ fistulæ, id.
id. castorei, II, 52.
id. catechu, II, 59.
id. catharticum, II, 163.
id. catholicum, II, 163; IV, 131.
id. centaureæ benedictæ, II, 30.
id. centaurii minoris, I, 79, 80.
id. chærophylli, III, 383.
id. chamomillæ, III, 88.
id. chelidonii majoris, II, 75.
id. cichorii, I, 11.
id. cinchonæ aquosum, IV, 21.
id. cinchonæ gummosum, id.
id. cnico-pharmacum, IV, 131.
id. cocculi, II, 141.
id. cochleariæ, II, 142.
id. colocynthidis, II, 162.
id. colocynthidis compositum, II, 163.
id. conii, II, 92.
id. conii maculati, id.
id. contrayervæ, II, 175.
id. corticis Peruviani alcoholico-aquosum, IV, 24.
id. corticis Peruviani alcoholicum, IV, 25.

Extractum corticis Peruviani aquosum, IV, 21.
id. corticis Peruviani gummosum, id.
id. corticis Peruviani vinosum, IV, 23.
id. croci alcoholicum, I, 386.
id. croci aquosum, id.
id. cucumeris agresti, II, 151.
id. dauci, IV, 373.
id. dauci carottæ, id.
id. dauci radicis, id.
id. dulcamaræ, II, 202.
id. fellis, I, 462.
id. ferri, II, 480.
id. ferri cydoniatum, II, 483.
id. ferri pommatum, id.
id. ferri cum tartaro, II, 488.
id. flammulæ Jovis, II, 115.
id. fumariæ, II, 322.
id. genistæ, II, 35.
id. gentianæ, II, 359.
id. geoffrææ, II, 372.
id. glechonæ hederaceæ, IV, 357.
id. Goulardii, III, 413.
id. graminis, II, 406.
id. gratiolæ, II, 404.
id. guaiaci, II, 417, 418.
id. hellebori nigri, id.
id. humuli, III, 40.
id. juniperi, II, 220.
id. lactucæ virosæ, id.
id. leontodinis taraxaci, IV, 260.
id. levistici, III, 19.
id. lichenis islandici, III, 26.
id. ligni aloes, III, 366.
id. ligustici, III, 19.
id. lupuli, III, 40.
id. malatis ferri, II, 483.
Extractum martis, II, 480.
id. martis cydoniatum, II, 483.
id. martis pomatum, id.
id. martis cum succo pomarum, id.
id. martis cum tartaro, II, 488.
id. melampodii, II, 208.
id. momordicæ elaterii fructus, II, 151.
id. myrrhæ graminatum, III, 238.
id. myrrhæ gummosum, III, 237.
id. myrrhæ resinosum, III, 238.
id. narcisi pratensis, III, 275.
id. nicotianæ, IV, 243.
id. cum nuce vomica, III, 283.
id. nucis vomicæ alcoholicum, III, 283.
id. nucis vomicæ aquosum, id.
id. nucum, III, 280.
id. opii, III, 308.
id. opii aquosum, id.
id. opii cinnabarinum, III, 157.
id. opii cydoniatum, III, 311, 312.
id. opii glycyrrhizatum, III, 312.
id. opii gummosum, III, 308.
id. opii thebaicum, id.
id. opii vinosum, III, 290.
id. panchymagogum, IV, 131.
id. panchymagogum Crollii, II, 163.
id. panchymagogum Quercetani, id.
id. papaveris albi, I, 109.
Extractum papaveris erratici, I, 213.
id. papaveris rhœados, id.
id. patientiæ, IV, 87.
id. pimpinellæ albæ, 395.
id. pini alcoholicum, I, 2.
id. pini aquosum, id.
id. plumbi, III, 413.
id. polygalæ amaræ, III, 450.
id. pomorum ferrarium liquidum, II, 484.
id. pulsatillæ alcoholicum, I, 272.
id. pulsatillæ aquosum, I, 271.
id. quassiæ alcoholicum, IV, 4.
id. quassiæ aquosum, IV, 1.
id. rathaniæ, IV, 69.
id. rhabarbari, IV, 130.
id. rhapontici, IV, 68.
id. rhei, IV, 130.
id. rhei compositum, IV, 131.
id. rhois radicantis, IV, 409.
id. rorismarini, IV, 89.
id. rubiæ alcoholicum, IV, 118.
id. rubiæ aquosum, id.
id. rutæ alcoholicum, IV, 121.
id. rutæ aquosum, IV, 120.
id. sabinæ aquosum, IV, 145.
id. sabinæ alcoholicum, id.
id. salicis aquosum, IV, 172.
id. salviæ, IV, 153.
id. sambuci florum, IV, 175.
id. saponariæ, IV, 167.

Extractum sarsaparillæ, IV, 376.
id. sassafras, IV, 169.
id. saturni, III, 411, 413.
id. scillæ, II, 250.
id. scordii, II, 263.
id. scorzoneræ, II, 267.
id. senegæ radicis, III, 450.
id. sennæ, IV, 190.
id. siliquæ dulcis, I, 173.
id. solutivum, IV, 191.
id. stramonii, II, 291.
id. stramonii è seminibus, id.
id. tabaci, IV, 243.
id. tanaceti alcoholicum, IV, 257.
id. tanaceti aquosum, IV, 256.
id. taraxaci, IV, 260.
id. thebaicum ammoniacale, III, 308.
id. theriacale, III, 344.
id. tormentilæ, IV, 269.
id. trifolii fibrini alcoholicum, IV, 320.
id. trifolii fibrini aquosum, IV, 319.
id. tritici repentis, II, 406.
id. turpethi, IV, 323.
id. valerianæ alcoholicum, IV, 332.
id. valerianæ aquosum, IV, 331.
id. verbasci, II, 403.
id. veronicæ, IV, 344.
id. vincitoxici, IV, 340.
id. virgæ aureæ, IV, 339.
id. visci albi aquosum, IV, 352.
id. visci vinosum, id.
id. zedoariæ, IV, 389.

Exuviæ serpentum, II, 342.

F.

Faba, II, 434.
id. carica, II, 498.
id. febrifuga, II, 435.
id. Ignatii, id.
id. indica, id.
id. marina, I, 493.
id. pichurim, II, 435.
id. Tunka, id.
id. vulgaris, II, 434.
Fæcula ari, IV, 355.
id. cicutæ, II, 91.
id. cucumeris agresti, II, 151.
id. ireos, III, 33.
id. marantæ, I, 355.
id. pæoniæ, III, 375.
id. sagu, IV, 147.
id. solani tuberosi, III, 370.
id. stramonii, II, 290.
id. tapioca, IV, 258.
Fagara octandra, IV, 248.
Fagus, II, 426.
id. sylvatica, id.
Falsa branca ursina, II, 268.
Farina hordei præparata, II, 67.
Febrifugum Cranii, I, 293.
id. salsum, III, 470.
Fecula amilacea, I, 188.
id. de belladona, I, 445.
id. de beleño, I, 434.
id blanca, I, 188.
id. de brionia, I, 471.
id. de castaña de Indias, II, 44.
id. de cicuta, II, 91.
id. de cohombro silvestre, II, 151.
id. de estramonio, II, 290.
id. de lirio, III, 33.
id. de patatas, III, 370.
Fécula de peonia, III, 375.
id. de yaro, IV, 355.
Fel bovinum, I, 462.
id. tauri inspisatum, id.
id. terræ, II, 77.
id. vitri, III, 479.
Felandrio, II, 311.
id. aquatico, id.
Fermentum cerevisiæ, III, 17.
Ferraria, II, 267.
Ferrocianato de potasa, I, 73.
Ferrocyanas potassæ, id.
Ferrum, II, 440.
id. ammoniacale, II, 477.
id. ammoniacatum, id.
id. borussicum, II, 496.
id. hæmatites, II, 453.
id. hydraticum, II, 456.
id. muriaticum, II, 471.
id. oxydatum, II, 456.
id. oxydatum carbonicum fuscum, id.
id. oxydulatum nigrum, II, 448.
id. phosphoricum, II, 463.
id. potabile, II, 486.
id. præparatum, II, 440.
id. pulveratum, id.
id. sabitum, II, 471.
id. sulphuratum, II, 447.
id. sulphuricum, II, 463.
id. sulphuricum oxidulatum, II, 464.
id. tartarisatum, II, 486
id. vitriolatum, II, 464.
id. vitriolatum exiccatum, id.

Ferrum vitriolatum ustum, II, 454.
id. zooticum, II, 496.
Ferula asa fœtida, I, 369.
id. persica, IV, 147.
Fetuca, II, 312.
id. flotante, id.
Ficaria, II, 75, 267.
Ficus indica, II, 396.
id. religiosa, id.
Filicula dulcis, III, 454.
Filipendula, II, 312.
Filix, II, 436.
id. mas, id.
Fitolaca, II, 312.
Flammula, II, 313.
id. Jovis, II, 114.
Flamula, II, 313.
Flavedo corticum aurantiorum, III, 259.
id. corticum citri, II, 98.
Flores antimoniales, II, 477.
id. de antimonio plateado, I, 293.
id. de azufre compuestas, I, 36.
id. de benjuí, I, 56.
id. béquicas, III, 58.
id. marciales, II, 477.
id. de sal amoniaco, I, 251.
id. de sal amoniaco marciales, II, 477.
id. de zinc, IV, 392.
Flores æris, II, 138.
id. auri, II, 477.
id. benzoes, I, 56.
id. boracis, I, 58.
id. salis ammoniaci hæmatisantes, II, 477.
id. salis ammoniaci martiales, id.
id. salis ammoniaci volatiles, I, 238.
id. salis armoraciæ, I, 251.
id. sulphuris, I, 397.
id. sulphuris compositi, I, 27, 36.
Flores sulphuris loti, I, 397.
id. viridis æris, II, 138.
id. zinci, IV, 392.
Fœniculum, II, 499.
id. aquaticum, II, 311.
id. dulce, II, 499.
id. lusitanicum, IV, 218.
id. porcinum, III, 385.
id. ursinum, III, 110.
Fœnum camelorum, II, 546.
id. græcum, I, 173.
Folia cochlearum, I, 493.
Foliculos de sen, IV, 180.
Follicula sennæ, id.
Fomento acetoso alcanforado, I, 154.
id. alcanforado, I, 155.
id. amoniacal alcanforado, I, 245.
id. anodino, I, 110.
id. antihelmintico, I, 348.
id. antihemorroidal, I, 138; III, 59.
id. antiflogístico, III, 520.
id. antipleurítico, I, 110; II, 218.
id. antiseptico, I, 376; II, 218; IV, 338.
id. aromatico, I, 126; II, 264; III, 45; IV, 91.
id. astringente, I, 207, 487; II, 217, 218, 409, 467; III, 43, 417; IV, 403.
id. de Brunninghausen, III, 458.
id. calmante, III, 67, 290, 300, 426.
id. contra el cólico, III, 92.
id. comun, I, 54.
id. detersivo, III, 355.
id. diuretico, I, 255.
id. emenagogo, I, 472.
Fomento emoliente, III, 22, 67.
id. emoliente y laxante, III, 67.
id. escitante, I, 66, 83, 154; III, 503; IV, 154, 245.
id. laxante y antiespasmódico, III, 519.
id. narcótico, III, 314.
id. nítrico, I, 90.
id. refrigerante de Schmucker, III, 489.
id. resolutivo, I, 55, 71, 254, 260, 264; III, 91, 416, 426, 472; IV, 117, 306.
id. contra los sabañones, II, 118.
id. saturnino, III, 416.
id. tanino, II, 217.
id. vinoso, IV, 347.
Fomentum acidi phosphorici, I, 66.
id. ammoniacale camphoratum, I, 245.
id. aromaticum, II, 264; IV, 91.
id. belladonæ ammoniatum, I, 260.
id. camphoratum, I, 155.
id. commune, I, 54.
id. detergens, III, 355.
id. discutiens, I, 54, 71.
id. nitricum, I, 90.
id. ad perniones, II, 118.
id. ad pustulas fovendas, I, 83.
id. quercinum, II, 217.
id. refrigerans, III, 416.
id. resolvens, III, 91, 355.
id. saturninum, III, 426.

Fomentum saturninum cum opio, III, 417.
id. tonico adstringens, IV, 403.
id. tonico antisepticum, I, 376.
Formicæ cum acervo, II, 511.
Fosfato de amoniaco, I, 250.
id. amoniaco mercurial, III, 207.
id. de cal, III, 501.
id. de cal acido, III, 504,
id. de calcio, id.
id. de mercurio, III, 207.
id. de sosa y de amoniaco, IV, 230.
Fosforo, II, 313.
id. estraido de los huesos, II, 314.
id. estraido de la orina, II, 315.
id. líquido, id.
id. pulverizado, id.
Fotus adstringens, II, 218.
id. anodynus, II, 403.
id. antisepticus, II, 218.
id. aromaticus, I, 126.
id. ex bryonia, I, 471.
id. communis, I, 126.
id. discutiens, I, 55, 254; III, 91.
id. frigidum, I, 55.
id. frigidum Schmuckeri, III, 489.
id. ad gangrænam, IV, 38.
id. refrigerans, I, 55.
id. refrigerans et deprimens, id.
Fraga, II, 320.
Fragaria, id.
id. vesca, II, 319.
Frambuesa, II, 317.
Frambueso, id.
Frassera Walteri, II, 155.
Fraxinela, II, 200.
Fraxinella, id.
Fraxinus, II, 321.
id. argentea, III, 76.
id. excelsior, II, 321; III, 76.
id. ornus, III, 76.
id. parviflora, id.
id. pumilis, II, 200.
id rotundifolia, III, 76.
id. subrufescens, id.
Fresa, II, 319.
id. oficinal, id.
Fresno, II, 321.
id. comun, id.
Freza de ranas, II, 341.
Frontal anticefálico, I, 153.
id. hipnótico, I, 432.
Frutos pectorales, I, 392; II, 498.
Fuco vegigoso, II, 219.
Fucus barbatus, II, 177.
id. ericoides, id.
id. fasciatus, id.
id. helminthocortos, id.
id. sodoides, id.
id. vexiculosus, II, 219.
Fuligo, II, 509.
id. splendens, id.
Fumaria, II, 321.
id. bulbosa, id.
id. oficinal, id.
id. officinalis, id.
Fumigacion de ácido nítrico, I, 89.
id. antiloimica de Gaub, I, 82.
id. antiséptica, I, 89.
id. de cloro, II, 116.
id. desinfectante, I, 82.
id. de Guyton, II, 116.
id. Guytoniana, id.
id. higienica, id.
id. nitrosa, I, 89.
id. resinosa, IV, 310.
Fumigatio muriatico-oxygenata, II, 116.
Fumigatio Smithiana, I, 89.
Fundente de Lassone, III, 512.
id. de Richard, IV, 304.
id. de Rotrou, I, 302.
id. de Ruhland, I, 303.
Fungus bedeguar, I, 430.
id. chirurgorum, III, 371.
id. cynosbati, I, 430.
id. melitensis, II, 510.
id. rosæ, I, 430.
Furfur, IV, 151.

G.

Gagates, I, 386.
Galanga, II, 324.
id. espurea, id.
id. mayor, id.
id. menor, id.
Galanga major, id.
id. minor, id.
id. spuria, id.
Galato-carbonato de potasa, III, 466.
Galbanetum Paracelsi, II, 326.
Galbano, II, 325.
Galbanum, id.
id. in granis, id.
id. in lacrymis, id.
id. in masis, id.
Galega officinalis, IV, 123.
id. virginiana, IV, 124.
Galeopsidis, III, 362.
Galio, II, 337.
id blanco, id.
id. cruzado, II, 338.
id. luteo, II, 337.
Galipea cusparia, I, 283.
Galium album, II, 337.
id. aparine, I, 341.
id. cruciatum, II, 338.
id. lucteum, II, 337.
id. mollugo, id.
id. verum, id.
Galla de Aleppo, I, 115.

Galla quercina, I, 115.
id. tinctoria, id.
id. turcica, id.
Gambiogium, II, 393.
Garbanzo, II, 338.
Garcinia cambogia, II, 393.
Gardenia gummifera, II, 214.
Gargarisma adstringens, I, 81, 209.
id. adstringens acidum, I, 95.
id. aluminosum, I, 209.
id. in angina maligna, I, 56.
id. antiscorbuticum, II, 149.
id. ad aphthas, IV, 229.
id. belladona cum hydrargyro, III, 196.
id. eborace, IV, 229.
id. boraxatum, id.
id. cochleariæ, II, 149.
id. commune, IV, 109.
id. mercuriale Plenkii, III, 115.
id. nitrosum, III, 485.
id. piperitum, III, 394.
id. refrigerans, III, 485.
id. salitum, I, 260.
id. salviæ cum acido muriatico, I, 81.
id. saturninum, III, 426.
id. è scilla, II, 260.
id. in ulceribus venereis, III, 189.
Gargarismo acético, I, 54.
id. acetoso, I, 254.
id. acídulo, I, 54.
id. alcanforado, I, 153.
id. aluminoso, I, 209.
id. amoniacal, I, 222, 244.
id. antiaftoso, II, 64.
Gargarismo antiescorbútico, I, 81; II, 149; III, 57; IV, 61.
id. antiflogístico, II, 301.
id. antiodontálgico, III, 372.
id. antiséptico, I, 209, 253; II, 118; IV, 36, 41.
id. antisifilítico, III, 189, 192.
id. antivenéreo, III, 161.
id. astringente, I, 81, 117, 151, 209, 260; II, 172, 409; III, 254, 415, 426.
id. boratado, IV, 229.
id. calmante, I, 110.
id. clórico, II, 118.
id. comun, III, 484.
id. demulcente, I, 114.
id. detersivo, I, 81, 95; III, 243; IV, 109, 176.
id. dulcificante, III, 59, 66.
id. emoliente, II, 172; III, 66.
id. escilítico, II, 260.
id. escitante, I, 56; III, 372, 394.
id. estimulante, I, 244; IV, 153.
id. estíptico, III, 415.
id. mercurial, III, 189, 196, 300.
id. mercurial de Plenk, III, 115.
id. opiado, III, 300.
id. con ogimiel, I, 54.
id. refrigerante, III, 485.
id. resolutivo, I, 253.
id. sedante, III, 314, 426.
id. sialagago, III, 254, 372.
id. tónico, I, 209; II, 175.
Gargarismo tónico y hemastático, I, 109.
id. verde, II, 121.
Gas ácido carbónico, I, 59.
id. arótico, I, 392.
id. óxido de azoe, id.
id. hidrógeno percarbonado, II, 497.
id. hidrógeno sulfurado, I, 83.
Gaulteria tendida, II, 338.
Gaultheria procumbens, id.
Gayuba, id.
Gayubera, id.
Gaz azoticum, I, 392.
id. azoticum oxigenatum, id.
id. hepaticum, I, 83.
id. hydro-carbonatum, II, 497.
id. hydrogenium carbonatum, id.
id. hydrogenium sulphuratum, I, 83.
Gelappium, II, 529.
Gelatina amyli, I, 199.
id. ex amylo solani tuberosi, III, 370.
id. animalis, II, 351.
id. brassicæ rubræ, I, 456.
id. cornu cervi, II, 351.
id. cornu cervi acida, II, 352.
id. cornu cervi amygdalata, II, 351.
id. cornu cervi citrata, II, 352.
id. lichenis islandici, III, 28.
id. liquiritiæ, IV, 74.
id. ribesiorum nigrorum, II, 415.
id. ribium, II, 413,
id. sagu, IV, 148.
id. salep, id.
Gelatina, II, 339.

Gelatina de almidon, I, 189.
id. analéptica, II, 353.
id. de cola, II, 350.
id. de cola de pescado, II, 351.
id. de coralina, II, 178.
id. de cuerno de ciervo, II, 351.
id. de cuerno de ciervo ácida, II, 352.
id. de cuerno de ciervo amigdalina, II, 351.
id. dulcificante, II, 350, 351.
id. de fécula de patatas, III, 370.
id. de grosellas, II, 413.
id. laxante, III, 77.
id. de liquen islándico, III, 28.
id. de liquen islándico opiada, III, 30.
id. de liquen islándico con quina, id.
id. de lombarda, I, 456.
id. de membrillos, III, 106.
id. de membrillos aromática, III, 107.
id. de pan, III, 368.
id. purgante, II, 539.
id. de regaliz, IV, 74.
id. de sagú, IV, 148.
id. de salep, id.
id. de ternera, II, 351.
id. de tortuga, II, 350.
Genciana, II, 356.
id. amarilla, id.
id. de Catesby, id.
id. mayor, id.
Gencianina, II, 367.
Gencianino, id.
Genepi album, II, 371.
id. spurium, I, 344.
id. verum, id.
Gengibre, II, 363.
id. blanco, id.
Gengibre comun, II, 368.
id. negro, id.
Geniculata, III, 453.
Genipi, II, 370.
id. de los Alpes, II, 371.
id. blanco, II, 370.
Genita angulosa, II, 35.
id. Canariensis, III, 16.
id. juncea, II, 35.
id. sagitalis, II, 34.
id. scoparia, II, 35.
id. tinctoria, II, 34.
Genistella, id.
Gentiana alba, III, 7.
id. Catesbæ, II, 356.
id. chirayita, I, 480.
id. cruciata, II, 338.
id. luctea, II, 357.
id. major, id.
id. minor, II, 338.
id. nigra, IV, 373.
id. rubra, II, 357.
id. veterum, id.
Gentianeina, II, 367.
Gentiania, id.
Geofrea, II, 371.
id. de la Jamaica, id.
id. de Surinam, id.
Geoffræa inermis, id.
id. Jamaicensis, id.
id. Surinamensis, id.
Geranio, II, 373.
id. almizcleño, id.
id. manchado, II, 374.
id. de los prados, II, 373.
id. Roberciano, id.
id. sanguineo, id.
Geranium batrachioides, II, 373.
id. maculatum, II, 374.
id. moschatum, II, 373.
id. pratense, id.
id. Robertianum, id.
id. rotundifolium, id.
id. sanguineum, id.
Germanica, II, 268.
Geum, II, 32.
id. rivale, id.
Geum urbanum, II, 32.
Gialappa, II, 529.
Gigartina helminthochorton, II, 177.
id. plicata, id.
Gilenia, II, 374.
id. trifoliata, id.
Gilla, II, 454.
id. theophrasti, IV, 400.
id. vitrioli, id.
Gillenia, II, 374.
id. trifoliata, id.
Glacies mariæ vulgaris, I, 504.
Gladiolo comun, II, 374.
Gladiolus cæruleus, III, 35.
id. communis, II, 374.
id. luteus, III, 35.
Glandes quercus, II, 216.
id. quercus tostæ, II, 219.
Glaucium corniculatum, I, 115.
Glechoma hederacea, IV, 356.
Globularia, II, 374.
id. comun, id.
Globularia, id.
id. vulgaris, id.
Globuli carminativi, I, 461.
id. ad erysipelas, III, 407.
id. ferri tartarisati, II, 488.
id. martiales soluti, id.
id. martiati, id.
id. moschati, I, 193.
id. tartari martiales, II, 488.
id. tartratis ferri et lixiviæ, id.
Gluten pectoral, IV, 74.
Goma adraganto ó tragacanto, II, 398.
id. amoniaco, II, 374.
id. anime, I, 285.
id. arábiga, II, 336.
id. carana, II, 20.
id. elástica, II, 393.

Goma de enebro, IV, 163.
id. de euforbio, II, 307.
id. de guayaco, II, 417.
id. guta, II, 393.
id. laca, II, 395.
id. de limon, II, 214.
id. de oliva, II, 398.
id. del pais, id.
id. del Senegal, id.
id. seráfica, IV, 147.
id. de yedra, II, 402.
Gomo-resina euforbio, II, 307.
Gordolobo, II, 402.
id. blanco, id.
id. negro, id.
Gosipina, I, 173.
Gossypium herbaceum, id.
Gotas acústicas, I, 231.
id. amargas, I, 463; III, 285.
id. inglesas cefálicas, I, 245.
id. anodinas ácidas, II, 307.
id. antiespasmódicas de Eller, I, 267.
id. antihelmínticas, III, 281.
id. antihistéricas, I, 379.
id. blancas de Ward, III, 207.
id. calmantes, III, 249.
id. cordiales de Warner, IV, 195.
id diuréticas, IV, 245.
id. escitantes, I, 9.
id. estomacales, II, 66.
id. fosfóricas, I, 67.
id. de Jena, I, 42.
id. del general Lamotte, II, 474; III, 361.
id. marciales, II, 470.
id. de la Madre, I, 379.
Gotas negras, III, 289.
id. resolutivas, I, 427.
id. del abate Rousseau, III, 299.
id. uterinas, I, 379.
id. uterina de la reina de España, III, 285.
Graciola, II, 403.
Grafito, II, 446.
Gragea de Keyser, III, 226.
id. de quina, IV, 26.
id. vermífuga, III, 164.
Grama, II, 405, 407.
Gramen, II, 405.
id. album, id.
id. caninum, id.
id. majus, IV, 388.
id. orientale, II, 546.
id. rubrum, IV, 388.
Grana cnidia, III, 98.
id. kermes, III, 1.
id. Molucca, II, 183.
id. tigli, id.
id. tiglia, id.
id. tilli, id.
Granada, II, 408.
Granado, id.
Granatum, I, 201.
Granos de vida de Franck, I, 27.
id. de vida de Mesué, I, 26.
id. de las Molucas, II, 182.
Graphites, II, 446.
id. hydrargyratus, III, 129.
Grasa de anade, II, 411.
id. de anguita, II, 412.
id. de buey, II, 410.
id. de castor, id.
id. de capon, II, 411.
id. de carnero, id.
id. de cigüeña, id.
id. de codorniz, id.
id. de cola de caballo, II, 410.
Grasa de conejo, II, 411.
id. de culebra, id.
id. de erizo, id.
id. de foca, id.
id. de gallina, II, 412.
id. de ganso, id.
id. de garza real, id.
id. de gato montés, II, 410.
id. de hombre, II, 411.
id. de liebre, id.
id. de lobo, id.
id. de marmota, id.
id. de oso, id.
id. de perro, id.
id. de pez lucio, II, 412.
id. de puerco, II, 411.
id. de tejon, II, 410.
id. de vívora, II, 412.
id. de zorra, II, 411.
Gratia Dei, II, 403.
Gratiola, id.
id. officinalis, II, 403.
Greda, I, 491.
id. parótica, I, 428.
id. blanca, I, 491.
id. de Brianzon, III, 55.
id. pesada, I, 428.
id. de plomo, III, 406.
id. precipitada, I, 495.
id. roja, I, 198.
id. de sosa, IV, 223.
Grosellas, II, 413.
Grosellero, id.
id. encarnado, id.
id. negro, II, 415.
Guajacum, II, 416.
id. officinale, id.
Gualdapara, II, 189.
Gualteria, II, 416.
id. tendida, id.
Gualthera procumbens, id.
Guayacina, II, 417.
Guayaco, II, 416.
Guindo, II, 432.
id. comun, id.
id. Mahaleb, id.
id. de Virginia, II, 433.

Gummi aloes, I, 13.
id. ammoniacum, II, 374.
id. ammoniacum alcoholisatum, II, 386.
id. ammoniacum amygdaloides, II, 374.
id. ammoniacum electum, id.
id. ammoniacum in granis, id.
id. ammoniacum in panis, id.
id. anime, I, 285.
id. arabicum, II, 386.
id. asæ fœtidæ, I, 368.
id. bédelii, I, 430.
id. benzoes, I, 448.
id. benzoinum, id.
id. carannæ, II, 20.
id. cerasi, II, 398.
id. cerasorum, id.
id. copal, II, 177.
id. elasticum, II, 393.
id. euphorbi, II, 307.
id. gamandræ, II, 393.
id. de Goa, id.
id. guajaci, II, 417.
id. gutta, II, 393.
id. guttæ, id.
id. guttæ Cambogium, id.
id. guttæ Siamense, id.
id. guttæ spurium, id.
id. guttæ verum, id.
id. guttæ Zeylanicum, id.
id. hederæ, II, 402.
id. de jemu, II, 393.
id. juniperi, IV, 163.
id. laccæ, II, 395.
id. ladanum, III, 6.
id. ligni sancti, II, 417.
id. mimossæ, II, 386.
id. myrrhæ, III, 237.
id. nostras, II, 398.
id. olei, id.
Gummi olibani, II, 513.
id. panaceis, III, 365.
id. sagapenum, IV, 147.
id. sanguis draconis, IV, 163.
id. sarcocolle, IV, 168.
id. Senegalense, II, 398.
id. Serapinum, IV, 147.
id. Serapionis, II, 386.
id. tragacanthæ, II, 398.
Gusano de seda, II, 20.
Gutta gamandra, II, 393.
id. gamba, id.
Guttæ acidæ tonicæ, I, 98.
id. Anglicanæ cephalicæ, I, 245.
id. ad arthrodyniam, I, 267.
id. ad blenorrhœam, I, 411.
id. è cupro, II, 122.
id. febrifugæ, I, 93.
id. ferratæ, II, 470.
id. nervinæ, II, 474.
id. sthomachicæ, II, 66.
Guttulæ albe Wardiis, III, 217.
id. diureticæ, IV, 430.
id. phosphoratæ, I, 67.

H.

Haba comun, II, 434.
id. de san Ignacio, II, 435.
id. pecurin, id.
id. Tonka, id.
Hæmatinum, I, 512.
Hæmatoxylinum, id.
Hæmatoxylum campechianum, id.
Halcyonium rotundum, IV, 408.
Haloidum oxygenatum, III, 492.
Hamamelis de Virginia, II. 435.
Harina fosil, I, 492.
id. de cebada, pp, II, 67.
Harinas emolientes, III, 20.
id. resolutivas, I, 174.
Harraclan, II, 436.
Hastula regis, I, 383.
Haustus adstringens, III, 301.
id. anodynus, III, 295.
id. antiemeticus, I, 61.
id. balsamicus, I, 420.
id. ad blenorrhagiam, I, 411.
id. catharticus pro infantibus, IV, 129.
id. catharticus oleosus, IV, 85.
id. catharticus salinus, III, 53.
id. collæ animalis, II, 346.
id. diaphoreticus resolvens, I, 106.
id. diureticus Milmanni, III, 500.
id. emeticus, I, 329.
id. incitans diaphoreticus, I, 261.
id. incitans nervinus, I, 153.
id. incitans resolvens, IV, 133.
id. oleosus laxans, IV, 195.
id. ex olibano, II, 514.
id. opiatus, III, 315.
id. pectoralis incitans, III, 453.
id. pectoralis resolvens, II, 205.
id. sedans narcoticus, I, 435.
id. stomachicus, IV, 4.

Haustus terebinthinatus, I, 411.
id. tonicus adstringens, III, 295.
id. tonicus marciales, II, 485.
Haya, II, 436.
Hedera arborea, IV, 356.
id. helix, id.
id. terrestris, id.
Hedysarum alhagi, III, 76.
Helecho macho, II, 436.
Helianto tuberoso, II, 437.
Helianthus tuberosus, id.
Heliotropio, id.
Helychrysum, II, 17.
id. arenarium, II, 18.
id. stœchas, id.
Helyotropium æuropeum, II, 437.
Helix pomatica, II, 341.
Helleborus, II, 205.
id. albus, id.
id. fœtidus, II, 206.
id. niger, id.
id. orientalis, id.
id. viridis, id.
Helminthochorton, II, 177.
Helminthochortos, id.
Hematites, II, 453.
id. rojo, id.
Hepar anguillæ, II, 343.
id. antimonii, I, 322.
id. canis rabidi, II, 341.
id. lupi, id.
id. sulphuris, I, 489.
id. sulphuris calcareum, id.
id. sulphuris salinum, III, 461.
id. sulphuris volatile, I, 255.
id. sulphuris vulgare, III, 461.
Hepatica, II, 437.
id. estrellada, I, 383.
id. de fuente, II, 437.
id. de jardin, II, 438.
Hepatica fontana, id.
id. nobilis, id.
Hepatica stellata, I, 383.
id. triloba, II, 438.
Hepatorium, I, 136.
Heracleum gummiferum, II, 375.
id. spondylium, II, 268.
Herba ægyptiaca, III, 103.
id. britannica, IV, 87.
id. cancri, II, 437.
id. ignis, III, 23.
id. ophthalmica, II, 310.
id. Ruperti, II, 373.
id. Trinitatis, III, 374.
id. ventis, I, 271.
Herbæ aromaticæ, IV, 282.
Hermodactyli, II, 438.
Hermodatiles, id.
id. falsos, id.
Herniaria, id.
id. lampiña, id.
id. velluda, II, 439.
Herniaria glabra, II, 438.
id. hirsuta, II, 439.
Heuchera americana, id.
Hibiscus abelmoschum, I, 1.
Hidrastide del Canadá, II, 439.
Hidrato de cal, I, 485.
id. de hierro tritoxidado, II, 453.
id. de potasio protoxidado, III, 456.
id. de azufre, I, 397.
Hidriodato de hierro, II, 519.
id. de potasa, II, 517.
id. de potasa iodurado, II, 518.
id. de potasio protoxidado, II, 517.
Hidrocarbonato de cobre verde, II, 123.
Hidroclorato de amoniaco, I, 251.
id. de amoniaco cupreo, II, 132.
id. de amoniaco y de hierro, II, 477.
id. de barita, I, 426.
Hidroclorato de cobre deutoxidado, II, 131.
id. de hierro, II, 470.
id. de magnesia, III, 55.
id. de manganesa, III, 81.
id. de mercurio y de amoniaco, III, 218.
id. de mercurio y de hierro, III, 174.
id. de oro, III, 358.
id. de oro y de sosa, III, 359.
id. de plata y de amoniaco, III, 401.
id. de potasio, III, 493.
id. de potasio protoxidado, id.
id. de sodio protoxidado, IV, 220.
id. de sosa, id.
Hidrogala, III, 15.
Hidrogeno, II, 497.
id. azootizado, I, 218.
Hidromel, III, 230.
id. antiasmatico, II, 195.
id. anticatarral, III, 31.
id. compuesto, II, 231.
id. vinoso, I, 168.
Hidrosilicato de zinc, IV, 392.
Hidrosulfato de amoniaco, I, 255.
id. de amoniaco sulfurado, id.
id. de antimonio sulfurado, I, 315.
id. de cal, I, 505.
id. de cal antimoniado, I, 321.
id. de cal compacto, I, 505.
id. de cal lenticular, I, 504.
id. de calcio protoxidado, I, 505.

Hidrosulfato de potasa, III, 494.
id. de sosa, IV, 230.
Hidrosulfuro de amoniaco, I, 255.
id. amarillo de oxido de antimonio sulfurado, I, 315.
id. de cal antimoniado, I, 321.
Hidrosulfuro-sulfuro hidrogenado de amoniaco, I, 255.
Hidroxido de hierro, II, 453.
Hiel, véase *Bilis*.
Hieracio, II, 439.
id. de las murallas, id.
id. pelosilla, id.
Hieracium murorum, id.
id. pilosella, id.
Hierro, II, 440.
id. oligisto concreto, II, 453.
id. oxidado geodico, id.
Hígado de anguila, II, 343.
id. de antimonio, I, 303.
id. de azufre calcáreo, I, 489.
id. de azufre volátil, I, 255.
id. de lobo, II, 341.
id. de perro rabioso, id.
Higuera, II, 498.
id. de tuna, id.
id. de Indias, id.
Hinojo, II, 498.
id. acuático, II, 311.
id. hediondo, II, 226.
id. marino, II, 501.
Hipericon, id.
id. oficinal, id.
id. cuadrangular, II, 562.
Hipocistidos, II, 507.
Hipofosfito de potasa, III, 475.
Hipogloso, II, 507.
Hipoqueris, id.
Hiposulfito de mercurio y de amoniaco, III, 209.
id. de mercurio y de potasa, id.
id. de mercurio y de sosa, id.
id. de potasio, III, 481.
id. de sosa, IV, 233.
Hippocastanum, II, 44.
Hippocras, I, 530.
Hippolapathum, IV, 125.
Hirudo officinalis, IV, 164.
Hirundinaria, IV, 339.
Hirundines combustæ, II, 22.
Hirundo rustica, I, 495.
Hisopo, II, 507.
id. húmedo, II, 509.
id oficinal, II, 507.
Histrix cristatus, I, 461.
Hollin, II, 509.
Hongo de Malta, II, 510.
Hordeum crudum, II, 66.
id. decorticatum, id.
id. integrum, id.
id. mundatum, id.
id. perlatum, II, 67.
id. præparatum, id.
id. vulgare, II, 66.
Hormiga, II, 510.
Horminum, IV, 152.
Hueso de corazon de ciervo, I, 502.
id. de gibia, I, 493.
Hueses, I, 501.
Huevos, II, 512.
id. de gallina, id.
Humulus lupulus, III, 39.
Hyoscyaminum, I, 432.
Hyoscyamus, 431.
id. albus, id.
id. niger, id.
Hyperboras sodæ, IV, 227.
Hypercarbonas potassæ venale, III, 465.
Hypericum, II, 501.
id. androsæmum, I, 370.
Hypericum bacciferum, II, 394.
id. cayennense, id.
id. perforatum, II, 501.
id. quadrangulare, II, 502.
Hyperoxalas potassæ, III, 501.
Hyperoxodes ferri nigrum, II, 448.
id. hydrargyri, III, 144.
Hypertartras potassæ, III, 506.
Hypersulphas aluminæ et potassæ, I, 201.
Hypercarbonas ammoniæ, I, 238.
id. ammoniæ liquidum, I, 239.
id. ammoniæ pyro-animale, I, 240.
id. ammoniæ pyro-animale liquidum, I, 242.
id. magnesiæ, III, 48.
id. potassæ liquidum, III, 468.
id. potassæ venale, III, 465.
id. sodæ, IV, 223.
Hydragogum Boylei, III, 398.
Hydrargyrum, III, 111.
id. acetatum, III, 224.
id aceticum, id.
id. ammoniato muriaticum, III, 218.
id. muriaticum corrosivum, III, 185.
id. muriaticum mite, III, 157.
id. muriaticum præcipitatum, III, 218.
id. nitricum, III, 212.
id. oxydatum nigrum, III, 139, 209.
id. oxydatum rubrum, III, 143.

Hydrargyrum phosphoratum, III, 207.
id. phosphoreum, id.
id. præcipitatum album, III, 218.
id. saccharatum, III, 117.
id. stibiato-sulphuratum, III, 136.
id. sulphuratum nigrum, III, 133.
id. tartarisatum, III, 227.
Hydrargyrus, III, 111.
id. acetatus, III, 224.
id. calcinatus, III, 143.
id. corrosivus albus, III, 185.
id. muriaticus ammoniacalis fortior, III, 218.
id. muriaticus dulcis, III, 157.
id. muriatus, III, 185.
id. muriatus corrosivus, id.
id. muriatus dulcis, III, 157.
id. nitratus ruber, III, 143.
id. oxydulatus, III, 157.
id. purificatus, III, 111.
id. sulphuratus niger, III, 133.
id. cum sulphure, id.
id. vitriolatus, III, 207.
Hydras calcariæ, I, 485.
id. ferricum, II, 456.
id. kalicum, III, 456.
id. potassæ, id.
Hydrochlorinas ferri, II, 431.
id. natricus, IV, 221.
Hydrocyanas ferri, II, 496.
id. potassæ ferruginosus, I, 73.
Hydrogeno-sulphuretum ammoniæ liquidum, I, 255.
Hydropiper, III, 384.
Hydroselinum, I, 341.
Hydro-sulpho-cyanato de potasa, I, 74.
Hydrosulphas ammoniæ, I, 255.
Hydrosulphuretum ammoniacale aquosum, id.
id. ammoniæ, id.
id. ammonicum, id.
id. antimonii rubrum, I, 307.
id. oxydi stibii fuscum, id.
id. oxydi stibii rubrum, id.
id. oxydi stibii sulphuratum, I, 307, 315.
id. stibii sulphurati rubrum, id.
id. stibiosum, I, 307.
id. stibiosum cum sulphure, I, 315.
Hyssopus, II, 507.
id. officinalis, id.

I.

Ictiocola, II, 340.
Ichthyocolla, id.
Icica caranna, II, 20.
id. icicariba, II, 215.
Ignatia amara, II, 435.
Ilex aquifolium, I, 6.
Illecebra major, IV, 213.
Illecebrum vermiculare, IV, 212.
Illicium anisatum, I, 290.
Iman arsenical, I, 358.
Imbricaria parietina, III, 25.
Incienso, II, 513.
id. hembra, id.
id. macho, id.
id. en suerte, id.
Indigofera anil, I, 340.
id. argentea, id.
id. tinctoria, id.
Indigotina, id.
Infusion de agallas, I, 116.
Infusion de agenjos, I, 123.
id. de agenjos nitrada, id.
id. de amapolas, I, 213.
id. amarga, II, 31, 361.
id. amarga alcalizada, II, 362.
id. de anemone, I, 272.
id. de angustura, I, 284.
id. de anis, I, 289.
id. antelmintica, II, 157.
id. antiescorbutica, II, 143.
id. antihidropica, IV, 65.
id. de arnica, I, 351.
id. de arnica compuesta, I, 352.
id. de arnica vinosa, I, 353.
id. de arnica eterea, id.
id. de astragalo, I, 383.
id. astringente, IV, 104.
id. de aya pana, II, 311.
id. de azafran, I, 387.
id. de belladona, I, 446.
id. de bellotas de encina, II, 219.
id. béquica, I, 214; II, 58.
id. de borraja, I, 468.
id. de buglosa, I, 473.
id. de cálamo aromático, I, 482; II, 118.
id. de cálamo aromático con cloro, id.
id. de camedrios, I, 511.
id. de canela, I, 522.
id. de cantáridas, II, 3.

Infusion de cañafistula, II, 41.
id. de cañamones, II, 19.
id. cardiaca, I, 349.
id. cardiaca avinagrada, id.
id. de cardo santo, II, 31.
id. carminativa, III, 91.
id. de cascarilla, II, 38.
id. catártico-anodina, III, 91.
id. de catecú, II, 63.
id. de centaura menor, II, 78.
id. de centeno atizonado, IV, 265.
id. de cicuta, II, 93.
id. de cisampelos pareira, I, 476.
id. de clavos de especia, III, 45.
id. de clematide, II, 115.
id. de colombo, II, 156.
id. de coralina, II, 178.
id. de corteza de naranja compuesta, III, 264.
id. de corteza de nuez compuesta, III, 281.
id. de culantrillo, II, 186.
id. de digital, II, 194.
id. diurética, II, 194; III, 381.
id. de doradilla, II, 201.
id. de dulcamara, II, 204.
id. de eleboro negro de Hoffman, II, 210.
id. emenagoga, II, 362.
id. de enebro, II, 225.
id. de enebro compuesta, id.
Infusion de espigelia antielmíntica, II, 275.
id. de espliego, II, 279.
id. estomacal, IV, 32.
id. de eupatorio perfoliado, II, 311.
id. de flores de melocoton, I, 144.
id. de flores de arnica compuesta, I, 352.
id. de flores de peonía, III, 376.
id. de flores de sauco, IV, 176.
id. de flores fortificante, II, 361.
id. de galio amarillo, id.
id. de galio luteo, II, 337.
id. de garbanzos, II, 338.
id. de genciana compuesta, II, 361.
id. de graciola, II, 404.
id. de hisopo, II, 508.
id. de laurel real, III, 14.
id. de hollin, I, 263.
id. de ipecacuana, II, 524.
id. contra la jaqueca, IV, 321.
id. de laurel cerezo, id.
id. de lepidio, III, 17.
id. de liquen islándico, III, 26.
id. de lúpulo, III, 41.
id. de malta, III, 56.
id. de malvas, III, 58.
id. de malvavisco, III, 65.
id. de manzanilla, III, 89.
id. de manzanilla compuesta, III, 91.
id. de menta, IV, 361.
id. de menta compuesta, id.
Infusion de menta rizada, IV, 361.
id. de mil pies, III, 235.
id. de hojas de naranjo, III, 264.
id. de ninfea, III, 278.
id. nervina, IV, 330.
id. nervina etérea, I, 354.
id. nervina marcial, id.
id. de olmo, III, 286.
id. de opio acuosa, III, 308.
id. de orégano, III, 356.
id. contra la paralisis, IV, 65.
id. de pasta de malvavisco, II, 391.
id. pectoral, III, 65; IV, 358.
id. de pensamiento, III, 374.
id. de pimienta de Cayena, III, 394.
id. de pimpinela, III, 395.
id. de polígala amarga, III, 451.
id. de quasia, IV, 4.
id. de quasia con sulfato de zinc, IV, 5.
id. de quina acidulada, IV, 33.
id. de quina calcárea, IV, 32.
id. de quina caliente, IV, 30.
id. de quina compuesta, IV, 34.
id. de quina fria, IV, 30.
id. de quina magnesiada, IV, 31.
id. de quina potasada, id.
id. de rábanos, IV, 64.
id. de regaliz, IV, 80.
id. de rododendro de flores blancas, IV, 86.
id. de romero, IV, 89.

Infusion de romero silvestre, IV, 88.
id. de rosas, IV, 103.
id. de rosas acídula, IV, 104.
id. de ruibarbo, IV, 132.
id. de sabina, IV, 146.
id. de sabina acidulada, I, 67.
id. de salvia, IV, 153.
id. de salvia acidulada, id.
id. de salvia vinosa, IV, 154.
id. de sanguinaria de Canadá, IV, 165.
id. de santónico, IV, 215.
id. de sasafras, IV, 169.
id. de sen, IV, 197.
id. de sen con zumo de limon, IV, 198.
id. de sen laxante, IV, 200.
id. de sen de Maryland, IV, 208.
id. de sen purgante, IV, 200.
id. de sen con tamarindos, id.
id. de serpentaria de virginia, I, 349.
id. de simaruba, IV, 214.
id. de simiente de lino, III, 21.
id. de simiente de lino purgante, id.
id. de simiente de cidra, II, 104.
id. de tabaco, IV, 244.
id. de tamarindos, IV, 251.
id. de tamarindos compuesta, id.
id. de tanaceto, IV, 257.
id. de te de Mégico, IV, 263.
id. de tilo, IV, 264.
id. de tomillo, IV, 268.
Infusion tónica, II, 524; IV, 33.
id. de torongil, IV, 273.
id. de trebol acuático, id.
id. de trifolio acuático, IV, 321.
id. de valeriana, IV, 329.
id. de valeriana compuesta, id.
id. vermífuga, II, 264, 275.
id. de verónica, IV, 343.
id. de violetas, IV, 350.
id. vulneraria, I, 137.
id. de yedra terrestre, IV, 357.
id. de yemas de abeto, I, 3.
Infuso-cocimiento de sauce, IV, 173.
Infusum absinthii nitratum, I, 123.
id. acaciæ catechu, II, 63.
id. alexiterum, I, 349.
id. amarum, II, 361.
id. amarum cum natro, II, 362; IV, 225.
id. amarum et roris marini, II, 362.
id. amarum vinosum, II, 363.
id. angusturæ, I, 284.
id. anthelmintico-irritans, II, 264.
id. anthelmintico-tonicum, II, 157.
id. anthelminticum, II, 178, 275.
id. anthemidis, III, 89.
id. antihydropicum, IV, 65.
id. armoraciæ, IV, 64.
id. armoraciæ compositum, id.
Infusum arnicæ florum, I, 351.
id. arnicæ florum compositum, I, 352.
id. arnicæ florum vinosum, I, 353.
id. arnicæ vinosum, id.
id. astragali exscapi, I, 383.
id. aurantiorum foliorum, III, 264.
id. aurantii compositum, id.
id. baccarum juniperi, II, 225.
id. belladonæ, I, 446.
id. borraginis florum, I, 468.
id. brucæ, I, 284.
id. buglossi, I, 473.
id. bynes, III, 56.
id. calami aromatici, I, 482.
id. calami aromatici cum acido muriatico oxigenato, II, 118.
id. calcis cinchonatum, IV, 32.
id. cannabis, II, 19.
id. capilli veneris, II, 186.
id. cardiacum, I, 329.
id. cardiacum acetatum, I, 347.
id. cardui benedicti, II, 31.
id. carminans, III, 91.
id. caryophyllorum, III, 45.
id. cascarillæ, II, 38.
id. cassiæ marylandicæ, IV, 208.
id. catechu compositum, II, 63.
id. cathartico anodinum, III, 91.
id. centaureæ benedictæ, II, 31.
id. centaurii minoris, II, 78.

Infusum ceterach (foliorum), II, 201.
id. chamomillæ, III, 89.
id. chenopodii ambrosioides, IV, 163.
id. chinæ, IV, 31.
id. cinchonæ cum aqua calcis, IV, 32.
id. cinchonæ aquarum compositum, id.
id. cinchonæ calidum, IV, 30.
id. cinchonæ sine calore, id.
id. cinchonæ frigidum, id.
id. cinchonæ cum magnesia, IV, 31.
id. cinchonæ cum succo limonum, IV, 33.
id. columbæ, II, 156.
id. conii maculati, II, 93.
id. corticis peruviani vinosum, IV, 45.
id. cuspariæ, I, 284.
id. digitalis, II, 194.
id. digitalis purpureæ, id.
id. dulcamaræ, II, 204.
id. eupatorii perfoliati, II, 311.
id. flammulæ Jovis, II, 115.
id. foliorum ceterach, II, 201.
id. gallarum, I, 116.
id. gentianæ compositum, II, 361.
id. glandium quercus tostarum, II, 219.
id. glycyrrhizæ, IV, 80.
id. gratiolæ, II, 404.
id. hellebori nigri Hoffmanni, II, 210.
id. ad hidropicos, IV, 65.
Infusum ipecacuanhæ, II, 524.
id. jaceæ hervæ, III, 374.
id. japonicum, II, 63.
id. juglandis compositum, III, 289.
id. juniperi vaccarum, II, 225.
id. kali carbonici cum scilla vinosum, II, 254.
id. laxativum simplex, IV, 200.
id. laxativum Viennense, id.
id. ledi, IV, 88.
id. ledi palustris, id.
id. lepidii, III, 17.
id. lichenis Islandici, III, 26.
id. lini, III, 21.
id. lini catartici, id.
id. liquiritiæ, I, 80.
id. malti, III, 56.
id. malvæ, III, 58.
id. menthæ, IV, 361.
id. menthæ compositum, id.
id. menyanthis, IV, 321.
id. millepedum, III, 235.
id. nervina ætherea, I, 354.
id. nervina martialis, id.
id. nicotiana tabaci, IV, 244.
id. nymphææ florum, III, 278.
id. orchidis, IV, 149.
id. pæoniæ petalorum, III, 376.
id. ad paralysim, IV, 65.
id. paralyticum, id.
id. pareiræ bravæ, I, 474.
id. pectorale, IV, 358.
id. persicorum, I, 144.
id. picis liquidæ, III, 386.
Infusum pini turionum, I, 3.
id. pulsatillæ, I, 272.
id. quassiæ, IV, 4.
id. quassiæ excelsæ, id.
id. quassiæ cum natro, IV, 226.
id. quassiæ cum sulfate zinci, IV, 5.
id. quercus glandium tostarum, II, 219.
id. raphani, IV, 64.
id. rhabarbari, IV, 132.
id. rhei, id.
id. rhei alcalisatum, IV, 136.
id. rhei amarum, IV, 132.
id. rhei boraxatum, IV, 136.
id. rhei salinum, id.
id. rhei cum sub-carbonate potassæ, id.
id. rhododendri chrysanti, IV, 86.
id. roborans, II, 361.
id. rosarum, IV, 103.
id. rosarum acidulum, IV, 104.
id. rosarum compositum, id.
id. sabinæ, IV, 146.
id. sabinæ cum acido phosphorico, I, 67.
id. salep cum adstringentibus, IV, 228.
id. salviæ, IV, 153.
id. salviæ vinosum, IV, 154.
id. sambuci florum nigri, IV, 176.
id. sambuci cum tartaro stibiato, I, 331.
id. sanguinariæ Canadensis, IV, 165.
id. santonici seminis, IV, 215.

Infusum sassafras ligni, IV, 169.
id. scilliticum vinosum compositum, II, 254.
id. secalis cornuti, IV, 265.
id. seminis santonici, IV, 215.
id. sennæ, IV, 177.
id. sennæ sine aromatibus, IV, 200.
id. sennæ citratum, IV, 198.
id. sennæ compositum, IV, 200.
id. sennæ cum manna, id.
id. sennæ simplex, IV, 197.
id. sennæ tamarindatum, IV, 200.
id. sennæ et tamarindi, id.
id. sennæ tartarisatum, id.
id. serpentariæ virginianæ, I, 349.
id. simarubæ, IV, 214.
id. sinapios, IV, 64.
id. tabaci, IV, 244.
id. tamarindorum, IV, 251.
id. tamarindorum compositum, id.
id. tanaceti, IV, 257.
id. tonico nervosum, IV, 329.
id. ulmi, III, 286.
id. valerianæ, IV, 329.
id. valerianæ compositum, id
id. valerianæ vinosum, IV, 332.
Injectio adstringens, IV, 403.
id. aluminis composita, III, 427.
id. anodyna, III, 315.
id. cum aqua lauro-cerasi, I, 75.
Injectio articularis detersiva, IV, 121.
id. ad blennorræam, IV, 407.
id. catechu, II, 63.
id. chinæ, IV, 39.
id. chinæ antipútrida, IV, 36.
id. contra stimulans, I, 75.
id. cuprata, II, 131.
id. detergens, III, 243.
id. detergens et roborans, I, 36.
id. fellea, I, 463.
id. ad fistulas, I, 487; II, 6.
id. ex gallis, I, 117.
id. in gonorrhæa, III, 182.
id. hydrargyrica simplex, III, 115.
id. hydrargyro saturnina, III, 201.
id. hydrargyro terebintinata, III, 119.
id. lactis opiata, III, 315.
id. leniens, III, 249.
id. ad leucorrhæam, III, 414; IV, 404.
id. mercurialis Plenkii, III, 115.
id. ex muriato hydrargyri, III, 161.
id. muriatis hydrargyri camphorata, III, 185.
id. in necrosi syphilitica, III, 190.
id. de plombo et mercurio, III, 201.
id. sulphatis zinci aluminosa, IV, 404.
id. terebinthinacea, IV, 283.
id. vaginalis emenagoga, I, 223.
id. vaginalis cum mercurio, III, 141.
Inulina, II, 227.
Inyeccion acústica, I, 419.
id. aluminosa compuesta, III, 427.
id. antiséptica, IV, 36, 173.
id. astringente, I, 117, 208; II, 63, 131, 217, 466; III, 221, 414, 427; IV, 39, 403, 407.
id. balsámica, II, 411.
id. calmante, III, 249, 294, 316.
id. de cobre amoniacal, II, 123.
id. contra las carnosidades de la uretra, III, 162.
id. contraestimulante, I, 75.
id. detersiva, I, 20, 36; II, 121; III, 190, 243; IV, 121.
id. diurética, II, 193.
id. emenagoga, I, 223.
id. emoliente, I, 110.
id. escitante, I, 463, 487; II, 6.
id. contra el fimosis, II, 127.
id. de Girtanner, III, 458.
id. de cola de pescado y de mirra, II, 246.
id. contra la gonorrea, III, 182.
id. hidrargiro saturnina, III, 201.
id. hidrargiro trementinada, III, 119.
id. litontríptica, III, 485; IV, 225.
id. de mercurio, III, 161.
id. mercurial, III, 141, 188.
id. mercurial opiada, III, 199.
id. mercurial de Plenk, III, 115.

Inyeccion mercurial simple, id.
id. mucilaginosa, III, 22.
id. narcótica, I, 435; III, 277.
id. opiada, III, 315.
id. saturnina, III, 403.
id. saturnina con mirra, IV, 427.
id. sedante, III, 299, 314, 414.
id. sedante astringente, IV, 405.
id. tónica, IV, 36.
id. trementinada, IV, 281.
id. tónica, IV, 36.
id. de Whately, III, 192.
Iodato de cal, II, 516.
id. de potasa, id.
Iodo, II, 514.
Ipecacuana, II, 519.
id. amilacea, II, 520.
id. anulada, II, 519.
id. anulada mayor, id.
id. blanca, 520.
id. cenicienta, II, 519.
id. estriada, II, 520.
id. gris blanca, II, 519.
id. gris cenicienta, II, 520.
id. gris negruzca, II, 519.
id. gris roja, id.
Ipecacuana gris rojiza, id.
id. glizirrizada, II, 520.
id. negra, id.
id. parda, II, 519.
Iris florentina, III, 31.
id. fœtidisima, id.
id. germanica, III, 35.
id. nostras, id.
id. palustris, id.
id. pseudacorus, id.
id. versicolor, III, 32.
Isatis tinctoria, I, 340.
Isólusina, III, 450.
Iva, I, 511.
id. arthritica, id.
id. moscada, I, 511.
Izavinum, IV, 117.

J.

Jabon de aceite de croton tiglio, II, 183.
id. de aceite de trementina y de potasa, IV, 304.
id. acético etéreo, III, 522.
id. ácido, I, 98.
id. ácido de Achard, I, 98.
id. ácido sulfúrico, id.
id. de Alicante, III, 515.
id. amoniacal, I, 231.
id. amoniacal alcanforado, I, 233.
id. animal, III, 516.
id. animal aromático, id.
id. antiflogístico y resolutivo, III, 417.
id. antimonial, I, 318.
id. antisialagogo de Singer, III, 462.
id. aromático, III, 519.
id. artrítico de Pott, IV, 303.
id. de cacao, III, 516.
id. calcáreo, I, 487.
id. de cera, IV, 219.
id. doméstico, III, 515.
id. estibiado, I, 318.
id. de eter acético, III, 522.
id. de goma amoniaco, II, 386.
id. de goma guta, II, 395.
id. de guayaco, II, 425, 429.
id. de jalapa, II, 538.
id. medicinal, III, 315.
id. de medula, III, 516.
Jabon de medula de vaca amoniacal y alcanforado, I, 233.
id. mercurial, III, 228.
id. mercurial de Chaussier, III, 229.
id. mercurial volátil, III, 129.
id. negro, III, 515.
id. de Starkey, IV, 304.
id. sulfurado de sosa, IV, 220.
id. trementinado, IV, 305.
id. de tuétano de vaca, III, 516.
id. vegetal, II, 387; III, 468.
id. de Venecia, III, 515.
id. de vidrio, III, 81.
id. de Wologd, III, 515.
Jacea, II, 544.
id. nigra, id.
Jalapa, II, 259.
Jalapa, II, 529.
id. alba, III, 301.
Jalapina, II, 529.
Jalapium, id.
Jamaicina, II, 372.
Janipha manihot, IV, 258.
Jarabe de abedul, I, 1.
id. de acederas, I, 7.
id. de acederilla, I, 8.
id. de acetato de morfina, III, 250.
id. de ácido cítrico, I, 64.
id. de ácido fosfórico, I, 66.
id. de ácido hidroclórico, I, 81.
id. de ácido hidrociánico, I, 71.
id. de ácido sulfúrico, I, 95.
id de ácido tartárico, 103.

Jarabe de adormideras, I, 111.
id. de adormideras anisado, I, 114.
id. de adormideras azafranado, I, 113.
id. de agenjos, I, 123.
id. de agenjos cidoniado, id.
id. de agracejo, I, 136.
id. de agraz, IV, 346.
id. de agua, I, 395.
id. de achicorias, I, 12.
id. de achicorias compuesto, id.
id. de achicorias con ruibarbo, IV, 134.
id. de ajos, I, 138.
id. alcalino, III, 470.
id. de almáciga, I, 177.
id. de almendras, I, 82.
id. de amapolas, I, 213.
id. amigdalino, I, 182.
id. amoniacal, I, 377.
id. de amoniaco compuesto, I, 223.
id. anodino, II, 292.
id. antihelmíntico, I, 123.
id. antiartrítico, II, 243.
id. antiescorbútico, IV, 63.
id. antiescorbútico de Portal, III, 196.
id. antiescrofuloso, III, 359.
id. antihidrópico, II, 243.
id. antisifilítico y depurativo de Larrey, III, 271.
id. antivenéreo de san Ildefonso, III, 192.
id. aperitivo, I, 342.
id. de apio, id.
Jarabe de apio compuesto, id.
id. de aquilegia, I, 345.
id. de arandano, id.
id. aromático, I, 367.
id. agrio, I, 346.
id. de artemisa, I, 367.
id. de artemisa compuesta, id.
id. de arrayan, I, 355.
id. astringente, IV, 66.
id. astringente de Foubert, III, 245.
id. de azafran acuoso, I, 387.
id. de azafran vinoso, id.
id. de azofaifas, I, 393.
id. balsámico, I, 416.
id. balsámico pectoral, I, 423.
id. de bálsamo de Copaiba, I, 411.
id. de bálsamo del Perú, I, 417.
id. de bálsamo de Tolú, I, 421.
id. de beleño, I, 434.
id. de belis, I, 444.
id. de belladona, I, 447.
id. de Bellet, III, 214.
id. de benjui, I, 448.
id. béquico, III, 464.
id. de betónica, I, 460.
id. de berros, I, 458.
id. bizantino, I, 343.
id. de botris compuesto, I, 468.
id. de borraja, id.
id. de Boullay, IV, 33.
id. de Boyle, II, 172.
id. de brionia, I, 471.
id. de buglosa, I, 473.
id. de calabaza, I, 479.
id. de cálamo aromático, I, 482.
Jarabe calibeado, II, 467, 494.
id. de canela acuoso, I, 529.
id. de canela vinoso, I, 530.
id. de canela alcohólico, I, 491.
id. de cantueso, II, 18.
id. de cantueso compuesto, id.
id. de caracoles, II, 347.
id. de cardiaca, I, 530.
id. de cardo santo, II, 31.
id. de cártamo solutivo, I, 142.
id. de cascarilla, II, 38.
id. de catecú, II, 63.
id. de centaura menor, II, 78.
id. de china compuesto, II, 88.
id. cianico, I, 71.
id. de cicuta, II, 91.
id. de cidra, II, 104.
id. de cinconina, II, 110.
id. de claveles, II, 114.
id. de cloruro de oro y de sodio, III, 359.
id. del cocinero, IV, 386.
id. de coclearia, II, 143.
id. de coclearia compuesto, II, 143; IV, 63.
id. de colchico, II, 155.
id. comun, I, 395.
id. de consuelda, id.
id. de consuelda compuesto, II, 172.
id. de consuelda mayor, II, 171.

Jarabe de contrayerba, II, 175.
id. de contrayerba compuesto, II, 176.
id. contra la coqueluche, II, 172.
id. de coral, I, 396, 508.
id. de coralina, II, 179.
id. de corteza de cidra acuoso, II, 105.
id. de corteza de cidra vinoso, id.
id. de corteza de cidra, II, 106.
id. de corteza de naranja alcohólico, III, 273.
id. de corteza de naranja acuoso, III, 265.
id. de corteza de naranja vinoso, III, 266.
id. de cuisinier (véase *jarabe del cocinero*).
id. de culantrillo compuesto, II, 187.
id. de culantrillo de Montpeller, II, 186.
id. depurativo, IV, 386.
id. depurativo amargo, IV, 64.
id. depurativo de Majault, I, 223.
id. de Dessesarts, II, 527.
id. diacodion, I, 111.
id. de dictamo, II, 200.
id. de digital, II, 195.
id. doméstico, II, 277.
id. drástico, II, 243.
id. emético, I, 332.
id. emético de Angel Sala, id.
id. emético de Glaubero, I, 333.
Jarabe de emetina, II, 215.
id. emulsivo, I, 182.
id. de énula, II, 230.
id. de erisimo, II, 236.
id. de erisimo compuesto, id.
id. de escamonea, II, 243.
id. escelotyrbico, I, 458.
id. de escila acetoso, II, 259.
id. de escila acuoso, II, 252.
id. de escila compuesto, id.
id. de escordio, II, 264.
id. espectorante, II, 525.
id. de espigelia, II, 275.
id. de espino serval, II, 277.
id. esplénico, I, 343.
id. de éter sulfúrico, II, 304.
id. de flores de ciruelo silvestre, II, 113.
id. de flores de melocoton, I, 144.
id. de flores de naranjo, III, 262.
id. de frambuesas, II, 318.
id. de fresas, II, 320.
id. de fumaria, II, 323.
id. de gengibre, II, 369.
id. gencianina, II, 367.
id. de goma amoniaco acuoso, II, 377.
id. de goma amoniaco vinoso, id.
id. de goma arábiga, II, 389.
id. de granada, II, 409.
Jarabe de grosellas, II, 414.
id. de grosellas negras, II, 415.
id. de guayaco, II, 424.
id. de guindas, II, 433.
id. de hidrocianato de potasa, I, 73.
id. de hígado de azufre, III, 464.
id. de hipericon, II, 502.
id. de hisopo, II, 508.
id. de hisopo compuesto, id.
id. de hisopo escilítico, id.
id. de china compuesto, II, 88.
id. incisivo, II, 525.
id. de iodo, II, 515.
id. de ipecacuana, II, 528.
id. de ipecacuana acuoso, II, 525.
id. de ipecacuana compuesto, II, 527.
id. de jalapa, II, 541.
id. de karabe, III, 316.
id. de kermes animal, III, 1.
id. de larga vida, III, 110.
id. laxante, III, 80.
id. de Lescure, IV, 40.
id. de limon, II, 106.
id. de limon compuesto, II, 107.
id. de liquen islandico, III, 26.
id. de lombarda, I, 455.
id. de lupulina, III, 42.
id. de llanten, III, 43.
id. de madreselva, III, 47.
id. de malvavisco, III, 68.

Jarabe de malvavisco compuesto, III, 69.
id. de maná, III, 79.
id. de maná compuesto, III, 80.
id. de manzanas, III, 94.
id. de manzanas compuesto, IV, 199.
id. de manzanas con eléboro, II, 211.
id. de manzanilla, III, 90.
id. marcial, II, 492.
id. de marrubio, III, 97.
id. de membrillos, III, 108.
id. de menta piperita, IV, 362.
id. de menta piperita vinoso, IV, 363.
id. mercurial, III, 113.
id. mercurial de Cheron, III, 193.
id. mercurial gomoso de Lagneau, III, 114.
id. de mercurio, III, 113.
id. de mercurio y goma, id.
id. de mercurio soluble de Hahneman, III, 212.
id. de mil en rama, III, 232.
id. de mil pies, III, 235.
id. de mirtilo, III, 245.
id. de moras, III, 246.
id. de moras arboreo, III, 26.
id. de nenufar, id.
id. de nuez moscada, III, 256.
id. de ninfea, III, 278.
id. de opio, III, 314.
id de opio alcoholico, III, 298.
id. de opio emulsivo, III, 315.
id. de opio succinado, III, 316.
Jarabe de opio vinoso, III, 291.
id. de horchata, I, 182.
id. de oro, III, 358.
id. de ortigas, III, 362.
id. de pasas, IV, 346.
id. pectoral, II, 262; III, 315.
id. pectoral de Courti, II, 525.
id. pectoral dulcificante, III, 86.
id. pectoral inglés, I, 114.
id. pectoral de Maluet, III, 316.
id. pectoral succinado, id.
id. de peonía, III, 376.
id. de peucedan, III, 386.
id. de poligala glicirrizado, III, 452.
id. de poligala moscado, id.
id. de poligala de Virginia, id.
id. de primula, III, 527.
id. de pulmones de ternera, II, 347.
id. de quina acuoso, IV, 37.
id. de quina vinoso, IV, 46.
id. de quinina, IV, 57.
id. de rábanos, IV, 65.
id. de rábanos compuesto, IV, 63.
id. de las cinco raices aperitivas, I, 342.
id. de regaliz, IV, 80.
id. resolutivo, I, 335.
id. de rosas blancas, IV, 105.
id. de rosas compuesto, IV, 106.
id. de rosas rojas, IV, 105.
Jarabe de rosas simple, IV, 106.
id. de rosas solutivo, id.
id. de ruibarbo, IV, 133.
id. de ruibarbo alcalino, IV, 138.
id. de ruibarbo aromático, IV, 134.
id. de ruibarbo compuesto, id.
id. de sasafras, I, 470; IV, 170.
id. de sauco, IV, 174.
id. de sen, IV, 198.
id. de sen compuesto, IV, 199.
id. de siempre viva, IV, 213.
id. simple, I, 395.
id. solutivo, IV, 199.
id. de Stevery, IV, 385.
id. sudorífico y depurativo, IV, 386.
id. de sulfato de morfina, III, 249.
id. de sulfato de quinina, IV, 57.
id. de sulfato de quinina compuesto, id.
id. sulfurético, I, 256.
id. de sulfuro de potasa, III, 464.
id. de tabaco, IV, 145.
id. de tartrato de mercurio, III, 228.
id. de te de Mégico, IV, 263.
id. de torongil, IV, 273.
id. de tridacio, IV, 318.
id. de trifolio acuático, IV, 319.
id. de trifolio acuático compuesto, id.
id. de tusílago, IV, 324.

Jarabe de uvas, IV, 346.
id. de vainilla, IV, 338.
id. de valeriana, IV, 329.
id. vermífugo, II, 179.
id. vermífugo y purgante, IV, 207.
id. de verónica, IV, 344.
id. de vinagre, I, 53.
id. de vinagre antimoniado, I, 332.
id. de vinagre y de frambuesas, I, 53.
id. de violetas, IV, 350.
id. de violetas solutivo, IV, 351.
id. vitriólico ácido, I, 95.
id. de víboras, II, 347.
id. de yedra terrestre, IV, 358.
id. de yerba buena, IV, 361.
id. de zarza de la plata, IV, 371, 375.
id. de zarzaparrilla, IV, 378.
id. de zarzaparrilla compuesto, IV, 386.
id. de zarzaparrilla y de guayaco, IV, 385.
id. de zarzaparrilla y de sen compuesto, IV, 386.
id. de zarzaparrilla vinoso, II, 387.
id. de zumo de naranja, III, 261.
id. de zumo de cidra, II, 106.
Jasminum, II, 544.
id. officinale, id.
Jaramago, II, 238.
Jazmin, II, 544.
id. comun, id.
Judia, II, 545.
id. comun, id.
Juglans, III, 279.
Juglans cinerea, III, 279.
id. regia, id.
Jugo de acederilla, I, 10.
id. de agracejo, I, 135.
id. de agraz, IV, 346.
id. de achicorias, I, 11.
id. antiescorbútico, II, 146.
id. de arandano, I, 346.
id. de bayas de espino serval, II, 276.
id. de bayas de sauco, IV, 174.
id. de becabunga, I, 430.
id. de berros, I, 458.
id. de borraja, I, 467.
id. de brionia, I, 471.
id. de buglosa, I, 472.
id. de cicuta, II, 91.
id. de cidra, II, 103.
id. de coclearia, II, 142.
id. de coclearia compuesto, id.
id. de cohombro II, 150.
id. de cohombro silvestre, id.
id. de diente de leon, IV, 259.
id. diurético, IV, 59.
id. de bayas de espino serval, II, 276.
id. de flores de melocoton, I, 143.
id. de frambuesas, II, 318.
id. de fresas, II, 320.
id. de fumaria, II, 322.
id. de grama, II, 405.
id. de granada, II, 409.
id. de grosellas, II, 413.
id. de grosellas negras, II, 415.
id. de guindas, II, 433.
id. de kermes, III, 1.
Jugo de llanten, III, 43.
id. de manzanas, III, 95.
id. de membrillos, III, 108.
id. de mil en rama, III, 231.
id. de moras, III, 246.
id. de naranja, III, 260.
id. de perifollo, III, 383.
id. de prunela, I, 470.
id. de pulmonaria, III, 528.
id. de regaliz, IV, 72.
id. de regaliz anisado, id.
id. de regaliz de Blois, IV, 75.
id. de regaliz depurado, IV, 72.
id. de regaliz gomado, id.
id. de rosas blancas, IV, 100.
id. de saponaria, IV, 167.
id. temperante y diurético, III, 383.
id. de trifolio acuático, IV, 319.
id. de violetas, IV, 349.
Julapium acidulatum, II, 301.
id. acidum, I, 96.
id. æthereum, II, 304.
id. è camphora, I, 149.
id. è camphora cum aceto, I, 150.
id. camphoratum, I, 149.
id. moschatum, I, 194.
id. moschi, id.
id. regium, IV, 112.
id. rosarum, id.
id. rosatum, id.

Julapium sambucinum, IV, 178.
id. sistens, III, 352.
id. stomachicum, III, 472.
id. succinatum, IV, 237.
id. violarum, IV, 349.
Julepe ácido, I, 80.
id. acídulo, II, 301.
id. alcanforado, I, 149.
id. anodino, I, 114.
id. antelmíntico, IV, 217.
id. antiespasmódico, II, 306.
id. antihemorrágico, I, 96.
id. antihistérico, I, 194; IV, 123.
id. astringente, I, 210; III, 352.
id. calmante, III, 211, 294, 426, 471.
id. diatartareum, IV, 207.
id. diurético, IV, 299.
id. emenagogo, I, 390.
id. escilítico, II, 261.
id. escocés, I, 422.
id. espectorante, I, 114.
id. estomacal, III, 472.
id. etéreo, II, 304.
id. fétido (véase *mistura fétida*).
id. gomoso, II, 391.
id. hidragogo, I, 340.
id. de menta, V, 368.
id. de Mitrídates, III, 332.
id. moscado, I, 194.
id. nitroso, I, 90.
id. con ogimiel, I, 53.
id. pectoral, II, 368, 391.
id. purgante, II, 540.
id. refrigerante, I, 103; II, 104; III, 485.
id. rosado, IV, 112.
id. de sauco, IV, 178.
id. succinado, IV, 237.
Julepe sudorífico, I, 261.
id. temperante, III, 487.
id. violado, IV, 349.
id. vitriólico, I, 96.
Juncia, II, 545.
id. avellanada, id.
id. larga, id.
id. olorosa, id.
id. redonda, id.
Junco aromático, id.
id. oloroso, id.
Juncus odoratus, id.
Juniperus communis, II, 220; IV, 163.
id. lycia, II, 513; IV, 163.
id. phœnicea, II, 513.
id. oxycedrus, IV, 163.
id. sabina, IV, 144.
id. thurifera, II, 513.
id. virginiana II, 220.
Jupiter, II, 286.
Jusculum helicinum, II, 245.
id. lientericum, II, 350.
id. siccum, II, 353.
id. viperæ, II, 345.
id. viperinum, id.
Justitia Adhatoda, I, 107.

K.

Kadmium, III, 477.
Kæmpferia galanga, II, 324.
id. rotunda, IV, 389.
Kali acetatum, III, 494.
id. aceticum, id.
id. carbonicum, III, 465.
id. carbonicum crudum, id.
id. carbonicum impurum, id.
id. causticum succum, III, 456.
id. citratum, II, 501.
id. nitricum, III, 481.
Kali oxalicum acidulum, III, 501.
id. præparatum, III, 465.
id. subcarbonicum crudum, id.
id. subcarbonicum purissimum, III, 466.
id. sulphurato-stibiatum, I, 322.
id. sulphuratum, III, 461.
id. sulphuricum, III, 476.
id. tartaricum, III, 502.
id. tartarisatum, id.
id. vitriolatum, III, 476.
Kalmia, III, 1.
id. de hojas anchas, id
id. latifolia, III, 1.
Kermes, id.
id. mineral, I, 306.
Ketmia ægyptiaca, I, 1.
Kikekunemalo, III, 3.
Kininum, IV, 55.
Kirschwasser, III, 28.
Krameria triandra, IV, 68.

L.

Labdano, III, 6.
Lac, III, 15.
id. ammoniacale, II, 375.
id. ammoniaci, id.
id. asæ fœtidæ, I, 374.
id. asininum, III, 15.
id. asininum artificiale, II, 346.
id. bubulum, III, 15.
id. caprinum, id.
id. ebutyratum, id.
id. guajacinum, II, 428.
id. lunæ, I, 492.
id. sulphuris, I, 397.

Lac terebinthinaceum, IV, 280.
id. terræ, III, 48.
id. vaccinum, III, 15.
id. virginis, I, 449.
Laca, II, 395.
id. en cilindros, id.
id. en granos, id.
id. en masas, id.
id. en panes, id.
Lacca, id.
id. cœrulea, IV, 271.
id. in granis, II, 395.
id. in massis, id.
id. musica, IV, 271.
id. in ramis, II, 395.
id. in ramulis, id.
id. in tabulis, id.
Laccina, II, 396.
Lacerta agilis, II, 341.
Lacryma Job, id.
Ládano (goma), III, 6.
id. en cilindros, id.
id. en masas, id.
id. en panes, id.
Ladanum gummi, id.
id. in masis, id.
id. in sortis, id.
Lagarto, II, 341.
id. marino, id.
Lágrima de Job, III, 6.
Lamium album, III, 362.
id. montanum, III, 105.
Lana philosophica, IV, 392.
Lapathum aquaticum, IV, 87.
id. crispum, id.
id. sanguineum, id.
Lapides cancrorum, I, 494.
id. cancrorum acetati, I, 507.
id. cancrorum citrati, I, 508.
id. carpionum, I, 494.
id. percarum, id.
id. spongiorum, id.
Lapilla, II, 110.
Lapilli cancrorum, I, 494.
Lapis Armenia, II, 123.
id. Bufonius, I, 501.
Lapis calaminaris, IV, 392.
id. causticus, III, 456.
id. chirurgorum, id.
id divinus, II, 127.
id. hæmatites, II, 453.
id. infernalis, III, 399.
id. infernalis alcalinus, IV, 456.
id. judaicus, I, 494.
id. lazuli, I, 201.
id. lyncis, I, 494.
id. manati, I, 502.
id. medicamentosus, I, 204.
id. miraculosus, II, 128.
id. nephriticus, III, 388.
id. ophtalmicus, II, 127.
id. porcinus, I, 461, 492.
id. pumicis, III, 389.
id. septicus, IV, 456.
id. specularis, I, 504.
id. suillus, I, 492.
id. vulnerarius externus, II, 128; IV, 405.
Lappa major, I, 423.
Lappulæ hepaticæ, I, 136.
Laserpicio, III, 7.
id. de hojas anchas, id.
id. siler, id.
Laespitium germanicum, III, 19.
id. latifolium, III, 7.
id. siler, id.
Lathyris majus, II, 58.
Láudano antihistérico, III, 311.
id cydoniado, III, 312.
id. diurético, id.
id. de Lalouette, III, 289.
id. líquido, III, 297, 301.
id. líquido de Sydenham, III, 292.
Láudano líquido de Warner, III, 304.
id. de Rousseau, III, 299.
Laudanum cinabarium, III, 157.
id. compositum, III, 291.
id. crocratum, id.
id. diureticum, III, 312.
id. liquidum, III, 291, 297.
id. liquidum compositum, III, 292.
id. liquidum Sydenhami, id.
id. Warneri, III, 304.
id. opiatum, III, 290, 308, 311.
id. opiatum cidoniatum, III, 312.
id. opiatum Rousseau, III, 299.
id. simplex, III, 308.
id. urinarium, III, 312.
Laurel, III, 7.
id. comun, id,
id. real, III, 14.
Laureola, III, 98.
Lauro ceraso, III, 14.
Laurus, III, 7.
id. camphora, I, 146.
id. cassia, I, 514.
id. cinnamomum, id.
id. culilawan, I, 187.
id. nobilis, III, 7.
id. sassafras, id.
Lavandula spica, I, 278.
id. stœchas, II, 17.
Lazuli, I, 201.
Leche, III, 15.
id. de almendras, I, 180.
id. amoniacal, II, 375.
id. amoniacal compuesta, II, 377.
id. anodina, I, 182.
id. antipsórica, I, 505.
id. artificial, I, 182.

Leche de asafétida, I, 374.
id. astringente, II, 218.
id. de azufre, I, 397.
id. de burra, III, 15.
id. de burra artificial, II, 346.
id. de cabra, III, 15.
id. diurética, IV, 280.
id. dulcificante, I, 186.
id. de guayaco, II, 428.
id. mercurial de Plenk, III, 115.
id. de montaña, I, 492.
id. para niños, III, 471.
id. pectoral, II, 274.
id. de plomo, III, 402.
id. de vacas, III, 15.
id. virginal, I, 449; III, 410, 420, 428.
Ledum palustre, IV, 88.
Legía de agenjos, III, 469.
id. de enebro, id.
id. de jaboneros, III, 454.
id. litontríptica de Saunders, III, 458.
id. de retama, III, 469.
id. de taray, id.
Lengua cerval, II, 262.
id. cervina, id.
id. de ciervo, id.
id. de perro, II, 110.
id. de serpiente, III, 16.
Lenteja, id.
Leño del Brasil, id.
id. de guayaco, II, 416.
id. de Rodas, III, 16.
id. de rosa, id.
id. santo, II, 416.
Leonurus cardiaca, II, 27.
Lepidio, III, 17.
id. de hoja ancha, id.
Lepidium iberis, id.
id. latifolium, id.
Lepus combustus, II, 22.
id. timidus, I, 495; II, 341.
Levadura de cerbeza, III, 17.
Libanus thurifera, II, 513.
Licopiadon de ciervo, III, 18.
Licopodio, id.
Licor de alcanfor artificial, id.
id. de amoniaco mercurial, III, 219.
id. de amoniaco estibiado, I, 267.
id. anodino animal, II, 296.
id. anodino marcial, II, 474.
id. anodino mineral, II, 303.
id. anodino succinado, IV, 240.
id. anodino de Triller, I, 247.
id. anodino vegetal, II, 295.
id. anodino de Vicat, I, 227.
id. antiartrítico de Ellen, I, 267.
id. antiartrítico de Sainte Marie, I, 268.
id. antiescrofuloso, I, 426, 507.
id. antiespasmódico, I, 55, 72, 266, 268.
id. antiflogístico, I, 55.
id. antinefrítico, I, 111.
id. antiodontálgico, I, 177.
id. antioftálmico, III, 230.
id. antisifilítico, III, 191.
id. antisifilítico de Chaussier, III, 215.
id. antivenéreo, III, 191.
Licor artrítico de Pott, IV, 303.
id. astringente, I, 200.
id. auricular, I, 419.
id. de Belloste, III, 213.
id. de cal muriatada, I, 506.
id. de los caribes, II, 422.
id. caterético, I, 357; II, 127.
id. de cloro estemporáneo, II, 118.
id. de cuerno de ciervo blanco, I, 266.
id. de cuerno de ciervo trementinado, I, 257.
id. de cuerno de ciervo succinado, I, 265.
id. cúprico y mercurial, II, 133.
id. desinfectante, I, 490.
id. de deuto-cloruro de mercurio, III, 187.
id. diurético, III, 236.
id. escilítico, III, 500.
id. esplénico de tártaro, III, 502.
id. estimulante y vulnerario, III, 242.
id. estíptico, II, 472.
id. etéreo marcial nítrico, II, 470.
id. exutorio, II, 7, 9.
id. febrífugo, II, 466.
id. fundente de Boyle, I, 255.
id. fundente de Libabius, II, 289.
id. fundente, III, 500.
id. contra la gangrena, I, 254.
id. de Hoffmann, II, 303.
id. hidrargiro acético, III, 227.
id. de jabon estibiado, I, 319.

Licor de jaboneros, véase *Legía*, I, 319.
id. mercurial, III, 213.
id. mercurial alcanforado, III, 191.
id. de mercurio, III, 219.
id. muriático--hidrargiro cuprico—amoniacal, II, 133. 222.
id. nervino, II, 474.
id. anodino, II, 399.
id. oftálmico, I, 36.
id. oftálmico anodino, II, 399.
id. oftálmico detersivo, I, 36.
id. probatorio de Hahnemam, I, 84.
id. probatorio de Mægling, I, 358.
id. contra el pterigion, II, 138.
id. resolutivo, II, 139; III, 119.
id. contra los sabañones, III, 416.
id. de sal de tártaro, III, 468.
id. de Spangenberg, III, 199.
id. de tártaro soluble, III, 515.
id. de tierra foliada de tártaro, III, 495.
id. de tierra foliada espirituoso, III, 499.
id. tónico, I, 216.
id. de Van—Swieten, III, 190.
id. de vegeto mercurial de Pressavin, III, 228.
id. de vino probatorio, I, 84.
id. visceral, II, 485.
Lignum agallochi veri, III, 365.
id. agallochium, id.
Lignum aquillæ, III, 365.
id. aspalathi, id.
id. benedictum, II, 416.
id. Brasilianum, I, 512; III, 16.
id. Brasiliense, III, 16.
id. buxi, I, 469.
id. campechianum, I, 512.
id. campescanum, id.
id. cedrisnum, II, 220.
id. cœruleum, I, 512.
id. colubrinum, III, 366.
id. Coryli, I, 384.
id. ebenum, II, 205.
id. Fernambuci, III, 16.
id. guajaci, II, 416.
id. Indicum, id.
id. juniperi, II, 220.
id. nephriticum, III, 366.
id. panavæ, II, 183.
id. pavonæ, id.
id. moluccanum, id.
id. moluccense, id.
id. Rhodii, III, 16.
id. sanctum, II, 416.
id. santali albi, IV, 161.
id. santali rubri, id.
id. santali citrini, id.
id. sappan, I, 512.
id. sassafras, IV, 169.
Ligústico, III, 19.
Ligusticum, id.
id. levisticum, id.
id. meum, III, 110.
id. ægypciacum, I, 145.
id. vulgare, I, 174.
Licher cinerus terrestris, III, 23.
id. islandici, III, 24.
Lilium candidum, I, 394.
id. convallium, III, 35.
Limaduras de estaño, II, 286.
id. de hierro preparadas, II, 440.
Limatura chalybis, II, 440.
id. ferri, II, id.
id. martis, id.
id. martis depurata, id.
id. martis preparata, id.
id. martis purificata, id.
id. Stanni, II, 286.
Limonada alcohólica, I, 169.
id. de cremor tártaro, III, 503.
id. emetizada, I, 332.
id. fosfórica, I, 66.
id. laxante, III, 512.
id. mineral, I, 80, 96.
id. nítrica, I, 90.
id. seca, I, 64, 102.
id. sulfúrica, I, 96.
id. tartárica, I, 103.
id. vegetal, II, 103.
id. vinosa, IV, 348.
Linaria, III, 19.
id. bastarda, id.
id. comun, id.
id. oficinal, id.
Linaria cymbalaria, II, 108.
id. spuria, III, 19.
id. vulgaris, id.
Linctus acidus, III, 109.
id. albus, I, 184.
id. amygdalinus, id.
id. antisyphiliticus, III, 221.
id. aperiens, III, 78.
id. ad aphtas, IV, 228.
id. de borace, id.
id. camphoraceus, I, 148.
id. cetacei, II, 274.
id. communis, II, 274; IV, 103.
id. demulcens, I, 185.
id. emeticus, I, 336.
id. emolliens, I, 185.
id. expectorans, II, 260.
id. gelatinosus nutriens, II, 351.

Linctus ad gingivas, III, 243.
id. laxans, II, 41.
id. leniens, II, 399.
idi mannatus, III, 78.
id. mesembryanthemi crystallini, IV, 371.
id. oleosus, I, 185.
id. oxymuriatis calcici, I, 491.
id. refrigerans, III, 485.
id. saponaceus, III, 518.
id. saponatus, id.
id. ad stomacacen, I, 491.
id. subadstringens, II, 63.
id. vermifugus, IV, 328.
Lingua avis, II, 321.
id. bovis, I, 473.
id. cerbina, II, 262.
id. serpentaria, III, 16.
Linimento acetico, III, 522.
id. afrodisiaco, I, 418.
id. de agenjos, I, 125.
id. alcalino, III, 471.
id. alcanforado, I, 156, 231.
id. alcanforado jabonoso, id.
id. alcanforado opiado, III, 303.
id. aluminoso, I, 209.
id. amigdalino, I, 179.
id. amoniacal, I, 231.
id. amoniacal alcanforado, I, 232, 248.
id. amoniacal de cantáridas, II, 7.
id. amoniacal etéreo, I, 236.
id. amoniacal estibiado, I, 334.
id. amoniacal fétido, I, 233.
Linimento amoniacal opiado, I, 233.
id. de amoniuro de mercurio, III, 206.
id. contra la angina, I, 266.
id. anodino, III, 294, 303, 304, 317.
id. anodino y resolutivo, I, 434.
id. antiaftoso, I, 209.
id. antiartritico, I, 232, 248; IV, 307.
id. antielmintico, II, 160.
id. antiespasmodico, III, 294.
id. antihemorroidal, I, 441; III, 20; IV, 284.
id. antiherpetico, II, 447.
id. antihisterico, III, 420.
id. antioftalmico, I, 208; II, 454; III, 407.
id. antipleuritico, III, 523.
id. antipsorico, I, 488.
id. antireumatico, IV, 304.
id. arsenical, I, 361.
id. antivenereo, III, 130.
id. baritico, I, 428.
id. blanco, II, 271.
id. calcareo, I, 487.
id. calcareo opiado, I, 488.
id. calmante, I, 156.
id. de cantáridas, II, 8.
id. de cobre, II, 135.
id. demulcente, II, 71.
id. digestivo, IV, 284.
id. diurético, II, 224, 250; IV, 299.
id. emoliente, I, 188.
id. para las encías, III, 241.
id. de enebro, II, 224.
id. depilatorio, I, 358.
Linimento escitante, I, 231; III, 258.
id. espirituoso, I, 247.
id. espirituoso anodino, III, 304.
id. estimulante, II, 3.
id. estomacal, IV, 92.
id. etereo, III, 8, 523.
id. escitante, I, 153, 231; II, 14; III, 300.
id. escitante alcanforado, II, 7.
id. escitante aromático, id.
id. escitante etereo, id.
id. escitante trementinado, id.
id. fosforado, II, 316.
id. fosforado alcanforado, II, 311.
id. de goma amoniaco, II, 377.
id. hydrargiro-acetoso, III, 226.
id. irritante, I, 238.
id. irritante jabonoso, II, 8.
id. de jabon etereo, III, 522.
id. jabonoso, III, 521; IV, 521.
id. jabonoso alcoholico, III, 519.
id. jabonoso alcanforado, III, 521.
id. jabonoso amoniacal, I, 233.
id. jabonoso hydro-sulfúrico, III, 463.
id. jabonoso de Kemp, IV, 521.
id. mamilar, I, 418.
id. mercurial, III, 114.
id. mercurial amoniacal, III, 129.
id. mercurial amoniacal alcanforado, id.
id. mercurial opiado, III, 130, 295.
id. narcótico, III, 294.
id. negro, II, 337.

Linimento oleoso-calcáreo, I, 487.
id. opiado, III, 293, 300, 313, 314, 420.
id. opiado alcanforado, III, 294.
id. opiado jabonoso, IV, 522.
id. de opio con hiel de ternera, III, 319.
id. de petróleo, III, 385.
id. de pez, III, 387.
id. refrigerante, II, 272.
id. resolutivo, I, 148, 248, 463, 491; II, 14; IV, 303.
id. rubefaciente, II, 7.
id. sedante, III, 294, 313.
id. sedante alcanforado, III, 303.
id. sedante etéreo, III, 307.
id. de sub-carbonato de amoniaco, I, 248.
id. de sulfuro de cal, I, 490.
id. de sulfuro jabonoso, IV, 220.
id. de tabaco, IV, 246.
id. contra la tiña, I, 233.
id. trementinado, IV, 301.
id. trementinado etéreo, IV, 294.
id. vermífugo, IV, 257.
id. volátil, I, 231.
id. volátil alcanforado, I, 232.
Linimentum acetatis cupri-ci, II, 120.
id. æruginis, id.
id. æthericum, III, 522.
id. album, II, 271.
id. aluminosum, I, 208, 209.
Linimentum ad ambustiones, I, 487.
id. ad ambustiones cum opio, I, 488.
id. ammoniacæ, I, 231.
id. ammoniacatum, id.
id. ammoniacatum mixtum, I, 248.
id. ammoniæ, I, 231.
id. ammoniæ et antimonii tartarisati, I, 334.
id. ammoniæ subcarbonatis, I, 248.
id. ammoniato-æthereum, I, 237; II, 7.
id ammoniato-aromaticum, I, 238; II, 7.
id. ammonicum, I, 231.
id. ammoniæ fœtidum, I, 233.
id. ammoniæ opiatum, id.
id. amygdalinum, I, 179.
id. anglicanum, I, 231.
id. anodynum, I, 233; III, 304, 522.
id. antiarthriticum, I, 416.
id. antiherpeticum, II, 447.
id. antipleuriticum, III, 523.
id. antispasticum, I, 233.
id. ad aphtas, IV, 228.
id. ex aqua calcis, I, 487.
id. aromaticum, II, 280.
id. aromaticum stimulans, IV, 92.
id. ad arthrodiniam, II, 14.
id. balsami Peruviani, I, 416.
id. boracis, IV, 228.
id. de borate, id.
id. boraxatum, id.
Linimentum calcariæ sulphuratæ, I, 490.
id. calcinum, I, 487.
id. calcinum cum opio, I, 488.
id. calcis, I, 487.
id. camphoræ compositum, I, 226, 232.
id. camphoratum, I, 156; III, 304.
id. cepæ, II, 73.
id. diureticum gastro-scilliticum, II, 250.
id. farinaceum cum pice, III, 387.
id. ex felle tauri, I, 463.
id. gingivale, I, 81; II, 61.
id. gingivale mundificans, III, 240.
id. gingivale roborans, II, 61.
id. gummoso-balsamicum, I, 418.
id. hydrargyri, III, 129.
id. incitans, I, 153.
id. irritans, II, 7.
id. juniperum, II, 224.
id. opiatum, III, 522.
id. petrolei ammoniatum, I, 231.
id. phosphoreum camphoratum, II, 317.
id. plumbatum, III, 417.
id. resolvens, I, 247, 419; IV, 303.
id. resolvens et diureticum, II, 224.
id. rubefaciens, III, 252.
id. saponaceum, I, 233; III, 521.
id. saponato-ammoniatum, I, 233.
id. saponato-camphoratum, I, 233; III, 523.

Linimentum saponis, III, 521, 523.
id. saponis camphoratum, I, 233; III, 521.
id. saponis compositum, I, 233; III, 304, 521.
id. saponis cum opio, III, 304, 522.
id. saturnino-querci-num, III, 428.
id. simplex, II, 83.
id. stimulans, IV, 305.
id. de sulphuræ, I, 403.
id. tabaci, IV, 246.
id. terebinthino-ammoniatum, I, 232.
id. volatile, I, 231.
id. volatile cum camphora, I, 232.
id. volatile camphoratum, id.
Lino, III, 20.
id. ordinario, id.
id. purgante, id.
Linum, id.
id. catharticum, id.
id. purgativum, id.
id. usitatisimum, id.
Liquamen martis, II, 471.
id. myrrhæ, III, 242.
id. salis tartari, III, 468.
Liquen, III, 23.
id. blanco de nieve, id.
id. de ciruelo, III, 25.
id. de embudo, III, 24.
id. entrelazado, id.
id. de fuego, III, 23.
id. islándico, III, 24.
id. parietimo, III, 25.
id. de perres, III, 24.
id. pulmonar, III, 25.
Liquidambar orientale, II, 289.
Líquido (véase *licor*), id.
Liquiritia, IV, 71.
id. cocta citrina, IV, 76.
Liquor acetatis ferri ætherea, II, 482.
id. acetatis plumbi basicæ, III, 411.
id. acidi muriatici oxigenati, II, 117.
id. acidus Halleri, I, 98.
id. adstringens, IV, 404.
id. æri cinnamomatus, II, 126.
id. ætherens oleosus, II, 304.
id. æthereus sulfuricus, II, 303.
id. alcali volatilis acetis, I, 257.
id. alcali volatilis compositus, I, 267.
id. alexiterius acetatis, I, 51.
id. alexiterius extemporaneus, II, 118.
id. alexiterius oxigenatus, II, 117.
id. ex ammonia et oleo succini, I, 236.
id. ammoniacalis cum aceto, I, 256.
id. ammoniæ anisatus, I, 225.
id. ammoniæ puræ, I, 218.
id. ammoniæ spirituosus, I, 223.
id. ammoniæ sub carbonicæ, I, 239.
id. ammoniato stibiatus, I, 267.
id. ammonii acetici, I, 257.
id. ammonii carbonici aquosus, I, 239.
id. ammonii caustici, I, 218.
id. ammonii hydiothiodis, I, 255.
id. ammonii puri, I, 218.
id. ammonii pyro-oleosi, I, 241.
id. ammonii pyro-oleosi succini, I, 265.
Liquor ammonii sub-carbonici aquosus, I, 239.
id. ammonii succinici, I, 265.
id. ammonii sulphureti, I, 255.
id. ammonii tartarici, I, 268.
id. ammonii vinosus, I, 223.
id. anodynus martialis, II, 474.
id. anodynus mineralis Hoffmanni, II, 303.
id. anodynus mineralis martialis, II, 474.
id. anodynus topicus, I, 247.
id. anodynus vegetabilis, II, 295.
id. antiarthriticus, II, 423.
id. antimonii tartarisatus, I, 328.
id. antimonii tartarisati, I, 329.
id. aperitivus, III, 511.
id. ad aphtas, IV, 229.
id. argenti muriatico-ammoniati, III, 401.
id. aromaticus saponato-ammoniatus, I, 247.
id. arthriticus Elleri, I, 267; IV, 303.
id. arthriticus Potti, IV, 303.
id. æruginis, II, 127.
id. balsamico-aromaticus, IV, 95.
id. baryticus, I, 427.
id. Bellosti, III, 213.
id. calcis muriatis, I, 506.
id. carbonatis ammoniæ, I, 239.
id. ad condylomata, III, 191, 201.
id. cornu cervi alcalinus, I, 241.

Liquor cornu cervi tartarisatus, I, 268.
id. cornu cervi terebinthinatus, I, 257.
id. cornu cervi volatilis, I, 241.
id. cupri ammoniati, II, 130.
id. cupri ammonio-muriatici, II, 132.
id. digestivus Boerhaavii, III, 495,
id. discuciens, I, 54.
id. enixus, I, 250.
id. excitans, I, 236.
id. exutorius, II, 9.
id. ferri alcalini, II, 457.
id. hydrargyri ammoniati, III, 219,
id. hydrargyri camphorati, III, 191.
id. hydrargyri muriatici corrosivi, III, 187.
id. hydrargyri nitrici, III, 213.
id. hydrargyri oximuriati, III, 190.
id. hydrogenii sulphurata, I, 84.
id. hydro-sulphureticoacidulus, id.
id. hydro—sulfureticum liquidum, id.
id. hydro-sulphureticus pro balneo, I, 86.
id. kali acetici, III, 495.
id. kali acetici cum rheo, III, 490.
id. kali carbonici, III, 468.
id. kali caustici, III, 454.
id. kali subcarbonici, III, 468.
id. kæchlini, II, 132.
id. de Lamote, II, 474.
id. martialis, id.
Liquor mercurialis, III, 187.
id. Mindereri, I, 257.
id. muriatis deutoxidohydrargyro—calcarei, III, 142.
id. muriatis ferri, II, 473.
id. muriatis hydrargyri, III, 187.
id. muriatis hydrargyri ammoniacalis, III, 219.
id. myrrhæ, III, 242.
id. myrrhæ alcalisatus, id.
id. ad nephritidem calculosam, I, 111.
id. nervinus Bangli, I, 152.
id. nitratis hydrargyri, III, 213.
id. ad odontalgiam, I, 177.
id. olei animalis et cajeputi, I, 9.
id. oleosus Sylvii, I, 227.
id. ophthalmicus roborans, I, 36.
id. ad pannum oculorum consumendum, II, 138.
id. ad perniones, III, 416.
id. plumbi subacetatis, III, 411.
id. plumbi subacetatis dilutus, III, 415.
id. potasæ, III, 454.
id. potasæ arseniatis, I, 362.
id. potasæ causticæ, III, 454.
id. probatorius Wirtembergicus, I, 358.
id. pyro-tartareus, I, 93.
id. pyro-tartaricus, id.
id. salinus laxativus, III, 511.
Liquor salis alcali vegetabilis acetati, III, 495.
id. salis tartari, III, 468.
id. saponis stibiati, I, 319.
id. spleneticus ex tartari, III, 502.
id. stibiatus cum aconito, I, 106.
id. stipticus, I, 200; II, 472.
id. stipticus Weberi, II, 467.
id. subacetatis lithargyri, III, 411.
id. succinicus anodynus, IV, 240.
id. Swietenii, III, 190.
id. syphilliticus Turneri, id.
id. tartari solubilis, III, 502, 515.
id. tartari solubilis Chalybeati, II, 495.
id. tartari stibiati, I, 329.
id. tartari tartarisati, III, 503.
id. tartari vegetabilis, III, 495.
id. tartratis ammoniaci, I, 268.
id. terræ foliatæ, III, 495.
id. terræ foliatæ tartari, id.
id. terræ ponderosæ salitæ, I, 426.
id. ad ulcera atonica, III, 493.
id. ad ulcera fauciuin, III, 243.
id. ad ulcera oris, II, 122.
id. vini probatorius Hahnemanni, I, 84.
id. vulnerarius, II, 491; IV, 295.

Liquor vulnerarius vegetalis Dippelii, III, 234.
Lirio, III, 31.
id. de Alemania, III, 35.
id. fétido, III, 31.
id. de Florencia, id.
id. ilírico, id.
id. de los valles, I, 383; III, 35.
id. variado, III, 32.
Liriodendro tulipifera, III, 38; IV, 7.
Liriodendron tulipifera, III, 38.
Litargirio, III, 403.
id. de plata, id.
id. de oro, id.
Lithargyrium, id.
Lithargyrum, id.
Lithargyrus, id.
Lithospermum, III, 38.
id. officinale, id.
Litontriptico de Tulp, II, 6.
Litospermo oficinal, III, 38.
Litus ad hæmorroides, I, 441.
id. hydrargyri, III, 199.
Lixivia acetata, III, 494.
id. caustica, III, 454.
id. purificata, III, 465.
id. vitriolata, III, 476.
Lixivium ammoniacale, I, 218.
id. ammoniacale anisatum, I, 225.
id. ammoniacale aromaticum, I, 227.
id. ammoniacale causticum, I, 218; IV, 219.
id. ammoniacale vinosum, I, 223.
id. causticum, III, 454.
id. causticum vegetabile, id.
id. kali vegetabilis, id.
id. magistrale, III, id.
id. martis, II, 471.
Lixivium mater salis marini, I, 505.
id. saponarium, III, 454.
id. sodæ, IV, 219.
id. tartari, III, 468.
Lobaria pulmonaria, III, 25.
Lobelia, III, 39.
id. hinchada, id.
id. sifilítica, id.
Locion alcoholica, id.
id. alcoholica jabonosa, III, 519.
id. anodina, I, 111.
id. antipsorica, I, 85; III, 161.
id. antiraquítica de Baudomme, III, 469.
id. antiseptica, III, 426; IV, 35, 36.
id. astringente, I, 169; III, 414, 425; IV, 394.
id. desecante, III, 201.
id. eleborada, II, 213.
id. escitante, I, 331; IV, 232.
id. fagedénica, III, 243.
id. hydrocianica, I, 71.
id. hydro-sulfurada, I, 85.
id. mercurial, III, 188.
id. mercurial de Alibert, id.
id. mercurial de Manvry, III, 214.
id. mercurial negra, III, 40.
id. resolutiva, III, 416.
id. sedante, I, 110.
id. contra los sabañones, I, 226.
id. contra la tiña, I, 487; IV, 220.
id. vinosa, IV, 347.
Lombrices de tierra, II, 342.
Lombriguera, IV, 255.
Lonicera periclymenum, 47.
Looc alcanforado, I, 148.
id. de almendras, I, 78.
id. de almidon, II, 63.
id. anisado, I, 287.
id. antiasmatico, II, 249, 378.
id. anticatarral, II, 298.
id. antihelmintico, IV, 217.
id. antisifilítico, III, 221.
id. astringente, II, 63.
id. azafranado, II, 400.
id. balsamico, I, 408, 419.
id. blanca, I, 184.
id. bequico, III, 109.
id. de berza, id.
id. calmante, III, 296.
id. comun, II, 274.
id. dulcificante, II, 274; III, 22.
id. espectorante, I, 314, 402, 500; II, 391; III, 230.
id. contra el estomacace, I, 491.
id. gomoso, II, 392.
id, de Gordon, I, 455.
id. de huevo, I, 186.
id. jabonoso, III, 518.
id. kermetizado, I, 313.
id. laxante, I, 12.
id. de lombarda, I, 455.
id. de maná, III, 77.
id. oleoso, I, 185.
id. pectoral, I, 287, 318; II, 252, 260, 389; III, 233.
id. de pulmon de zorra, IV, 80.
id. refrigerante, III, 485.
id. rojo, I, 186.
id. simple, I, 185; II, 399.

Looc contra la tos, III, 296.
id. trementinado, IV, 281, 300.
id. de tusilago, IV, 324.
id. verde, II, 400.
id. vermífugo, II, 180; IV, 328.
id. vomitivo, I, 336.
id. de yerba de la plata, IV, 371.
Looch album, I, 184.
id. ad asthma, II, 249.
id. balsamicum, I, 419.
id. gummoso-oleosum, I, 184.
id. gummoso-balsamicum, IV, 281.
id. pectorale leniens, II, 389.
id. pulmonale, I, 287; IV, 80.
id. è pulmone vulpis, I, 287; IV, 80.
id. sanum et expertum, IV, 79.
id. saponaceum, III, 518.
id. saponatum, id.
id. saponicum, id.
id. de scilla, II, 249.
Lotio acida, I, 90.
id. alcoholisata, I, 487.
id. antipsorica, III, 161.
id. è cupro et zinco composita, IV, 394.
id. ad hæmorroides, I, 441.
id. hydrargyri, III, 140, 188.
id. hydrargyri lutea, III, 142.
id. nicotianæ, IV, 245.
id. plumbata, III, 416.
id. plumbi composita, III, 201.
id. quercus saturnina, III, 429.
Lotio ad rheumatismum, IV, 304.
id. saturnina, III, 416.
id. è staphisagria, II, 285.
id. tartari stibiati, I, 331.
id. ad tineam, IV, 232.
id. veratri mercurialis, III, 161.
id. è veratro, II, 212.
Lumbricus terrestris, II, 342.
Limaria, III, 39.
Lunaria, id.
id. botrytis, id.
Lupulina, III, 40.
Lupinus albus, I, 197.
Lupulinum, III, 40.
Lupulo, III, 39.
Lupulus, id.
Lybisticum, III, 19.
Lycoperdom bovisca, III, 371.
Lycopodium, III, 19.
Lysimachia lutea, III, 38.
id. mummularia, III, 285.
id. vulgaris, III, 38.
Llanten, III, 42.
id. acuatico, id.
id. comun ó mayor, id.
id. mediano, id.
id. menor, id.

M.

Macias, III, 255.
Macis, id.
Madre de clavo, III, 44.
id. de perlas, I, 493.
id. selva, I, 383; III, 47.
Magisterio de azufre, I, 397.
id. de ojos de cangrejo, I, 495.
id. de plomo, III, 402, 406.
id. de sulfato de hierro, II, 454.
Magisterio de zinc, IV, 393.
Magisterium bismuti, I, 464.
id. coralliorum, I, 495.
id. matris perlarum, id.
id. oculorum cancri, id.
id. saturni, III, 402, 406.
id. sulphuris, I, 397.
id. tartari purgans, III, 494.
id. vitrioli martis, II, 454.
id. zinci, IV, 393.
Magma escitodepsico, III, 428.
Magma scytodepsicum, id.
Magnes arsenicalis, I, 358.
Magnesia, III, 47.
id. aereada, III, 48.
id. aromatizada, id.
id. blanca, id.
id. calcinada, III, 47.
id. estibiada, id.
id. gredosa, III, 48.
id. negra, id.
id. de nitro, id.
id. pura, III, 47.
id. sulfatada, III, 52.
Magnesia aerata, III, 48.
id. alba, III, 47, 48.
id. calcinata, III, 47.
id. Edimburgensis, III, 48.
id. mitis, id.
id. nitrica, III, id.
id. opalina, I, 293.
id. pura, III, 47.
id. salis amari, III, 48.
id. salis Ebshamensis, id.
id. subcarbonica, id.
id. sulphurica, III, 52.
id. usta, III, 47.
id. vitriolata, III, 52.
Magnesio, III, 47.

Magnesium oxidatum nativum, III, 81.
id. oxidatum nigrum, id.
Magnolia, III, 56.
Magnolia glauca, id.
Maiz, III, 56.
Malabathrum, I, 514.
Malas ferri, II, 483.
Malato de hierro, id.
id. protoxidado, id.
Malta, III, 56.
Malthum, id.
Malum communis, III, 94.
Malva, III, 57.
id. menor, id.
id. real, III, 59.
id. silvestre, I, 161; III, 57.
Malva alcea, id.
id. arborea, III, 59.
id. hortensis, id.
id. minor, III, 57.
id. rosea, III, 59.
id. rotundifolia, III, 57.
id. sylvestris, id.
id. vulgaris, id.
Malvavisco, III, 59.
Malvaviscum, id.
Maná, III, 76.
id. de alhagi, id.
id. de Brianzon, III, 76.
id. capacy, id.
id. en cilindros, id.
id. comun, id.
id. escogido, id.
id. escogido graso, id.
id. de geracy, id.
id. en granos, id.
id. en lágrima, id.
id. líquido, III, 78.
id. en suerte, III, 76.
id. tartarizada, III, 509.
Mandíbulas del pez lucio, I, 502.
Mandragora, III, 81.
Manganesa, id.
id. oxidada, id.
id. negra, id.
Manganesium ochraceum nigrum, III, 81.
id. oxydatum nativum, id.
Manna, III, 76.
id. brigantina, id.
id. canellata, id.
id. canulata, id.
id. communis, id.
id. crassa, id.
id. electa, id.
id. granulosa, id.
id. varicina, id.
id. longa, id.
id. metallorum, III, 157.
id. persica, III, 76.
id. pinguis, id.
id. sordica, id.
id. in sortis, id.
id. spissa, id.
id. tabulata, III, 509.
id. tartarisata, id.
Manteca de almendras, I, 179.
id. antipsorica, III, 128.
id. de cacao, I, 476.
id. de mejorana, III, 102.
id. de vacas, III, 15.
Manzana, III, 94.
id. de la Reyna, id.
Manzanilla, III, 82.
id. fina, III, 94.
id. hedionda, III, 82.
id. romana, id.
id. de tintoreros, III, 83.
Manzano, III, 94.
Marcasita robial, I, 464.
Marchantia polymorpha, II, 438.
Marfil, I, 502.
id. quemado ó calcinado, I, 503.
id. fosil, I, 502.
Margarita grande, I, 444.
id. pequeña, id.
id. perenne, id.
id. mayor, II, 182.
Margaritæ, I, 494.
Mármol blanco salino, I, 492.
id. calcareo, id.
id. sacarino, id.
Marmor album, id.
Maro, III, 95.
Marrubio, III, 96.
id. blanco, id.
id. negro, id.
Marrubium album, id.
id. fœtidum, id.
id. nigrum, id.
id. vulgare, id.
Mars, II, 440.
id. vitriolatus, II, 464.
Marum syriacum, III, 95.
id. verum, id.
Masa odontalgica, I, 176.
Massa althææ, II, 390.
id. pro fornace odorifera, I, 453.
id. ad fornaceum, id.
Masticatorio escitante, III, 371.
Mastiches, I, 175.
Mastichina gallorum, III, 76.
Mastuerzo silvestre, III, 17.
id. silvestre mayor, id.
id. silvestre menor, id.
Matalobos, II, 201.
Mataperros, III, 283.
Mater margaritarum, I, 493.
id. perlarum, id.
Materia estractiva del caldo, III, 363.
id. perlada de Kerkring, I, 296.
Matonia cardamomum, II, 26.
Matricaria, III, 98.
Matricaria, id.
id. chamomilla, III, 82.
id. parthenium, III, 98.
Mecereon, id.
id. germanico, id.
Meconato de sodio protoxidado, IV, 235.
id. de sosa, id.

Médula ó tuétano de vaca, II, 410.
Medula bovila, id.
id. saxorum, I, 198.
Mefito, I, 491.
id. de plomo, III, 406.
id. de sosa, IV, 223.
Mechoacan, III, 101.
Mechoacanæ, id.
id. albæ, id.
Meconio, III, 287.
Meconium, id.
Mejorana, III, 101.
id. silvestre, IV, 267.
Mel aceti, I, 53.
id. aceti colchitici, II, 154.
id. aceti scillæ, II, 259.
id. album, III, 229.
id. anthosatum, IV, 89.
id. armoraciæ, IV, 59.
id. boracis, IV, 228.
id. chelidonii, II, 76.
id. colchici, II, 153.
id. commune, III, 229.
id. cupratum, II, 120.
id. depuratum, III, 229.
id. despumatum, id.
id. glycyrrhizatum, IV, 80.
id. hydrargyratum, III, 117.
id. hydrargyri, III, 161.
id. liquiritiæ, IV, 80.
id. mercuriale, III, 110.
id. mercurialis annuæ, id.
id. mororum, III, 246.
id. è muriate hydrargyri, III, 161.
id. rorismarini, IV, 89.
id. rosaceum, IV, 107.
id. rosæ gallinæ, id.
Mel rosatum, IV, 107.
id. rosatum solutivum, IV, 108.
id. de rosis, IV, 107.
id. sambuci florum, IV, 175.
id. sambuci fructum, id.
id. scillæ acetatum, II, 259.
id. scilliticum, II, 251.
id. scilliticum compositum, II, 253.
id. super-acetatis cupri, II, 120.
id. violarum, IV, 350.
id. vermium majalium, II, 36.
id. virgineum, III, 229.
Melaleuca cajuputi, I, 9.
id. leucadendron, id.
Melanthium, III, 277.
Melia azederach, II, 108.
Meliloto, III, 103.
id. azul, id.
id. oficinal, id.
Melilotus cœruleus, id.
id. citrinus, id.
id. oficinalis, id.
Melisa bastarda, III, 105.
id. oficinal, IV, 272.
id. de Moldavia, id.
id. de Canarias, id.
Melissa calamintha, I, 479.
id. citrata, IV, 272.
id. citrina, id.
id. hortensis, id.
id. humilis, III, 105.
id. nepeta, I, 479.
id. oficinalis, IV, 272.
id. turcica, id.
Melite de rosas, IV, 107.
Melitis metassophilum, III, 105.
Melito de acetato de cobre, II, 119.
id. de acetato simple, I, 53.
Meloe majalis, II, 35.
Meloe proscarabeus, II, 35.
Melon, III, 106.
id. de la India, IV, 373.
Mellago taraxaci, II, 406; IV, 260.
id. tritici repentis, id.
Membrillero, III, 106.
Menstrum auri, I, 82.
Mentha aquatica, IV, 359.
id. arvensis, id.
id. balsamina, id.
id. crispa, id.
id crispa verticillata, id.
id. equina, id.
id. gentilis, IV, 359.
id. longifolia, IV, 360.
id. piperita, id.
id. pulegium, III, 448.
id. romana, id.
id. rotundifolia, IV, 359.
id. rubia, id.
id. sativa, id.
id. sylvestris, id.
id. venticillatæ, id.
id. viridis, IV, 360.
id. menthastrum, id.
Meo, III, 110.
Mephitis hepatica, I, 83.
Mercurial, III, 110.
id. anua, id.
Mercurialis, id.
id. annua, id.
Mercurio, III, 111.
id. alcalizado, III, 118.
id. azucarado, III, 116.
id. dulce, III, 157.
id. gomoso de Plenk, III, 113.
id. con magnesia, III, 118.
id. metálico, III, 112.
id. de Moretti, id.
id. purificado, III, 111.
id. revivificado de cinabrio, id.
id. sacarino, III, 116.

Mercurio soluble de Hahnemann, III, 209.
id. soluble de Moretti, III, 141.
id. soluble de Moschat, III, 139.
id. de vida, I, 322.
Mercurius, III, 111.
id. aceticus, III, 224.
id. alcalisatus, III, 118, 119.
id. boraxatus, III, 206.
id. causticus flavus, III, 207.
id. causticus luteus, id.
id. corallinus, III, 143.
id. corrosivus flavus, III, 207.
id. corrosivus ruber, III, 143.
id. cosmeticus, III, 218.
id. cum Creta, III, 118.
id. depuratus, III, 111.
idi depuratus vivus, id.
id. dulcis, III, 157.
id. dulcis martiatus, III, 174.
id. emeticus flavus, III, 207.
id. flavus, id.
id. gummosus Plenkii, III, 113.
id. liquidus, III, 221.
id. cum magnesia, III, 119.
id. mortis, I, 322.
id. muriaticus, III, 157, 185.
id. muriatus corrosivus, III, 185.
id. niger moschati, III, 139.
id. nitratus ruber, III, 143.
id. nitrosus, III, 212.
id. præcipitatus albus, III, 157, 218.
Mercurius præcipitatus flabus, III, 207.
id. præcipitatus fuscus, III, 206.
id. præcipitatus viridis, III, 145.
id. præcipitatus Wurtzii, III, 206.
id. rectificatus, III, 111.
id. ruber, III, 143.
id. saccharatus, III, 116.
id. solubilis Hahnemanni, III, 209.
id. sublimatus corrosivus, III, 185.
id. sublimatus dulcis, III, 157.
id. cum sulphure, III, 133.
id. tartarisatus, III, 227.
id. terrestris, III, 384.
id. vitæ, I, 322.
id. vitriolatus, III, 207.
Mermelada de agarico muscario, I, 120.
id. antinefrítica, IV, 283.
id. astringente, IV, 308.
id. de De-Haen, II, 41.
id. espectorante, I, 314.
id. febrífuga, III, 83; IV, 301.
id. de lirio, III, 33.
id. mercurial, III, 114.
id. pectoral, I, 400; II, 369, 522.
id. purgante, II, 394; IV, 128.
id. de tamarindos, IV, 187.
id. de Tronchin, II, 41.
id. de Zaneti, I, 314.
Mesembryanthemum crystalinum, IV, 371.
Mespilus arbutifolius, IV, 7.
id. germanica, III, 279.
id. oxyacantha, II, 276.
Meum, III, 110.
id. athamanticum, id.
Miel, III, 229.
id. amarilla, id.
id. con acetato de cobre, II, 119.
id. de bayas de sauco, IV, 175.
id. blanca, III, 229.
id. boratada, IV, 228.
id. de celidonia, II, 76.
id. colchitica, II, 153.
id. despumada, III, 227.
id. escilitica, II, 251.
id. escilitica compuesta, II, 253.
id. de frambuesas, II, 318.
id. glizirrizada, IV, 80.
id. de jabon, III, 518.
id. de mercurio dulce, III, 161.
id. mercurial, III, 110, 117, 146, 212.
id. purificada, III, 229.
id. de rábanos, IV, 59.
id. de romero, IV, 89.
id. rosada, IV, 107.
id. rosada solutiva, IV, 108.
id. de sauco, IV, 175.
id. trementinada, IV, 301.
id. vírgen, III, 229.
id. de violetas, IV, 350.
Mil en rama, III, 231.
Mil-pies, III, 235.
Millefolium, III, 231.
Milli sophyllum, III, 105.

Mimosa catechu, II, 59.
id. cinerea, II, 396.
id. corinda, id.
id. nilotica, I, 5.
Mimosa unguis cati, III, 366.
Minium, III, 403.
Mirica Galæ, I, 355.
Miristica oficinal, III, 255.
Mirobolanos, III, 236.
id. bellíricos, id.
id. cetrinos, id.
id. emblicos, III, 237.
id. indicos, III, 236.
id. negros, id.
id. guebulos, id.
Mirospermum touliferum, I, 420.
Miroxilum peruiferum, I, 416.
Mirtilo, III, 244.
Mirra, III, 237.
Mistura absorvente, I, 487, 507.
id. acida, I, 83, 91, 96; III, 479.
id. alcalina, III, 470.
id. alcanforada, I, 155.
id. alcanforada acidula, I, 150.
id. aloética, I, 35.
id. amarga, IV, 129.
id. analeptica, II, 513.
id. anodina, III, 295.
id. antielmintica, I, 414.
id. antiaftosa, II, 513.
id. antiartrica, I, 106.
id. antiasmatica, II, 231, 378; IV, 175.
id. antiasmatica de Vans-Wieten, I, 244.
id. antiblenorragica, I, 411.
id. anticatarral, II, 255.
id. anticatartica, III, 302.
Mistura antidisenterica, I, 332; III, 316.
id. antiemetica, I, 122.
id. antiepileptica, I, 246.
id. antiespasmodica, I, 266.
id. antifebril, IV, 28.
id. antifrigorica, III, 489.
id. antigonorreica, I, 411.
id. antihelmintica, III, 183, 385; IV, 217.
id. antihemorragica, I, 96; II, 346.
id. antiespasmodica, I, 245.
id. antihidropica, id.
id. antihidrofobica, II, 17.
id. anti-icterica, III, 497,
id. antiletargica, III, 297.
id. antiodontalgica, III, 46, 322.
id. antiotodinica, III, 322.
id. antiperiodica, IV, 28, 29.
id. antipsorica, II, 447.
id. antisifilitica, II, 121; III, 181.
id. antisifilitica de Haen, III, 198.
id. antitisica, II, 203.
id. aromatica, I, 538; II, 36.
id. de asafétida, I, 374.
id. astringente, I, 411, 513; II, 63; IV, 30, 103.
id. balsamica, I, 422.
id. calmante, I, 186; II, 193, 392.
id. con calomelanos, III, 161.
id. cardiaca, I, 532.
Mistura carminativa, IV, 139.
id. catartica árabe, II, 243.
id. cateretica, I, 357.
id. deprimente, I, 75.
id. desobstruente, III, 499.
id. detersiva, IV, 112.
id. diaforetica, I, 246, 390.
id. contra la diarrea, II, 81; III, 257.
id. diuretica, II, 193, 255; III, 18, 490; IV, 295.
id. diuretica y refrigerante, III, 488.
id. contra la disminorrea, II, 306.
id. dulcificante, III, 109.
id. emetica, II, 215, 524.
id. emetico anodina, I, 315.
id. escitante, I, 230; IV, 30, 222.
id. espectorante y tonica, II, 526.
id. estomacal, II, 360; III, 41, 274.
id. febrífuga, IV, 28.
id. fétida, I, 376.
id. fundente, I, 338, 427; III, 500, 505, 514; IV, 295.
id. fundente de Mutzel, III, 504.
id. fundente nervina, I, 354.
id. fundente espirituosa, III, 461.
id. gomosa de sublimado corrosivo, III, 220.
id. hidragoga, II, 152.
id. jabonosa purgante, II, 539.
id. kermetizada, I, 314.

Mistura laxante, III, 511; IV, 85.
id. litontriptica, II, 306.
id. mercurial, III, 114.
id. mercurial balsamica, id.
id. mineral, III, 191.
id. de mirra alcalizada, III, 244.
id. moscada, I, 194.
id. mucilaginosa, II, 392.
id. nitrada, III, 484.
id. nitrada y alcanforada, III, 488.
id. oleoso-ácida, I, 64; II, 104.
id. oleoso-salina, III, 54.
id. opiada, III, 295, 302.
id. pectoral, I, 71, 72, 253; II, 231, 261.
id. purgante, II, 543.
id. purgante acidula, III, 510.
id. refrigerante, III, 484, 491.
id. resolutiva, I, 254; II, 204.
id. contra los sabañones, I, 418.
id. salina, III, 497, 499.
id. salina antiacida, III, 54.
id. salina compuesta, III, 502.
id. salina simple, III, 490, 502.
id. sedante, III, 297, 307, 317.
id. sedante y aromatica, III, 302.
id. simple, I, 93.
id. simple de Ladwig, id.
id. de Silvio, III, 289.
Mistura sudorifica, I, 261.
id. tartarizada, III, 507.
id. teriacal, III, 347.
id. tonica, II, 469; IV, 54.
id. tonica de Griffith, II, 458.
id. tonico-nervina de Stahl, III, 460.
id. contra la tos convulsiva, IV, 28.
id. vermífuga, II, 264.
id. vermífuga y purgante, II, 535.
id. vinosa, III, 479.
id. volátil, I, 267.
Mixtura acida anodyna, III, 307.
id. acidi muriatici, I, 83.
id. acidi muriatici oxygenati, II, 118.
id. acidi nitrici, I, 91.
id. acidi phosphorici, I, 67.
id. acido-mineralis, I, 83.
id. adstringens, II, 63; III, 301.
id. ætherea, II, 305.
id. aloetica, I, 35.
id. amara cum rheo, IV, 129.
id. ammoniacalis salina, I, 252.
id. ammoniaci, II, 375.
id. ammoniaci et antimonii, I, 337.
id. ammonii acetici, I, 261.
id. ammonii acetici liquoris, I, 262.
id. ammonii carbonici pyro-oleosa camphorata, I, 245.
id. ammonii caustici liquoris, I, 222.
id. ex ammonio muriatico, I, 252.
Mixtura amygdalarum, I, 180.
id. anodyna, II, 305.
id. anthelmintico inicitans, II, 264.
id. antiacida, III, 51; IV, 224.
id. antidisenterica, I, 90.
id. antimiasmatica, II, 133.
id. antiphlogistica, III, 489.
id. antiscabiosa, II, 447.
id. antispasmodica et diuretica, I, 266; II, 306.
id. antispasmodica resolvens, II, 306.
id. antispasmodica simplex, II, 296.
id. asæ fœtidæ, I, 374.
id. asæ pro clysmate, id.
id. boxarata, IV, 229.
id. è camphora cum aceto, I, 150.
id. camphorata, I, 149.
id. camphorata æthera, I, 153.
id. camphorata spirituosa, I, 154.
id. carbonatis potassæ stomachica, III, 472.
id. castorei ætherea, II, 56.
id. castorei ammoniato-spirituosa, II, 56.
id. chelivonii, II, 76.
id. chinæ phosphorata, II, 316.
id. cicutæ, II, 93.
id. citro-muriatica, IV, 222.
id. cretacea, I, 500.
id. cretæ, id.
id. è conio, II, 93.

Mixtura cornu cervini, II, 389.
id. cornu ammoniacalis, I, 252.
id. deprimens, I, 75; II, 193.
id. deprimens et valde diuretica, id.
id. deprimens et expectorans, II, 194.
id. desobstruens, III, 505.
id. diatrion, I, 93.
id. digitalis camphorata, II, 197.
id. ad dislochiam, II, 306.
id. excitans mitis, I, 262.
id. ferrea, II, 477.
id. ferri composita, II, 458.
id. frigorifica, III, 489.
id. pro gingivis roborandis, II, 61.
id. guaiaci, II, 428.
id. guaiaci gimmi Bergeri, id.
id. guaiacina, II, 420.
id. gummosa ex hydrargyro corrosivo, III, 220.
id. in hæmaturia chronica, III, 375.
id. Hulmiana, I, 62.
id. incitans martialis, II, 485.
id. incitans nervina, I, 354.
id. incitans et sedans, III, 276.
id. è kali nitrico, III, 484.
id. è kali tartarici, III, 507.
id. è kali sulphurico, I, 338.
id. lauro cerasi aquæ, I, 75.
id. laxans, III, 78; IV, 253.
id. leniens, I, 186.
id. è lupulo, III, 40.
Mixtura lycopodii, III, 18.
id. è magnesia sulphurica, III, 53.
id. marrubii, III, 97.
id. martiata amara, II, 485.
id. mercurialis, III, 219.
id. mercurii gummosa, III, 114.
id. millefolii, III, 233.
id. moschata, I, 194.
id. moschi, id.
id. mucilaginoso aromatica balsámica, I, 422; II, 37.
id. myrrhæ alcalisata, III, 244.
id. myrrhæ Griffitbii, II, 458.
id. natri phosphorici, IV, 230.
id. nervina et resolvens, I, 354.
id. nitrato-camphorata, III, 488.
id. nitrosa, III, 484.
id. nucum juglandium, III, 281.
id. olei ricini cum jalappa, II, 543.
id. oleosa, I, 186.
id. oleoso-acida, I, 64.
id. oleoso-balsamica, I, 521.
id. opiato ætherea, III, 297.
id. oxygeno muriatica, II, 118.
id. ad partum, IV, 228.
id. pectoralis, I, 253.
id. pectoralis hydrocyanica, I, 71.
id. piperita, I, 538.
id. pyro-tartarica, I, 93.
id. refrigerans, III, 484.
id. resolvens, I, 427; II, 519.
id. resolvens roborans, III, 505.
Mixtura resolvens spirituosa, III, 461.
id. salina, I, 257; III, 502.
id. salina composita, III, 502.
id. salina Macbridii, id.
id. saponacea, III, 470.
id. sedativo—narcotico-pectoralis, III, 296.
id. sedativo-refrigerans, III, 484.
id. simplex, I, 55, 93.
id. simplex antiscorbutica, II, 147.
id. simplex Ludovici, I, 93.
id. sistens, III, 352.
id. solvens, I, 338.
id. styptica, II, 126.
id. sulfurico-acida, I, 98.
id. sulphuris præcipitati, I, 402.
id. tartari stibiati et boraxati junipe—rina, I, 337.
id. tonico adstringens, IV, 41.
id. tonico antiseptica, I, 375; IV, 38.
id. tonico balsamica diaphoretica, IV, 40.
id. tonico nervina Stahlii, III, 461.
id. tonico stomachica, II, 157.
id. trifolii aquatici fœtida, IV, 321.
id. ad vomitum sanguinis, III, 352.
id. vulneraria acida, I, 262.
Moho ú orin de hierro, II, 476.
Molybdœnum magnesii, III, 81.

Molleja de gallina, II, 342.
Momia de Egipto, I, 382,
Momordica balsamina, I, 408.
id. elaterium, II, 150.
Monarda, III, 245.
Monarda punctata, id.
Monoceros, I, 501.
Mora, III, 246.
Moral, III, 245.
id. negro, id.
Mordisco del diablo, III, 247.
Morfina, III, 247, 288.
Moringa oleifera, I, 431.
Morphinum, III, 247.
Morsuli aceti, I, 52.
id. anthelmintici, I, 305; IV, 217.
id. antimoniales, I, 305.
id. aromatici, I, 518.
id. aromatico stomachici, id.
id. chinati, IV, 15.
id. citri, II, 103.
id. imperatoris, I, 518.
id. menthæ piperitæ, IV, 364.
id. purgantes, II, 539.
id. restaurantes Kunkelii, I, 305.
id. ad scabiem, I, 401.
id. stibiati, I, 305.
id. stibii, id.
id. stomachici, I, 518.
id. contra vermes, IV, 217.
Morsus diaboli, III, 247.
id. gallinæ, I, 197.
Morus indica, IV, 66.
id. nigra, III, 245.
Mosambé, III, 251.
Moscada, III, 255.
Moscas de España, II, 1.
Moschus, I, 190.
id. artificialis, IV, 239.
id. moschiferus, I, 190.
Mostaza, III, 251.
id. blanca, id.
id. negra, id.
Mosto, IV, 345.
Mostum, id.
Mucharum rosarum, IV, 103.
Mucílago alcanforado, I, 148.
id. de alholba, I, 173.
id. de cantáridas, II, 6.
id. de consuelda mayor, II, 170.
id. de coralina, II, 178.
id. de goma arábiga, II, 388.
id. de goma arábiga mercurial, III, 113.
id. de goma tragacanto, II, 399.
id. de membrillos, III, 109.
id. de membrillos acidulado, id.
id. de pulguera, III, 528.
id. de raiz de malva-visco, III, 64.
id. de simiente de lino, III, 21.
Mucilago althææ, III, 64.
id. cantharidarum, II, 6.
id. consolidæ majoris, II, 170.
id. cydoniorum, III, 109.
id. cydoniorum seminum, id.
id. cydoniorum seminum acidulata, id.
id. gummi arabicæ, II, 388.
id. lichenis islandicæ, III, 28.
id. liquiritiæ, IV, 74.
id. mercurialis Plenkii, III, 113.
id. oleosa, I, 185.
id. psyllii, III, 528.
Mumiæ, I, 382.
Muria, IV, 221.
Murias ammoniacæ ruginatus, II, 132.
id. ammoniacæ ferratus, II, 477.
id. ammoniacæ superhydrargyricus, III, 218.
id. ammoniæ, I, 251.
id. ammoniæ et ferri, II, 477.
id. ammoniæ ferricus, id.
id. ammoniæ martiatus, id.
id. ammoniæ oxidi ferri, id.
id. ammonii ferricum, id.
id. ammonio ferricum, id.
id. auri, III, 358.
id. auri liquidus, id,
id. auri aurico-natricum, III, 359.
id. baryticum, I, 425.
id. calcis, I, 505.
id. ferri, II, 471.
id. ferri ammoniacalis, II, 477.
id. ferri liquidus, II, 471.
id. ferricus, id.
id. hydrargyrii corrosivus, III, 185.
id. hydrargyrii ferratus, III, 174.
id. hydrargyrii mitis, III, 157.
id. hydargyrii oxydi ammoniacalis, III, 218.
id. hydargyrii oxydulati, III, 157.
id. hydargyrii oxigenatus, I, 323.
id. hydargyrii sub-oxigenatus, III, 157.
id. hydargyrii spirituosus liquidus, III, 190.
id. hydrargyricus corrosivus, III, 185.
id. hydrargyro ammoniacalis, III, 218,

Murias hydrargyro ammoniacalis acerrimus, III, 218.
id. hydrargyro ammoniacalis solutus, III, 219.
id. hydrargyrosus mitis, III, 157.
id. manganesii, III, 81.
id. oxyduli hydrargyrii mitis, III, 157.
id. oxyduli stibii, I, 323.
id. oxygenatus hydrargirii sublimatus, III, 185.
id. platinæ, III, 401.
id. potassæ, III, 493.
id. potassæ hyperoxygenatus, III, 492.
id. potassæ oxygenatus, id.
id. sodæ, IV, 221.
id. stanni, II, 289.
id. stibii, I, 323.
id. stibiosus, id.
Muriato de amoniaco, I, 251.
id. de amoniaco y de cobre, II, 132.
id. de amoniaco y de hierro, II, 477.
id. de antimonio, I, 323.
id. de antimonio sobre-oxygenado, id.
id. de barita, I, 425.
id. de cal, I, 505.
id. de cal oxygenado, I, 490.
id. de cal sobre-oxigenado, id.
id. de cobre, II, 131.
id. de hierro, II, 471.
id. de hierro líquido, id.
id. de hierro sublimado, id.
id. de magnesia, III, 55.
id. de mercurio corrosivo, III, 185.
Muriato de mercurio dulce, III, 157.
id. de mercurio sobre-oxygenado, III, 185.
id. de mercurio sub-oxygenado, III, 157.
id. de oro, III, 358.
id. de plomo, III, 402.
id. de plomo sobre-oxygenado, III, 492.
id. de sosa, IV, 221.
Murigeno, II, 116.
Muscæ hispanicæ, II, 1.
Muscari, III, 254.
id. oloroso, id.
Muscari ambrosiacum, III, 254.
Muscus arboreus, III, 24.
id. caninus, id.
id. capillaceus major, III, 455.
id. catharticus, III, 24.
id. corallinus, II, 177.
id. helminthocorton, id.
id. helminthocortus, id.
id. islandicus, III, 24.
id. marinus, II, 177.
id. pulmonarius, III, 25.
id. pyxidatus, III, 24.
id. quercus albus, id.
Musgo de Córcega, véase *Coralina*.
Mustum hordei, III, 56.
Myristica aromatica, III, 255.
Myrobolani bellíricæ, III, 235.
id. chevullæ, id.
id. citrinæ, id.
id. emblicæ, III, 237.
id. indicæ, III, 236.
id. nigro, id.
Myrobolanus bellirica, id.
id. chebula, id.
Myrobolanus citrina, III, 236.
Myroxylum peruiferum, I, 416.
Myrrha, III, 237.
id. liquida, III, 242.
id. rubra, III, 237.
Myrthacantha, IV, 143.
Myrthilus, III, 244.
Myrtus communis, I, 354.
id. pimenta, III, 389.

N.

Nabo, III, 258.
Nafta, id.
id. de los alemanes, II, 301.
id. de vitriolo, id.
id. de vinagre, II, 294.
Naphta, III, 258.
id. aceti, II, 294.
id. nitri, II, 298.
id. vitrioli, II, 301.
id. vitrioli camphorata, I, 152.
id. vitrioli phosphorata, II, 316.
Napellus, I, 104.
Napus, III, 258.
Naranja, III, 259.
Naranjo, III, 258.
Narciso falso, III, 274.
id. de los prados, id.
id. silvèstre, id.
Narcisus pseudo-narcisus, III, 274.
Narcotina, III, 275.
Nardo, III, 276.
id. celtico, id.
id. de las Indias, id.
Nardus celtica, id.
idi indica, III, 277.
Nastutium aquaticum, I, 457.
id. hortense, id.
id. indicum, II, 20.
id. pratense, I, 457.
id. sylvestre, II, 181.
Natrum, IV, 223.
id. aceticum, IV, 234.

Natrum carbonicum, IV, 223.
id. glaciale, I, 504.
id. muriaticum, IV, 221.
id. oxyphosphorodes, IV, 230.
id. phosphoricum, id.
id. sulphuratum, IV, 219.
id. sulphuricum, IV, 230.
id. tartarisatum, III, 513.
Neguilla, III, 277.
id. de los campos, id.
id. de Damasco, id.
id. de jardin, id.
Nenufar, id.
id. blanca, id.
id. amarilla, id.
Nepeta, I, 480.
Nerium, I, 107.
id. oleander, id.
Nicotiana, IV, 242.
id. minor, id.
id. rustica, id.
id. tabacum, id.
Nicocianina, id.
Nicotianinum, id.
Nicotina, id.
Nidi hirundinum, I, 495.
Nidos de golondrinas, id.
Ninfea, III, 277.
id. blanca, id.
id. amarilla, id.
Nigella, III, 277.
id. arvensis, id.
id. damascena, id.
id. sativa, id.
Nihil album, IV, 392.
Nihilum griseum, id.
Ninsi, IV, 218.
id. de la China, id.
Ninsinus, id.
Nispero, III, 279.
Nitrato de ammoniaco, I, 250.
id. de barita, I, 426.
id. de bismuto con esceso de base, I, 464.
id. de cobre, II, 131.
id. de hierro, II, 470.
Nitrato de hierro tritoxydado, II, 470.
id. de plata, III, 398.
id. de plata amoniacal, III, 401.
id. de potasa, III, 481.
id. de potasio protoxydado, id.
id. de sodio protoxydado, IV, 234.
id. de sosa, id.
Nitras ammoniacæ, I, 250.
id. argenti, III, 398.
id. argenti cristalinum, id.
id. argenti fusum, III, 399.
id. barytæ, I, 429.
id. bismuthi, I, 464.
id. cubicum, IV, 234.
id. hydrargyrii, III, 212.
id. hydrargyrii liquidum, III, 213.
id. hydrargyrii nitricum, id.
id. kalicum, III, 481.
id. lixiviæ, id.
id. natricum, IV, 234.
id. potassæ, III, 481.
id. potassæ depuratum, id.
id. potassæ purum, id.
id. potassæ cum sulphure fusum, III, 482.
id. sodæ, IV, 234.
id. subbismuticum, I, 464.
Nitro, III, 481.
id. antimoniado de Stahl, I, 303.
id. borático, I, 429.
id. del comercio, III, 481.
id. cúbico, IV, 234.
id. depurado, III, 481.
id. fijo, III, 467.
id. fijo por el tártaro, id.
Nitro de mercurio, III, 212.
id. perlado, III, 483.
id. purificado, III, 481.
id. regenerado, III, 482.
id. romboidal, IV, 234.
id. de Schræder (fijo), III, 475.
id. de tierra pesada, I, 429.
Nitrogeno, I, 392.
Nitrum, III, 481.
id. antimoniatum, I, 303.
id. crudum, III, 481.
id. depuratum, id.
id. fixum, III, 467.
id. flammans, I, 250.
id. lunare, III, 398.
id. papaveratum, III, 482.
id. perlatum, III, 483.
id. purificatum, III, 481.
id. regeneratum, III, 482.
id. rosatum, id.
id. saturninum, III, 422.
id. tabulatum, III, 482.
id. venale, III, 481.
id. vitriolatum Schræderi, III, 476.
Nodulus purgans, IV, 182.
Nogal, III, 279.
id. ceniciento, id.
id. comun, id.
Nostoc, III, 282.
id. comun, id.
Nostochium commune, id.
Nuez, III, 279.
id. de ciprez, II, 110.
id. moscada, III, 255.
id. vómica, III, 283.
Nuces cupresi, II, 110.
id. quercus, II, 213

Nuces quercus tostæ, II, 219.
Numularia, III, 285.
Nummularia, id.
Nux barbardensis, IV, 356.
id. cathartica americana, id.
id. juglans, III, 279.
id. moschata, III, 255.
id. vomica, III, 283.
Nimphæa alba, III, 277.
id. lutea, id.

O.

Ochra lutea, II, 453.
id. rubra, id.
id. veneris, II, 123.
Ocre amarillo, II, 453.
id. rojo, I, 198; II, 453.
Oculi cancrorum, I, 494.
Ocymum basilicum, I, 142.
id. magnum, I, 143.
id. medium, id.
id. minimum, id.
id. vulgatius id.
Oenos, IV, 347.
Offa alba, I, 244.
Ojos de cangrejo, I, 494,
Olea europæa, I, 9.
Oleo cerato unido al agua, II, 84.
id. margarato de mercurio, III, 228.
id resina de Copaiba, I, 409.
id. de la Meca, I, 415.
Oleo sacaro de aceite de piñones de Indias, II, 183.
id. de anís, I, 285.
id. de cajeput, I, 9.
id. de clavos de especia, III, 46.
id. de canela, I, 521.
id. cefálico, I, 196.
id. de cidra, II, 99.
id. de enebro, II, 223.
Oleo sacaro de hinojo, II, 499.
id. de macias, III, 257.
id. de manzanilla, III, 85.
id. de menta piperita, IV, 364.
id. de myrra, III, 238.
id. de naranja, III, 261.
id. de sasafras, IV, 171.
id. de succino, IV, 239.
id. de trementina, IV, 301.
id. de valeriana, IV, 336.
Oleo—saccharum anisi, I, 285.
id. aurantii, III, 261.
id. cajeputi, I, 9.
id. caryophilorum aromaticorum, III, 46.
id. cephalicum, I, 196.
id. chamæmeli, III, 85.
id. cinnamomi, I, 520.
id. citri, II, 99.
id. crotonis tigli, II, 183.
id. fœniculi, II, 499.
id. juniperi, II, 223.
id. menthæ piperitæ, IV, 364.
id. mirrhæ, III, 238.
id. sassafras, IV, 171.
id. succini, IV, 239.
id. valerianæ, IV, 336.
Oleum absinthii æthereum, I, 122.
id. absinthii coctum, I, 130.
id. absinthii infusum, id.
id. amoniatum, I, 231.
Oleum amygdalarum, I, 178.
id. amygdalarum dulcium, id.
id. anethi æthereum, II, 226.
id. anethi coctum, II, 227.
id. althææ, III, 71.
id. anagallidis, I, 269.
id. animale æthereum, II, 356.
id. animale æthereum empyreumaticum, II, 355.
id. animale Dippelii, II, 356.
id. animale Dippelii fœtidum, II, 355.
id. anisi, I, 287.
id. anisi æthereum, id.
id. anthos æthereum, IV, 91.
id. antimonii, I, 323.
id. Apparitii, II, 506.
id. artemisæ æthereum, I, 366.
id. arthanitæ compositum, II, 166.
id. asphaltii, I, 382.
id. aurantii æthereum, III, 261.
id. avellanarum, I, 384.
id. balatinum, I, 431.
id. been, id.
id. bryoniæ compositum, II, 262.
id. bufonum, I, 439.
id. cacao, I, 476.
id. cacao fructus, id.
id. cacao spissatum, id.
id. cacao theobromæ, id.
id. cajeputi, I, 9.
id. calcis, I, 505.
id. camphoræ, I, 155.
id. camphoræ nitricatum, id.
id. camphoratum, I, 156.
id. cannabis, II, 19.

Oleum cardamomi seminis æthereum, II, 27.
id. de capparibus, I, 158.
id. de capparum, id.
id. carminativum, III, 93.
id. carvi æthereum, I, 160.
id. caryophillorum aromaticorum, III, 45.
id. castorei, II, 49.
id. cataputiæ minoris, II, 58.
id. catellorum, II, 505.
id. de cedro, II, 99.
id. de ceræ, II, 83.
id. chamæmeli æthereum, III, 84.
id. chamæmeli compositum ceruleum, III, 85.
id. chamæmelinum, III, 92.
id. chærophilli, III, 384.
id. cheiri, I, 172.
id. chenopodii antelmintici æthereum, I, 291.
id. cinnamomi æthereum, I, 521.
id. cicutæ, II, 94.
id. citri corticis expressum, II, 99.
id. citri aurantii corticis expressum, III, 261.
id. citri aurantii fructus, id.
id. colocynthidis, II, 166.
id. coriandri æthereum, II, 107.
id. cornu cervi empyreumaticum rectificatum, I, 356.
id. cornu fœtidum, II, 355.
id. cornu rectificatum, II, 356.
Oleum corticis flavi expressum, 261.
id. croci, I, 388.
id. cubebarum, II, 185.
id. cucumeris seminum, id.
id. cucurbitæ pleureticum, I, 478.
id. cumini æthereum, II, 169.
id. dictamni æthereum, II, 200.
id. Dippellii, II, 356.
id. empyreumaticum animale, II, 355.
id. florum septem, III, 93.
id. florum slotani, II, 504.
id. fœniculi æthereum, II, 499.
id. formicarum, II, 512.
id. gaultheriæ, II, 338.
id. guaiaci compositum, II, 417.
id. gualtheriæ, II, 416.
id. hyoscyami ammoniato-camphoratum, I, 233.
id. hyoscyami foliorum coctum, I, 437.
id. hyoscyami foliorum, infusum, id.
id. hyoscyami herbæ coctum, id.
id. hyoscyami herbæ infusum, id.
id. hyoscyami viride, id.
id. hyperici infusum, II, 503.
id. hyperici seminum, II, 502.
id. hyssopi æthereum, II, 509.
id. inulæ compositum, II, 234.
id. ireos, III, 34.
id. iridis, id.
id. irinum, id.
Oleum juglandis regia, II, 279.
id. juniperi baccharum, II, 222.
id. juniperi ligni, II, 223.
id. lacertarum viridium, II, 354.
id. de lateribus, I, 10.
id. laterum, id.
id. lauri baccarum, III, 7.
id. lauri expresum, id.
id. laurinum, id.
id. lavandulæ æthereum, II, 280.
id. liliorum alborum, I, 395.
id. lini (seminum) expressum, III, 23.
id. lumbricorum, II, 353.
id. macidis, III, 257.
id. majoranæ æthereum, III, 102.
id. majoranæ infusum, III, 103.
id. Mariæ, IV, 248.
id. martis per deliquium, II, 471.
id. mastiches, I, 177.
id. mastichinum, id.
id. meliloti, III, 104.
id. melissæ æthereum, IV, 273.
id. menthæ æthereum, IV, 364.
id. millefolii æthereum, III, 233.
id. momordicæ, II, 155.
id. monardæ æthereum, III, 245.
id. de mucilaginibus, III, 22.
id. mucilaginum, id.
id. myrrhæ, III, 244.
id. myrrhæ per deliquium, III, 242.
id. myrtinum, I, 354.
id. naphæ, III, 261.

Oleum narcoticorum , I , 439.
id. nicotianæ , IV , 246.
id. nucistæ æthereum , III , 257.
id. nucistæ expressum, III , 256.
id. nucum juglandium, III , 279.
id. olivarum , I , 9.
id. olivarum empyreumaticum , id.
id. olivarum oxygenatum , II , 119.
id. origani æthereum , III , 356.
id. ovorum expressum, II, 512.
id. palmæ, I, 10.
id. palmæ Christi, IV, 83.
id. papaveris albi, I, 108.
id. papaveris somniferi, id.
id. petrolei volatile , III , 385.
id. petroselini æthereum , III , 381.
id. peucedani æthereum , III, 386.
id. philosophorum, I, 10.
id. phosphoratum, II, 317.
id. pimentæ æthereum, III , 392.
id. pinguedinis, II, 413.
id. pistaciorum , I, 172.
id. pulegii æthereum , III , 448.
id. purgans, III, 242.
id. pyro—animale, II, 355.
id. pyro—depuratum , II , 356.
id. ricini , IV , 83.
id. ricini Americani , IV, 356.
id. rorismarini, IV, 91.
Oleum rosarum , IV, 110.
id. rosarum æthereum, id.
id. rosatum, id.
id. rutæ æthereum, IV, 122.
id. rutæ infusum , id.
id. sabinæ æthereum , IV, 146.
id. salviæ æthereum , IV, 155.
id. sambuci , IV, 177.
id. santali citrini æthereum , IV, 161.
id. saponis , III, 526.
id. sassafras ligni æthereum , IV, 170.
id. saturejæ, I, 137.
id. saturni , III, 423.
id. scarabeorum , II, 36.
id. scorpionum , II, 353.
id. scorpionum compositum, II, 354.
id. serpylli, IV , 210.
id. sesami orientalis , id.
id. sinapi infusum , III, 253.
id. solani nigri , IV , 369.
id. spermatis ranæ , II , 354.
id. stramonii , II, 293.
id. stramonii compositum , I , 439.
id. succini æthereum , IV , 238.
id. succini oxydatum , IV , 239.
id. succini sulphuratum , I , 403.
id. sulphuratum, id.
id. tacamahacæ , IV , 249.
id. tanaceti æthereum, IV , 257.
id. tartari per deliquium , III , 468.
id. templinum , IV , 294.
id. terebinthinæ , id.
Oleum terebinthinæ sulphuratum , I , 403.
id. thapsiæ antirheumaticum , IV , 258.
id. thymi æthereum , IV , 368.
id. ad tormina ventris , III, 93.
id. valerianæ æthereum , IV, 336.
id. verbasci, II , 403.
id. vini æthereum , II , 304.
id. violarum , IV, 352.
id. è vitillis ovorum . II , 512.
id. vitrioli, I, 94.
id. vitrioli depuratum , id.
id. vitrioli dulce , II , 303.
id. vitrioli purificatum, I , 94.
id. volatile , IV , 294.
id. volatile animale , II, 356.
id. vulpinum, II, 505.
id. zedoariæ æthereum, IV , 391.
id. zingiberis æthereum , II , 370.
Olibanum, II , 513.
id. electum , id.
id. in sortis, id.
Olmo , III , 287.
id. de América, id.
id. piramidal, id.
Olsnitium , III , 380.
Ombligo marino , I , 493.
id. de Venus, III, 286.
Ombliguera , id.
Omphacium agresta , IV, 345.
Ongula alces , II , 342.
Oniscus asellus , III, 235.
Ononis , III, 287.
id. de los campos , id.
id. espinosa , id.
Ononis arvensis, id.
id. spinosa , id.

Onopordon acanthium, IV, 266.
Onosma echioides, I, 270.
Operucula cochearum, I, 493.
Operculo del caracol, id.
Ophioglosum vulgare, III, 16.
Ophiorriza Mungos, IV, 67.
Opiata antiapoplectica, II, 462.
id. anticlorotica, II, 461.
id. antiepileptica, III, 318, 379.
id. antigonorraica, I, 414.
id. antihemorroidal, III, 393.
id. antiherpetica, II, 534.
id. antiodontalgica, III, 46.
id. antiperiódica y tónica, I, 302.
id. antisifilitica, III, 174.
id. antitisica, I, 402.
id. aperitiva y purgante, II, 462; III, 133.
id. astringente, I, 44; II, 62, 219; IV, 16.
id. de azufre, I, 401.
id. calmante, III, 428.
id. dentrífica, I, 200, 504.
id. desalterante, II, 28.
id. detersiva, III, 240.
id. disenterica, III, 347.
id. disenterica balsamica, id.
id. emenagoga, II, 446, 461.
id. estimulante, II, 534.
id. estomacal, II, 369.
Opiata febrífuga, IV, 16, 17.
id. febrífuga é incisiva, IV, 17.
id. febrífuga purgante, id.
id. hydragoga, II, 462.
id. mesenterica, II, 446.
id. napolitana, III, 179.
id. de Pajot Laforest, III, 197.
id. pectoral, I, 414.
id. pectoral tónica, II, 446.
id. purgante, III, 164.
id. purgante tónica, III, 174.
id. de Roccamore, III, 260.
id. trementinada, IV, 301.
id. vermífuga, II, 534; III, 135.
Opio, III, 287.
id. bruto, III, 288.
id. crudo, id.
id. depurado, id.
id. gomoso, III, 308.
id. de Indias, III, 287.
id. purificado, III, 288.
id. tebaico, III, 287.
id. de Turquía, id.
Opium colatum, III, 288, 308.
id. crudum, III, 288.
id. depuratum, III, 288, 308.
id. thebaicum, III, 287.
Opobalsamo verdadero, I, 415.
Opobalsamum verum, id.
Opopanaco, III, 355.
Orato de amoniaco, III, 361.
Orchilla, IV, 85.
Orégano, III, 356.
Orégano comun, III, 356.
id. de Creta, II, 199 III, 356.
Oreja de Judas, III, 357.
Oreoselino, id.
Oreoselinum, id.
Origanum creticum, III, 356.
id. dictamnus, II, 199.
id. majoranæ, III, 101.
id. vulgare, III, 355.
Orin de hierro, II, 456.
Oro, III, 357.
id. blanco, III, 401.
id. dividido, III, 358.
id. fulminante, III, 361.
id. de Judea, II, 288.
Ornithoglosa, II, 321.
Orobauca, III, 361.
id. de Virginia, id.
Orobanche Virginiana, id.
Orobo, id.
Orontium majus, I, 340.
Oropimente, I, 357.
Ortiga, III, 362.
id. blanca, id.
id. muerta, III, 362.
id. quemante, id.
id. romana, id.
id. viva, id.
Oruga, II, 238.
id. de flor blanca, id.
Orvietano, III, 348.
Orvietanum, id.
Oryza sativa, I, 355.
Osmazoma, III, 363.
Os sepiæ, I, 493.
Ossa, I, 501.
id. de cordibus cervi, I, 502.
id. usta præparata, I, 503.
Osteocolla, I, 492.
Ostrea edulis, id.
Ova gallinacea, II, 512.
Oxalato de amoniaco, I, 264.
id de mercurio, III, 224.
id. de potasa ácida, III, 501.

Oxalato de potasa acídulo, III, 501.
Oxalas ammoniæ, I, 264.
id. hydrargyri, III, 224.
id. potassæ acidulus, III, 501.
id. basicus, id.
id. subpotasicus, id.
Oxalato de amoniaco, I, 264.
id. de mercurio, III, 224.
id. de potasa ácido, III, 501.
id. de potasa acidulo, id.
Oxalis acetosella, I, 7.
id. cornicula, I, 8.
Oxalium, III, 501.
Oxicloruro de cal, I, 490.
Oxicrato, I, 52.
Oxido de aluminio, I, 197.
id. de antimonio, I, 293.
id. de antimonio blanco, I, 322.
id. de antimonio blanco lavado, I, 296.
id. de antimonio hidrosulfurado pardo, I, 307.
id. de antimonio hidrosulfurado auaranjado, I, 315.
id. de antimonio hidrosulfurado rojo, I, 307.
id. de antimonio mayor, I, 296.
id. de antimonio por el nitro, id.
id. de antimonio no lavado, I, 302.
id. de antimonio con el fosfato de cal, I, 297.
id. de antimonio por la potasa, I, 302.
id. de antimonio sulfurado gris, I, 294.
Oxido de antimonio sulfurado anaranjado, I, 315.
id. de arsénico blanco I, 358.
id. de bismuth blanco, I, 464.
id. de cadmio, I, 477.
id. de cobre verde, II, 134.
id. de estaño hidrosulfurado, II, 288.
id. de hierro moreno, II, 456.
id. de hierro negro, II, 448.
id. de magnesia negro, III, 81.
id. de magnesia, III, 47.
id. de mercurio, id.
id. de mercurio blanco, III, 209.
id. de mercurio gris, id.
id. de mercurio negro, id.
id. de mercurio rojo, III, 142.
id. de mercurio sulfurico, id.
id. de oro, III, 359.
id. de platina, III, 402.
id. de plomo amarillo, III, 403.
id. de plomo blanco, III, 406.
id. de plomo gris, III, 403.
id. de plomo puro, III, 405.
id. de plomo rojo, III, 403.
id. de plomo semi vitreo, id.
Oxidulo de hierro, II, 488.
Oxifosfato de cal, I, 504.
Oxigeno, III, 363.
Oxigeno cloruretum potassi, III, 492.
Oximiel de ajos, I, 138.
Oximiel antiespasmódico, I, 376.
id. de belladona, I, 447.
id. colchitico, II, 154.
id. de cobre, II, 119, 135.
id. eleborado, II, 213.
id. escilítico, II, 259.
id. marcial, II, 481.
id. de narciso silvestre, III, 275.
id. pectoral, II, 232.
id. de primula, III, 527.
id. sacarino, I, 53.
id. de sauco, IV, 176.
id. simple, I, 53.
id. de tabaco, IV, 246.
Oximiel tartaroso, III, 507.
Oximuriato de cal, I, 490.
id. de mercurio, III, 185.
id. de plomo, III, 402.
Oxisacaro emético, I, 332.
id. de digital líquida, id.
Oxiseptonico, I, 87.
Oxycratum, I, 52.
Oxodes ferri, II, 448.
id. hydrargyri nigrum, III, 209.
id. hydrargyri rubrum, III, 144.
id. mangani nativum, III, 81.
id. plumbi nigrum, III, 493.
id. stibii album, I, 296.
id. stibii sulphuratum, I, 315.
id. zinci, IV, 392.
id. zinci album, id.
Oxydulum antimonii hydrosulfuratum aurantiatum, I, 315.

Oxydulum ferri fuscum, II, 456.
id. ferri nigrum, II, 448.
id. hydrargyri Hannemanni, III, 209.
id. hydrargyri nigrum, III, 139.
id. plumbi, III, 403.
id. plumbi sulphuratum, I, 315.
id. plumbi vitreatum, I, 295.
id. plumbi vitreum, id.
id. zinci, IV, 392.
id. zinci album, id.
Oxydum aluminii, I, 197.
id. antimonii auratum, I, 315.
id. antimonii nitro muriaticum, I, 322.
id. antimonii sulphuratum rubrum, I, 307.
id. antimonii cum sulphure—vitrificatum, I, 295.
id. antimonii vitrificatum, id.
id. arsenici album, I, 358.
id. arsenici album cum sulphure stibii, I, 359.
id. auri ammoniatum, III, 361.
id. calcis, I, 485.
id. cupri per acidum vegetabile, II, 134.
id. ferri nigrum, II, 448.
id. ferricum, id.
id. ferricum crystallisatum nativum, II, 453.
id. ferroso-ferricum, II, 448.
id. ferrosum, id.
id. hydrargyri ammoniacale, III, 209.
Oxydum hydrargyri cinereum, III, 139.
id. hydrargyri completum, III, 144.
id. hydrargyri nigrum, III, 139, 209.
id. hydrargyri nitratum, III, 144.
id. hydrargyri nitratum rubrum, id.
id. hydrargyri nitrico—antimoniale, III, 209.
id. hydrargyri nitricum, III, 144.
id. hydrargyri rubrum, id.
id. hydrargyri rubrum, per acidum nitricum, id.
id. hydrargyri saccharatum, III, 117.
id. hydrargyri salinum, III, 209.
id. hydrargyri hydrargyricum, III, 144.
id. hydrargyri præcipitatum, III, 139.
id. hydrargyrosum, id.
id. kadmii, I, 477.
id. magnesii nigrum, III, 81.
id. magnesii nigrum nativum, id.
id. mangani nativum, III, 81.
id. platinæ, III, 402.
id. plumbi album, III, 406.
id. plumbi carbonatum, id.
id. plumbi fusum, III, 403.
id. plumbi rubrum, id.
id. plumbi semifusum, id.
id. plumbi semivitreum, id.
id. plumbicum semivitreum, id.
Oxydum stibii acido muriatico oxygenato paratum, I, 322.
id. stibii non ablutum, I, 302.
id. stibii hydrosulphuratum, I, 315.
id. stibii hydrosulphuratum rubro—fuscum, I, 307.
id. stibii cum potassa non ablutum, I, 302.
id. stibii potasseum non ablutum, id.
id. stibii sulphuratum rubrum, I, 207.
id. stibii sulphuratum vitreum, I, 295.
id. stibiosum, I, 296, 303.
id, zinci, IV, 392.
id. zincicum, id.
id. zincicum album, id.
id. zincicum griseum, id.
id. zincicum per se, id.
Oxygenium, III, 363.
Oxygeno—cloruretum potassi, III, 493.
Oxymel æruginis, II, 120.
id. alliatum, I, 138.
id. belladonæ, I, 447.
id. chalybeatum, II, 481.
id. colchici, II, 154.
id. helleboratum, II, 213.
id. narcissi pratensis, III, 275.
id. oxyduli cupri, II, 120.
id. primulæ veris, III, 527.
id. sambuci, IV, 176.
id. scilliticum, II, 259.
id. simplex, I, 53.
id. tartasorum, III, 507.

Oxynitras hydrargyri et ammoniæ, III, 209.
Oxysaccharum digitalis, II, 195.
id. emeticum, I, 332.
id. scilliticum, II, 259.
Oxytartarus, III, 494.
Oxytriphyllum, I, 8.

P.

Palma, III, 364.
Palo del águila, III, 365.
id. de aloes, id.
id. de culebra, III, 366.
id. nefrítico, id.
Paludapium, I, 341.
Pamphilus chirurgorum, IV, 397.
Pan, III, 366.
id. de puerco, I, 366.
Panacea de Holstein, III, 475.
id. de Korumann, III, 360.
id. mercurial, III, 157.
Panacea duplicata, III, 476.
id. Korumanni, III, 360.
id. mercurii rubra, III, 144.
Panada de los ingleses, III, 367.
id. anglorum, id.
Panax quinquefolium, II, 88.
Panchymagogum minerale, III, 157.
id. quercetanum, id.
Pancratium verum, II, 244.
Panicum miliaceum, III, 369.
Panis cassaviensis, IV, 258.
id. cydoniorum, III, 106.
Panis cydoniorum, cum aromativus, III, 107.
id. cydoniorum compositus, id.
id. porcinus, id.
Panizo, III, 369.
Papaver, I, 108.
id. album, id.
id. cæruleum, id.
id. corniculatum, I, 115.
id. nigrum, I, 108.
id. rhæas, I, 212.
id. somniferum, I, 108.
Papel de cauterio, IV, 284.
id. encerado, II, 86.
id. vegigatorio, III, 101.
Parietaria, III, 369.
Parietaria, id.
id. oficinalis, id.
Pariglina, IV, 376.
Paris quadrifolia, IV, 370.
Parnasia palustre, III, 370.
Parnassia palustris, id.
Paronychia argentea, IV, 164.
Pasas, IV, 345.
id. de Calabria, id.
id. de Corinto, id.
id. de España, id.
id. de Esmirna, id.
id. de Francia, id.
id. purgantes, IV, 183.
id. vermifugas, IV, 129.
Paspalum dactylum, II, 407.
Passulæ anthelminticæ, IV, 129.
id. corinthiacæ, IV, 345.
id. corinthinaceæ, id.
id. laxative, IV, 183.
id. majores, IV, 345.
id. minores, id.
Pasta de almendras cosmetica, I, 179.
id. anticefalica, I, 432.
id. arsenical, I, 363.
id. astringente, I, 199.
id. de azufaifas, I, 393.
id. de cacao, I, 475.
id. de caracoles, II, 353.
id. caustica de Else, III, 458.
id. de dátiles, III, 365.
id. epilatoria, I, 358.
id. de liquen isländico, III, 30.
id. de lirio de Florencia, III, 34.
id. de malvavisco, II, 390.
id. contra las manchas de nacimiento, I, 488.
id. pectoral, II, 388.
id. de regaliz, IV, 74.
id. de regaliz anisada, IV, 75.
id. de regaliz opiada, id.
id. rubefaciente y febrífuga, IV, 120.
id. contra los sabañones, I, 206.
Pasta althææ, II, 390.
id. amygdalata cosmetica, I, 179.
id. amygdalina, I, id.
id. cacaotina, I, 475.
id. cacaotina linchenifera, III, 25.
id. cacaotina sacchara-ta, I, 475.
id. emulsiva, I, 179.
id. depilatoria, I, 358.
id. glycyrrhizæ, IV, 74.
id. de gummo arabico, II, 390.

Pasta gummosa sacchara—ta, id.
id. lichenifera, III, 30.
id. linacina, II, 353.
id. liquiritiæ, IV, 74.
id. liquiritiæ fusca, IV, 75.
id. ad nævos, I, 488.
id. regia, I, 179.
Pastillas absorventes, III, 50.
id. de acido citrico, I, 64.
id. afrodisiacas, I, 192.
id. de agracejo, I, 135.
id. de amapolas, I, 214.
id. antiacidas, III, 50.
id. antiacidas laxantes, id.
id. antihelminticas, III, 133; IV, 217.
id. antimoniales de Kunkel, I, 305.
id. antiperiodicas, IV, 26.
id. aromaticas, I, 518.
id. atemperantes, I, 102.
id. de azufre, I, 400.
id. de azufre de Tolú, I, 420.
id. contra el bocio, II, 24.
id. de Calabria, III, 76.
id. de caldo, II, 353.
id. de castoreo, II, 48.
id. de catecu, II, 60.
id. de catecu olorosas, II, 61.
id. de catecu y de magnesia, id.
id. de Chausier, III, 324.
id. de Chinsange, II, 89.
id. de cidra, II, 103.
id. desalterantes, III, 478.
Pastillas diarrhodon, IV, 102.
id. digestivas, IV, 227.
id. emenagogas, II, 445, 519.
id. emeticas, I, 336; II, 215.
id. de énula, II, 227.
id. escilíticas, II, 249.
id. escitantes, III, 371, 393.
id. estimulantes, II, 369.
id. ferruginosas, II, 445.
id. gomosas, II, 401.
id. de guayaco, II, 419.
id. de ipecacuana, II, 522.
id. de ipecacuana compuestas, II, 523.
id. de ipecacuana opiadas, id.
id. del Japon, II, 291.
id. de kermes, I, 310.
id. de Lagneau, III, 116.
id. de liquen islandico, III, 30.
id. de lirio, III, 34.
id. de malvavisco, III, 64.
id. de manus—Christi, I, 396.
id. marciales, II, 445, 452.
id. de menta piperita, IV, 364.
id. de mercurio sacarinas, III, 116.
id. mercuriales, III, 156, 170.
id. mogoles, I, 193.
id. de la moka, II, 518.
id. odoriferas, I, 453.
id. de ojos de cangrejo, I, 496.
id. de opio, III, 313.
Pastillas pectorales, I, 310, 400, 419; II, 215; III, 313.
id. purgantes, II, 241, 539. III, 179.
id. de quina, IV, 15, 26.
id. de regaliz, IV, 25.
id. de ruibarbo, IV, 129.
id. contra la sed, I, 102.
id. solutivas, II, 533.
id. de Spitzlay, I, 287.
id. de tribus, III, 491.
id. vermífugas, III, 134, 164, 177.
id. vermífugas de Barthez, III, 164.
idi de vinagre, I, 52.
id. de violetas, IV, 349.
Pastinaca, III, 370.
id. de opoponax, III, 355.
id. sativa, III, 370.
Patata, id.
Pediluvio irritante, IV, 59.
Pedilubium ex armoracio, IV, 59.
Pedo de lobo, III, 371.
Pelitre, id.
Peltigera aphthosa, III, 24.
id. canina, id.
id. horizontalis, id.
id. polydactyla, id.
id. venosa, id.
Pene de ballena, II, 342.
id. de ciervo, id.
id. de toro, id.
Penea sarcocolia, IV, 168.
Pensamiento, III, 374.
Peonía, III, 375.
id. officinalis, id.
Pentaphylum, III, 526.
Pera marcial, II, 488.
Perca fluviatilis, I, 494.

Percloruro de mercurio, III, 185.
Perdeutoxi-sulfuro de antimonio, I, 315.
Peregil, III, 379.
id. comun, id.
id. de Macedonia, id.
id. del monte, III, 357.
Perfoliata, III, 382.
Periclimenum, III, 47.
Perifollo, III, 382.
id. comun, id.
id. oloroso, id.
id. silvestre, id.
Periploca indica, IV, 376.
id. scamonea, II, 239.
Perlas, I, 494.
Perlæ, id.
id. textiles, id.
id. uniones, id.
Permurias hydrargyri, III, 185.
Peroxido de cobre, II, 122.
id. de hierro estalactico, II, 453.
id. de manganesa, III, 81.
id. de mercurio, III, 142.
id. de plomo, III, 405,
Peroxidum manganesii nigrum, III, 81.
Persica vulgaris, I, 143.
Persicaria, III, 384.
id. acre, id.
id. dulce, id.
Persicaria minor, id.
id. creus, id.
Persulfuro de estaño, II, 288.
Pervinca, IV, 347.
Pes cati, III, 388.
id. columbi, II, 373.
id. leonis, I, 197.
Petroleo, III, 385.
id. endurecido, I, 382.
Petroleum, III, 385.
Petroselinum, III, 379.
id. macedonicum, id.
Peucedan, III, 385.
Peucedanum, id.
id. oficinale, III, id.
Pez, III, 386.
id. blanca, IV, 307.
id. de Borgoña, id,
id. coriacea, I, 382.
id. líquida, III, 386.
id. de montaña, I, 382.
id. para cauterios, IV, 284.
id. resina, IV, 307.
id. seca, III, 308.
Phænicites, I, 494.
Phænix dactilifera, III, 363.
Phaseolus communis, II, 544.
Phellandrium aquaticum, II, 311.
Philonium romanum, III, 353.
Phosphas ammoniæ, I, 250.
id. calcium stibiatum, I, 297.
id. calcis, I, 501.
id. calcis stibiatus, I, 297.
id. ferri, II, 463.
id. hydrargyri, III, 207.
id. magnesiæ, III, 52.
id. natricum, IV, 230.
id. sodæ, id.
Phyllanthus emblica, III, 237.
Physalis alkerkengi, I, 174.
Physcia islandica, III, 24.
id. nivalis, III, 23.
id. prunastri, III, 25.
Physeter macrocephalus, I, 215; II, 271.
Phytolacea decandra, II, 313.
Picapica, III, 388.
Picrotoxinum, II, 140.
Pie de gato, III, 388.
Piedra del águila, II, 453.
id. de Armenia, II, 123.
id. armenica, id.
id. azul, I, 201.
id. calaminar, IV, 392.
id. de carpa, I, 494.
id. de cauterio, III, 456.
id. divina, II, 127.
id. especularia, I, 504.
id. de esponja, I, 494.
id. de Goa, I, 193.
id. infernal, III, 399.
id. judaica, I, 494.
id. lince, id.
id. medicamentosa, I, 204.
id. milagrosa, II, 128.
id. nefrítica, III, 389.
id. oftalmica, II, 127.
id. de perca, I, 494.
id. pomez, III, 389.
id. porcina, I, 461.
id. de puerco, I, 492.
id. prunela, III, 482.
id. de vaca marina, I, 502.
id. vulneraria esterna, II, 128; IV, 405.
Piel de Goulard, III, 420.
Pigmentum indicum, I, 340.
Pila marina, IV, 408.
Pilæ damarum, I, 461.
id. rupicaprarum, id.
Píldoras absorventes, I, 462; IV, 128, 224.
id. de acetato de plomo, III, 423.
id. de acetato de plomo y de ipecacuana, id.
id. de acibar, I, 18.
id. de acibar y de agarico, I, 20.
id. de acibar y de asa fétida, id.

Píldoras de acibar y de asafétida jabonosas, id.
id. de acibar y de coloquintida, I, 21.
id. de acibar y de goma amoniaco, I, 25.
id. de acibar jabonosas, I, 18.
id. de acibar marciales, I, 18, 23.
id. de acibar y de mirra, I, 37.
id. de acibar y de quina, I, 40.
id. de acibar y de sustancias fétidas, I, 23.
id. de acibar y de tártaro emético, I, 20.
id. de acónito mercuriales, III, 195.
id. alcanforadas, I, 146.
id. de almáciga, I, 27.
id. de almizcle, I, 191.
id. de aloes, mirra y guayaco, I, 301.
id. aloeticas amargas, I, 40.
id. aloeticas marciales, I, 23.
id. alterantes, II, 420; III, 165, 166, 167.
id. contra la amaurosis, I, 372.
id. de ambar, I, 215.
id. amargas, II, 360; III, 240; IV, 128.
id. amargas y catárticas, I, 38.
id. de Anderson, I, 26.
id. angélicas, I, 44.
id. anodinas, I, 317; III, 318.
id. anodinas y sudoríficas, I, 337.
Píldoras antelmínticas, I, 44; II, 72, 287; III, 164, 168, 171, 284.
id. antelmínticas purgantes, III, 165.
id. ante cibum, I, 26.
id. antiartríticas, I, 243, 306, 317, 320, 339; II, 420; III, 140, 175.
id. antiasmáticas, II, 24.
id. antidisentéricas, III, 329; IV, 15.
id. antielmínticas, IV, 216.
id. antieméticas, III, 320, 351.
id. antiepilépticas, III, 400; IV, 327.
id. antiescrofulosas, I, 427; III, 133.
id. antiespasmódicas, I, 191, 369; III, 324, 400; IV, 327.
id. antiespasmódicas y tónicas, I, 147.
id. antifebriles, IV, 26
id. antiflogísticas, III, 423.
id. antigonorráicas, I, 415.
id. antiherpéticas, I, 427; III, 136, 166, 168, 175, 196.
id. antihidrópicas, II, 382; III, 181, 284.
id. antihistéricas, I, 191, 369, 434; II, 47.
id. antiictéricas, I, 44, 446; III, 163.
id. antilácteas, I, 147; III, 173; IV, 234.
id. antimoniales, I, 307.
Píldoras antimoniales compuestas, III, 170.
id. de antimonio compuestas, III, 169.
id. antireumáticas, I, 147; III, 175.
id. antisépticas, I, 147.
id. antisifilíticas, III, 169, 173, 175, 196.
id. antisifilíticas de Penk, III, 116.
id. antivenéreas, III, 138, 163, 164, 199.
id. antivenéreas de Kæmpf, III, 169.
id. antivenéreas de Lassone, III, 203.
id. antivenéreas de Swediaur, III, 224.
id. aperitivas, I, 22; II, 444; III, 181, 483.
id. aromáticas, I, 19.
id. de arseniato de hierro, I, 366.
id. arsenicales, I, 362.
id. de asafétida compuestas, I, 369.
id. de asafétida simple, id.
id. asiáticas, I, 362.
id. astringentes I, 203, 205, 415; II, 59, 444, 468; III, 172, 240; IV, 70, 269, 292, 309.
id. astringentes y tónicas, II, 467.
id. azules, II, 130; III, 117.
id. de Bacher, II, 210.
id. de Baldinger, III, 138.
id. balsámicas, I, 38, 45, 57, 409; II, 514; III, 239; IV, 293, 309.
id. balsámicas aperitivas, IV, 292.

Píldoras balsámicas marciales, III, 239.
id. balsámicas opiadas, III, 313.
id. de belladona, I, 446.
id. de Belloste, III, 130.
id. benditas de Fuller, I, 23.
id. benzoicas, I, 58.
id. blancas, II, 460; III, 179.
id. de brucino, I, 470.
id. calibeadas, II, 444, 459.
id. calmantes, I, 312, 434; II, 156, 192; III, 249, 250, 312; IV, 394.
id. calmantes béquicas, III, 294.
id. de cantáridas, II, 16.
id. de cantáridas mercuriales, II, 17.
id. de cantáridas opiadas, id.
id. de carbon alcalinas, III, 462.
id. carminativas, I, 462.
id. de castoreo compuestas, II, 47.
id. catarticas, I, 21; III, 178.
id. cefálicas, II, 538.
id. de celidonia, II, 76.
id. de Celler, III, 215.
id. de cicuta, II, 92.
id. de cinoglosa, III, 325.
id de cloruro de oro, III, 358.
id. de cobre amoniacal, II, 130.
id. de cohombro silvestre, II, 151.
id. de coloquíntida compuestas, II, 162.
id. coquias, I, 21.
Píldoras depurativas, I, 317; III, 182.
id. de los tres diablos, III, 173.
id. diaforéticas, III, 138.
id. de digital, II, 191.
di. diuréticas, II, 248; III, 184; IV, 292.
id. doradas, I, 46.
id. de dulcámara, II, 202.
id. dulcificantes, II, 388.
id. dulcificantes de Mesué, III, 325.
id. de duobus, I, 45.
id. eccoproticas, I, 23.
id. ecfracticas, I, 38.
id. emenagogas, I, 24, 39, 191, 369, 373; II, 210, 382, 443, 451, 459, 468; III, 172, 250; IV, 145.
id. eméticas, II, 125.
id. de escamonea mercuriales, III, 203.
id. escilíticas, II, 246.
id. escitantes, II, 156; III, 284, 371, 400.
id. escocesas, I, 26.
id. contra las escrófulas, III, 133.
id. espectorantes, II, 249, 522; III, 170; IV, 401.
id. esplénicas, I, 25, 46.
id. esténicas, III, 169.
id. estibiadas, I, 305, 338.
id. estimulantes, III, 283, 392; IV, 128.
id. estípticas, III, 423.
Píldoras estomacales, I, 40, 43; II, 443; III, 239; IV, 26.
id. de estoraque, III, 320.
id. de estracto de opio, III, 325.
id. de estricnina, II, 293.
id. etiopicas, III, 137.
id. etiopicas compuestas, id.
id. febrífugas inglesas, IV, 15.
id. fétidas mayores, II, 160.
id. fétidas, I, 369.
id. fétidas marciales, I, 373.
id. fisagogas, II, 248.
id. contra la flema, I, 137.
id. fortificantes, II, 125; III, 240.
id. fundentes, I, 25, 44, 252; II, 92, 192, 241, 247, 312, 379, 443, 451, 460, 510; III, 140, 156, 163, 168, 169, 172, 175, 360, 450; IV, 127, 261, 293, 318.
id. fortificantes y diuréticas, II, 192.
id. fortificantes de Finke, III, 167.
id. fortificantes y purgantes, I, 304.
id. fortificantes de Richter, I, 338.
id. fortificantes de Stahl, I, 23.
id. de gálvano compuestas, II, 326.
id. contra la gangrena de hospitales, I, 191.
id. para terminar la gonorrea, III, 172.

Píldoras de goma amoniaco, II, 379.
id. de goma guta compuesta, I, 25.
id. gomosas laxantes, I, 19.
id. contra la gonorrea, I, 148; III, 132.
id. de grafito, II, 447.
id. de Griffith, II, 459.
id. de guayaco, II, 429.
id. de Hahnemann, III, 211.
id. hidragogas, I, 373; II, 151, 184, 192, 248; III, 170, 178, 513.
id. hidragogas de Boncio, I, 26.
id. hidragogas de Janin, III, 170.
id. de hidriodato de potasa, II, 518.
id. de hidroclorato de manganesa, III, 81.
id. incisivas, I, 137, II, 249, 452.
id. inglesas, I, 18.
id. de iodo, II, 515.
id. de ioduro de mercurio, III, 204.
id. de jabon, III, 517.
id. de jabon aloéticas, I, 18.
id. de jabon compuestas, I, 369; III, 177.
id. jabonosas, I, 489.
id. jabonosas de acibar, I, 18.
id. de jalapa compuestas, III, 178.
id. de James, I, 301.
id. kermesinas, I, 313.
id. de Keyser, III, 226.
id. laxantes, II, 452, 532, 538; IV, 235.
Píldoras laxantes y fundentes, III, 179.
id. de Leslie, III, 181.
id. litontrípticas, IV, 224.
id. lunares, III, 400.
id. de manteca de cacao, I, 477.
id. de Maquiabelo, I, 38.
id. marciales, II, 442, 451, 468, 496.
id. mayores de Hoffmann, III, 194.
id. de Meglin, I, 434.
id. de mercurio dulce, III, 162.
id. de mercurio dulce y de alcanfor, III, 172.
id. de mercurio dulce y de guayaco, III, 174.
id. de mercurio dulce y de jalapa compuestas, III, 178.
id. de mercurio dulce y de jalapa simples, III, 177.
id. de mercurio dulce y de jalapa jabonosas, id.
id. de mercurio dulce y de jalapa jabonosas compuestas, III, 178.
id. de mercurio dulce y de opio, III, 181.
id. de mercurio dulce y de opio compuestas, III, 170.
id. de mercurio dulce glicirrizadas, III, 118.
id. de mercurio sulfurado estibiadas, III, 137.
id. de mercurio trementinadas, id.
id. de mercurio terebintinado, III, 119.
Píldoras mercuriales, III, 120, 173, 175, 202.
id. mercuriales alcanforadas, III, 175.
id. mercuriales amoniacales, III, 223.
id. mercuriales diuréticas, III, 211.
id. mercuriales jabonosas, III, 177.
id. mercuriales de Moscati, III, 140.
id. mercuriales de Nolte, III, 224.
id. mercuriales de Plenk, III, 116.
id. mercuriales de Plenk compuestas, id.
id. mercuriales purgantes, III, 131.
id. de Morton, I, 157.
id. de Moscow, II, 158.
id. napolitanas, III, 131.
id. narcóticas, II, 93; III, 294.
id. nauseosas, II, 522.
id. de opio, III, 318.
id. de opio compuestas, III, 325.
id. de opio jabonosas, III, 323.
id. ópticas, I, 22.
id. orientales, III, 325.
id. de oro fulminante, III, 361.
id. de oxido de antimonio y de sulfuro de mercurio, III, 133.
id. pectorales, I, 317; II, 248, 379.
id. pectorales opiadas, III, 313.
id. pectorales tónicas, II, 459.
id. perpetuas, I, 293.
id. de pez, III, 388.
id. de Plummer compuestas, III, 167.

Píldoras de Plummer simples, III, 166.
id. policrestas, II, 207.
id. de precipitado rojo, III, 145.
id. de Pringle, III, 181.
id. profilacticas de las viruelas, III, 165.
id. profilacticas de viruela, id.
id. de protocloruro de mercurio, III, 162.
id. de protocloruro de mercurio con el azufre dorado de antimonio, III, 166.
id. purgantes, I, 19, 21, 45, 46; II, 164, 183, 210, 241, 394, 532, 538; III, 130, 163, 177, 181.
id. purgantes de calomelanos, III, 177.
id. de quina, IV, 15.
id. relajantes, I, 18.
id. de resina de jalapa, III, 177.
id. resolutivas, III, 135, 168.
id. de Rufo, I, 37.
id. de ruibarbo, IV, 127.
id. de ruibarbo compuestas, I, 43.
id. sedantes, I, 434; III, 312.
id. de Sedillot, III, 123.
id. sialagogas, III, 182, 195.
id. solares, III, 361.
id. de subcarbonato de cobre y de amoniaco, II, 123.
id. de Stahl, I, 301.
id. de sublimado y de opio, III, 198.
Píldoras de succino, I, 27.
id. sudoríficas, II, 420.
id. sudoríficas calmantes, I, 313.
id. suecas, III, 169.
id. de sulfato de hierro, II, 465.
id. de sulfato de hierro compuestas, II, 469.
id. de sulfuro de antimonio y de cal, I, 322.
id. de tabaco, IV, 243.
id. de Taddei, III, 198.
id. tartáreas de Schræder, I, 23.
id. contra la tenia, I, 427; III, 132; IV, 293.
id. de Thomson, II, 467.
id. tónicas, I, 465; II, 125, 158, 210, 360, 443, 460, 469; IV, 4.
id. tónicas y antiespasmódicas, I, 301.
id. tónicas y calmantes, IV, 15.
id. tónicas y purgantes, IV, 183.
id. traumáticas, IV, 292.
id. de trementina, IV, 292, 308.
id. de tribus, I, 44.
id. de ungüento mercurial, III, 123.
id. de veratrina, IV, 341.
id. de Vigarous, III, 163.
id. de Vogler, III, 193.
id. de Werlhof, III, 183.
id. de Zeller, III, 215.
Píldoras de zumaque venenoso, IV, 410.
Pilulæ aloes amaræ, I, 40.
id. aloes cum colocynthide, I, 21.
id. aloes crocatæ, I, 37.
id. aloes martiales, I, 23.
id. aloes cum myrrha, I, 37.
id. aloeticæ, I, 18.
id. aloeticæ martiales, I, 23.
id. aloeticæ cum mirrha, I, 43.
id. aluminis, I, 205.
id. amaræ catharticæ, I, 38.
id. ambræ, I, 215.
id. ex ammoniaco cum sulphure stibiato, I, 317.
id. ammoniureti cupri, II, 130.
id. analepticæ, I, 301.
id. anglicæ, I, 18.
id. ante cibum, I, 26, 40.
id. anthelminticæ, III, 164.
id. anthelminticæ purgantes, III, 165.
id. anthystericæ, I, 369.
id. antimoniales Kleinii, I, 307.
id. antispasmodicæ, I, 369.
id. antisyphiliticæ et resolventes, III, 163.
id. antivenereæ, III, 145.
id. aperientes, I, 22.
id. aperientes hydrargyratæ, III, 181.
id. aperientes laxantes, I, 44.
id. aperientes Stahlii, II, 444.
id. aperitivæ, III, 483.

Pilulæ cum arnica è camphora, I, 317.
id. ex asafetida, I, 369.
id. ex asafetida helleboratæ, I, 373; II, 210.
id. ex asafetida saponatæ, I, 369.
id. ex asafetida scilliticæ, I, 373.
id. ex asafetida martiatæ, id.
id. aureæ, I, 46.
id. balsamicæ, II, 210.
id. balsamicæ Mortonianæ, I, 57.
id. balsamicæ cum opio, III, 313.
id. benedictæ Fulleri, I, 23.
id. benzoicæ, I, 58.
id. bilis, I, 462.
id. in bronchitidæ lenta, II, 312.
id. cachecticæ, II, 444.
id. ceruleæ, II, 130.
id. calcariæ sulphurato-stibiatæ, I, 322.
id. cambogiæ compositæ, I, 25.
id. camphoratæ, I, 146.
id. carbonum kalinæ, III, 462.
id. castorei compositæ, II, 47.
id. catarrhales, III, 178.
id. catharticæ, II, 162.
id. chalybeatæ, II, 451.
id. chinæ aluminatæ, I, 205.
id. coccini, I, 21.
id. cocchii, id.
id. cochiæ, id.
id. colocynthidis compositæ, I, 21; II, 162.
id. colocynthidis extracti compositi, II, 164.
Pilulæ communes, I, 37.
id. conii, II, 92.
id. conii cinnabarinæ, III, 156.
id. è conio, II, 92.
id. cupratæ, II, 130.
id. cupri ammoniaci, id.
id. è cupro ammoniaco, id.
id. de cynogloso, III, 325.
id. deprimentes, III, 249.
id. depurantes, III, 167.
id. desobstruentes, I, 338; II, 247, 379, 452.
id. diaphoretico-sedativæ, I, 312.
id. diaphoretico-stibiatæ, I, 301.
id. diureticæ resolventes, II, 247.
id. diureticæ deprimentes, II, 192.
id. diureticæ roborantes, IV, 308.
id. è chelidonio, II, 76.
id. ecphracticæ, I, 38, 46; IV, 127.
id. elaterii compositæ, II, 151.
id. ex elaterii, id.
id. Emmanuelis, I, 38.
id. emmenagogæ et leviter deprimentes, III, 250.
id. emmenagogæ irritantes, II, 468.
id. extracti catholici, II, 241.
id. fellis tauri amaræ, I, 462.
id. ferri compositæ, II, 452.
id. è ferro laxantes, id.
id. ferulacæ cum ammonio, I, 369.
id. ferulacæ cum arnica, et tartaro stibiato, I, 372.
id. ferulacæ camphoratæ, I, 373.
Pilulæ fetidæ, I, 369.
id. fetidæ martiatæ, I, 373.
id. galbani compositæ, II, 326.
id. è galbano martiatæ, II, 443.
id. è gentiana crocatæ, I, 40.
id. Griffithii, II, 459.
id. guaiaci, II, 429.
id. guaiaci cum stibio, I, 320.
id. guaiacinæ, II, 429.
id. de gummatibus, II, 326.
id. gummosæ, I, 369; II, 326.
id. gummosæ laxativæ, I, 19; II, 326.
id. gummi guttæ aloeticæ, I, 25.
id. hellebori, II, 210.
id. hellebori aloeticæ, id.
id. hellebori compositæ, id.
id. hellebori nigri compositæ, id.
id. ex helleboro et myrrha, id.
id. de hiera, I, 20.
id. hieræ cum agarico, I, 20.
id. hydragogæ, II 513.
id. hydrargyri, III, 117, 211.
id. hydrargyri gummosi, III, 116.
id. hydrargyri jalappinæ, III, 177.
id. hydrargyri muriatis camphoratæ, III, 172.
id. hydrargyri sub-muriaticis compositæ, III, 167.
id. ex hydrargyro catharticæ, III, 177.
id. ex hydrargyro diureticæ, III, 211.

Pilulæ ex hydrargyro muriatico miti, III, 162, 177.
id. ex hydrargyro muriatico cum sulphure stibiato aurantiaco, III, 166.
id. ex hydrargyro nitrico, III, 215.
id. ex hydrargyro oxidulato nigro, III, 211.
id. hydropicæ, I, 26.
id. hypnoticæ, III, 312.
id. hystericæ, II, 326.
id. iodatæ, II, 515.
id. ex jalappæ resina, III, 177.
id. kermesinæ, I, 312.
id. laxantes, III, 177.
id. laxantes cum mercurio, III, 178.
id. majornæ, I, 45.
id. magnesii muriatici, III, 81.
id. martiales, II, 468.
id. martiate cum galbano et myrra, id.
id. mistichinæ, I, 27.
id. menagogæ, II, 468.
id. menagogæ catarticæ, I, 46.
id. ad menstrua, I, 24, 39.
id. mercuriales, III, 177, 178.
id. mercuriales Plenkii, III, 116.
id. ex mercurio dulci, III, 162.
id. ex mercurio solubili Hahnemanni, III, 211.
id. ad morbos cutaneos, I, 317.
id. ad morbos deploratos, I, 301.
Pilulæ myrrhæ amaræ cum ammoniaco, III, 240.
id. myrrhæ cum arnica, id.
id. myrrhæ compositæ I, 369; II, 459.
id. nauseam cientes, II, 522.
id. opiatæ, III, 318.
id. opii compositæ, III, 325.
id. ex opio, III, 318.
id. opticæ, I, 22.
id. pectorales, II, 248, 379.
id. physagogæ, II, 448.
id. picis, III, 388.
id. Plummeri, III, 166, 167.
id. polychrestæ, III, 145.
id. polychrestæ balsamicæ, I, 38.
id. polychrestæ Starkeyi, II, 207.
id. Pringelii, III, 181.
id. purgantes, III, 177, 178.
id. purgantes cum hydrargyro muriatico miti, III, 177.
id. purgantes cum mercurio, III, 178.
id. pyrethri, III, 371.
id. resolventes, I, 339; II, 192, 397; III, 163, 169, 517.
id. resolventes diureticæ et deprimentes, II, 192.
id. resolventes cum mercurio, III, 167.
id. resolventes cum rheo, IV, 127.
id. resolventes in scrophulis, I, 427.
id. rhabarbarinæ antacidæ, IV, 128.
Pilulæ rhei, IV, 127.
id. rhei compositæ, I, 43.
id. è rheo cum natro acetico, IV, 127.
id. roborantes ad blennorrhæam, IV, 128.
id. Rufi, I, 37.
id. saponaceæ, I, 489; III, 517.
id. scamonii hydrargyrossæ, III, 203.
id. è scammonio compositæ, III, 203.
id. scilliticæ, II, 246.
id. sedativæ, III, 312.
id. solares, III, 361.
id. specificæ, III, 223.
id. stibiatæ, I, 305.
id. stibiatæ cum opio et laxantibus resinosis, I, 305, 320.
id. è stibio et hydrargyro, III, 166.
id. stimulantes ad gonorrhæam, IV, 308.
id. stomachicæ, I, 40.
id. storacæ, III, 320.
id. strychnini, II, 239.
id. subcarbonatis sodæ, IV, 224.
id. de succino, I, 27.
id. sub sulphatis ammonico cuprici, II, 130.
id. sub sulphatis ferri compositæ, II, 467.
id. sub sulphatis potassæ aloeticæ, I, 26.
id. sulphurato-stibiatæ cum arnica et camphora, I, 317.
id. sulphurato-stibiatæ cum cicuta, id.
id. syphiliticæ, III, 145.

Pilulæ systema nervosum et musculare vellicantes, III, 283.
id. systema nervosum summopere vellicantes, III, 400.
id. tartareæ Bontii, I, 26.
id. tartareæ Schroederi, I, 23.
id. ex tartaro boraxato, III, 513.
id. è terebinthina, IV, 308.
id. tonicæ Bacheri, II, 210.
id. tonicæ nervinæ, II, 468.
id. torpentes et resolventes, IV, 318.
id. toxicodendri, id.
id. valerianæ ferulaceæ, I, 369.
id. ad variolas, III, 165.
id. venereæ, II, 130.
Pimienta, III, 389.
id. de agua, III, 384.
id. comun, III, 389.
id. de Guinea, id.
id. de la Jamaica, id.
id. larga, id.
id. de muralla, IV, 212.
id. de las Indias, I, 459.
id. de los ingleses, III, 389.
Pimpinela, III, 394.
id. blanca, id.
id. comun, III, 396.
id. mayor, III, 394.
id. menor, III, 396.
id. de los prados, IV, 165.
Pimpinella alba, III, 394.
id. anisum, I, 285.
id. hircina, III, 394.
id. hortensis, III, 397.
id. italica, III, 397; IV, 165.
id. magna, III, 395.
Pimpinella minor, III, 396.
id. nigra, III, 395.
id. nostras, III, 394.
id. rubra, III, 397.
id. saxifraga, III, 394.
id. umbellifera, id.
Pino, III, 397.
id. silvestre, id.
Pinus canadensis, I, 408.
id. maritima, IV, 279.
id. muglio, IV, 294.
id. pinea, III, 397.
id. sylvestris, IV, 279.
Piñones dulces, III, 397.
Piper album, III, 389.
id. betel, I, 459.
id. candatum, II, 184.
id. cubeba, id.
id. hispanicum, III, 389.
id. indicum, id.
id. jamaicense, id.
id longum, id.
id. nigrum, id.
id. tabasci, III, 390.
Piper turcicum, III, 389.
Pipera, III, 388.
Piperino, id.
Piperinum, id.
Piretro, III, 371.
Pirola, III, 398.
id. de hojas redondas, id.
id. umbelada, id.
Pisa pro fonticulis, IV, 284.
Pistacia lentiscus, I, 175.
id. terebinthus, IV, 278.
id. vera, I, 172.
Pistaciæ, id.
Pix atra, IV, 308.
id. burgundica, IV, 307.
id. cidria, III, 386.
id. græca, IV, 308.
id. liquida, III, 386.
id. liquida nigra, id.
Pix navalis, IV, 308.
id. vegetabilis, id.
Plantago angustifolia, III, 42.
id. aquatica, id.
id. cynops, III, 527.
id. lanceolata, III, 42.
id. latifolia, id.
id. major, id.
id. medica, id.
id. psyllium, III, 527.
Plata copelada, III, 398.
id. pura, id.
Platina, III, 401.
Plomo, III, 402.
id. gris, I, 464.
id. quemado, III, 403.
id. espatico, III, 406.
Plumbago, II, 446.
id. europæa, II, 199.
Plumbum, III, 403.
id. acetatum, III, 421.
id. oxidatum, III, 403.
id. oxidatum rubrum, id.
Pozgereba, III, 447.
Pocion absorvente, I, 222; III, 298, 470; IV, 224.
id. aceitosa, I, 9.
id. acetosa y oleosa, I, 54.
id. acetosa, II, 399.
id. acida, I, 66.
id. acidula, I, 52.
id. contra la afonia, I, 170.
id. alcalina, III, 474.
id. alcalina gaseosa, I, 61.
id. alcanforada, IV, 229.
id. alcohólica alcanforada, I, 154.
id. alexifarmaca, I, 266.
id. alternante, I, 332.
id. aluminosa, I, 210.
id. amoniacal de Peyrilhe, I, 244.
id. anodina, I, 114.
id. antihelmíntica, id.

Pocion antiácida, III, 51.
id. antiartrítica, II, 420, 429.
id. antiasmática, I, 262; III, 470.
id. anticatarral, II, 260.
id. anticlorótica, I, 99.
id. contra el croup, I, 336.
id. antidisentérica, III, 297.
id. antielmíntica, IV, 85, 215.
id. antiemética, I, 61; II, 524.
id. antiemética y astringente, II, 64.
id. antiepiléptica, II, 337; IV, 328.
id. antiescorbútica, III, 471; IV, 27.
id. antiescrofulosa, I, 246; IV, 35, 225.
id. antiespasmódica, I, 91, 222, 266, 302; II, 48, 56, 296, 304, 523; III, 278, 347, 470; IV, 264, 369.
id. antiespasmódica y diurética, II, 306.
id. antiespasmódica y fundente, id.
id. antiespasmódica y tónica, IV, 29.
id. antiestrumosa, III, 470.
id. antifebril, I, 82.
id. antiflogística, III, 485.
id. antigonorréica, I, 411; II, 185; III, 285.
id. antihemorrágica, I, 210; IV, 29.
id. antihidrópica, III, 79.
Pocion antihistérica, I, 266; II, 48, 56.
id. antiláctea, III, 471.
id. antitísica, I, 262; II, 36.
id. antinefrítica, II, 392; III, 489.
id. antiperiódica, III, 296; IV, 29.
id. antipleurítica, I, 302.
id. antiséptica, I, 263; IV, 29, 38.
id. antisifilítica, III, 189.
id. antitetánica, I, 237.
id. antivomitiva, I, 61.
id. aperitiva, III, 485, 497.
id. aromática, I, 391.
id. contra el asma, I, 222.
id. astringente, I, 99, 117, 200, 210, 264, 466, 513; II, 66, 456; III, 299; IV, 27, 41, 70, 214, 228.
id. astringente blanca, I, 411.
id. atemperante, III, 158.
id. balsámica, I, 3, 411.
id. béquica, I, 261.
id. blanca, I, 401.
id. calmante, I, 59, 114, 375, 447; II, 56, 93, 194, 197, 304, 389, 392; III, 250, 276, 296, 297, 298, 315; IV, 315.
id. calmante de Andry, III, 117.
id. calmante y diurética, III, 487.
id. capivi, I, 401.
Pocion cardiaca, I, 246, 391; II, 175.
id. carminativa, I, 222; III, 296; IV, 368.
id. catártica, III, 53; IV, 53, 233.
id. catártico diaforética, I, 339.
id. clórica, II, 118.
id. confortante, I, 391.
id. contra la coqueluche, III, 427.
id. cordial, III, 347.
id. cordial diurética, II, 231.
id. contra el croup, I, 336.
id. demulcente, I, 110, 114.
id. diaforética, I, 244, 268, 302, 337.
id. diaforética y béquica, I, 303.
id. contra la diarrea, I, 264.
id. digestiva, IV, 225.
id. diurética, I, 91, 262, 419; II, 6, 104, 153, 193, 197, 252, 256, 260, 301; III, 389, 470, 484, 486, 496, 498, 510, 513; IV, 246, 300.
id. diurética y calmante, III, 500.
id. diurética de Milmann, id.
id. contra los dolores de tripas de los niños, III, 86.
id. drástica, I, 118.
id. dulcificante, I, 187; II, 274; III, 22; IV, 149.
id. efervescente, I, 61.
id. contra la embriaguez, I, 222.
id. emética, I, 314, 329, 381; II, 523, 526.

Pocion emética cordial, I, 332.
id. emenagoga, I, 150; II, 6, 477; IV, 121, 146.
id. emetizada, I, 329.
id. emetocatártica, I, 339.
id. emulsiva, I, 180.
id. de énula compuesta, II, 231.
id. escilítica acilulada, II, 260.
id. escitante, I, 262, 482; II, 118, 285, 316, 514; IV, 43, 330, 410.
id. escitante y fundente, IV, 133.
id. escitante y marcial, II, 496.
id. escitante y nervina, I, 354.
id. espectorante, I, 91, 262, 375; II, 259, 364; III, 470; IV, 226.
id. espectorante é incisiva, II, 526.
id. estimulante y tónica, IV, 30.
id. estibiada, I, 329.
id. estibio-opiada, I, 337.
id. estimulante, I, 246, 470; II, 293, 518; IV, 300.
id. estomacal, I, 19, 126, 466; II, 157; IV, 5.
id. etérea, II, 304.
id. etérea alcanforada, I, 153.
id. febrífuga, I, 364, 365, 478; II, 46, 526; III, 316, 484; IV, 27, 57, 227.
id. febrífuga amarga, IV, 21.
id. febrífuga y laxante, IV, 28.
Pocion ferruginosa, II, 477.
id. fosfórica, II, 315.
id. fundente, I, 335; II, 519; III, 479.
id. gomosa, II, 391, 399.
id. gomosa escilítica, II, 261.
id. gomosa opiada, I, 114.
id. con greda, I, 500.
id. hemastática, I, 210; II, 469.
id. contra los herpes, III, 464.
id. hidragoga, I, 337; II, 76, 194, 222; III, 510; IV, 321.
id. hipnóptica, I, 114; III, 296.
id. de Hulme, I, 62.
id. incisiva, II, 261; III, 473.
id. jabonosa, III, 470, 519.
idi kermetizada, I, 313.
id. laxante, III, 78, 479; IV, 230, 253.
id. laxante aceitosa, IV, 195.
id. laxante y fundente, IV, 133.
id. de Viena, IV, 200.
id. litontríptica, I, 82; III, 52, 469, 475; IV, 226.
id. con el maná y el ruibarbo, IV, 139.
id. de marte dorada, II, 273.
id. de marte salada, id.
id. mercurial, III, 112.
id. mercurial de Plenk, III, 114.
id. narcótica, III, 315.
id. nervina, II, 56.
id. ocítica, IV, 266.
id. oleosa, I, 186.
Pocion con ogimiel, I, 54.
id. paregórica, III, 295.
id. pectoral, I, 71, 72, 186, 304, 331, 337, 419; II, 205, 388; III, 97, 296, 453; IV, 149.
id. pectoral amarga, III, 450; IV, 31.
id. purgante, I, 314, 339, 340; II, 184, 256, 278, 555, 544; III, 51, 78, 511; IV, 129, 85, 203, 231, 253.
id. purgante mayor, II, 535.
id. purgante alcanforada, IV, 207.
id. purgante y febrífuga, III, 472; IV, 207.
id. purgante inglesa, II, 540.
id. purgante para los niños, III, 504.
id. purgante y tónica, IV, 139.
id. purgante y vermífuga, IV, 129, 206.
id. con el cocimiento de quina, IV, 35.
id. con quina en polvo, IV, 20.
id. de quina compuesta, IV, 31.
id. refrigerante, III, 487.
id. de Rivero, I, 61.
id. salina, III, 53.
id. salina purgante, I, 339.
id. sedante, I, 435; III, 27; IV, 318.
id. sudorífica, I, 106, 253, 264, 331.

Pocion sulfurada, I, 402.
id. sulfurosa, III, 463.
id. tartarica compuesta, III, 511.
id. temperante, III, 485.
id. contra la tenia, I, 413; IV, 300.
id. tonica, I, 264, 284, 375, 391, 432; II, 156, 175, 367, 466; III, 347; IV, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 42, 132.
id. tonica y antiespasmodica, I, 391; IV, 28.
id. tonica marcial, II, 485.
id. vermífuga, I, 17, 230, 291; II, 179, 264, 394; IV, 217, 301.
id. vinosa, I, 525; IV, 348.
id. vomitiva, I, 329, 336.
id. vomitiva estibiada, I, 329.
Podofilo, III, 447.
Podophilum peltatum, id.
Polœnisia dodecandra, III, 251.
Poleo, III, 448.
id. cretico, III, 449.
id. de montaña, id.
Poligala, id.
id. amarga, id.
id. comun, III, 450.
id. de Virginia, id.
Poligonato, III, 453.
Poligono fagopiro, id.
Polipodio, III, 454.
Poliporus officinalis, I, 118.
Politrico, III, 454.
id. comun, id.
Polvos contra el aborto, IV, 115.
id. absorventes, I, 299; II, 76; III, 48; IV, 126.
Polvos de acibar compuestos, I, 24, 27.
id. de ácido benzoico, I, 57.
id. de hojas de aconito, I, 105.
id. de hojas de aconito nitrados, id.
id. æreoforos, I, 60.
id. afrodisiacos, I, 190.
id. de agarico blanco, I, 118.
id. para el agua confortante, I, 449.
id. alcanforados, I, 146.
id. alexifarmacos, I, 199; III, 488.
id. alexifarmacos de Rollwag, I, 199.
id. alexitereos, I, 349; II, 521.
id. de Algaroth, I, 322.
id. de almizcle, I, 191.
id. de almizcle compuestos, id.
id. alterantes compuestos, III, 167.
id. alterantes simples, III, 165.
id. de alumbre, I, 202.
id. de alumbre compuestos, I, 204.
id. aluminosos de Helvecio, I, 203.
id. amargos, I, 33, 358.
id. amoniacales, I, 243.
id. amoniacales alcanforados, id.
id. analepticos, III, 153.
id. del Santo Angel, I, 380.
id. anodinos, III, 213, 320, 322.
id. anónimos, II, 401.
Polvos antelminticos, II, 465, 531, 529; III, 153.
id. antiartriticos, I, 105; II, 240; 358, 419; IV, 86.
id. antiartriticos amargos, II, 77.
id. antiartriticos purgantes, IV, 182.
id. antiasmaticos, I, 398.
id. anticalculosos, II, 337.
id. anticalculosos, I, 474.
id. anticaquecticos, II, 441, 456, 461.
id. anticatarrales, I, 311, 399; II, 312; III, 377, 483.
id. anticloroticos, II, 442.
id. antidisentericos, I, 399; II, 174; III, 320.
id. antiepilepticos, III, 154, 377.
id. antiemeticos, III, 48.
id. antiescrofulosos, III, 134.
id. antiespasmodicos, I, 190, 312; II, 47, 191; III, 155, 169, 324; IV, 12, 326, 352, 392, 393.
id. antiespasmodicos tonicos, II, 441.
id. antifebriles, II, 480; IV, 10.
id. antifebriles astringentes, IV, 9.
id. antiglerosos, II, 529.
id. antiflogisticos, III, 478.
id. antihemotisicos, IV, 163.

Polvos antihelmínticos, I, 133; IV, 327.
id. antihemorragicos, II, 170.
id. antiherpeticos, III, 136.
id. antihidropicos, II, 191.
id. antihistericos, II, 47.
id. antiictericos, IV, 181.
id. antileucorraicos, I, 175; II, 435.
id. antilísicos, I, 269; II, 228; III, 25, 153; IV, 121.
id. antilísicos del conde de Isembourg, I, 499.
id. antimoniales, I, 297, 305.
id. de antimonio sulfurado, I, 304.
id. antinefríticos, I, 508.
id. antipsóricos, I, 398; III, 422.
id. antiperiódicos, IV, 57.
id. antiperiódicos y purgantes, IV, 12.
id. antipleuríticos, I, 398, 503.
id. antiraquíticos, IV, 118.
id. antisépticos, IV, 10, 12, 25.
id. antitísicos, I, 490; II, 125.
id. aperitivos, III, 450, 483.
id. aperitivos y fundentes, III, 478.
id. de arnica compuestos, I, 351.
id. aromáticos, I, 515; IV, 89.
id. arsenicales, I, 359.
id. arsenicales de Bammann, I, 361.
Polvos arsenicales de Justamond, I, 359.
id. arsenicales de Plenciz, I, 361.
id. arsenicales de Plukket, I, 360.
id. arsenicales de Ronsselot, id.
id. astringentes, I, 199, 203; II, 125, 455, 461; III, 320; IV, 9, 163, 269, 406.
id. atemperantes, I, 59; II, 190.
id. atemperantes de Stahl, III, 155.
id. atramentarios, II, 466.
id. balsámicos, III, 238.
id. de belladona, I, 445.
id. bezoárdicos, IV, 13.
id. bezoárdicos de Hallé, I, 299.
id. bezoárdicos ingleses, id.
id. bezoárdicos de Ludwig, I, 503.
id. contra el bocio, II, 23.
id. de café con quina, IV, 9.
id. de cálamo aromático, I, 480.
id. calmantes, I, 464.
id. de calomelanos, III, 160.
id. de calomelanos y de azufre dorado de antimonio, III, 165.
id. de Camerarius, I, 503.
id. de los capuchinos, II, 72.
id. caquécticos, II, 450.
id. contra la caries, I, 369.
Polvos de la princesa de Carignan, III, 377.
id. carminativos, I, 286, 521.
id. de cariofilata y ruibarbo, II, 33.
id. de los cartujos, I, 307.
id. catárticos, I, 15; II, 529; III, 182; IV, 11.
id. catárticos febrífugos, IV, 11.
id. catárticos diuréticos, IV, 232.
id. de catecú compuestos, II, 59.
id. catecréticos, I, 204.
id. católicos, I, 300.
id. cáusticos de Kruger, III, 197.
id. cáusticos de Plenk, III, 145.
id. cefálicos, I, 459; IV, 243.
id. cefálicos de Camerarius, III, 154.
id. cefálicos negros, IV, 394.
id. cefálicos rojos, III, 154; IV, 115.
id. de subcarbonato de cal, I, 496.
id. cetrinos, III, 32.
id. de cloruro de oro, III, 358.
id. contra el cólico, III, 468.
id. de coloquintidas, II, 160.
id. confortantes de Camerarius, III, 153.
id. de contrayerba compuestos, II, 174.
id. contra la coqueluche, I, 312.
id. de coralina compuestos, II, 178.

Polvos cornaquinos, I, 300.
id. corroborantes, IV, 10.
id. cosméticos, I, 179; II, 45; III, 517.
id. dentrificos, I, 498, 504; II, 22; III, 507; IV, 13.
id. dentrificos blancos, III, 389.
id. dentrificos de Pelletier, IV, 57.
id. depurativos de Jaser, I, 306; III, 137.
id. desecantes, I, 146.
id. contra la diabetes, I, 201.
id. diaforeticos, I, 398, 505; II, 419; III, 170, 180, 492.
id. diaforeticos y sedantes, III, 322.
id. contra la diarrea, II, 520.
id. digestivos, I, 286, 338; III, 48, 53, 183, 468, 477.
id. digestivos compuestos, III, 478.
id. digestivos de Klein, III, 503.
id. de digital, II, 190.
id. diureticos, II, 16, 190, 220, 339; IV, 234.
id. diureticos marciales, III, 488.
id. de Dower, III, 321.
id. dulcificantes, III, 64.
id. escropoticos, III, 509.
id. ecfracticos, III, 49, 509.
id. de embalsamar, I, 36.
id. emeticos, I, 335; II, 125, 521.
id. emeticos compuestos, I, 333.
Polvos emeticos de Helvecio, I, 336.
id. emeticos de Maryat, I, 335.
id. emetocatarticos, II, 520.
id. emenagogos, II, 16, 442; IV, 144.
id. de encina compuestos, II, 216.
id. de énula aromáticos, II, 228.
id. contra la erisipela, I, 132; III, 403; IV, 173.
id contra las escrófulas, I, 498.
id. escaróticos, II, 138; III, 145, 224, 423.
id. escaróticos rojos, III, 145.
id. de escila compuestos, II, 245.
id. escitantes, II, 223; III, 172; IV, 126.
id. contra las escoriaciones, I, 499.
id. escrofulosos, III, 255.
id. espectorantes, I, 310, 399; II, 521; III, 180.
id. estibiados, I, 297, 333.
id. estibio-opiados, I, 337.
id. de estaño, II, 286.
id. de estaño ferruginosos, id.
id. estimulantes, III, 7.
id. estípticos, III, 422.
id. estomacales, I, 286; II, 156, 358; IV, 9, 12, 355, 393.
id. estornutatorios, I, 380, 459; II, 185, 207, 308; III, 36, 174, 371; IV, 243.
Polvos de estricnina, II, 294.
id. de etiope antimonial, III, 136.
id. etiópicos, III, 137.
id. febrífugos, I, 252, 300, 359; II, 33, 129, 358, 521; III, 392; IV, 25.
id. febrífugos antiacquecticos, IV, 10.
id. febrífugos estibiados, IV, 9.
id. febrífugos de Fices, IV, 11.
id. febrífugos de Gaub, id.
id. febrífugos de Hoffmann, id.
id. febrífugos é incisivos, IV, 9.
id. febrífugos de Jadelot, IV, 12.
id. febrífugos de Lescure, id.
id. febrífugos nervinos, IV, 11.
id. febrífugos opiados, id.
id. febrífugos salinos, III, 492.
id. febrífugos de Triller, IV, 10.
id. ferruginosos, II, 450.
id. ferruginosos aromáticos, II, 465.
id. de Fontaneilles, I, 361.
id. de Fordyce, III, 514.
id. fortificantes marciales, II, 441; IV, 10.
id. fumigatorios, IV, 256.
id. fundentes, II, 312; III, 503.
id. galactopoiéticos, II, 500.
id. contra la gangrena, I, 134.
id. de genciana compuestos, II, 358.

Polvos gomosos, II, 386.
id. gomosos alcalinos, II, 387.
id. gomosos sulfurados, II, 386.
id. contra la gota serena, I, 273.
id. grafíticos, II, 447.
id. de greda compuestos, I, 497.
id. de greda tebáicos, III, 317.
id. de Grimaldi, II, 461.
id. gustosos, I, 515.
id. de Haly, I, 188.
id. hepáticos rojos, III, 507.
id. hidragogos, II, 529, 538; III, 183.
id. hippiatricos, I, 307.
id. húngaros, I, 200.
id. de chocolate con quina, IV, 9.
id. de incienso compuestos, II, 514.
id. incisivos, I, 319, 333, 398, 508.
id. incisivos compuestos, I, 300.
id. incisivos de Stahl, id.
id. incrasantes, II, 387.
id. de ipecacuana mercuriales, III, 176.
id. de ipecacuana opiados, III, 321.
id. de ipecacuana con el opio, id.
id. de ipecacuana con el opio compuestos, id.
id. de James, I, 297.
id. de kermes é ipecacuana, I, 312.
id. kermecinos, I, 311.
id. kermecinos alcanforados, id.
id. de knox, I, 491.
Polvos laxantes, I, 398; IV, 181.
id. laxantes para los niños, III, 176.
id. laxantes y temperantes de Tronchin, III, 509.
id. de lupulina, III, 41.
id. de magnesia compuestos, III, 48.
id. contra las manchas de la cornea, IV, 406.
id. marciales, II, 440.
id. mercuriales, III, 170.
id. mercuriales antimoniados, III, 165.
id. mercuriales ingleses, 441.
id. de mercurio dulce y de opio, III, 180.
id. de mercurio de Moscati, III, 139.
id. de mirra compuestos, III, 238.
id. mucilaginosos, II, 398.
id. de nardo céltico compuestos, III, 276.
id. nauseabundos, II, 190, 520.
id. para los niños, I, 498.
id. de nitrato de plata, III, 400.
id. de nitro alcanforado, III, 487.
id. de nitro tartarizados, III, 491.
id. de nuez vómica, III, 283.
id. nutritivos, II, 343.
id. ocíticos, III, 393.
id. oftálmicos, I, 285; II, 310.
id. oftálmicos de Baldinger, III, 508.
id. oftálmicos olorosos, IV, 115.
Polvos de opio, III, 317.
id. de opio artificiales, I, 357.
id. paregóricos, III, 48.
di. ad partum promovendum, IV, 227.
id. pectorales, I, 108, 252, 300, 304, 311, 351, 448; III, 15; IV, 181.
id. pectorales balsámicos, I, 399.
id. pectorales y diaforéticos, I, 304.
id. pectorales y fundentes, I, 316.
id. pectorales y resolutivos, I, 399.
id. contra los piojos, II, 72, 285.
id. píricos de Struense, III, 493.
id. de plomo compuestos, III, 407.
id. de Plummer compuestos, III, 167.
id. de Plummer simples, III, 165.
id. contra las poluciones nocturnas, II, 37.
id. de Portland, II, 358.
id. de precipitado rojo, III, 144.
id. de precipitado rojo con el alumbre, III, 145.
id. de estracto de pulsatila, I, 272.
id. purgantes, I, 338, 462; II, 240, 404, 529; III, 48, 53, 176.
id. purgantes absorventes, I, 399.
id. purgantes y diuréticos, II, 191.
id. de Quarin, I, 311.
id. de quina, IV, 8.

Polvos de quina alcanforados, IV, 9.
id. de quina facticios, II, 44.
id. de quina con sal amoniaco, IV, 12.
id. reales, III, 167.
id. de regaliz compuestos, IV, 181.
id. resolutivos, I, 133, 338; III, 183.
id. restaurantes, I, 475.
id. contra el reumatismo, I, 316.
id. rojos ingleses, I, 499.
id. de rubia compuestos, IV, 118.
id. de ruibarbo y de magnesia, IV, 126.
id. de ruibarbo y de sulfato de potasa, id.
id. de ruibarbo y de tartrato de potasa, id.
id. de ruibarbo jabonosos, IV, 127.
id. contra el reumatismo, I, 316.
id. de Rudling, I, 295.
id. de salep, IV, 148.
id. salinos, III, 509.
id. salinos compuestos, III, 52.
id. contra la salivacion, III, 462.
id. del santo Angel, I, 380.
id. de sauco, IV, 174.
id. sedantes, III, 320.
id. de Seolitz, I, 61.
id. sialagogos, I, 752.
id. de sub-carbonato de cal, I, 496.
id. sudoríficos de Dower, III, 321.
id. sudoríficos y tónicos, IV, 376.
id. de tanaceto compuestos, IV, 255.
Polvos temperantes, III, 422, 492.
id. temperantes alcanforados, III, 487.
id. temperantes blancos, III, 491.
id. temperantes de Boillon, Lagrange, id.
id. temperantes diuréticos, id.
id. temperantes de Rosenstein, id.
id. de Stahl, I, 312.
id. de Uncer, III, 492.
id. de Tennant, I, 490.
id. contra la tiña, I, 427.
id. tisaníferos, II, 387.
id. tónicos, II, 107, 125, 451, 460, 465, 496, 497.
id. tónicos é incisivos, I, 312.
id. tónicos y estomacales, II, 442.
id. de tribus, I, 300.
id. de Tunkin, I, 191.
id. de vainilla, IV, 338.
id. del conde de Warwick, I, 300.
id. vermífugos, I, 133, 300, 317; II, 178, 275, 286, 287, 289, 403, 436, 529; III, 118, 134, 160, 171, 175, 176, 183, 184; IV, 144, 216, 221.
id. vermífugos purgantes, II, 531.
id. vermífugos mercuriales, III, 133.
id. de Vernix, II, 125.
id. vomitivos, I, 335.
id. vomitivos compuestos, I, 333.
Polvos vomitivos de Helvacio, I, 336.
id. de yaro compuestos, IV, 355.
Polygala amara, III, 449.
id. rubella, III, 450.
id. senega, id.
id. virginiana, id.
id vulgaris, id.
Polygalina, id.
Polygonatum angulosum, III, 453.
id. latifolium, id.
id. majus, id.
id. vulgare, id.
Polygonum aviculare, IV, 165.
id. bistorta, I, 465.
id. fagopyrum, III, 453.
id. hydropiper, III, 384.
id. persicaria, id.
Polypodum, III, 454.
id. vulgare id.
Polytricum aureum, id.
id. commune, id.
Pomada de adormideras, beleño y belladona, I, 441.
id. alcalina, IV, 224.
id. alcanforada, II, 273.
id. de Alyon, I, 91.
id. amoniacal jabonosa, I, 231.
id. antiescrofulosa, II, 512, 519.
id. antipsorica, III, 146, 472.
id. antiespasmódica, II, 48; III, 319.
id. antihemorroidal, III, 294, 317, 424; IV, 396.
id. antiherpética, I, 488; III, 157, 162, 222, 417, 424.
id. antiherpética de Cullerier, III, 208.

Pomada antiherpética de Goulard, III, 420.
id. antiherpética de Chevaller, I, 491; III, 208.
id. antipsorica, II, 22.
id. antisarnosa, I, 404.
id. antivenerea, III, 181, 358.
id. astringente, IV, 346.
id. de Autenrieth, I, 333.
id. de azufre compuesta, I, 405
id. de Bell, III, 150.
id. de belladona, I, 446.
id. calmante, I, 157; III, 315.
id. de cantáridas, II, 10.
id. de carbon, II, 22.
id. de cianuro de mercurio, III, 205.
id. de Cirilo, III, 193.
id. de Cirilo opiada, id.
id. de cohombros, II, 150.
id. de la condesa, IV, 406.
id. cosmética, II, 272.
id. de Desault, III, 150.
id. de deuto-cloruro de mercurio, III, 193.
id. dulcificante y balsámica, IV, 285.
id. de Dubois, III, 216.
id. dulcificante, II, 412: III, 319; IV, 213.
id. epispástica, II, 9, 15; III, 99.
id. epispástica alcanforada, II, 2.
id. epispástica amoniacal, I, 231.
id. escarótica, I, 361; III, 147.
Pomada estibiada, I, 333.
id. de estramonio, II, 293.
id. de Tabre, I, 335.
id. fosforada, II, 317.
id. fundente, III, 524.
id. de Gonderet, I, 231.
id. de Goulard, III, 420.
id. de Grandjean, II, 14.
id. de hidriodato de potasa, II, 518.
id. de iodo, II, 515.
id. de ioduro de mercurio, III, 204.
id. de Inch, III, 124.
id. jabonosa, III, 519.
id. de Jadelot, III, 223, 463.
id. de Janin, id.
id. de Jenner, I, 334.
id. de Jardens, III, 149.
id. para los labios, II, 85.
id. de laurel, III, 8.
id. de leon, III, 146.
id. contra el lumbago, I, 243.
id. de lupulina, III, 41.
id. mercurial, III, 148.
id. mercurial alcanforada, III. 129.
id. mercurial jabonosa, id.
id. mercurial opiada, III, 130.
id. mercurial oxigenada, III, 123.
id. mercurial de Sanchez, id.
id. de mercurio dulce, III, 161.
id. de flores de naranjo, III, 264.
id. contra la nevralgia parcial, III, 408.
Pomada oftálmica, I, 98.
id. oftálmica de Dupuytren, III, 149.
id. oftálmica de Pelletan, III, 146.
id. opiada, III, 293, 318.
id. de oxido blanco de mercurio por el ácido sulfúrico, III, 208.
id. de oxido de zinc, IV, 395.
id. de oxido alcanforada, IV, 396.
id. oxigenada, I, 91.
id. de precipitado rojo III, 146.
id. purgante, II, 160; III, 180.
id. de Regent, III, 150.
id. de resina verde de torvisco, III, 100.
id. resolutiva, II, 510; III, 184, 424.
id. rosada, IV, 112.
id. de Rust, III, 150.
id. de sal marina, IV, 222.
id. saturnina, III, 422.
id. saturno-mercurial, III, 216.
id. de subcarbonato de plomo, III, 408.
id. sulfurada simple, I, 404.
id. sulfuro-alcalina, III, 463.
id. sulfuro-jabonosa, I, 404.
id. á la sultana, II, 273.
id. contra la tiña, I, 407; II, 22, 510; III, 216 223.
id. de torbisco, III, 99.

Pomada de turbit mineral, III, 208.
id. de veratrina, IV, 341.
id. virginal, IV, 406.
Pommatum florum naphæ, III, 264.
id. saturni, III, 417.
Pompholis, IV, 392.
Pomum citri, II, 98.
Ponche, I, 169.
Populus balsamifera, I, 141; IV, 248.
id. nigra, id.
id. tremula, I, 142.
Portulaca, IV, 342.
id. oleracea, IV, 341.
Posca de Galeno, IV, 348.
Posca Galeni, id.
Potasa, III, 465.
id. por el alcohol, III, 457.
id. cáustica, III, 454.
id. cáustica con la cal, III, 458.
id. del comercio, III, 465.
id. fundida, id.
id. líquida, III, 454.
id licuada, III, 456.
id. preparada, III, 465.
id. purificada, id.
id. sulfatada, III, 475.
id. vitriolada, id.
Potasio, III, 454.
Potassa cum calce, III, 458.
id. caustica, III, 454, 456.
id. caustica fusa, III, 456.
id. fusa, id.
id. impura, III, 465.
id. pura, III, 456.
id. pura kali, III, 454.
id. venalis, III, 465.
Potassidum myrrhæ, III, 241.
Potentila, III, 526.
Potentilla, id.
Potentilla anserina, I, 290.
id. reptans, III, 526.
Poterium sanguisorba, III, 397.
Potio alcalina, III, 474.
id. alexipharmaca, I, 266.
id. amara antifebriles, II, 46.
id. ammoniacalis, II, 246.
id. ammoniata, I, 244.
id. angelica, III, 78.
id. anthelmintica aloetica, I, 17.
id. anthiasmatica, I, 262.
id. anticolica, III, 78.
id. antiphlogistica laxans, I, 339.
id. antiphlogistica diaphoretica et leviter laxans, I, 331.
id. asthmatica, II, 262.
id. carbonatis calcis, I, 500.
id. cardiaca, I, 246.
id. cathartica, III, 53.
id. confortans acidulata, I, 391.
id. cretacea, I, 500.
id. demulcens, II, 391.
id. emetico—laxans, I, 339.
id. expectorans, I, 331.
id. frigida martialis, II, 496.
id. juniperina, II, 222.
id. laxans, IV, 253.
id. laxativa, III, 18.
id. leniens, I, 186.
id. mannæ tamarindata, III, 78.
id. mercurii vivi, III, 112.
id. narcotica, III, 248.
Potio nutriens ed sedans, III, 27.
id. oleosa, I, 186.
id. oleosa leniens, I, 187.
id. oximetica, I, 54.
id. picea, III, 386.
id. resolvens, III, 417.
id. resolvens ex iodo, II, 517.
id. salina mannata, III, 78.
id. sistens, I, 391.
id. stibiata, I, 329.
id. stomachica visceralis, I, 126.
id. terebinthinata, IV, 281.
id. tonica—anodina, id.
id. Viennensis, id.
Potus acidus, I, 95.
id. aluminosus, I, 207.
id. analepticus, I, 169.
id. antifebrilis acidulus, I, 97.
id. antiphlogisticus diureticus, III, 490.
id. antiphlogisticus et leviter laxans, I, 331.
id. antiphlogisticus leviter laxans, I, 332.
id. ad blennorrheam, I, 411.
id. carminativus, II, 226.
id. citri stibiatus, I, 332.
id. communis incitans, I, 169.
id. diureticus, II, 225.
id. diureticus simplex, III, 498.
id. hydrocyanicus, I, 72.
id. mercurialis Belleti, III, 215.

Potus muriatico acidus , I, 80.
id. oryzæ citratus , I, 356.
id. oxygenatus , III, 493.
id. ad perniones , I, 207.
id. ex pomis , III , 95.
id. pomorum , id.
id. sacchari lactis , III, 16.
id. spirituosus, I, 169.
id. sulphurico-salinus , III , 480.
Precipitado amarillo , III , 207.
id. blanco, III , 159 , 218.
id. negro , III , 209.
id. per se , III, 143.
id. rojo , id.
id. rosa , III , 207.
id. verde , III , 145.
id. de Wurtz, III , 206.
Precipitatus ruber , III, 144.
id. solubilis niger , III, 209.
Priapus cervi , II , 342.
id. ceti , id.
id. tauri , id.
Primula de jardin , III , 527.
Primula officinalis , id.
id. paraliseos , id.
id. veris, id.
Prinos verticulado , id.
Prinos , id.
id. verticulatus , id.
Propolis , id.
Proto-acetato de bario , I, 429.
id. de calcio, I , 507.
id. de mercurio , III, 224.
id. de plomo , III, 421.
id. de potasio , III , 494.
id. de sodio , IV, 234.
Proto-carbonato de potasio, III , 474.
Proto—carbonato de potasio y de amoniaco , III , 475.
id. de sodio, IV, 226.
Proto-citrato de calcio , I , 508.
id. de hierro, II, 485.
id. de potasio , III , 501.
Proto-clorato de potasio, III , 492.
Proto-cloruretum hydrargyri, III, 157.
Proto cloruro de hierro , II , 470.
id. de mercurio , III, 157.
Proto-galato de plomo , III, 428.
Proto-hidriodato de potasio, III , 517.
Proto-hidroclorato de calcio , I , 505.
id. de hierro , II , 471.
id. de hierro sólido , id.
id. de magnesia, III, 55.
id. de mercurio , III, 157.
id. de potasio, III , 493.
id. de sodio, IV, 221.
Proto-hydrocyanato de potasio , I, 72.
Proto-hydroferrocyanato de potasio , I , 73.
Proto-hydrosulfato de calcio, I , 505.
Proto-hydro-sulfuro-cyanato de hierro, II, 497.
Proto—hydro—sulfuro-cyanato de potasio , I , 74.
Proto-hyposulfito de potasio, III , 481.
Proto-hyposulfito de sodio , IV , 233.
Proto iodato de mercurio, III, 217.
Proto-ioduro de mercurio, III, 203.
Proto-malato de hierro, II, 483.
Proto-meconato de sodio, IV, 235.
Proto-nitrato de bario , I, 429.
id. de mercurio , III, 212.
id. de mercurio y amoniaco, III , 217.
id. de plomo , III, 411.
id. de potasio , III, 481.
id. de sodio, IV, 234.
Proto—oleo—margarato de plomo , III , 429.
id. de potasio , III, 515.
id. de sodio, IV, 235.
Proto-fosfato de calcio ácido, I , 504.
id. de magnesio , III, 51.
Proto-sulfato de bario , I, 428.
id. de calcio , I , 504.
id. de hierro , II , 463.
id. de magnesia , III , 52.
id. de potasio , III , 475.
id. de potasio y amoniaco , III , 480.
id. de potasio y de magnesio , id.
Proto-sulfato de sodio , IV, 230.
Proto-sulfito de potasio, III , 481.
id. de sodio, IV, 233.
Proto-sulfuro de antimonio, I , 304, 307.
id. de cobre , II , 122.
Proto-tartrato de antimonio , I , 324.
id. de antimonio y de potasio , I, 38.
id. de potasio, III, 502.
id. de potasio de amoniaco, III , 314.
id. de potasio y de hierro , II , 486.

Proto-tartrato de potasio, de hierro y de sodio, III, 518.
Protoxicloruro de calcio, I, 49.
id. de sodio, IV, 220.
Protoxido de antimonio, I, 293.
id. de bario, I, 427.
id. de calcio, I, 485.
id. de cobalto, II, 119.
id. de estaño, II, 288.
id. de plomo, III, 403.
id. de potasio, IV, 219.
id de sodio, id.
id. de zinc, IV, 392.
Protoxi-fosfuro de calcio, I, 489.
Protoxi-sulfuro de calcio, id.
id. de potasio, III, 461.
id. de sodio, IV, 219.
Protoxidum hydrargyri nitrico-ammoniacale, III, 209.
id. stibii griseum, I, 293.
Prunella vulgaris, I, 470.
Pruneolus sylvestris, II, 111.
Prunus domestice, id.
id. spinosa, id.
Prusiato de mercurio, III, 204.
id. de potasa y de hierro, I, 73; II, 496.
Prussias lixiviæ et ferri, id.
id. potassæ et ferri, id.
Psoralea glandulosa, IV, 264.
Ptarmica, IV, 262.
Pterocarpus draco, IV, 163.
id. santalinus, id.
Ptisana callaci, IV, 384.
id. datisbii, II, 104.
id. hippocratica, II, 67.
Ptisana laxativa, IV, 200.
id. oryzæ, I, 356.
id. ex pane, III, 366.
Puerro, III, 527.
Pulicaria, id.
Pulguera, id.
id. comun, id.
Pulmonaria, III, 528.
id. de los franceses, II, 439.
id. mayor, III, 528.
Pulmonaria gallica, II, 439.
id. maculosa, III, 528.
id. officinal, id.
Pulpa de azufaifas, I, 393.
id. de azucenas, I, 394.
id. de casia, II, 40.
id. de casia compuesta, II, 41.
id. de casia para lavativas, II, 40.
id. de cebollas, II, 72.
id. de ciruelas, II, 112.
id. de cinorrodon, IV, 102.
id. de dátiles, III, 364.
id. emoliente, III, 64.
id. de escila, II, 244.
id. de higos, II, 498.
id. de pasas, IV, 345.
id. de tamarindos, IV, 250.
Pulpa cassiæ, II, 40.
id. cassiæ fistulæ, id.
id. cassiæ pro clysteribus, id.
id. cynorrhodontes, IV, 102.
id. dactylorum, III, 364.
id. ebuli, IV, 179.
id. ficarum, II, 498.
id. jujubarum, I, 393.
id. lilii, I, 394.
id. passularum, IV, 345.
Pulpa prunorum, II, 112.
id. scillæ, II, 244.
id. tamarindorum, IV, 250.
Puls arsenicalis, I, 361.
Pulsatilla cærulea, I, 371.
id. minor, id.
id. nigricans, id.
id. vulgaris, id.
Pulticula de manna, III, 77.
id. saponacea, IV, 128.
Pulvis contra abortum, IV, 115.
id absorvens, III, 48.
id. absorvens pro uso externo, II, 76.
id. de acido tartari, I, 103.
id. ex acido tartarico, I, 102.
id. acidulus, id.
id. aconiti, I, 105.
id. adstringens, III, 320; IV, 163.
id. cerophorus sede tartaricus, I, 60.
id. ex æthiope antimoniali, III, 136.
id. alexipharmacus Rolwagii, I, 199
id. alexipharmacus sinicus, I, 191.
id. alexiterius, II, 174; III, 321.
id. Algarothi, I, 322.
id. aloes cum canella, I, 27.
id. aloes cum guaiaco, id.
id. alterans Plummeri, III, 165.
id. aluminis compositus, I, 204.
id. aluminoso-mercurialis, I, 145.
id. aluminosus, I, 202, 204; III, 145.

Pulvis amarus ferratus II, 465.
id. ammoniato camphoratus, I, 243.
id. ammonii, id.
id. ammonii muriatici, I, 252.
id. anagallidis, I, 269.
id. analepticus, III, 153.
id. angelicæ compositus, I, 252.
id. angelicus, I, 322.
id. anodynus, III, 317, 321.
id. antiacidus, I, 496.
id. anthelminticus, II, 465; III, 118; IV, 216.
id. antiacidus, III, 48.
id. antiarthriticus purgans, II, 240.
id. antiarthriticus purgativus, IV, 182
id. anticolicus Camerarii, III, 468.
id. anticalculosus, II, 339.
id. antihecticus, IV, 126.
id. antihectico-scrofulosus, ex bacis lauri compositus, III, 255.
id. antilycus, III, 25.
id. antilycus ormskirkianus, II, 228.
id. antilycus Tunchinensis, I, 191.
id. antimonialis, I, 277, 305.
id. antispasmodicus, III, 155.
id. antispasmodicus et anticonvulsivus stomaticus, II, 47.
id. antispasticus infantum, IV, 352.
id. aperitivus, II, 47; III, 483.
Pulvis ad aquam confortativam, I, 499.
id. ad arenulas, I, 474.
id. ari alcalinus, IV, 355.
id. ari compositus, id.
id. arnicæ compositus, I, 351.
id. arnicæ opiatus, id.
id. aromatico-ferratus, II, 450, 465.
id. aromaticus, I, 515.
id. arthriticus, I, 105.
id. asari compositus, I, 330.
id. atramentarius, II, 466.
id. basilicus, III, 167.
id. benzoicus, I, 57.
id. è benzoino, id
id. Bernhardi, I, 360.
id. bezoardicus albus Ludovici, I, 503.
id. bezoardicus anglicus completus, I, 299.
id. bezoardicus incompletus, id.
id. bezoardicus curvi, IV, 13.
id. bezoardicus Halensis, I, 299.
id. bezoardicus Rollwagii, I, 199.
id. ad botium, II, 23.
id. calami aromatici, I, 480.
id. calcariæ sulphuratæ cum aconito, I, 490.
id. ad calculum, I, 474.
id. camphoratus, I, 146.
id. cantharidum camphoratus, II, 16.
id. capitalis sancti Angeli, I, 380.
id. carbonatis calcii compositus, I, 497.
Pulvis cardiacus, II, 174; III, 153.
id. carthusianorum, I, 307.
id. caryocostinus, II, 240.
id. castoreatus, II, 47.
id. contra casum, IV, 163.
id. catarrhalis, I, 399.
id. catechu compositus, II, 59.
id. catharticus, IV, 126.
id. catharticus absorvens, id.
id. catholicus, II, 240.
id. causticus, III, 145.
id. Cellensis aureus, III, 153.
id. Cellensis nobilis, III, 153.
id. cephalicus, III, 377.
id. cephalicus niger, IV, 394.
di. cephalicus ruber, III, 154.
id. cervinus Camerarii, I, 503.
id. chamomillæ cum antimonio, I, 300.
id. è chelis cancrorum compositum, I, 496.
id. Cheltenhamensis, III, 52.
id. chinæ antisepticus, IV, 13.
id. chocolatæ chinatæ, IV, 9.
id. è cinchona catharticus, IV, 11.
id. cinnamomi compositus, I, 415.
id. colocinthydis, II, 160.
id. comitis Warwick, I, 300.
id. comitissæ Kautii, II, 174.

Pulvis ad condienda intranea, I, 36.
id. ad condiendas carnes, id.
id. ad condiendum cor, id.
id. Constantini, III, 227.
id. contrayervæ compositus, II, 174.
id. cornachini, I, 300.
id. cornu cervi usti cum opio, III, 317.
id. cosmeticus ad manus, I, 179.
id. Cosmii, I, 360.
id. cretæ, I, 497.
id. cretæ cum opio, III, 317.
id. cupressi restrictivus, IV, 406.
id. dentrificus, III, 507.
id. deprimens et nauseam liens, II, 190.
id. diacarthami, II, 240.
id. diaphoreticus, I, 299; III, 321.
id. diaphoreticus et sedativus, III, 322.
id. diapnoicus, III, 321.
id. diarrhodon, IV, 115.
id. diaromaton, I, 515.
id. diasennæ, IV, 182.
id. digestivus, III, 477; IV, 126.
id. digestivus cum rheo, III, 478.
id. digitalis purpureæ, II, 190.
id. diureticus, II, 16; III, 490.
id. Doveri, III, 321.
id. ad dysuriam, III, 64.
Pulvis eccoproticus, III, 509.
id. ecphracticus, II, 465.
id. ecphracticus Sellii, III, 49.
id. Edimburgensis, I, 165.
id. emeticus, I, 335; II, 521.
id. emeticus compositus, I, 333.
id. emenagogus, III, 238.
id. epilepticus, III, 377; IV, 326.
id. epilepticus albus, I, 378.
id. epilepticus Cellarii, id.
id. epilepticus Marchioni, id.
id. epilepticus Marchionum, III, 48.
id. epilepticus niger, I, 378.
id. epilepticus ruber, III, 154.
id. equorum, I, 307.
id. errhinus, I, 380; III, 174.
id. ad erysipelam, IV, 173.
id. ad erysipelas externus, I, 132.
id. erysipelatodes, III, 403.
id. erysipelatodes externus, I, 132.
id. ex ethiope antimoniali, III, 136.
id. evacuans puerorum, III, 176.
id. in excoriatione agri, I, 499.
id. ad excrescentias, I, 204.
id. expectorans, I, 310, 311.
id. exsicans et incitans, I, 146.
id. febrifugus antimonialis, id.
Pulvis febrifugus Mortonii, I, 300.
id. febrifugus pauperum, II, 33.
id. febrifugus Unceri, I, 317.
id. ferratus, II, 450.
id. ferri limati, II, 440.
id. contra florem album, II, 435.
id. ad florem album, I, 175.
id. fœniculi compositus, II, 500.
id. fumalis, IV, 236.
id. ad fumigationes muriaticas, II, 116.
id. galactopoæus, III, 48.
id. galactopoiæticus, II, 500.
id. gratiolæ cum hydrargyro, II, 403; III, 171.
id. guaiaci cum senna, IV, 181.
id. gummosus, II, 386
id. gummosus cum liquiritia et sulphure stibiato, I, 316.
id. gummosus stibiatus, I, 311.
id. ad guttetam, III, 154, 377.
id. ad gutteta, III, 377.
id. hepaticus ruber, III, 507.
id. ad herpetem, III, 136.
id. hieræ picræ, I, 27.
id. hydrargyri cinereus, III, 139, 210.
id. hydrargyri cum camphora, III, 172.
id. hydrargyri cum opio, III, 180.
id. hydrargyri oxydati rubri, III, 144.

Pulvis hydrargyri stibiato-sulphurati cum cicuta, III, 137.
id. hydrargyri stibiatus, I, 165.
id. hydrargyri stibiatus cum hyoscyamo, III, 169.
id. ex hydrargyro muriatico miti cum sulphure stibii aurantiaco, I, 165.
id. ex hydrargyro rubro cum alumine, III, 145.
id. ex hydrargyro stibiato sulphurato, III, 136.
id. hydrargyrosi muriatis thebaicus, III, 180.
id. imperatoris, I, 515.
id. incidens, III, 503.
id. incidens Stahlii, I, 508.
id. incrasans Fulleri, II, 387.
id. pro infantibus, III, 48.
id. infantum, id.
id. infantum antiacidus, id.
id. infantum cum rheo, IV, 126.
id. ipecacuanhæ compositus, III, 321.
id. ipecacuanhæ hydrargyratus, III, 176.
id. ipecacuanhæ opiatus, III, 321.
id. ipecacuanhæ et opii, id.
id. ipecacuanhæ cum opio, id.
id. ipecacuanhæ thebaicus, id.
id. iridis cum nitro, III, 483.
id. jalappæ compositus, II, 529.
Pulvis jalappæ hydrargyratus, id.
id. jalappæ cum hydrargyro muriatico miti, id.
id. jalappæ cum kali sulphurico, id.
id. jalappæ cum nitro, id.
id. jalappæ salinus, id.
id. jalappæ tartaricus, id.
id. Jamescii, I, 297.
id. Joannis de Vigo, III, 144.
id. pro jusculo extemporaneo, II, 343.
id. kentianus, I, 299, 311.
id. è kermes mineralis, I, 311.
id. kermesinus, I, 310, 311.
id. kermesinus, cum camphora, I, 311.
id. kino, I, 204.
id. lauri carbonicus, III, 7.
id. laxans, II, 529; IV, 126, 181.
id. laxans cum mercurio, II, 529.
id. laxans cum sale, II, id.
id. laxativus vegetabilis, id.
id. leniens antihypochondriacus Klenii, III, 503.
id. lenitivus, IV, 126.
id. lenitivus tartarisatus, IV, 181.
id. ad lumbricos, III, 176.
id. liquiritiæ compositus, IV, 181.
id. lunaris, III, 400.
id. ad maculas cornæ, III, 508.
id. magnesiæ compositus, IV, 126.
id. magnesiæ tartaricus, I, 60.
Pulvis Mantuanus, II, 174.
id. martialis, II, 440.
id. manualis, I, 179; II, 45.
id. mercurialis argenteus, III, 227.
id. è mercurio, III, 170.
id. è mercurio dulcis, III, 160.
id. mitigans Wepferi, III, 64.
id. moschi compositus, I, 191.
id. moschi opiatus, I, 190.
id. motum peristalticum iupertens, II, 420.
id. mucilaginosus, II, 398.
id. myrrhæ compositus, III, 238.
id. nasalis odoratus, IV, 115.
id. natri carbonici cum acido tartarico, I, 60.
id. nephriticus pretiosus, I, 508.
id nervinus, IV, 326.
id. nitri oxalicus, III, 491.
id. nitri tartaricus, id.
id. nitri Thebaicus, III, 320.
id. nitroso camphoratus, III, 487.
id. nitrosus, III, 491.
id. nitrosus cinnabarius, III, 155.
id. nucis vomicæ, III, 283.
id. nucum moschatarum compositus, III, 255.
id. nutricum, II, 500; III, 48.
id. ophthalmicus, III, 508.
id. opiatus, III, 317.

Pulvis oxydi stibii compositus, I, 300.
id. ex pæonia compositus, III, 377.
id. pannonicus ruber, I, 200.
id. pannonicus ruber incompletus, id.
id. pannonicus ruber mirus pretiosus, I, 201.
id. ad partum promovendum, IV, 227.
id. pectoralis, I, 311, 351, 399; IV, 181.
id. pectoralis balsamicus, I, 399.
id. pectoralis resolvens, I, 316, 399.
id. peristalticum motum invertens, II, 520.
id. peruvianus purgans, IV, 12.
id. ex phellandro aquatico gummosus, II, 312.
id. pleureticus, I, 503.
id. pleureticus Mynsichtis, I, 398.
id. precipitans Sthalii, I, 299.
id. pretiosus, I, 496.
id. ad procidentiam ani, I, 199.
id. ad prolapsum ani, id.
id. puerorum citrinis, III, 32, 48.
id. puerorum epilepticus cum rheo, IV, 126.
id. purgans, II, 529; IV, 126.
id. purgans antelminticus, III, 183.
id. purgans et irritans, II, 404.
id. purificans, III, 137.
Pulvis purificans Kæmplii, I, 305.
id. purpureus, anglicus, I, 499.
id. pyricus, III, 493.
id. refrigerans, I, 102; III, 509.
id. relaxans, I, 338.
id. resolvens antiphlogisticus, III, 450.
id. resolvens compositus, I, 300.
id. resolvens Stahlii, id.
id. rhei compositus, IV, 126.
id. rhei cum magnesia, id.
id. rhei salinus, id.
id. rhei cum tartaro, id.
id. è rheo, id.
id. rheumaticus anodynus, I, 337.
id. roborans antispasmodicus, IV, 326.
id. sacchari acidulus, I, 102.
id. salino-stibiatus, I, 338.
id. salinus, II, 529; III, 509.
id. salinus compositus, III, 52, 155.
id. sanguinis draconis dentrificus, I, 504.
id. saponis compositus, I, 462.
id. contra scabiem, I, 398.
id. scammonii antimonialis, I, 300.
id. scammonii compositus, II, 240.
id. scillæ compositus, II, 245.
id. sedativus, III, 320.
id. sennæ compositus, IV, 181, 182.
Pulvis sennæ cum sulphure, IV, 181.
id. sialagogus, I, 252.
id. spongiæ compositus, II, 23.
id. spongiæ martiatus, II, 286.
id. spongiæ philosophice paratus, id.
id. stornutatorius, I, 380; II, 207; III, 36; IV, 243.
id. stornutatorius albus, I, 196.
id. stornutatorius variegatus, III, 36.
id. stornutatorius viridis, id.
id. stibiato opiatus, I, 337.
id. stibiatus, I, 299, 316, 333.
id. stomachicus Birckmanni, IV, 355.
id. ad strumas, II, 23.
id. contra strumas, id.
id. stypticus, I, 202, 204.
id. sudorificus, III, 321.
id. sudorificus Doweri, id.
id. ad suffiandum, IV, 236.
id. pro suffumigio, id.
id. ex sulphure stibiato, I, 317.
id. ex sulphure stibiato rubro, I, 311.
id. ex sulphure stibiato rubro cum camphora, id.
id. sulphureus, I, 399.
id. sulphurosus, id.
id. tanaceti compositus, IV, 255.

Pulvis tartari argillatus, III, 508.
id. tartari compositus, III, 507, 509.
id. tartari tartaricus, II, 529.
id. temperans, III, 491, 509.
id. temperans albus, III, 491.
id. temperans camphoratus, III, 487.
id. temperans diureticus, III, 491.
id. temperans ruber, III, 155
id. terebinthinatus, IV, 301.
id. terrestris, I, 496.
id. tonico-adstringens, IV, 9.
id. tonico antispasmodicus martialis, II, 441.
id. tonico martialis, id.
id. tonicus Bangii, IV, 12.
id. tormentillæ compositus, IV, 269.
id. ad tormina infantum, III, 48; IV, 127.
id. tragacanthæ compositus, II, 398.
id. contra tussim infantum, III, 327.
id. contra tendinum, III, 238.
id. uvæ ursi, II, 339.
id. valerianæ aromaticus, IV, 326.
id. contra vermes, III, 134; IV, 216.
id. vermifugus, IV, 216.
id. Vienuensis albus virgineus, I, 505.
id. vigonis, III, 144.
id. vitæ imperatoris, I, 515.
Pulvis zinci oxydati albi, IV, 393.
Pumex, III, 389.
Punica granatum, II, 408.
Purgante de Graut, III, 503.
id. de Le-Roy, II, 540.
Putamen juglandis, III, 279
Pyrethrum officinale, III, 371.
Pyri martialis, II, 488.
Pyritis arsenicalis nicaceus, I, 357.
id. ferri artificialis, II, 447.
Pyrola, III, 398.
id. rotundifolia, id.
Pyroleum ossium rectificatum, II, 356.
id. succini, IV, 238.

Q.

Quadricloruro de sodio, IV, 221.
Quasia, IV, 1.
Quasina, IV, 3.
Quassia amara, id.
id. excelsa, id.
Quassina, id.
Quercus, II, 215.
id. alba, id.
id. cerris, I, 115.
id. Ilex, II, 216.
id. infectoria, id.
id. marina, II, 219.
id. robur, II, 215.
id. suber, I, 171.
Quercus tinctoria, II, 215.
Queso, III, 15.
Quina, IV, 6.
id amarilla, IV, 7.
id. amarilla real, id.
id. aromatica, II, 36.
id. calisaya, IV, 7.
id. de los Caribes, IV, 6.
id. de la Carolina, id.
Quina gris, IV, 6.
id. gris parda, IV, 7.
id. parda, IV, 6.
id. del Rey de España, IV, 7.
id. roja, id.
id. de Santa Lucía, IV, 8.
Quinina, IV, 55.
Quita meriendas de otoño, II, 152.

R.

Rábano, IV, 58.
id. cultivado, id.
id. silvestre, id.
Rabarbarina, IV, 125.
Radix Brasiliensis, II, 519
id. Lopeziana, IV, 66.
id. serpentum, IV, 67.
Raiz de Juan Lopez, IV, 66.
id. de la serpiente, IV, 67.
id. vírgen, IV, 254.
Ramnus catarticus, II, 276.
id. frangula, II, 436.
Rana esculenta, II, 341.
id temporaria, id.
Ranunculo, IV, 67.
id. acuatico, id.
id. blanco, I, 271.
id. bulboso, IV, 67.
id. malvado, id.
id. de los prados, id.
Ranunculus, II, 313.
id. aeris, IV, 67.
id. aquaticus, id.
id. bulbosus, id.
id. ficaria, II, 75.
id. palustris, IV, 67.
id. pratensis, id.
id. sceleratus, id.
Raphanus hortensis, IV, 58.
id. marinus, IV, 59.
id. niger, IV, 58.
id. rusticanus, IV, 59.
id. rusticus, id.

Raphanus sativus, IV, 58.
Raponticino, IV, 68.
Rapontico, id.
Raquela, II, 238.
Raquis à Murena, I, 502.
Raspatura cornu cervi, I, 501.
id. ligni guaiaci, II, 416.
Rasura cornu cervi, I, 501.
id. ligni guaiaci, II, 416.
Ratafia antiescorbutica, II, 434.
id. de Caribes, II, 422.
Ratania, IV, 68.
Racrementa vitri, III, 479.
Regalicia erizada, IV, 71.
Regaliz, id.
Regaliza, id.
id. real, IV, 74.
Regina pratensis, IV, 83.
Reguli viti, I, 495.
Regulo de antimonio, I, 291.
id. de bismuto, I, 464.
id. de bismuto marcial, I, 292.
id. de bismuto medicinal, I, 293.
id. de bismuto simple, I, 291.
Regulus antimonii, id.
id. antimonii martialis, I, 292.
id. antimonii medicinalis, I, 293.
id. antimonii simplex, I, 291.
id. antimonii stellatus, id.
id. stibii, id.
Reina de los prados, IV, 82.
Rejalgar, I, 357.
Remedio del Capuchino, III, 213.
Remedio antidiabetico de Redfearu, III, 413.
id. antivenereo de Mittie, III, 280.
id. de Chrestien, II, 338.
id. del duque de Antin, III, 213.
id. contra la hidropesía, II, 456.
Remedium antiphthisicum, Adairi, II, 126.
id. antitæniosum, III, 160.
Requies Nicolai, III, 354.
Resina almaciga, I, 175.
id. blanca de trementina, IV, 307.
id. de benjui, I, 449.
id. de la Barsera gummifera, IV, 82.
id. del Canadá fluida, I, 408.
id. de Cayena, II, 393.
id. Chibou, IV, 82.
id. comun, IV, 307.
id. de copaiba, I, 409.
id. elastica, II, 393.
id. de escamonea, II, 240.
id. de guayaco, II, 418.
id. de jalapa, II, 536.
id. de jalapa preparada, II, 538.
id. de la Meca líquida, I, 415.
id. negra de trementina, IV, 308.
id. de Nueva España, I, 409.
id. de quina, IV, 25.
id. de succino, IV, 238.
id. de yedra, II, 401.
Resina alba, IV, 307.
id. benzoica, I, 449.
id. Canadensis fluida, I, 408.
id. caranna, II, 20.
Resina Cayennensis, II, 393.
id. copal, II, 177.
id. copallina, id.
id. corticis peruviani, IV, 25.
id. elastica, II, 393.
id. elemi, II, 214.
id. flava, IV, 308.
id. galvani, II, 325.
id. gialappæ, II, 536.
id. guaiaci nativa, II, 417.
id. hederæ, II, 401.
id. jalappæ, II, 536.
id. juniperi, IV, 163.
id. lentisci, I, 175.
id. mastiches, id.
id. mecanensis fluida, I, 415.
id. pini balsami liquida, I, 401.
id. empyreumatica liquida, III, 386.
id. sanguinis draconis, IV, 163.
id. scamonii, II, 240.
id. succini, IV, 238.
id. succini balsamica, IV, 239.
Resinoso estractivo de quina, IV, 24.
Rhabarbarum, IV, 124.
id. britanicum, IV, 125.
id. chinense, IV, 124.
id. danicum, id.
id. gallicum, IV, 125.
id. indicum, IV, 124.
id. monacorum, IV, 125.
id. moscobiticum, IV, 124.
id. nostras, IV, 125.
id. pauperum, IV, 250.
id. rhaponticum, IV, 68.
id. russicum, IV, 124.
id. sinense, id.
id. tartaricum, id.
id. tostum, IV, 125.
id. verum, IV, 124.

Resta vovis, III, 287.
Rhausnino, II, 276.
Rhamnium, id.
Rhamnus catharticus, id.
Rhaponticum, IV, 68.
id. verum, id.
Rheum compactum, IV, 125.
id. palmatum, IV, 124.
id. rhaponticum, IV, 68.
id. undulatum, IV, 125.
Rheumino, id.
Rhodiæ, IV, 180.
Rhododendron chrysanthum, IV, 86.
Rhodosaccharum, IV, 105.
Rhodomel, IV, 107.
Rhus cotinus, IV, 143.
id. copallinum, II, 177.
id. coriaria, IV, 409.
id. radicans, id.
id. toxicodendron, id.
Ribes grossularia, II, 413.
id. nigrum, II, 415.
id. rubrum, II, 413.
id. uva crispa, id.
Richardsonia brasiliensis, II, 520.
Ricinico, IV, 84.
Ricino, IV, 83.
id. comun, id.
id. vulgar, id.
Ricinus, id.
id. communis, id.
Rob de agracejo, I, 135.
id. antisifilitico, IV, 381.
id. de arandano agrio, I, 346.
id. de cerezas, II, 433.
id. de cidra, II, 103.
id. de ciruelas silvestres, II, 112.
id. de cinorrodon, IV, 102.
Rob de enebro, II, 222.
id. de espino serval, II, 277.
id. de frambuesas, II, 318.
id. de fresas, II, 320.
id. de grosellas, II, 413.
id. de grosellas negras, II, 415.
id. de Lafecteur, IV, 388.
Rob acaciæ germanicæ, II, 112.
id. herbarum, I, 135.
id. cerasorum, II, 433.
id. cydoniorum, III, 106.
id. cynoshatos, IV, 102.
id. danci, IV, 373.
id. danci carottæ, id.
id. danci radicis, id.
id. diacori Galeni, III, 280.
id. ebuli, IV, 179.
id. fragariæ, II, 320.
id. juniperi, II, 222.
id. mororum, III, 246.
id. myrtillorum, III, 245.
id. nucum, III, 279.
id. oxycoccos, I, 346.
id. prunorum, II, 112.
id. ribesiorum, II, 413.
id. ribesiorum nigrorum, II, 415.
id. ribium, II, 413.
id. rosæ caninæ fructus, IV, 102.
id. rubi idæi, II, 318.
id. sambuci, IV, 174.
id. sorbi aucupariæ, IV, 209
id. spinæ cervinæ, II, 277.
id. uvarum, IV, 345.
id. vaccinii myrtilli, III, 245.
Rob vaccinii oxycocci, I, 346.
id. vitis idæ, id.
Rododendro, IV, 86.
Rodomel, IV, 107.
Rogelia farmacéutica, IV, 85.
Rojo de Inglaterra, II, 454.
id. cinchonico, IV, 8.
id. de montaña, II, 453.
Romaza, IV, 86.
id. acuatica, id.
id. crespa, id.
Romero de color de sangre, IV, 87, 88.
id. oficinal, id.
id. silvestre, id.
Rosa alba, IV, 100.
id. canina, id.
id. centifolia, id.
id. gallica, id.
id. incarnata, id.
id. moschata, id.
id. pallida, id.
id. rubra, id.
id. rubra vulgaris, id.
id. silvestris, id.
Rosel, IV, id.
id. blanco, id.
id. de cien hojas, id.
id. encarnado, id.
id. moscado, id.
id. silvestre, id,
Rosariæ, IV, 180.
Rosæ benedictæ, III, 375.
id. regiæ, id.
Rosolis ó rocío del sol, IV, 117.
id. de hojas largas, id.
Ros marinum sylvestre, IV, 88.
Ros marinus, id.
id. hortensis, id.
id. officinalis, id
Rosoli de quina, IV, 51.
Rotulæ anthelminticæ, III, 184.
id. berberum, I, 135.
id. citri, II, 103.
id. diaereos, III, 34.

Rotulæ manus Christi, I, 396.
id. menthæ piperitæ, IV, 364.
id. pectoralis, I, 400.
id. contra vermes, III, 134.
Rubetæ terrestres majores, II, 341.
Rubia ó granza, IV, 117.
Rubia major, id.
id. manguta, id.
id. sativa, IV, 117.
id. tinctoria, id.
Rubí de Oriente, I, 197.
Rubrica fabrilis, I, 198.
Rubus chamæmorus, IV, 374.
id. fructicosus, id.
id. ideus, II, 317.
id. niger, IV, 374.
id. ruber, id.
id. trivialis, IV, 375.
id. villosus, id.
Ruda, IV, 120.
id. cabruna, IV, 123.
id. comun, IV, 120.
id. de murallas, IV, 124.
Ruibarbo, id.
id. bastardo, IV, 125.
id. de Bucaria, IV, 124.
id. de la China, id.
id. de Europa, IV, 125.
id. de Indias, IV, 121.
id. de monges, IV, 125.
id. de Moscovia, IV, 124.
id. oficinal, id.
id. de Tartaria, id.
id. tostado, IV, 125.
Rumex acetosa, I, 6.
id. aquaticus, IV, 87.
id. crispus, id.
id. sanguineus, id.
Ruptorium commune, III, 456.
Rus cotino, IV, 143.
Rusco, id.
Ruscus, id.
id. aculeatus, id.
id. hypoglosum, II, 507.
Ruta, IV, 120.
id. capraria, IV, 122.
id. graveolus, IV, 120.
id. hortensis, id.
id. muraria, IV, 124.

S.

Sabadilla, II, 71.
Sabadillina, id.
Sabadillum, id.
Sabina, IV, 144.
Saccharum, I, 395.
id. clarificatum, id.
id. glizyrrhyzatum, IV, 74.
id. hordeatum, II, 67.
id. lactis, III, 15.
id. mercurii vermifugum, III, 117.
id. mercurii compositum, III, 130.
id. myrrhæ, III, 238.
id. myrrhatum, id.
id. nitratum, III, 491.
id. perlatum, I, 396.
id. rosatum, IV, 102.
id. saturninum, III, 421.
Sacco gomita, IV, 71.
Sagapeno, IV, 147.
Sagapenum, id.
Sagú, id.
id. blanco, IV, 258.
Sagus raphia, IV, 148.
Sal acetosa mineral, IV, 234.
id. admirable de Glaublero, IV, 230.
id. admirable perlada, id.
id. de agenjos, III, 468.
Sal acetosa de Alembroth, III, 218.
id. de amoniaco, I, 251.
id. de amoniaco purificada, id.
id. de canal, III, 52.
id. de cardo santo, III, 468.
id. catartica amarga, III, 52.
id. de centaura menor, III, 468.
id. de ciencia, III, 218.
id. comun, IV, 221.
id. de cuerno de ciervo, I, 240.
id. digestiva, III, 493.
id. de duobus, III, 475, 476.
id. de Egia, III, 52.
id. de Epsou, id.
id. febrifuga de Silvio, III, 493.
id. fusible, III, 477.
id. de Grabela, IV, 221.
id. de Gatuña, III, 468.
id. de gemma, IV, 221.
id. de goma, id.
id. de Guindre, IV, 233.
id. de la higuera, III, 52.
id. de Lagaraye, IV, 23.
id. de leño de enebro, III, 468.
id. lixivial de Techenins, III, 467.
id. marina, IV, 221.
id. marina de cal, I, 505.
id. microscomica de la orina, III, 477.
id. marcial de Lagresié, II, 465.
id. nativa, III, 477.
id. de nitro, III, 481.

Sal de opio, III, 275.
id. de opio cristalizable, id.
id. de opio esencial, III, 310.
id. polycresta de Glaser, III, 475.
id. polycresta soluble, III, 513.
id. prunela, III, 482.
id. de quina esencial, IV, 23.
id. de la sabiduría, III, 475.
id. de saturno, III, 421.
id. sedativa mercurial, III, 206.
id. de Seignete, III, 513.
id. de sen esencial, IV, 191.
id. de Seydlitz, III, 52.
id. de succino esencial, I, 100.
id de tallos de habas, III, 468.
id. de tartaro, III, 466.
id. de tartaro volátil, I, 240.
id. vegetal, III, 502.
id. de la vida, III, 218.
id. de vidrio, III, 479.
id. de vinagre, I, 51.
id. volátil de Inglaterra, I, 239.
id. volátil aromática, I, 249.
id. de Westendorf, I, 51.
Sal absinthii citratum, III, 501.
id. acetosellæ, id.
id. acetosum ammoniacale, I, 257.
id. amarum, III, 52.
id. ammoniacum, I, 251.
Sal ammoniacum anglicanum, I, 238.
id. ammoniacum depuratum, I, 251.
id. ammoniacum fixum, I, 505.
id. ammoniacum martiale, II, 477.
id. ammoniacum nitrosum, I, 250.
id. ammoniacum secretum Glauberi, I, 250.
id. ammoniacum tartareum, III, 514.
id. ammoniacum volatile, I, 238.
id. anglicum, III, 52.
id. armoriacum, I, 251.
id. astracanense artificiale, IV, 233.
id. benzoes acidum, I, 56.
id. benzoes essentiale, id.
id. benzoes volatile, id.
id. boracis acidum, I, 58.
id. boracis volatile, id.
id. catharticum, IV, 230.
di. catharticum amarum, III, 52.
id. chalybis, II, 464.
id. cinerum clavellatorum depuratum, III, 465.
id. commune, IV, 221.
id. coralliorum, I, 507.
id. cornu cervi depuratum, I, 241.
id. cornu cervi succinatum, I, 265.
id. cornu cervi volatile, I, 241.
id culinare, IV, 221.
id. digestivum, III, 493.
Sal diureticum, III, 494.
id. diureticum vegetabile, III, 502.
id. Ebshamense, III, 52.
id. Epsomiense, id.
id. febrifugum Sylvii, III, 493.
id. margaritarum, I, 507.
id. marinum, IV, 221.
id. martis, II, 463.
id. martis muriaticum, II, 471.
id. martis muriaticum ammoniacale, II, 477.
id. martis perlarum, I, 507.
id. mercuriale—acetosum, III, 224.
id. mercurii acetosum, id.
id. mirabile Glauberi, IV, 230.
id. muriaticum baroticum, I, 425.
id. oculorum cancrorum, I, 507.
id. panchrestum, III, 502.
id. plumbi, III, 421.
id. polychrestum Glaseri, III, 476.
id. polychrestum Lemery, id.
id. polychrestum parisiense, id.
id. polychrestum Seignetti, III, 513.
id. prunulæ, III, 481.
id. Rupellense, III, 513.
id. sapientiæ, III, 476.
id. saturni, III, 421.
id. sedativum mercuriale, I, 58; III, 206.
id. sedativum Hombergii, I, 58.

Sal Sedlitzense, III, 52.
id. Seydschntzense, id.
id. succini, I, 100.
id. Tachenianum, III, 467.
id. tartari, III, 466.
id. tartari essentiale, I, 101.
id. tartari per deliquium, III, 468.
id. tartari sulphuratum, III, 476.
id. urinosum purisimum, I, 238.
id. vegetabile, III, 502.
id. vitri, III, 479.
id. vitrioli narcoticum, I, 58.
id. volatile anglicanum, I, 239.
id. volatile oleosum angelicæ, I, 276.
id. volatile oleosum Sylvii, I, 227.
id. volatile salis ammoniaci, I, 238.
id. volatile succini, I, 100.
id. vomitorium vitrioli, IV, 400.
Salab, IV, 148.
Salep, id.
id. de las Indias Occidentales, I, 355.
Salicaria, IV, 150.
Salicariæ, id.
Salicina, IV, 172.
Salix alba, IV, 171.
id. capræa, id.
id. fragilis, id.
id. pentandra, id.
id. vitelina, id.
Salitre, III, 481.
Salsilago ammoniacalis, I, 257.
Salsilago ammoniacalis acetosa, id.
id. cornu cervi succinato, I, 265.
id. oxitartari, III, 495.
Salsola, IV, 151, 223.
id. kali, id.
id. soda, id.
Salsola tragus, id.
Salvado, id.
Salvia, id.
id. de los bosques, II, 263.
id. comun, IV, 151.
id. hormin, id.
id. de los prados, id.
id. silvestre, id.
Salvia agrestis, id.
id. hormicum, IV, 152.
id. minor, IV, 151.
id. officinalis, id.
id. pratensis, id.
id. silvestris, II, 263.
Sambucus agrestis, IV, 178.
id. Canadensis, IV, 173.
id. ebulus, IV, 178.
id. humilis, id.
id. nigra, IV, 173.
Sampsuchum, III, 102.
Sándalo, IV, 161.
id. de agua, IV, 359.
id. blanco, IV, 161.
id. cetrino, id.
id. rojo, id.
Sandaraca, IV, 163.
id. de Alemania, id.
id. germanica, id.
Sangre de drago, IV, 162.
id. de drago en granos, id.
id. de drago en lágrimas, id.
id. de drago en panes, id.
id. de drago en tablas, id.
id. de cabra montés, II, 342.
id. de macho, id.
Sanguijuela oficinal IV, 164.
Sanguina, I, 198.
Sanguinalis, IV, 165.
Sanguinaria oficinal, IV, 164.
id. del Canadá, id.
id. mayor, id.
id. menor, id.
id. plateada, id.
Sanguinaria Canadensis, id.
id. minor, id.
Sanguis draconis, IV, 163.
id. draconis in granis, id.
id. draconis in lacrimis, id.
id. draconis in placentis, id.
id. draconis in tabulis, id.
id. hirci, II, 342.
Sanguisorba, IV, 165.
id. oficinalis, id.
Sanicula de cubia ó de montaña, id.
id. de hojas largas, id.
Sanicula alba, II, 199.
id. europæa, IV, 166.
Santalina, IV, 161.
Santalum album, id.
id. citrinum, id.
Santolina, IV, 166.
id. de hojas de ciprez, id.
Santolina, id.
id. chamæcyparissias, id.
Santonico, IV, 214.
Sapa uvarum, IV, 345.
id. vomitoria Sylvii, I, 329.
Saphirus, I, 198.
Sapo albus, III, 515.
id. alcoholico-ammoniacalis, I, 234, 318.
id. alicantinus, III, 515.
id. aleniensis, id.
id. ammoniaco-camphoratus, I, 234.
id. ammoniæ, I, 231.
id. ammoniæ oleaceus, id.
id. amygdalinus, III, 515.
id. antimonialis, I, 318.
id. antimonii, id.

Sapo aromaticus, I, 234.
id. arthriticus, IV, 303.
id. cacaotinus, III, 516.
id. chemicus pro usu externo, IV, 304.
id. chymicus, I, 244.
id. domesticus, III, 515.
id. guaiacinus, II, 429.
id. gummi ammoniaci, II, 386.
id. hispanicus albus, III, 515.
id. hydrargyri, III, 228.
id. hydro-sulphureti oxiduli stibii sulphurati, I, 318.
id. jalappæ, II, 538.
id. jalappinus, id.
id. kalicus, III, 515.
id. medicatus, id.
id. medicinalis, id.
id. mollis, id.
id. niger, id.
id. nostras, id.
id. potassæ terebinthinaceus, IV, 304.
id. starkeyanus, id.
id. stibiatus, I, 318.
id. sulphurato ceratus, III, 462.
id. tartareus, IV, 304.
id. tartareus Starkeyi, id.
id. terebinthinatus, IV, 305.
id. venetus, III, 515.
id. viridis, id.
id. Wologdensis, III, 515, 516.
Saponaria, IV, 166.
Saponaria officinalis, id.
id. rubra, id.
Saponina, id.
Sapos, II, 341.
Sapota disceta, IV, 7.
id. salicifolia, id.
Saquillo aromático, IV, 361.
Saquillo purgante, IV, 182.
id. resolutivo, I, 218, 252; III, 103; IV, 221.
Sarcocola, IV, 168.
Sarcocolina, IV, 169.
Sarcocolla, IV, 168.
Sarsaparrilla, IV, 375.
Sasafrax, IV, 169.
Satureja capitata, IV, 267.
id. hortensis, I, 136.
id. thymbra, id.
Saturna, III, 402.
Saturnus, id.
Sauce, IV, 171.
id. blanco, id.
id. frágil, id.
Sauco, IV, 173.
id. menor ó yezgo, IV, 178.
id. negro, IV, 173.
Saxifraga blanca, IV, 179.
id. granulosa, id.
id. de los ingleses, IV, 212.
Saxifraga alba, IV, 179.
id. anglicana, IV, 213.
id. granulata, IV, 179.
Scabiosa succisa, IV, 247.
Scamonium, II, 239.
id. Aleppense, id.
id. de Aleppo, id.
id. Halepense, id.
id. Smyrnæum, id.
id. Syriacum, id.
Scarabeus unctuarios, II, 35.
Scariola, II, 243.
id. Schænanthus, II, 546.
Scilla marina, II, 244.
id. maritima, id.
id. rubra, id.
Scilliticum, II, 244.
Senicus, II, 341.
id. marinus, id.
id. maximus, id.
Saucus officinalis, II, 341.
Scleroderma cervicum, III, 18.
Sclerotium flavus, IV, 265.
Scobs ferri, II, 440.
Scolopendra, II, 262.
Scolopendrum, id.
id. officinale, id.
Scorpio europeus, II, 342.
Scorzonera hispánica, II, 266.
id. humillis, id.
id. latifolia sinuata, id.
Scrophularia aquatica, II, 267.
id. fœtida, II, 268.
id. nodosa, II, 267.
id. vulgaris, II, 268.
Scutum stomachicum, III, 346.
id pro umbilico, II, 334.
Scyphophorus cocciferus, III, 23.
Sebaceum palmæ, I, 10.
Sebesto, IV, 179.
Sebo, II, 410.
id. de carnero, id.
id. de castor, id.
id. de macho, id.
Sebum cervionum, II, 410.
id. bovillum, id.
id. hircinum, id.
id. vervecinum, II, 411.
Secale cornutum, IV, 265.
Sedo, IV, 179.
Sedum acre, IV, 212.
id. majus, id.
id. minus, id.
id. rodhiola, IV, 179.
id. telephium, IV, 212.
Segestria cellaria, I, 346.
Selinum cervaria, IV, 373.
id. oreo selinum, III, 357.
id. palustre, III, 380.
Semen contra, IV, 214.
Semen contra, id.
id. lumbricorum, id.
id. melonum, III, 106.
id. napi, III, 258.

Semen sanctum, IV, 214.
id. contra vermes, id.
id. zedoariæ, id.
Sementina, id.
Sempervivum tectorum, IV, 212.
Sen, IV, 180.
id. de Alepo, id.
id. de Alejandría, id.
id. de América, IV, 208.
id. de Berberia, IV, 180.
id. de Egipto, id.
id. de España, id.
id. falso, IV, 208.
id. de Italia, IV, 180.
id. de Nubia, id.
id. de hojas agudas, id.
id. de hojas obtusas, id.
id. de Palta, id.
id. de pobres, id.
id. de Say, id.
id. de la Thebaica, id.
Senecio, IV, 372.
id. jacobæa, IV, 371.
id. vulgaris, IV, 372.
Senega, III, 451.
Senegina, id.
Sepia officinalis, I, 494.
Septem folium, IV, 268.
Sericum adhesivum, II, 354.
id. crudum, II, 20.
id. tostum, II, 21.
Serpentaria de Virginia, I, 348.
Serpentaria minor, IV, 354.
id. rubra, I, 465.
id. virginiana, I, 349.
id. virginica, id.
id. vulgaris, I, 465.
Serpol, IV, 209.
Serpyllum, id.
Serum lactis acetosum, IV, 241.
Serum lactis acidum, id.
id. lactis aluminatum, I, 211.
Serum lactis aluminosum, id.
id. lactis aluminosum cum cinammomo, I, 212.
id. lactis antiscorbuticum, II, 143.
id. lactis chalybeatum, IV, 240.
id. lactis compositum, IV, 241.
id. lactis dulce, IV, 240.
id. lactis dulce Hoffmanni, id.
id. lactis mannatum, III, 79.
id. lactis cum sinapi, III, 253.
id. lactis sinapinum, id.
id. lactis sincerum, IV, 240.
id. lactis tamarindatum, IV, 252.
id. lactis tartarisatum, IV, 241.
id. lactis temperans, IV, 252.
id. lactis vinosum, IV, 240.
Serval, IV, 209.
id. de cazadores, id.
Sesamo, IV, 211.
id. oriental, id.
Sesamum, id.
id. orientale, id.
Seseli, id.
id. de Creta, id.
id. de Marsella, id.
id. de los prados, id.
Seseli creticum, id.
id. massiliense, id.
id. montanum, id.
id. pratense, IV, 212.
Sideritis hirsuta, IV, 370.
Sief album, III, 406.
id. cum opio, id.
Siempre viva mayor, IV, 212.
id. menor, id.
id. quemante, id.
Siempre viva de los tejados, IV, 212.
id. de las viñas, id.
Siete en rama, IV, 268.
Sigesbekia orientalis, I, 104.
Sigilum Salomonis, III, 453.
Silene, IV, 213.
Silene otites, id.
id. virginica, id.
Silicato de alumbre y de hierro, I, 201.
id. de alumbre y de glucina, id.
id. de alumbre y de sosa, id.
id. de alumina y de potasa, id.
id. de magnesia, III, 55.
id. de zircona, IV, 408.
Siliciphthoruro de aluminio, I, 201.
Siliqua dulcis, I, 173.
id. hirsula, III, 388.
id. vanillæ, IV, 337.
Simarruba amarga, IV, 213.
Simarruba, id.
id. amara, id.
Simiente de Alejandría, IV, 214.
id. de cedoaria, id.
Simientes frias mayores, II, 150.
id. de perlas, I, 494.
Sinapis alba, III, 251.
id. nigra, id.
Sinapismo, III, 252.
Sinapismus, id.
Sinfito mayor, II, 169.
Sinopis, I, 198.
Sio, IV, 218.
id. de las boticas, id.
id. ninsi, id.
Sisimbrio oficinal, II, 235.
Sison amomo, IV, 218.
id. falso, id.
Seson ammomum, id.

Sisymbrium nasturium , I, 457.
id. sophia , IV , 235.
Sium ammi, IV , 218.
id. ammomum , id.
id. cangus tifolium , I , 457.
id. latifolium , id.
id. ninsi , IV, 218.
id. nodiflorum , I, 457.
Smaltum, II , 119.
Smaragdus , I , 201.
Smilax china, II , 88.
id. salsaparilla , IV , 375.
Smyris, I , 198.
Sobre—carbonato de calcio protoxidado , I , 500.
id. deuto-sulfato de cobre, II , 124.
Sobre-hidro-sulfuro de mercurio , III , 151.
id. sulfuro sobre hipo—sulfito de oxido de antimonio , I, 315.
Sobre-oxalato de potasa , III , 50.
id. de potasio protoxidado , id.
Sobre oxido de plomo , III, 405.
Sobre—fosfato de cal, I , 504.
Sobre-proto—carbonato de calcio , I, 500.
id. proto carbonato de hierro , II , 462.
Sobre protoxalato de potasio , III, 501.
id. fosfato de calcio , I, 504.
id. protoxalato tartrato de potasio, III, 506.
Sobre-proto-sulfato de potasio , III, 479.
id. proto-sulfato de sodio, IV, 230.
Sobre—proto—tartrato de potasio, III, 506.
Sobre—proto—tartrato de potasio boratado, III , 512.
Sobre—sulfato de alumina y de potasa , I , 201.
id. de oxido de alumi—nio y de proto—xido de potasio , id.
id. de potasa acido , III , 479.
id. de protoxido de sodio , IV , 230.
Sobre-sulfuro de mercurio, III, 134.
id. de potasa, III , 462.
id. de sosa , IV , 219.
Sobre-tartrato de potasa , III, 506.
id. de protoxido de potasio, id.
Soda , IV , 223.
id. acetato , IV, 234.
id. acetosa , id.
id. caustica , IV , 219.
id. espinosa , IV, 151.
id. phosphorata , IV , 230.
id. pura , IV, 219.
id. tartarisata , III, 513.
id. vitriolata , IV , 230.
Sodio , IV , 219.
Sodium , id.
Soffia oficinal ó de los cijanos , IV , 235.
Sol, III, 357.
Solamen hypochondriacum, III , 503.
id. scabiosorum , II , 322.
Solanina , IV, 369.
Solaninum , id.
Solano, id.
id. amargo , II , 202.
id. dulce , id.
id. leñoso , id.
id. trepandor , id.
Solanum dulcamara , id.
id. furiosum , I, 444.
Solanum lethale , I , 444.
id. lycopersicum , IV , 267.
id. maniacum , II , 290.
id. melongena , I, 455.
id. nigrum , IV , 369.
id. quadrifolium, IV , 370.
id. tuberosum , III , 370.
id. vesicarium , I , 175.
Soldanela , IV , 235.
Solidago virga aurea , IV, 339.
Solucion de acetato de mercurio , III , 226.
id. de acetato de mor—fina , III , 249.
id. de acetato de plomo acuosa , III, 425.
id. de acetato de plomo acuosa opiada , id.
id. aluminosa , I, 207.
id. antiescrofulosa , I, 427 ; II , 519.
id. acuosa de sublima—do corrosivo , III, 187.
id. de arseniato de a—moniaco , I , 365.
id. arsenical amarga , I, 363.
id. arsenical de Brera , id.
id. arsenical de Fowler, id.
id. arsenical de Hein , id.
id. arsenical de Jacob , id.
id. arsenical de Prusia, I, 364.
id. arsenical simple , id.
id. balsamica alcoholizada , IV, 225.
id. de clorato de potasa , III , 493.
id. de Cohen , III, 458.
id. de Coindet , II , 518.

Solucion de cremor de tártaro, III, 510.
id. de deuto-ioduro de mercurio alcohólica, III, 204.
id. de deuto-ioduro de mercurio etérea, id.
id. epispástica, I, 330.
id. evaporatoria, II, 306.
id. de estracto de nuez vómica, III, 284.
id. gelatinosa, II, 346.
id. de Heineke, I, 365.
id. de hidriodato de potasa, II, 517.
id. de hidroclorato de amoniaco y de hierro, II, 480.
id. de hidroclorato de zinc etérea, IV, 391.
id. de hígado de azufre, III, 463.
id. hipnótica, III, 299.
id. de ioduro de mercurio, III, 204.
id. de jabon alcohólica, III, 519.
id. de jabon alcohólica aromatizada, III, 520.
id. de jabon alcohólica aromatizada alcanforada, III, 521.
id. de jabon alcohólica alcanforada, id.
id. de jabon alcohólica alcanforada y opiada, III, 522.
id. de jabon etérea, id.
id. litontríptica, III, 469.
id. litontríptica del Lalena, III, 499.
id. de malato de hierro, II, 484.
id. de Marryat, III, 191.
id. de mirra, III, 242.
Solucion de mirra alcahalizada, id.
id. mucilaginosa, II, 399.
id. de nitrato de plata, III, 399.
id. de nitrato de sosa, IV, 234.
id. nitrosa, I, 90.
id. oxigenada de cal, I, 490.
id. de Pearson, I, 365.
id. de potasa, III, 454.
id. de potasa alcohólica, III, 459.
id. de potasa cáustica, III, 454.
id. profilactica de la escarlatina, I, 446.
id. resolutiva de Niemann, I, 254.
id. resolutiva de Vogler, id.
id. de rob de enebro, II, 222.
id. contra los sabañones, III, 470.
id. salino-gelatinosa, I, 350; IV, 232.
id. de Saviard, III, 459.
id. sedante, III, 299, 314.
id. de sub-carbonato de amoniaco alcohólica, I, 244.
id. de sub-carbonato de potasa acuosa, III, 468.
id. de sublimado corrosivo alcohólica, III, 190.
id. de sublimado corrosivo opiada, III, 198.
id. de sublimado corrosivo acuosa, id.
id. de sublimado corrosivo etérea, III, 192.
id. de sulfato de plata, III, 401.
Solucion de sulfato de cobre acuosa, II, 126.
id. de sulfato de cobre alcanforada, id.
id. de sulfato de cobre y de amoniaco, II, 130.
id. de sulfato de cobre aromatizada, II, 126.
id. de sulfato de potasa acuosa, III, 479.
id. de sulfato de zinc acuosa simple, IV, 401.
id. de sulfuro de antimonio y de cal, I, 322.
id. de sulfuro de potasa alcohólica, III, 365.
id. de tártaro soluble alcohólica, III, 504.
id. de tártaro soluble acuosa, III, 503.
id. de Tascher, I, 244.
id. de veratrina, IV, 341.
id. de Weikard, III, 221.
Solutio acetatis plumbici, III, 415.
id. alexiteria, I, 80.
id. alexiteria gaubiana, I, 82.
id. alexiteria oxigenata, II, 117.
id. arsenicalis borussica, I, 364.
id. arsenicalis Fowleri, id.
id. arsenicata, I, 362.
id. arsenici, I, 359.
id. arsenitis kalicæ, I, 362.
id. balsamica alkalisata, IV, 225.
id. baritæ muriaticæ, I, 426.
id. calcariæ sulphurato-stibiatæ, I, 322.

Solutio calcis muriatis, I, 506.
id. camphoræ æthærea, I, 152.
id. camphoræ aquosa, I, 148.
id. camphoræ oleosa, I, 156.
id. cerata, II, 81.
id. citratis kalici, III, 502.
id. citro muriaticis, IV, 222.
id. cuprata, II, 126.
id. cupri ammoniacalis, II, 140.
id. elaterii, II, 152.
id. ferrata, II, 495.
id. ferri aluminosa, II, 466.
id. ferri muriatici cum barita, I, 427.
id. fuliginis fœtida, I, 378.
id. guaiaci gummosa, II, 428.
id. gummi gutæ alcalina, II, 394.
id. hydrargyri gummosi, III, 115.
id. mercurialis, III, 219.
id. mercurii corrosivi, III, 190.
id. mineralis Fowleri, I, 364.
id. mucilaginosa, II, 399.
id. muriatis barytæ, I, 426.
id. muriatis calcis hydrargyrata, III, 142.
id. muriatis ferri, II, 473.
id. muriatis ferri composita, II, 472.
id. muriatis ferri spirituosa, II, 473.
id. muriatis ferrici æthærea, II, 474.
Solutio muriatis ferrici spirituoso—æthærea, II, 472, 474.
id. muriatis hydrargyri oxygenati, III, 190.
id. muriatis potassæ oxygenati, III, 493.
id. myrrha alcalisata, III, 242, 244.
id. myrrha alcoholica, III, 242.
id. nitratis argenti, III, 399.
id. nitratis hydrargyri ammoniacalis, III, 217.
id. nitratis sodæ, IV, 234.
id. nitricata, I, 90.
id. opii alcoholisata, III, 290.
id. oxymuriatis calcici, I, 490.
id. plumbi in aceto acetoso, III, 411.
id. resinæ guaiaci acuosa, II, 428.
id. rob juniperi, II, 222.
id. styptica Looffii, II, 472.
id. sub-acetatis plumbici, III, 415.
id. sub-carbonatis ammonici spirituosa, I, 223.
id. sublimati, III, 189.
id. sulphatis cupri composita, II, 128.
id. sulphatis zinci, IV, 401.
id. tartari solubilis, III, 503.
id. tartari depurati, III, 510.
id. vitriolica, IV, 404.
id. zinci aluminosa, id.
Sombrerera, IV, 236.
Sonchus asper, II, 88.
id. levis, id.
Sonchus oleraceus, II, 87.
Sophia chirurgorum, IV, 235.
Sorbus aucuparia, IV, 209.
id. domestica, id.
Sosa aereada, IV, 223.
id. boratada, IV, 227.
id. caustica, IV, 219.
id. comun, IV, 151.
id. gredosa, IV, 223.
id. muriatada, IV, 221.
id. natural, IV, 223.
id. sulfatada, IV, 230.
id. vitriolada, id.
Sparadrapum ad corpus conditum involvendum, III, 258.
id. album, III, 434.
id. pallidum, III, 431.
Spatum ponderosum, I, 429.
Species adstringentes pro gargarismate, II, 408.
id. althæ, III, 60.
id. amaræ, I, 133.
id. amaricantes, id.
id. aperitivæ majores, III, 380.
id. aperitivæ minores, id.
id. contra apoplexiam III, 376.
id. aromaticæ, I, 515.
id. aromaticæ rosatæ, id.
id. avenaceæ, I, 385.
id. pro bromio avenæ, id.
id. de bryonia, I, 471.
id. carminativæ, I, 159.
id. pro cataplasmate emolliente, III, 59.
id. cephalicæ, I, 252; IV, 360.
id. cephalicæ pro cucuphis, III, 32.

Species cordiales temperatæ, III, 365.
id. decocti antinephritici, III, 380.
id. decocti lignorum, II, 429; IV, 388.
id. decocti antipodagrici Viennensis, II, 431.
id. decocti nephro-cathartici Foresti, III, 380.
id. pro decocto antipsorico, II, 404.
id. pro decocto avenæ, I, 385.
id. pro decocto carminativo, I, 159.
id. pro decocto demulcente, II, 386.
id. pro decocto florum et fructuum, I, 392.
id. pro decocto ad gangrænam, IV, 116.
id. pro decocto infantum, II, 343; IV, 71.
id. pro decocto lignorum, II, 429.
id. pro decocto nigro, I, 115.
id. pro decocto vulnerario, III, 396.
id. ad decoctum lignorum, II, 429.
id. diacinnamomi, I, 515.
id. diacretæ, I, 497.
id. diajalappæ, II, 529.
id. diamargaritæ frigidæ, III, 277.
id. diambræ, I, 515.
id. diarrhodon, IV, 115.
id. diatragacanthæ frigidæ, II, 400.
id. discutientes, I, 133.
id. emolientes, III, 59.
Species pro enemate emolliente, III, 59.
id. pro epithemate cordis et pulsuum, IV, 116.
id. ad fomentum emolliens, III, 59.
id. pro fomento emolliente, id.
id. pro fotu ad colicum, III, 83.
id. pro fotu emmenagogo, I, 472.
id. pro fotu ad gangrænam, I, 134.
id. pro fotu antihemorrhoidali, II, 408.
id. pro fotu laterali, I, 109.
id. pro fotu discutienti et nervino, I, 252.
id. fumales, I, 454.
id. fumales pro suffimento, id.
id. ad fumigationem anticontagiosam, I, 100.
id. pro fumo, I, 451.
id. pro gargarismate, III, 59.
id. de gemmis frigidis, III, 278.
id. herbarum pro infuso analeptico, I, 351.
id. hieræ picræ, I, 27.
id. imperatoris, I, 516.
id. pro infuso diuretico, III, 384.
id. pro infuso pectorali, III, 62.
id. ad infusum pectorale, id.
id. latifiantes Rhazis, I, 515.
id. lignorum, II, 429.
id. mundificantes, I, 2.
id. nervinæ pro cucuphis, IV, 256.
Species nervinæ externæ, IV, 360.
id. pro odoramento, III, 32.
id. pectorales, III, 62.
id. resolventes, I, 133; IV, 118.
id. resolventes externæ, id.
id. contra scorbutum, IV, 59.
id. contra sputum sanguinis, III, 231.
id. ad suffiandum, I, 451.
id. pro suffitu, id.
id. pro thea, IV, 272, 343.
id. pro vaporibus acidi acetici, I, 51.
id. pro vaporibus acidi muriatici, I, 80.
id. pro vaporibus acidi nitrici, I, 89.
id. pro vaporibus superoxydi muriatici, II, 116.
Specificum antiatrophicum Wepferi, II, 510.
id. antepilepticum Weismanni, II, 129.
id. antifebrile Crollii, I, 485.
id. Crannii, I, 293.
id. jalappinum, II, 529.
id. Paracelsi, III, 476.
id. stomachicum, I, 297.
id. tartari pharyngicum, I, 205.
Specilla cerea, III, 431.
Sperma ceti, II, 270.
id. mercurii, III, 224.
id. ranæ, II, 341.
Sperniola Crollii, III, 239.
Sphæra marina, IV, 408.
id. thalassia, id.
Sphondylium, II, 268.
Spica alpina, III, 276.
id. celtica, id.
id. cervina, II, 276.

Spica domestica, II, 276.
id. indica, III, 276.
id. nardus, id.
Spigilia anthelmica, II, 274.
id. marylandica id.
Spilantus æmella, I, 103.
id. oleracea, I, 457.
Spina alba, IV, 266.
Spinachia, II, 276.
Spinacia, id.
id. oleracea, id.
Spinæ cloris mustulæ piscis, II, 502.
id. vipere, II, 340.
id. vulpis, id.
Spiræa filipendula, II, 312.
id. ulmaria, IV, 82.
Spiritus absinthi, I, 122.
id. abietis, I, 2.
id. aceti, I, 47.
id. acetico æthereus, II, 295.
id. æruginis, I, 49.
id. æthereus nitrosus, II, 298.
id. æthereus vitriolatus, II, 303.
id. ætheris ferratus, II, 474.
id. ætheris nitratus, II, 298.
id. ætheris sulphurici, II, 303.
id. ætheris vitriolici, id.
id. ætheris vitriolici compositus, id.
id aluminis, I, 94.
id. ammoniæ, I, 223.
id. ammoniæ anisatus, I, 225.
id. ammoniæ aromaticus, I, 227.
id. ammoniæ compositus, id.
id. ammoniæ fœtidus, I, 376.
id. ammoniæ cum succino, I, 236.
id. ammoniato amiatus, I, 225.
Spiritus angelicæ compositus, I, 275.
id. Anhaltinus, IV, 297.
id. anisi, I, 288.
id. anisi compositus, I, 289.
id. anthos, IV, 97.
id. antiscorbuticus Drawitzii, II, 147.
id. antisthericus, IV, 295.
id. aperitibus Renoti, I, 93.
id. armoraciæ compositus, IV, 60.
id. aromaticus, III, 234; IV, 268, 275.
id. aromaticus ammoniacalis, I, 227.
id. aromaticus camphoratus, I, 275.
id. arthriticus Pottii, IV, 303.
id. aurantiorum abstractibus, III, 263.
id. balsami peruviani, I, 417.
id. Beguinii, I, 255.
id. bezoardicus Bussii, I, 267.
id. bryoniæ albæ compositus, II, 51.
id. cæruleus, II, 140.
id. camphoræ, I, 153.
id. camphoratus, id.
id. carminativus, IV, 98.
id. caryophilorum aromaticus, III, 45.
id. caryophilorum Silvii, I, 276.
id. carvi, I, 160.
id. castorei compositus, II, 50.
id. cinnamomi, I, 524.
id. cochleariæ, II, 145.
Spiritus cochleariæ compositus, id.
id. cornu cervi, I, 241.
id. cornu cervi succinatus, I, 265.
id. croci, I, 388.
id. diatrion, I, 93.
id. eboris, I, 241.
id. formicarum, I, 49; II, 511.
id. frumenti, I, 161.
id. fuliginis, I, 49.
id. fumans Beguinii, I, 255.
id. fumans compositus, II, 224.
id. lavandulæ, II, 281.
id. lavandulæ compositus, II, 282.
id. ligni guaiaci, II, 417.
id. liliorum convallium, III, 37.
id. lumbricorum, I, 241.
id. lumbricorum vinosus, I, 225.
id. mastiches compositus, I, 176.
id. matricalis, id.
id. mellis Andernaci, III, 230.
id. menthæ, IV, 367.
id. millefolii, III, 234.
id. Mindereri, I, 257.
id. muriatico-æthereus, II, 296.
id. myristicæ aromaticæ, III, 255.
id. nitri acidus, I, 87.
id. nitri dulcis, II, 298.
id. nitri fumans, I, 88.
id. nitri fumans glauberianus, id.
id. nitri tennior, I, 89.
id. nitri tennis, id.
id. nitrico-æthereus, II, 298.

Spiritus nucis moschatæ, III, 255.
id. oleosum aromaticus Sylvii, I, 227.
id. olei terebinthini æthereus, IV, 294.
id. ophthalmicus Himlyi, I, 418.
id. ophthalmicus Mindereri, I, 257.
id. potassatus, III, 459.
id. pulegii, III, 449.
id. raphani compositus, II, 145.
id. raphani rusticani, IV, 60.
id. resolvens, III, 520.
id. rorismarini, IV, 97.
id. rorismarini acetatus, III, 234.
id. rorismarini compositus, id.
id. rosarum, IV, 111.
id. salinus aromaticus, I, 227.
id. salis acidus, I, 78.
id. salis acidus fumans, id.
id. salis ammoniaci acuosus, I, 218, 239.
id. salis ammoniaci cum cineribus clavellatis, id
id. salis ammoniaci cum calce paratus, I, 218.
id. salis ammoniaci simplex, I, 239.
id. salis ammoniaci dulcificatus, I, 223.
id. salis ammoniaci dulcis, id.
id. salis ammoniaci lactescens, I, 236.
id. salis ammoniaci lactens, id.
id. salis ammoniaci sulphuratus, I, 255.
Spiritus salis ammoniaci tartarisatus, I, 239.
id. salis ammoniaci urinosus, I, 218.
id. salis ammoniaci vinosus, I, 223.
id. salis ammoniaci volatilis, I, 218.
id. salis ammoniaci anisatus, I, 225.
id. salis ammoniaci aquosus, I, 218.
id. salis dulcis, id.
id. salis marini coagulatus, III, 493.
id. salis marini dephlogisticatus, II, 116.
id. salis terebinthinatus, IV, 303.
id. salis volatilis oleosus Sylvii, I, 218, 227.
id. sambuci, IV, 178.
id. saponaceus, III, 520.
id. saponatus, III, 519, 520.
id. saponis, III, 520.
id. saponis compositus, IV, 305.
id. saturni, I, 51.
id. serpylli, IV, 210.
id. suaveolens pro suffitu, II, 99.
id. succinatus ammoniæ, I, 265.
id. succinatus ammonici, id.
id. sulphuricus æthereus, II, 303.
id. sulphuricus camphoratus, I, 152.
id. sulphuricus martiatus, II, 474.
id. sulphuris, I, 94, 99.
id. sulphuris per campanam, id.
id. sulphuris volatilis, I, 255.
id. tartari, I, 93.
Spiritus tartari vitriolatus, id.
id. de tribus, I, 93.
id. vanillæ, IV, 339.
id. vini, I, 161.
id. vini camphoratus crocatus, I, 154.
id. vini dephlegatissimus, I, 166.
id. vini depuratus, I, 164.
id. vini fortior, I, 163.
id. vini rectificatissimus, I, 163, 166.
id. vini rectificatus, id.
id. vini tartarisatus, I, 166.
id. vini tenuor, I, 163.
id. vinosus frumenti, I, 161.
id. viperarum, I, 241.
id. viridis æris et veneris, I, 49.
id. vitrioli coagulatus Mynsich, III, 476.
id. vitrioli dulcis, II, 303.
id. vitrioli phlogisticatus, I, 99.
id. vitrioli volatilis, I, 94.
id. vitrioli volatilis aromaticus, I, 227.
id. vitrioli volatilis causticus, I, 218.
id. vitrioli volatilis fœtidus, I, 374.
id. vitrioli volatilis oleosus, I, 227.
id. vulnerarius, III, 234.
id. vulnerarius acidus, id.
Spodium, I, 503.
Spongia cynosbati, I, 430.
id. calcinata, II, 20.
id. cerata, II, 284.
id. laciniulosa, id.
id. marina, id.
id. præparata, id.
id. vita, II, 20.
Sguinanthus, II, 546.

Stachis recta, IV, 370.
Stæchas arabica, II, 17.
id. citrina, id.
id. germanica, id.
id. neapolitana, II, 18.
id. purpurea, II, 17.
Stalagmitis cambogioides, II, 393.
Stannum granulatum, II, 286.
id. Jupiter, id.
id. præparatum, id.
id. pulveratum, II, 286, 288.
id. raspatum, id.
id. sub-oxidatum, II, 288.
Staphidisagria, II, 285.
Staphisagria, id.
Stercus caninum album, I, 502.
id. diaboli, I, 368.
id. gallinæ, I, 103.
id. pavonis, id.
Stibiis potassæ, I, 296.
Stibium, 291.
id. oxidatum album ablutum, id.
id. oxidatum album non ablutum, I, 302.
id. oxidatum fuscum, I, 303.
id. oxidatum sulphuratum vitrificatum, I, 295.
id. oxidulatum, I, 293.
id. purum, I, 291.
id. striatum, I, 304.
id. sulphuratum nigrum, id.
id. sulphuratum alcoholisatum, id.
id. sulphuratum levigatum, id.
Stillicidium aromaticum, I, 254.
Stizolobium pruriens, III, 388.
Strobili pini, III, 397.
Strychina, II, 293.
Strychninum, II, 293.
Strychnos colubrina, III, 366.
id. nux vomica, III, 283.
Styrax calamita, III, 289.
id. cannulata, id.
id. in granis, id.
id. granulata, id.
Sthyrax in massis, II, 289.
id. officinalis, id.
Sub acetas cupri, II, 134, 138.
id. cupri impurus, id.
id. cupricus, id.
id. plumbi, id.
id. plumbi dilutus, III, 415.
id. plumbi liquidus, III, 411.
Sub-acetato de cobre deutoxidado, II, 134.
id. de plomo, III, 411.
id. de plomo protoxidado, id.
Sub-borax natricum, IV, 227.
id. sodæ, id.
Sub borato de sodio protoxidado, id.
id. de sosa, id.
Sub-carbonas ammonicum empireumaticum, I, 241.
id. ammoniæ, I, 238.
id. ammoniæ animale, I, 240.
id. ammoniæ pyro-animale, id.
id. ammoniæ pyro animale liquidum, I, 241.
id bismuthicum, I, 460.
id. calcariæ cretaceum, I, 492.
id. ferri, II, 456.
id. ferrosum ferricum, id.
id. kalicum depuratum, III, 465.
id. kalicum impurum, id.
Sub-carbonas magnesiæ, III, 48.
id. natricum, IV, 223.
id. plumbi, III, 406.
id. potassæ impurum, III, 465.
id. sodæ, IV, 223.
Sub carbonato de amoniaco, I, 238.
id. de amoniaco aceitoso concreto, I, 240.
id. de amoniaco aceitoso líquido, I, 242.
id. de bario protoxidado, I, 428.
id. de baryta, id.
id. de bismuto, I, 464.
id. de calcio protoxidado, I, 491.
id. de cal, id.
id. de cobre y de amoniaco, II, 123.
id. de hierro, II, 456.
id. de hierro protoxidado, id.
id. de magnesia, III, 48
id. de plomo, III, 406.
id. de plomo protoxidado, id.
id. de potasa, III, 465.
id. de potasio protoxidado, id.
id. de sodio protoxidado, IV, 223.
id. de sosa, id.
Sub-clorato de cal, I, 490.
Sub-cloruro de antimonio, I, 322.
Sub-deuto-acetato de cobre, II, 134.
Sub-deuto-acetato de amoniaco, II, 139.
Sub-deuto-carbonato de cobre, II, 123.
Sub-deuto-nitrato de cobre y de amoniaco, II, 131.

Sub—deuto nitrato de bismuto, I, 464.
Sub-deuto-sulfato amoniaco—mercurial, III, 209.
Sub-deuto-sulfato de cobre y de amoniaco, II, 128.
Sub-deuto-sulfato de mercurio, III, 207.
Sub-deutoxisulfuro de antimonio, I, 307.
Sub-fosfato de calcio protoxidado, I, 501.
Sub-fosfuro de cal, id.
Sub-hidroclorato de antimonio, I, 322.
Sub-murias ammoniaco-hydrargyricus, III, 218.
id. hydrargyri, III, 157.
id. hydrargyri ammoniatus, III, 218.
id. hydrargyri mitis, III, 157.
id. hydrargyri præcipitatus, III, 157, 218.
id. hydrargyri sublimatus, id.
Sub-muriato de antimonio, I, 322.
id. de mercurio, III, 157.
id. de plomo, III, 402.
Sub-nitras bismuti, I, 464.
id. bismuticum, id.
Sub-nitrato de bismuto, id.
Sub-oxido de estaño, II, 288.
id. nitrico, I, 392.
id. de plomo, III, 403.
Sub—proto—acetato de plomo, III, 411.
Sub—proto—borato de sodio, IV, 227.
Sub—proto—carbonato de bario, I, 428.
Sub—proto—carbonato de bismuth, I, 464.
Sub—proto—carbonato de calcio, I, 491.
Sub—proto—carbonato de plomo, III, 406.
Sub—proto—carbonato de potasio, III, 465.
Sub—proto—carbonato de sodio, IV, 223.
Sub—proto-hidrosulfato de antimonio, I, 307.
Sub—proto-nitrato de bismuth, I, 464.
Sub—proto-nitrato de mercurio, III, 209.
Sub—proto—phosphato de calcio, I, 501.
Sub—proto—phosphato de sodio, IV, 230.
Sub—proto-sulfato de plomo, III, 410.
Sub—sulfato de antimonio, I, 295.
Sub—sulfato de deutoxido de cobre y de ammoniaco, II, 128.
Sub—sulphas ammonio cupricum, II, 129.
Sub—sulfas hydrargyri flavus, III, 207.
Sublimado corrosivo, III, 185.
id. dulce, III, 157.
Succinas ammoniæ, I, 265.
id. ammoniæ pyro-animale liquidum, id.
id. ammoniæ pyro-oleoso aquosum, id.
Succinato de amoniaco, id.
Sucino, IV, 236.
id. negro, I, 386.
Succinum, IV, 236.
id. oxygenatum, IV, 239.
Succisa, III, 247.
Succus acetosæ, I, 17.
id. aconiti inspisatus, I, 105.
id. agresti, IV, 346.
id. antiscorbuticus, II, 142.
id. armoraciæ compositus, IV, 59.
id. aurantiorum, III, 260.
id. è baccis myrtillorum, III, 245.
id. beccabungæ, I, 430.
id. berberum, I, 135.
id. brioniæ, I, 471.
id. buglossæ, I, 472.
id. carottæ, IV, 373.
id. cerefolii, III, 383.
id. cichorii, I, 11.
id. cicutæ, II, 91.
id. cicutæ inspisatus, II, 92.
id. citrorum, II, 103.
id. citri, id.
id. cochleariæ, II, 142.
id. cochleariæ compositus, id.
id. cydoniorum, III, 108.
id. dauci inspisatus, IV, 373.
id. ebuli, IV, 178.
id. ex floribus persicorum, I, 143.
id. fumariæ, II, 322.
id. granatorum, II, 409.
id. granorum kermes, III, 3.
id. liquiritiæ, IV, 72.
id. liquiritiæ depuratus, id.
id. marrubii albi, III, 96.
id. millefolii, III, 231.
id. mororum, III, 246.
id. mororum inspisatus, id.
id. plantaginis, III, 43.
id. pomorum, III, 94.

Succus pulmonariæ, III, 528.
id. rosarum pallidarum, IV, 100.
id. sambuci, IV, 174.
id. sambuci inspisatus, id.
id. saponariæ, IV, 167.
id. taraxaci, IV, 259.
id. trifolii febrini, IV, 319.
id. violarum, IV, 349.
Suelda, II, 169.
Suero, III, 15; IV, 240.
Suero acido, IV, 241.
id. aluminoso, I, 211.
id. aluminoso con canela, I, 212.
id. antiescorbutico, II, 143; IV, 252.
id. aperitivo, III, 55.
id. avinagrado, IV, 241.
id. calibeado, IV, 240.
id. compuesto, IV, 241.
id. dulce, IV, 240.
id. dulce de Hoffman, id.
id. en polvo, id.
id. purgante, III, 79.
id. sinapizado, III, 253.
id. tamarindado, IV, 252.
id. de Van—Swieten, III, 514.
id. vinoso, IV, 240.
id. de Weis, IV, 197.
Suetonia de acido de alumina y de potasa, I, 201.
Sulfato de alumbre y de potasa, id.
id. de amoniaco, I, 250.
id. de bario protoxidado, I, 428.
id. de cadmio, I, 477.
id. de cal, I, 504.
Sulfato de calcio protoxidado, I, 504.
id. de cinchonina, II, 109.
id. de cobre acido, II, 124.
id. de cobre aluminoso, II, 127.
id. de cobre y amoniaco, II, 129.
id. de cobre deutoxidado, II, 124.
id. de hierro, II, 463.
id. de hierro calcinado, II, 464.
id. de hierro disecado, id.
id. de hierro protoxidado, II, 463
id. de añil indigo líquido, I, 340.
id. de magnesia, III, 52.
id. de magnesia protoxidado, III, 52.
id. de mercurio, III, 208.
id. de mercurio oxidulado, III, 207.
id. de morfina, III, 249.
id. de plata, III, 401.
id. de potasa, III, 475.
id. de potasa acido, III, 479.
id. de potasa y de amoniaco, III, 480.
id. de potasa ferruginoso acido, II, 465.
id. de potasa y de magnesia, III, 480.
id. de potasio protoxidado, III, 476.
id. de quinina, IV, 56.
id. de sodio protoxidado, IV, 230.
id. de sosa, id.
id. de sosa acido, id.
id. de sosa acidulo, id.
Sulfato de sosa y de magnesia, IV, 233.
id. de zinc, IV, 400.
Sulfito de potasa, III, 481.
id. de potasa sulfurado, id.
id. de potasa y de mercurio, III, 209.
id. de sosa, IV, 233.
id. de sosa sulfurado, id.
Sulfuro de antimonio, I, 304.
id. de antimonio y de cal, I, 321.
id. de antimonio nativo, I, 304.
id. de antimonio negro, id.
id. de antimonio y de potasa, I, 322.
id. de antimonio rojo, I, 357.
id. de bario, I, 425.
id. de calcio protoxidado, I, 489.
id. de cal, id.
id. de cal y de arsenico, I, 358.
id. de cal líquido, I, 490, 505.
id. de cal estibiado, I, 321.
id. de hierro, II, 447.
id. de hierro potasado, II, 448.
id. hidrogenado de suboxido de antimonio, I, 255, 307,
id. de mercurio, III. 151.
id. de mercurio antimoniado, III, 136.
id. de mercurio negro, III, 133.
id. de mercurio oxidulado, III, 134.
id. de mercurio triturado, id.
id. de plomo, III, 401.
id. de potasa, III, 461.
id. de potasa marcial, III, 463.

Sulfuro de potasio protoxidado, III, 461.
id. de sodio protoxidado, IV, 219.
id. de sosa, id.
id. de sosa simple, id.
Sulfuro prusuro hidrogenado de potasa, I, 74.
Sulphas aluminæ acetatum, I, 204.
id. aluminæ fusum, I, 202.
id. aluminæ et potassæ acidulum, I, 201.
id. ammoniacæ, II, 250.
id. ammoniacæ cupratum, II, 129.
id. argenti, III, 401.
id. argenti liquidum, id.
id. barytæ, I, 428.
id. cadmii, I, 477.
id. calcicum, I, 504.
id. calcis, id.
id. cinchonini, II, 109.
id. cupri, II, 124.
id. cupri aluminosum camphoratum, II, 127.
id. cupri ammoniacale, II, 129.
id. cupro ammoniacale, id.
id. ferri, II, 464.
id. ferri calcinatum, II, 454.
id. ferri exsiccatum, II, 464.
id. hydrargyri luteum, III, 207.
id. hydrargyricum cum excessu oxydi, III, 207.
id. kalico aluminicum, I, 201.
id. magnesiæ, III, 52.
id. natricum, IV, 230.
id. potassæ, III, 476.
id. potassæ cum sulphure, III, 477.
id. sodæ, IV, 230.
Sulphas sodæ acidulum, IV, 230.
id. sodæ et magnesiæ, IV, 233.
id. zinci, IV, 400.
id. zincicum, id.
Sulphur, I, 397.
id. antimoniatum fuscum, I, 307.
id. antimoniatum præcipitatum, id.
id. antimoniatum tartarisatum, id.
id. antimonii auratum, I, 315.
id. auratum liquidum, I, 319.
id. depuratum, I, 397.
id. lotum, id.
id. lycopodii, III, 18.
id. præcipitatum, I, 397.
id. rubrum, I, 307.
id. stibiatum aurantiacum, I, 315.
id. stibiatum rubrum, I, 307.
id. vegetabile, III, 18.
Sulphuretum ammoniacæ, I, 255.
id. ammoniæ, id.
id. antimonii præcipitatum, I, 315.
id. arsenici flavum, I, 357.
id. calcariæ et stibii, I, 321.
id. calcis, I, 489.
id. calcis et arsenici, I, 358.
id. calcis stibiatum, I, 321.
id. ferri, II, 447.
id. hydrargyri nigrum, III, 133.
id. hydrargyri simplex, id.
id. hydrargyri stibiatum, III, 136.
Sulphuretum hydrargyri et stibii, III, 136.
id. kalicum, III, 461.
id. lixiviæ, id.
id. lixiviæ stibiatum, I, 302.
id. plumbi, III, 402.
id. potassæ, III, 461.
id. potassæ et ferri, II, 448.
id. stanni, II, 288.
id. stibii arsenicatum, I, 359.
id. stibii hydrogenatum, I, 315.
id. stibii nativum, I, 304.
id. oxiduli stibii hydrogenatum, I, 315.
id. stibii præparatum, I, 304.
id. stibii vini, I, 206.
Super acetas cupri impurus, II, 134.
id. plumbi, III, 421.
Super-carburetum ferri, II, 446.
Super-murias hydrargyri, III, 185.
Super-oxalas kalicum, III, 501.
id. potassæ, id.
Super oxidum manganicum, III, 81.
id plumbicum, id.
id. plumbosum, III, 403.
Superstibiis kalica, I, 296.
Super-sulphas alumine et potassæ, I, 201.
id. argillæ alcalisatum, id.
id. potassæ, III, 479.
Super tartras kalicum, III, 506.
id. potassæ, id.
Supositorio *(véase cala)*, id.
Supositorium ad album solicitandum, III, 518.

Supositorium mellis commune, III, 231.
id. mellis irritans, II, 160.
Swietania farmaceutica, IV, 241.
id. febrifuga, IV, 242.
id. Mahogoni, IV, 7, 241.
Sylvie, I, 271.
Symphitum maculosum, III, 528.
id. officinale, II, 169.
id. tuberosum, II, 170.
Synapis, III, 251.
Syringitis, I, 493.
Syrupus absinthii, I, 123.
id. absinthii compositus, id.
id. de absinthico, id.
id. de absinthico compositus, id.
id. acaciarum, II, 113.
id. acaciarum florum, id.
id. aceti, I, 53.
id. acetosæ, I, 7.
id. acetosellæ, I, 8.
id. acetositatis citri, II, 106.
id. accidi citrici, id.
id. accidi acetici, I, 53.
id. accidi phosphorici, I, 66.
id. accidi sulphurici, I, 95.
id. accidi vitriolatus, id.
id. de acido tartari, I, 103.
id. adianti capilli veneris, II, 186.
id. de adianto Monspeliaco, id.
id. cum æthere sulphurico paratus, II, 304.
id. de agrestæ, IV, 346.
id. alcalinus, III, 470.
id. aliri, I, 138.
id. de allio, id.
id. althææ, III, 68.
Syrupus althææ compositus, III, 69.
id. de ammoniaco, II, 377.
id. amygdalarum, I, 182.
id. amygdali persicæ, I, 144.
id. amygdali persicæ florum, id.
id. de amygdalis, I, 182.
id. amygdalium, id.
id. anethi fœniculi compositus, I, 342.
id. anodynus, II, 292.
id. antiscorbuticus, IV, 63.
id. antiscorbuticus compositus, id.
id. aperitivus, I, 342.
id. de apio, id.
id. aquilegiæ, I, 345.
id. armoraciæ, IV, 65.
id. armoraciæ compositus, IV, 63.
id. aromaticus, I, 367.
id. de artemisia, id.
id. de artemisia compositus, id.
id. artemisiæ, id.
id. de arundine, I, 482.
id. atriplicis mexicanæ, IV, 263.
id. aurantii florum, III, 262.
id. aurantii florum citri, id.
id. aurantiorum cocticum, III, 265.
id. aurantiorum floribus, III, 362.
id. aurantiorum è succo, III, 261.
id. de aurantiis, id.
id. balsami peruviani, I, 417.
id. balsami tolutani, I, 421.
id. balsamicus, I, 417.
id. balsamicus peruviani, id.
Syrupus balsamicus Tolú, I, 421.
id. belladonæ, I, 447.
id. Belleti mercurialis, III, 214.
id. bellidis, I, 444.
id. de benzoe, I, 448.
id. de berberide, I, 136.
id. berberum, id.
id. betonicæ, I, 460.
id. betulæ albæ, I, 1.
id. borraginis, I, 468.
id. Boyleanus, II, 172.
id. de brassica rubra, I, 453.
id. bryoniæ, I, 471.
id. buglossi, I, 473.
id. Byzantinus, id.
id. Byzantinus Messues, I, 343.
id. capilli veneris, II, 186.
id. capillorum veneris, id.
id. capillorum veneris compositus, II, 187.
id. caprifolii, III, 47.
id. cardui benedicti, II, 31.
id. carthami solutivus, I, 142.
id. cariophylli rubri, II, 114.
id. cascarillæ, II, 38.
id. cassiæ sennæ, IV, 198.
id. centaurii minoris, II, 78.
id. cerasorum, II, 433.
id. cerasorum accidorum, id.
id. chalybeatus, II, 494.
id. chamomillæ, III, 90.
id. chenopodii, IV, 263.
id. chermesinus, III, 1.
id. chinæ, IV, 37.
id. chinæ compositus, II, 88.

Syrupus de cichorio, I, 12.
id. de cichorio compositus, IV, 134.
id. cicutæ, II, 91.
id. cinchonæ, IV, 37.
id. citrei è succo, II, 106.
id. citri corticum, II, 105.
id. citri totius, II, 104.
id. citricum corticum amarus, II, 166.
id. citricum corticum aquosus, id.
id. citricum corticum vinosus, II, 105.
id. citricum succi, II, 106.
id. citricum è toto, II, 104.
id. de cochlearia officinali, II, 143.
id. cochleariæ, id.
id. cochleariæ compositus, II, 143; IV, 63.
id. colchici, II, 155.
id. colchici aceticus, id.
id. communis, I, 395.
id. contrayervæ, II, 175.
id. contrayervæ compositus, II, 176.
id. copaivicus, I, 411.
id. corallii, I, 396.
id. corallii rubri, I, 408.
id. coralliorum, I, 508.
id. è corticibus lignisassafras, IV, 470.
id. corticis peruviani, IV, 37.
id. corticum citrei, II, 106.
id. crocei, I, 387.
id. de cucurbita Mesden, I, 479.
id. Cuisinieri, IV, 386.
id. de cydoniis, III, 108.
Syrupus corticis peruviani, IV, 37.
id. cydoniorum, III, 108.
id. diacodii, I, 111.
id. diacodion, id.
id. diacodium crocatum, I, 113.
id. diacodium liquidum Montani, I, 111.
id. dianthi caryophylli, II, 114.
id. de dictamno, II, 200.
id. domesticus, II, 277.
id. emeticus, I, 332.
id. emulsivus, I, 182.
id. enulæ, II, 230.
id. erysimi, II, 236.
id. de erysimo, id.
id. de erysimo compositus, id.
id. de erysimo Lobelii, id.
id. fragorum, II, 320.
id. de framboesiis, II, 318.
id. de fumaria, II, 323.
id. fumariæ, II, 324.
id. glyzyrrhizæ, IV, 80.
id. de granatis, II, 409.
id. granatorum, id.
id. guaiacinus, II, 424.
id. gummi acaciæ, II, 389.
id. hederæ terrestris, IV, 358.
id. hordeatus, I, 182.
id. hydrargyri, III, 113.
id. hyperici, II, 502.
id. hypnoticus, III, 314.
id. hyssopi, II, 508.
id. hyssopi cum scilla, id.
id. de hyssopi, id.
Syrupus ipecacuanhæ, II, 528.
id. de jalappa, II, 541.
id. jalappinus, id.
id. de jujubis, I, 393.
id. kali sulphurati, III, 464.
id. karabe, III, 316.
id. kermes granorum, III, 1.
id. kermesinus, id.
id. de kinkina, IV, 37.
id. lichenis islandici, III, 26.
id. limonis, II, 106.
id. limonum, id.
id. limonum, è succo, id.
id. liquiritiæ, IV, 80.
id. longæ vitæ, III, 110.
id. magistralis, II, 492.
id. de manna, III, 79.
id. de manna laxativus, III, 80.
id. manyanthe trifoliata, IV, 319.
id. mannæ, III, 79.
id. mannæ cum senna, III, 80.
id. marrubii, III, 97.
id. de marrubio, id.
id. mastichinus, I, 177.
id. de meconio, I, 111.
id. melissæ, IV, 273.
id. menthæ, IV, 361.
id. menthæ crispæ, id.
id. menthæ piperitæ, IV, 362.
id. de menyanthe, id.
id. mercurialis, III, 110.
id. misambryanthemi, crystallini, IV, 371.
id. de millefolio, III, 232.

Syrupus mineralis, I, 95.
id. mori nigræ, III, 246.
id. de moribus, id.
id. mororum, id.
id. muriaticus, I, 81.
id. de musco querno, III, 26.
id. myrtilli, III, 245.
id. myrtillorum, id.
id. de myrto, I, 355.
id. naphæ florum, III, 262.
id. de nasturtio, I, 458.
id. de nicotiana, IV, 145.
id. nucistæ, III, 256.
id. nimpheæ, III, 378.
id. cum æthere sulphurico paratus, II, 304.
id. opiatus, III, 314.
id. opii, id.
id. opii succinatus, III, 316.
id. de opio, III, 314.
id. ex oxydulo-hydrargyri Hannemani, III, 212.
id. pæoniæ, III, 376.
id. papaveris albi, I, 111.
id. papaveris de capitibus, id.
id. papaveris erratici, I, 213.
id. papaveris somniferi, I, 111.
id. paralyseos florum, III, 527.
id. pectoralis, IV, 344.
id. persicorum florum, I, 144.
id. ad pertussim, II, 172; IV, 33.
id. peucedani, III, 386.
id. plantaginis, III, 43.
id. plantaginis majoris, id.
id. de pomis compositus, IV, 199.
Syrupus pomorum helleboratus, II, 211.
id. pomorum redolentium succi, III, 94.
id. prassii albi, III, 97.
id. prophylacticus, III, 110
id. prunellæ, I, 470.
id. psychotriæ emeticæ, II, 528.
id. è pulmonibus vitulinis, II, 347.
id. quinque radicum aperientium, I, 342.
id. quinque radicibus, id.
id. raphani rusticani, IV, 65.
id. rhabarbaro, IV, 133.
id. rhamni, II, 277.
id. rhamni cathartici, id.
id. rhei, IV, 133.
id. rhei alcalisatus, IV, 138.
id. rhei aromaticus, IV, 134.
id. rhei palmati, IV, 133.
id. rhei cum senna, IV, 199.
id. de rheo, IV, 133, 134.
id. rhoeados, I, 213.
id rhoeadus, id.
id. ribenæ nigræ, II, 415.
id. de ribesiis, II, 414.
id. ribenorum, id.
id. ribis nigri, II, 415.
id. ribis rubri, II, 414.
id. ribium, id.
id. rosæ gallicæ, IV, 105.
id. rosarum pallidarum, id.
Syrupus rosarum rubrarum, IV, 105.
id. rosarum solutivarum, id.
id. rosarum solutivus cum senna, IV, 107.
id. rosatus simplex, IV, 105.
id. rosatus solutivus, id.
id. rosæ, id.
id. de rosis pallidis, id.
id. de rosis siccis, id.
id. rubri, I, 213.
id. rubi aretici, IV, 375.
id. rubi idæi, II, 318.
id. rubi idæi acetatus, I, 52.
id. sacchari, I, 395.
id. saccharum clarificatum, id.
id. sambuci, IV, 174.
id. de sarsaparrillæ compositus, IV, 386.
id. de sarsaparrillæ et senna compositus, id.
id. è corticibus ligni sassafras, IV, 170.
id. de scamonio, II, 243.
id. scelotyrbicus Foresti, I, 458.
id. de scilla, II, 250.
id. scillæ, id.
id. scilliticus, II, 250, 508.
id. scordii, II, 264.
id. de scordio, id.
id. sedativus, III, 314.
id. sedi majoris, IV, 223.
id. sempervivi, IV, 213.
id. senegæ, III, 452.
id. senegæ cum liquiritia, id.

Syrupus senegæ moschatus, III, 452.
id. sennæ, IV, 198.
id. sennæ compositus, IV, 199.
id. rosaceus, IV, 107.
id. simplex, I, 395.
id. smilacis sarsaparrillæ, IV, 386.
id. solutivus, IV, 199.
id. de spina cervina, II, 277.
id. spleneticus, I, 343.
id. de stœchade, II, 18.
id. de stœchade compositus, id.
id. succi, II, 106.
id. succi citri medicæ, id.
id. sudorificus, IV, 386.
id. sulphureticus, I, 256.
id. de sulphuro potassæ, III, 464.
id. sulphuris, id.
id. symphyti, II, 171.
id. è symphyto, id.
id. è symphyto Fernelii, id.
id. thebaicus, III, 314.
id. tunicæ, II, 114.
id. tunicæ florum, id.
id. tusilaginis, IV, 324.
id. de urtica, III, 362.
id. urticarum, id.
id. uvarum, IV, 346.
id. valerianæ radicis, IV, 329.
id. de veronica, IV, 344.
id. violæ odoratæ, IV, 350.
id. violarum, id.
id. violarum solutivus, id.
id. violarum petalorum, id.
id. zingiberis, II, 369.

T.

Tabaco, IV, 242.
id. macho, id.
id. de montaña, I, 350.
id. oficinal, IV, 242.
id. rustico, id.
Tabacum, id.
Tabellæ absorventes, III, 50.
id. alimentariæ, II, 353.
id. althææ, III, 64.
id. anisi compositi, IV, 77.
id. ad ardorem ventriculi, I, 498.
id. ad botium, II, 24.
id. de catechu terra, II, 60.
id. diacarthami, II, 241.
id. diarhodon, IV, 102.
id. diarhodon cum rhabarbaro, IV, 129.
id. diatragacanthi, II, 401.
id. glycyrrhizæ glabræ compositæ, IV, 76.
id. iridis florentinæ compositæ, III, 34.
id. magnesiæ, III, 50.
id. manus Christi, IV, 102.
id. de mercurio, III, 170.
id. de rheo, IV, 129.
id. rosatæ, IV, 102.
id. de semine santonico, IV, 217.
id. ad sodam, I, 498.
id. de tribus, III, 491.
id. contra vermes, IV, 217.
id. violatæ, IV, 349.
Tabullæ althææ, III, 64.
Tabullæ ferri compositæ, II, 452.
id. instaurantes, II, 445.
id. martiales, II, 452.
Tacamaca, IV, 248.
id. de la América septentrional, id.
id. comun, id.
id. de la isla de Borbon, id.
id. en suerte, id.
id. sublimado, id.
Tacamahaca, id.
id. communis, id.
id. in sortis, id.
id. sublimis, id.
id. in testa, id.
Tafetan de Inglaterra, II, 354.
id. epispastico de Guilbert, II, 3.
id. de resina de torvisco, III, 101.
id. vegigatorio, II, 3.
Tafio, I, 161.
Talco, III, 55.
Talcum venetæ, id.
Talictro, IV, 250.
Talon de liebre, I, 501.
Tallos de apio confitados, I, 342.
id. de angélica confitados, I, 273.
Talpa europea, I, 495.
Talpæ combustæ, I, 495; II, 22.
Talus leporum, I, 501.
Tamarindo, IV, 250.
Tamarindos, id.
Tamarindus indica, id.
Tamarisco, IV, 554.
id. de Alemania, id.
id. de Francia, id.
Tamariscus, id
Tamaris gallica, id.
id. germanica, id.
Tamo, id.
Tamus, IV, 255.
id. communis, IV, 254.
Tanaceto, IV, 255.

Tanacetum, IV, 255.
id. vulgare, id.
Tapioca, IV, 258.
Tapsia, id.
Taraxacon ó diente de leon, id.
Taraxacum, id.
id. dens leonis, id.
Tarmica, IV, 262.
Tártaro antimoniado, I, 324.
id. cristalizado, III, 506.
id. emético, I, 324.
id. estibiado, id.
id. soluble, III, 502.
id. soluble amoniacal, III, 514.
id. tartarizado, III, 502.
id. vitriolado, III, 476.
Tartarus acetosus, III, 494.
id. ammoniacalis, III, 514.
id. ammoniatus, id.
id. antimonialis, I, 324.
id. chalybeatus, II, 486.
id. chalybeatus solubilis, id.
id. crystallisatus, III, 506.
id. emeticus, I, 324.
id. martialis, II, 486.
id. martialis solubilis, id.
id. mercurialis, III, 227.
id. natronatus, III, 513.
id. solubilis, III, 502.
id. tartarisatus, id.
id. vitriolatus, III, 476.
id. potassæ et sodæ, III, 513.
id. potassæ sodicum, id.
id. potassæ stibiatum, I, 324.
Tartarus potassæ stibiosum, I, 324.
id. sodæ et kali, III, 513.
id. stibii, I, 324.
id. sub-potassicum, III, 506.
id. super-potassicum, id.
Tartras ammoniacæ pyroleoso-aquosum, I, 268.
id. kalicum ferricum, II, 486.
id. kalico natricum, III, 513.
id. kalinum, III, 502.
id. lixiviæ, id.
id. potassæ, III, 502.
id. potassæ acidulum, III, 506.
id. potassæ ferratum, II, 485.
id. potassæ et ferri, II, id.
id. potassæ et ferri liquidum, II, 489.
id. potassæ ferrosum, II, 486.
id. potassæ ferruginosum, id.
Tartrato de amoniaco, I, 268.
id. de mercurio, III, 227.
id. de mercurio y de potasa, id
id. de potasa, I, 324; III, 502.
id. de potasa acido, III, 506.
id. de potasa acídulo, id.
id. de potasa y de hierro, II, 486.
id. de potasa y de hierro líquido, II, 489.
id. de potasa neutro, III, 502.
id. de potasa y de sosa, III, 513.
Tartrato de potasio protoxidado, III, 502.
id. de potasio protoxidado y de sodio, III, 513.
id. de potasio protoxidado y de amoniaco, III, 514.
Te, IV, 262.
id. amargo, IV, 318.
id. bony, IV, 262.
id. de Europa, IV, 342.
id. hemastático, IV, 104.
id. de Hyswen, IV, 262.
id. de Mégico, id.
id. del Paraguay, IV, 264.
id. de Pekao, IV, 262.
id. perlado, id.
id. de salud, IV, 182.
id. de Saot-chaou, IV, 262.
id. Schuland, id.
Tela de Gaulthier, III, 434.
id. de mai, II, 86.
Tela emplastica epulotica, III, 431.
id. Gualthieri, III, 434.
id. ichthyocollæ glutinans, II, 354.
Telephium vulgare, IV, 213.
Terebinthina, IV, 279.
id. abiegna, id.
id. abietina, id.
id. argentoratensis, id.
id. chia, IV, 278.
id. cocta, IV, 308.
id. communis, IV, 279.
id. cypria, IV, 278.
id. empyreumatica, III, 386.
id. laricea, IV, 279.
id. laricina, id.
id. larigna, id.
id. pinea, id.
id. pinea silvestris, id.

Terebinthina pistacina, IV, 278.
id. veneta, IV, 279.
Terra absorbens mineralis, III, 48.
id. aluminis, I, 198.
id. amara, III, 48.
id. amara ærata, id.
id. amara sulphurica, III, 52.
id. argillacea pura, I, 198.
id. bolaris, id.
id. calcarata, I, 491.
id. calcarea pura, I, 485.
id. foliata mercurii, III, 224.
id. foliata mineralis, IV, 234.
id. foliata tartari, III, 494.
id. japonica, II, 58.
id. Lemnia, I, 198.
id. Lemniana, id.
id. ossium, I, 501.
id. ponderosa acetata, I, 429.
id. ponderosa ærata, I, 428.
id. ponderosa carbonica, id.
id. ponderosa muriata, I, 425.
id. ponderosa pura, I, 427.
id. ponderosa salita, I, 425.
id. sigillata, id.
id. talcosa oxianthracodes, III, 48.
id. tartari crystalizabilis, IV, 234.
id. viridis, II, 124.
id. vitrioli dulcis, II, 454.
id. vitriolica, III, 52.
Testa cochleæ, I, 492.
id. oborum, id.
Testæ ostrearum, I, 492.
Testes equi, II. 342.
Testículos de caballo, id.
Tetroxido de manganeso, III, 81.
Teucrio verdadero, I, 510.
Teucrium chamædrys, id.
id. chamæpitys, I, 511.
id. creticum, III, 449.
id. flavum, I, 510.
id. iva, I, 511.
id. marum, III, 95.
id. montanum, III, 449.
id. scordium, II, 263.
id. scorodonia, id.
Thalictrium flavum, IV, 250.
id. magnum, id.
Thapsia asclepium, IV, 258.
Theamara, IV, 318.
id. bohea, IV, 262.
id. viridis, id.
Theobroma cacao, I, 475.
Theriaca, III, 332.
id. cœlestis Hoffmanni, III, 352.
id. diatessaron, III, 240.
id. officinalis, id.
id. pauperum, id.
Thlaspi bursa pastoris, I, 466.
Thus, II, 513.
id. verum, id.
Thuya articulata, IV, 163.
id. occidentalis, I, 347.
Thymus alpinus, IV, 267.
id. creticus, IV, 268.
id. hortensis, IV, 267.
id. mastichina, id
id. serpyllum, IV, 209.
id. vulgaris, IV, 267.
Tierra animal, I, 501.
id. bolar, I, 198.
id. calcaria, I, 491.
id. dulce de vitriolo, id.
id. de huesos, I, 501.
Tierra foliada mercurial, III, 224.
id. foliada mineral, IV, 234.
id. foliada de nitro, III, 48.
id. foliada de tártaro, III, 494.
id. del Japon, II, 59.
id. magnesiana, III, 48.
id. merita, II, 187.
id. pesada, I, 427.
id. de sal de Epsom, III, 48.
id. sellada, I, 198.
id. de sombra, II, 453.
Tilia, IV, 264.
id. æuropæa, id.
Tilo, id.
id. de Europa, id.
id. de Holanda, id.
Timelea, III, 98.
Tinkal, IV, 227.
Tinctura absinthii, I, 127.
id. absinthii alcalina, I, 128.
id. absinthii composita, id.
id. acetatis ferri, II, 481.
id. acetatis zinci, IV, 408.
id. ácida aromatica, I, 535.
id. acidi sulphurici, id.
id. aconiti, I, 106.
id. aconiti ætherea, id.
id. alcalina, III, 459.
id. alcalina aeris, id.
id. alceæ, I, 161.
id. alcoholica chinæ composita, IV, 52.
id. alexipharmaca Huxhami, id.
id. aloes, I, 16, 17.
id. aloes ætherea, I, 33.
id. aloes alcoholica composita, I, 29.

Tinctura aloes aquosa, I, 17.
id. aloes composita, I, 29.
id. aloes crocata, id.
id. aloes cum myrrha, crocata, id.
id. aloetica alcalina, I, 31.
id. amara, I, 128; II, 364; IV, 322.
id. amara halensis, I, 130.
id. ambræ, I, 216.
id. ambræ ætherea, I, 217.
id. ambræ balsamica Dippelii, I. 216.
id. ambræ liquida, I, 217.
id. ambræ Mindereri, I, 216.
id. ambræ moschata ætherea, I, 217.
id. ammoniata asthmatica, id.
id. ammoniata aromatica, I, 227.
id. amomi repentis, II, 26.
id. amomi zingiberis, II, 370.
id. angelicæ, I, 279.
id. angusturæ, I, 284.
id. anodyna, III, 292.
id. antiarthritica, III, 472.
id. antimonii acris, III, 469.
id. antimonii alcalina, id.
id. antimonii balsamica, id.
id. antimonii nigra, id.
id. antimonii tartarisata, III, 459.
id. antisyphilitica Besnardi, III, 473.
id. aquilegiæ florum, I, 345.
id. arnicæ ætherea, I, 353.
id. aromatica, II, 65.
Tinctura aromatica sulphurica, I, 535.
id. arthritica, IV, 146.
id. asæ fœtidæ, I, 378.
id. asæ fœtidæ ætherea, id.
id. asæ fœtidæ kalica, id.
id. asæ fœtidæ ammoniata, I, 376.
id. asæ fœtidæ stibiata, I, 320.
id. asari, I, 382.
id. aurantii, III, 272.
id. aurantii dulcis, III, 273.
id. aurantiorum ætherea, III, 266.
id. aurantiorum pommorum immaturatorum, III, 373.
id. aurantiorum corticum Whytii, III, 272.
id. aurea, II, 474.
id. auri, III, 359.
id. balsami canadensis roborans, I, 409.
id. balsami copaivæ, I, 410.
id. balsami Peruvianni, I, 416.
id. balsami de la Mecca, I, 415.
id. balsamica, I, 422.
id. balsamica composita, I, 409.
id. belladonæ, I, 446.
id. bellidis florum, I, 444.
id. bellidis florum composita, III, 306.
id. benzoes, I, 449.
id. benzoinis, I, 448.
id. benzoinis composita, I, 449.
id. bezoardica, IV, 390.
id. bomplandiæ trifoliatæ, I, 284.
Tinctura botryos, IV, 263.
id. brucæ, I, 284.
id. burgundica, IV, 49.
id. calami composita, I, 483.
id. calami aromatici, id.
id. cambogiæ ammoniacata, II, 395.
id. cambogiæ ammoniata, id.
id. camphoræ composita, III, 305.
id. cantharidis vesicatoriæ, II, 4.
id. cantaridum, II, 4.
id. cantaridum ætherea, II, 8.
id. cantaridum camphorata alcoholica, II, 6.
id. cantaridum composita, id.
id. cantharidum opiata, II, 7.
id. capsies, III, 39.
id. capsies annui, III, 390.
id. capsies et cantharidum, id.
id. cardamomi, II, 26.
id. cardamomi composita, II, 27.
id. cardui benedicti, II, 31.
id. caryophyllatæ, II, 33.
id. caryophyllorum aromaticum, III, 45.
id. cascarillæ, II, 39.
id. cascarillæ aquosa, id.
id. cassiæ ligneæ, IV, 5.
id. castorei, II, 52.
id. castorei ætherea, II, 53.
id. castorei composita, id.

Tinctura castorei kalina, II, 53.
id. castorei Thebaica, id.
id. catechu, II, 65.
id. catechu aromatica, id.
id. catechu composita, id.
id. catechu terræ, II, 65.
id. centaurii minoris, II, 78.
id. chamæmeli, III, 89.
id. chamomillæ, id.
id. chenopodii ambrosioides, IV, 263.
id. chenopodii ætherea, id.
id. chinæ amara, IV, 53.
id. chinæ composita, id.
id. chinæ gingivalis, IV, 55.
id. cicutæ, II, 94.
id. cicutæ ætherea, id.
id. cinchonæ, IV, 50, 51.
id. cinchonæ ætherea composita, IV, 54.
id. cinchonæ martiata, II, 484.
id. cinamomi, I, 331.
id. cinamomi composita, I, 532.
id. cinamomi phosphorico-acida, I, 66.
id. coccionellæ, II, 149.
id. coccionellæ septempunctatæ, IV, 325.
id. cochleariæ, II, 144.
id. colchini autumnalis, II, 153.
id. colchici seminum vinosa Williams, II, 154.
Tinctura colocynthidis, II, 165.
id. colocynthidis anisata, id.
id. colocynthidis stibiata, id.
id. colombæ, II, 158.
id. è colombo, id.
id. coni maculati composita, II, 94.
id. contrayervæ, II, 176.
id. convolvuli jalappe, II, 542.
id. coralliorum, I, 507.
id. corticis Peruviani, IV, 50.
id. corticis Peruviani kalina, IV, 51.
id. corticis Peruviani composita, IV, 53.
id. corticis quercus, II, 217.
id. corticum Winteranorum, II, 181.
id. cosmetica, I, 449.
id. croci, I, 388.
id. culilabani, II, 187.
id. cupri sulphurici, II, 127.
id. curcumæ, II, 188.
id. Daffyi, IV, 196.
id. Dahlbergi, II, 165.
id. delphinii, II, 199.
id. digitalis, II, 196.
id. digitalis æthereæ, II, 198.
id. digitalis æthereæ aquosa, II, 197.
id. digitalis composita, II, 195.
id. digitalis purpureæ, II, 196.
id. diuretica, IV, 322.
id. elastica, II, 457.
id. euphorbii, II, 308.
id. eterea camphorata, I, 152.
id. eterea Chittonii, I, 280.
id. ferrata, II, 491.
Tinctura ferrata ætherea, II, 474.
id. ferrata acetici ætherea, II, 482.
id. ætherea, II, 474.
id. ferrata ammoniati, II, 480.
id. ferrata aurantiaca, II, 486.
id. ferrata muriatis, II, 473.
id. ferrata muriatici, id.
id. ferrata tartarisata, II, 489.
id. florum salis ammoniaci martiata, I, 480.
id. florum pyro-oleosa, III, 308.
id. formicarum composita, II, 511.
id. formicarum fœtida, I, 378.
id. galangæ, II, 325.
id. galbani, II, 327.
id gallarum, I, 117.
id. gei urbani, II, 33.
id. gentianæ, II, 364.
id. gentianæ composita, id.
id. gentianæ rubræ, id.
id. gingivalis, II, 65.
id. gingivalis balsamica, id.
id. guaiaci, II, 423.
id. guaiaci ætherea, II, 421.
id. guaiaci ammoniacata, II, 423.
id. guaiaci ammoniata, id.
id. guaiaci fœniculata, id.
id. guaiaci officinalis, II, 421.
id. guaiaci gummi, II, 422.
id. guaiaci ligni, id.
id. guaiaci volatilis, II, 423.
id. gummi ammoniaci, II, 377.

Tinctura gummi lacæ aquosa, II, 396.
id. hematitis, II, 480.
id. Haffieldi, II, 424.
id. heleuii, II, 233.
id. hellebori albi, II, 212.
id. hellebori composita, id.
id. hellebori nigræ, id.
id. Hyærnæi contra tæniam, I, 21.
id. humili, III, 41.
id. hydragoga, II, 213.
id. hyoscyamii, I, 436.
id. hyoscyamii ætherea, id.
id. hyperici, II, 503.
id. hyperici vulneraria alcoholica, id.
id. hypnotica, III, 301.
id. iodii, II, 515.
id. iodii ætherea, id.
id. ipecacuanhæ opiata, I, 262.
id. jalappæ, II, 542.
id. jalappæ composita, II, 543.
id. jalappæ confortans, II, 542.
id. jalappæ resinæ, id.
id. japonica, II, 65.
id. kalina, III, 459.
id. laccæ aquosa, II, 396.
id. laccæ kalica, II, 397.
id. laudanum, III, 292.
id. laxativa, I, 17.
id. ligni aloes, III, 366.
id. lignorum, I, 3.
id. lobeliæ inflata, III, 39.
id. longæ vitæ, I, 40.
id. lupuli, III, 41.
id. lyltæ vexicatoriæ, II, 48.
id. macidis, III, 256.
id. malatis ferri, II, 484.
id. mari veri ætherea, III, 95.
Tinctura martis. II, 484.
id. martis adstringens, II, 473.
id. martis aperiens, II, 489.
id. martis aperitiva, II, 490.
id. martis aperitiva Zwelferi, II, 481.
id. martis aurea, II, 473.
id. martis cydoniata, II, 484.
id. martis dulcis, II, 473.
id. martis helleborata, II, 492.
id. martis pomata, II, 484.
id. martis saliti, II, 473.
id. martis cum spiritus salis, id.
id. martis cum succu cydoniorum, II, 484.
id. martis cum succu pomorum, id.
id. martis tartarisata, II, 489.
id. mastiches, I, 177.
id. matris perlarum, I, 507.
id. melampodii, II, 212.
id. melissæ, IV, 273.
id. menthæ crispæ, IV, 363.
id. menthæ piperitæ, id.
id. viridis, id.
id. menyanthis, IV, 321.
id. metallorum, III, 459.
id. millefolii, III, 233.
id. millepedum, III, 236.
id. moschata, I, 196.
id. moschi, id.
id. moschi ætherea, id.
id. moschi vinosa, I, 195.
Tinctura de muriate ferri ætherea alcoholica, II, 474.
id. muriatis ferri, II, 473.
id. muriatis ferri cum oxido rubro, id.
id. myrrhæ alcalisata, III, 244.
id. myrrhæ alcoholica, III, 242.
id. nervina Bestucheffii, II, 474.
id. nervina halensis, id.
id. nervino-tonica martialis, id.
id. nervino-tonica Lamotte, id.
id. nucis vomicæ, III, 285.
id. oculorum cancrorum, I, 507.
id. opii, III, 297.
id. opii alcoholica, III, 302.
id. opii alcoholica ammoniacalis, III, 303.
id. opii alcoholica ammoniata, III, 306.
id. opii alcoholica benzoica, III, 305.
id. opii alcoholica camphorata, id.
id. opii alcoholica crocata, III, 292.
id. opii alcoholica Ezcardi, III, 302.
id. opii alcoholica simplex, III, 290, 297, 301.
id. opii alcoholica spirituosa, III, 297.
id. opii alcoholica thebaica genuina, III, 290.
id. opii alcoholica vinosa, id.
id. opii alcoholica anticólica, III, 202.
id. oreoselini, III, 357.

Tinctura papaveris florum rhoeadis, I, 214.
id. phellandrii aquatici, II, 94.
id. pimentæ sulphurica, III, 391.
id. pimpinellæ albæ, III, 395.
id. pimpinellæ albæ kalica, id.
id. pimpinellæ composita, III, 388.
id. pini, I, 3.
id. pini composita, id.
id. populi, I, 141.
id. populi oculorum, id.
id. propietatis Mynsichti, I, 289.
id. quassiæ alcoholica, IV, 5.
id. quassiæ vinosa, id.
id. ratanhiæ, IV, 70.
id. ratanhiæ composita, id.
id. regia, I, 216, 528.
id. resinæ, II, 422.
id. rhabarbari, IV, 136, 142.
id. rhabarbari composita, IV, 142.
id. rhabarbari vinosa, IV, 139.
id. rhei, IV, 136, 139.
id. rhei et aloes, I, 40.
id. rhei amara, IV, 142.
id. rhei aquosa salina, IV, 137.
id. rhei composita, IV, 142.
id. rhei Darelli, IV, 141.
id. rhei dulcis, id.
id. rhei et gentianæ, II, 142.
id. rhei spirituosa, id.
id. rhei spirituosa dulcis, id.
id. rhododendri chrysanti, IV. 86.
id. rhois radicantis, IV, 410.
Tinctura roborans, I, 532; II, 365; IV, 52.
id. sabinæ, IV, 146.
id. sabinæ kalina, id.
id. sacra, I, 40.
id. salinæ composita, III, 460.
id. salina tartari, III, 459.
id. sanguinaria Canadensis, IV, 165.
id. sanguinis draconis, IV, 164.
id. saponis, II, 65.
id. saponis camphorata, I, 234.
id. ligni sassafras, IV, 170.
id. saturnino martialis, III, 426.
id. scammonii, II, 242.
id. scillæ, II, 255.
id. scillæ kalina, II, 256.
id. scillæ maritima, II, 255.
id. scordii, II, 264.
id. sedativa, III, 297, 301.
id. sedativa camphorata, III, 305.
id. senegæ, III, 451.
id. sennæ, IV, 193.
id. sennæ amara, IV, 195.
id. sennæ aromatica, IV, 193.
id. sennæ composita, id.
id. serpentariæ virginianæ, I, 350.
id. stibiata, III, 307.
id. stibii alcalisata, III, 459.
id. stomachica, II, 494.
id. stomachica acuta Erustingii, III, 491.
id. stomachica lipsiensis, I, 227.
Tinctura stomachica martialis, II, 494.
id. stramonii, II, 292.
id. stramonii ætherea, id.
id. strychninæ, II, 293.
id. strychnos, III, 285.
id. succini ætherea, IV, 236.
id. succini alcalisata, IV, 237.
id. succini alcoholica, id.
id. succini balsamica, IV, 236.
id. sulphuris, I, 402.
id. tanaceti, IV, 257.
id. tartari, III, 459.
id. tartari composita, II, 427.
id. tartarisata Glauberi, II, 490.
id. tartarisata Ludovici, id.
id. tartratis potassæ ferrici, II, 489.
id. terebinthinæ, IV, 280.
id. thebaica, III, 297, 301.
id. theriacalis, I, 275; III, 345.
id. tomifera balsami, I, 422.
id. tolutana, id.
id. tolutana ætherea, I, 423.
id. tonica martialis lutea, II, 473.
id. tonico nervina halensis, II, 474.
id. tormentillæ, IV, 270.
id. trifolii fibrini, IV, 321.
id. valerianæ, IV, 332.
id. valerianæ ætherea, IV, 335.
id. valerianæ ammoniata, IV, 334.
id. valerianæ camphorata, IV, 335.

Tinctura valerianæ composita, IV, 332.
id. valerianæ volatilis, IV, 334.
id. vanigliæ, IV, 338.
id. veratri, II, 212.
id. veratri viridis, II, 213.
id. vincetoxici, IV, 340.
id. volatilis anodyna, III, 303.
id. zedoariæ, IV, 389.
id. zedoariæ composita, id.
id. zingiberis, II, 370.
Tintura de abeto, I, 3.
id. de abeto compuesta, id.
id. de acetato de hierro alcohólica, II, 481.
id. de acetato de hierro etérea, II, 482.
id. de acetato de zinc, IV, 408.
id. de acibar, I, 16.
id. de acibar compuesta, I, 29.
id. de acibar y de mirra, I, 28.
id. de acibar y de mirra azafranada, I, 29.
id. de acibar y de regaliz, I, 17.
id. de acibar con ruibarbo, I, 40.
id. de acónito alcohólica, I, 106.
id. de acónito etérea, id.
id. de agallas, I, 117.
id. de agenjos, I, 127.
id. de agenjos alcalina, I, 128.
id. de agenjos compuesta, id.
id. de álamo negro, I, 141.
id. de alcea, I, 161.
id. alcohólica de quina compuesta, IV, 52.
Tintura alexifarmaca de Huxham, id.
id. de almáciga, I, 177.
id. de almáciga compuesta, I, 178.
id. de almizcle, I, 196.
id. de almizcle etérea, id.
id. de almizcle vinosa, I, 195.
id. de amapolas, I, 214.
id. amarga, I, 130; II, 364; IV, 322.
id. de ambar gris alcalina, I, 216.
id. de ambar gris alcohólica, id.
id. de ambar gris balsámica, I, 217.
id. de ambar gris de Dippel, I, 216.
id. de ambar gris etérea, I, 217.
id. de angélica, I, 279.
id. de angélica amoniacal, I, 276.
id. de angostura, I, 284.
id. anodina, IV, 335.
id. anodina amoniacal, III, 303.
id. antiartrítica, III, 472.
id. antiepiléptica, III, 37.
id. antiespasmódica, I, 379; IV, 336.
id. antiespasmódica alcanforada, III, 303.
id. antiespasmódica de Chrestien, III, 298, 303.
id. antiespasmódica y emenagoga, I, 28.
id. antiespasmódica de Kemp, IV, 335.
id. antiespasmódica y tónica, IV, 333.
Tintura antiespasmódica de Damus, III, 303.
id. antigonorráica, III, 489.
id. antihistérica, II, 55.
id. antireumática, II, 292.
id. antiséptica de Huxham, IV, 52.
id. antisifilítica, III, 192.
id. antisifilítica de Besnard, III, 473.
id. antisifilítica de Talbot, id.
id. antitísica de Gramann, II, 485; III, 478.
id. antivenérea de Falk, III, 197.
id. aperitiva, I, 82.
id. aperitiva de Zwelfer, II, 481.
id. de aquilegia, I, 145.
id. de arnica etérea, I, 353.
id. de arnica alcohólica, I, 352.
id. aromática, II, 65.
id. aromática acida, I, 535.
id. aromática amoniacal, I, 227.
id. aromática con ácido sulfúrico, I, 534.
id. de asa fétida alcalina, I, 378.
id. de asa fétida alcohólica, id.
id. de asa fétida amoniacal, I, 376.
id. de asa fétida antimonial, I, 320.
id. de asa fétida etérea, I, 378.
id. de asaro, I, 382.
id. astringente, I, 66; III, 426; IV, 66.
id. de azafran, I, 388.
id. de azufre, I, 402.
id. azul, II, 140.
id. balsámica, I, 422.

Tintura balsámica compuesta, I, 409, 411, 449.
id. de bálsamo del Canadá, I, 409.
id. de bálsamo alcalina, I, 410.
id. de bálsamo alcohólica, id.
id. de bálsamo de la Meca, I, 415.
id. de bálsamo del Perú, I, 416.
id. de bálsamo de Tolú alcohólica, I, 422.
id. de bálsamo de Tolú etérea, I, 423.
id. de beleño alcohólica, I, 436.
id. de beleño etérea, id.
id. de belis, I, 444.
id. de belladona, I, 446.
id. de benjuí alcoholica, I, 448.
id. compuesta, I, 449.
id. de Bettuche oficinal, II, 474.
id. bezoardica, IV, 390.
id. bezoardica de Ludwig, I, 280.
id. Burgundica, IV, 49.
id. de cálamo aromático, I, 483.
id. de cálamo compuesta, id.
id. de calanga, II, 325.
id. de canela, I, 531.
id. de canela compuesta, I, 532.
id. de canela eterea, I, 534.
id. de cantáridas, II, 4.
id. de cantáridas alcanforada, II, 6, 8.
id. de cantáridas etérea, II, 8.
Tintura de cantáridas etérea alcanforada, II, 8.
id. de cantáridas eterea compuesta, II, 9.
id. de cantáridas opiada, II, 7.
id. de carburo de azufre iodurado, II, 515.
id. de cardamomo, II, 26.
id. de cardamomo compuesta, II, 27,
id. de cardo santo, II, 31.
id. de cariofilata, II, 33.
id. de cascarilla, II, 39.
id. de cascarilla alcalina y alcohólica, id.
id. de cascarilla alcalina y acuosa, id.
id. de castoreo, II, 52.
id. de castoreo alcalina, II, 53.
id. de castoreo compuesta, id.
id. de castoreo eterea, II, 57.
id. de castoreo opiada, II, 53.
id. de catecu, II, 65.
id. de catecu aromática, id.
id. de catecu compuesta, II, 65.
id. de cicuta eterea, II, 94.
id. de cicuta alcohólica, id.
id. de cicuta acuática, id.
id. de cicuta acuática compuesta, id.
id. de centaura menor, II, 78.
id. de cinconina, II, 110.
Tintura de clavo de especia, III, 45.
id. de cobre, II, 129.
id. de cochinilla, II, 149.
id. de cloclearia, II, 144.
id. de bulbo de colchico, II, 153.
id. de colombo, II, 158.
id. de colombo anisada, II, 165.
id. de colombo estibiada, id.
id. de contrayerba, II, 176.
id. de coral, I, 507.
id. de corteza de encina, II, 217.
id. de corteza de nueces verdes, III, 281.
id. de corteza de naranja, III, 272.
id. de corteza de Winter, II, 181.
id. cosmética, I, 449.
id. de culilaban, II, 187.
id. de curcuma, II, 188.
id. de Daffy, IV, 196.
id. de Dahlberg, II, 165.
id. de Darel, IV, 141.
id. depurante balsamica, III, 197.
id. de delfinio, II, 199.
id. diaforetica, II, 176.
id. de dictamo blanco, II, 200.
id. digestiva, II, 366.
id. de digital, II, 196.
id. de digital compuesta, II, 195.
id. de digital eterea, II, 198.
id. de digital de Clitner, II, 197.
id. de digital de Fowler, II, 194.

Tintura de digital de Harles, II, 197.
id. de digital de Maclean, II, 196.
id. de digital de Plance, id.
id. de digital de Remer, II, 195.
id. de digital de Trommsdorf, II, 197.
id. diuretica, II, 198; IV, 322.
id. dorada, II, 166.
id. de Heccard, III, 302.
id. elástica, II, 457.
id. de eléboro blanco, II, 212.
id. de eléboro compuesta, II, 213.
id. de eléboro negro, II, 212.
id. de eléboro negro vinosa, II, 211.
id. de eléboro verde, II, 213.
id. para las encías, IV, 55.
id. de énula, II, 233.
id. de escamonea, II, 242.
id. de escila, II, 255.
id. de escila alcalina, II, 256.
id. de escila aromática, II, 255.
id. de escila compuesta, id.
id. escitante, II, 6.
id. de escordio, II, 264.
id. estibiada, III, 307.
id. estomacal, I, 227; III, 274, 390.
id. estomacal aromática, I, 534.
id. estomacal de Ernstinge, III, 391.
id. estomacal de Lentin, I, 484.
id. estomacal marcial, II, 492.
Tintura estomacal de Whytt, II, 354.
id. de estracto de opio, III, 297.
id. de estramonio alcóholica, II, 292.
id. de estramonio etérea, id.
id. de estramonio vinosa, id.
id. de estricnina, II, 293.
id. etérea alcanforada, I, 152.
id. de euforbio, II, 308.
id. febrífuga, I, 364.
id. febrífuga de Clutton, I, 280.
id. febrífuga de Mutis, IV, 53.
id. de fécula de beleño, I, 434.
id. de Felandrio, II, 312.
id. fétida, I, 376, 379.
id. de hollin, I, 378.
id. fisagoga, III, 266.
id. ferruginosa, II, 491.
id fortificante, I, 532; II, 365; IV, 52.
id. de gálbano, II, 327.
id. de gálbano compuesta, id.
id. de genciana, II, 364.
id. de genciana alcalina, II, 366.
id. de genciana compuesta, II, 364.
id. de genciana compuesta alcalina, II, 366
id. de gencianina, II, 367.
id. de gencianina alcalina, II, 368.
Tintura de gengibre, II, 370.
id. de geofrea, II, 373.
id. gingival balsámica, II, 65.
id. de Glaubero, II, 490.
id. de goma amoniaco, II, 377.
id. de goma amoniaco alcalina, id.
id. de goma guta, II, 395.
id. de goma guta alcalina, id.
id. de goma guta amoniacal, id.
id. de goma guta acuosa, id.
id. de guayaco amoniacal, II, 473.
id. de guayaco eterea, II, 421.
id. de guayaco con hinojo, II, 423.
id. de guayaco volátil, id.
id. hemastática, IV, 32.
id. hidragoga, II, 213, 224.
id. de hierro amoniacal, II, 480.
id. de hierro eterea, II, 474.
id. de hierro y de naranja, II, 486.
id. de hipericon, II, 503.
id. de hipericon alcohólica compuesta, id.
id. de hipericon vinosa compuesta, II, 502.
id. de hormigas compuesta, II, 511.
id. de iodo, II, 515.
id. de iodo eterea, id.
id. iodada de alcohol de azufre, id.

Tintura de ipecacuana, II, 527.
id. de ipecacuana anisada, II, 528.
id. jabonosa, II, 65.
id. de jalapa, II, 542.
id. de jalapa compuesta, II, 543.
id. de kermes animal, III, 1.
id. acuosa de laca, II, 396.
id. alcohólica de laca, id.
id. alcohólica compuesta de laca, II, 397.
id. alcalina de laca, id.
id. aluminosa de laca, id.
id. de leño de aloes, III, 366.
id. de leño de guayaco, II, 421.
id. de leño de sasafras, IV, 170.
id. de lobelia, III, 39.
id. de Ludwig, II, 490.
id. de lupulina, III, 41.
id. de lúpulo, id.
id. de macias, III, 256.
id. de malato de hierro, II, 484.
id. de manzanilla, III, 89.
id. marcial alcalina de Stahl, II, 457.
id. de maro eterea, III, 95.
id. de marte aperitiva, II, 490.
id. de marte astringente, II, 473.
id. de marte con eleboro, II, 492.
id. tartarizada, II, 489.
id. de menta rizada, IV, 363.
Tintura de menta piperita, IV, 363.
id. de menta verde, id.
id. de mil pies, III, 236.
id. de mil en rama, III, 233.
id. de mirra, III, 242.
id. de mirra alcalizada, III, 244.
id. de mirra fosfórica, I, 67.
id. de muriato de hierro, II, 473.
id. de muriato de hierro eterea alcoholica, II, 474.
id. de naranjas verdes, III, 273.
id. nervina y tónica, II, 474; IV, 333.
id. de nuez vómica, III, 285.
id. oftálmica, I, 337.
id. de opio, III, 297.
id. de opio simple, III, 301.
id. de opio acetosa, III, 289.
id. de opio amoniacal, III, 306.
id. de opio alcoholica, III, 297.
id. de opio amoniacal y alcanforada, III, 303.
id. de opio amoniacal alcoholica, III, 301.
id. de opio y de benzoate de amoniaco, III, 306.
id. de opio espirituosa, III, 297.
id. de opio vinosa, III, 290.
id. de opio vinosa aromática, III, 291.
id. de opio vinosa azafranada, id.
Tintura de opio alcoholica compuesta, III, 302.
id. de opio alcoholica azafranada, III, 303.
id. de opio alcoholica y de ácido benzoico alcanforada, III, 305, 359.
id. de oreoselino, III, 357.
id. de pelitre eterea, III, 373.
id. de pimienta de Cayena y de cantáridas, III, 390.
id. de pimienta de la Jamaica eterea, III, 391.
id. de pimienta negra, III, 390.
id. de pimienta de Guinea, id.
id. de pimpinela blanca, III, 395.
id. de pimpinela alcalina, id.
id. de pimpinela compuesta, III, 396.
id. de propiedad de Mynsicht, I, 289.
id. purgante, II, 543.
id. de quasia alcoholica, IV, 5.
id. de quasia vinosa, id.
id. de quina amarga, IV, 53.
id. de quina amarilla, IV, 51.
id. de quina amoniacal, id.
id. de quina eterea compuesta, IV, 54
id. de quina gris, IV, 50.
id. de quina marcial, II, 484.
id. de quina potasada, IV, 51.

Tintura de quina roja, IV, 51.
id. de quina de Whytt, IV, 53.
id. de rábanos compuesta, IV, 61.
id. de ratania, IV, 70
id. de ratania acetosa, IV, 69.
id. de ratania acuosa, id.
id. de ratania compuesta, IV, 70.
id. real, I, 216, 528.
id. de resina de añil, I, 340.
id. de resina de guayaco, II, 422.
id. de resina de jalapa, II, 542.
id. resino-jabonosa, II, 424.
id. de rododendro de flores blancas, IV, 86.
id. de rosas, IV, 109.
id. de rosas acida, IV, 111.
id. rubefaciente, II, 4.
id. rubefaciente compuesta, II, 6.
id. de ruibarbo alcoholica, IV, 141.
id. de ruibarbo alcoholica aromática, IV, 142.
id. de ruibarbo alcoholica compuesta, id.
id. de ruibarbo acuosa alcalina, IV, 136.
id. de sabina, IV, 146.
id. de sabina alcalina, id.
id. sagrada, I, 40.
id. de sal de tártaro fosforada, II, 316.
id. salina, III, 460.
id. de sangre de drago, IV, 164.
Tintura de sanguinaria del Canadá, IV, 165.
id. de sasafras compuesta, IV, 170.
id. sedante, III, 297, 301, 302.
id. de sen, IV, 193.
id. senega, III, 451.
id. de simiente de beleño, I, 436.
id. de sen, IV, 193.
id. de sen amarga, IV, 195.
id. de sen aromática, IV, 193.
id. de sen compuesta, id.
id. simiente de colchico de Williams, II, 154.
id. de serpentaria de Virginia, I, 350.
id. de succino alcalizada, IV, 237.
id. de succino alcoholica, id.
id. de succino eterea, IV, 236.
id. de sulfato de cobre, II, 127.
id. de sulfuro-prusuro de hierro, II, 497.
id. de tabaco, IV, 246.
id. de tanaceto, IV, 257.
id. de tártaro compuesta, II, 427.
id. de te de España alcóholica, IV, 263.
id. de te de Mégico eterea, id.
id. Tebaica, III, 301.
id. Tebaica de Bamberg, III, 302.
id. contra la tenia, I, 21.
id. teriacal, I, 275; III, 345.
Tintura tónica, IV, 33, 52.
id. tónica y calmante, id.
id. tónica de Whytt, IV, 53.
id. tónico nervina, II, 474.
id. de tormentila, IV, 270.
id. de torongil, IV, 273.
id. de trementina, IV, 280.
id. de tridacio, id.
id. de trifolio acuático, IV, 321.
id. de vaca de san Anton, IV, 325.
id. de vainilla, IV, 338.
id. de valeriana, IV, 332.
id. de valeriana alcanforada, IV, 333.
id. de valeriana amoniacal, IV, 334.
id. de valeriana amoniacal compuesta, id.
id. de valeriana compuesta, IV, 333.
id. de valeriana eterea, IV, 335.
id. de vencetósigo, IV, 340.
id. de veratrina, IV, 341.
id. vermífuga, III, 308.
id. vulneraria de Sthal, IV, 295.
id. de zedoaria, IV, 389.
id. de zedoaria compuesta, id.
id. de zumaque venenoso, IV, 410.
Tiphera magna, III, 347.
Tisana de achicorias, I, 11.
id. ácida, II, 104.
id. alcalina de Mascagni, III, 469.

Tisana alcanforada, I, 151.
id. antiescorbútica, II, 147; IV, 60.
id. antiescrofulosa, IV, 39, 118.
id. antifebril acídula, I, 97.
id. antihisterica, IV, 119.
id. antilactea, III, 383.
id. antivenérea, IV, 384.
id. antivenérea purgante, IV, 382.
id. aperitiva, III, 497.
id. árabe, IV, 398.
id. astringente, I, 96; II, 64, 171, 388, 409.
id. de Bourquenot, III, 192.
id. de Callac, IV, 384.
id. de cerezas, II, 433.
id. de cidra compuesta, II, 104.
id. comun, II, 67.
id. de cremor tártaro, III, 510.
id. depurativa, II, 205.
id. depurativa de Vigarous, IV, 380.
id. diurética, II, 225; III, 471, 498; IV, 144, 490.
id. dulcificante, III, 67, 375.
id. emulsionada, I, 182.
id. emulsionada alcanforada, III, 488.
id. de énula, II, 230.
id. estomacal fundente, III, 486.
id. febrífuga, I, 478.
id. febrífuga y laxante, III, 510.
id. de Feltz, IV, 380.
id. de frutos pectorales, II, 498.
Tisana fundente y diurética, III, 490, 498.
id. hemastática, III, 233.
id imperial, III, 510.
id. de Jausserand, IV, 383.
id. laxante, IV, 253.
id. laxativa, III, 78.
id. de Lisboa, IV, 383.
id. contra el mal de piedra, IV, 225.
id. de Milman, III, 510.
id. nitrada, III, 484.
id. oxigenada, III, 493.
id. pectoral, III, 16, 58, 67.
id. purgante, IV, 253.
id. real, id.
id. refrigerante y diurética, III, 490.
id. sudorífica, I, 424; II, 425; IV, 379.
id. sudorífica de Astruc, IV, 383.
id. sudorífica escitante, I, 380.
id. sudorífica y nutritiva, II, 427.
id. sudorífica y purgante, IV, 384.
id. sulfúrico salina, III, 480.
id. contra la tiña, II, 428.
id. tónica y antiherpética, IV, 119.
id. vermífuga, II, 178, 437.
id. de Vinache, IV, 382.
id. vinosa, III, 486.
id. vulneraria, I, 352.
id. vulneraria de Ivo Gaukes, II, 428.
Telisualo, II, 307.
Tizon, IV, 265.
Tithymalum latifolium, id.
Tithymalus cyparisias, II, 307.
Tlaspeos, IV, 266.
Tlaspi, id.
id. arvense, id.
Tlaspios, id.
id. campestre, id.
Toba, id.
Tomatera, IV, 267.
Tomillo, id.
id. de los Alpes, id.
id. comun, id.
Topacio, I, 201.
Topico antiespasmódico, II, 48.
id. antiespasmódico y tónico, III, 346.
id. aurífico, III, 358.
id. calmante, III, 290.
id. detersivo, III, 119.
id. purgante, II, 160.
id. resolutivo, I, 470.
id. vermífugo, II, 160.
Tordyllium, IV, 212.
id. officinale, id.
Tormentila, I, 268.
id. deshecha, id.
id. oficinal, id.
Tormentilla erecta, id.
id. sylvestris, id.
Tornasol, IV, 271.
id. en panes, id.
id. en piedra, id.
id. en trapos, id.
Tornasolis cœrulea, id.
Torongil, id.
id. cidrado, IV, 272.
id. de limon, id.
id. de Moldavia, id.
Tragacanto de semine santonico, IV, 317.
Tragea ophtalmica, I, 285; II, 310.
id. granorum actes, IV, 174.
Tragoselini, III, 395.
id. majoris, id.
Trebol acuático, IV, 318.
id. fibrino, id.
Tremella auricula Judæ, III, 357.
Trementina, IV, 278.
id. de abeto, IV, 279.
id. de Brianzon, id.

Trementina de Burdeos, IV, 278.
id. del Canadá, I, 401.
id. de Chipre, IV, 278.
id. cocida, IV, 308.
id. de copaiba, I, 409.
id. de Gilea, I, 415.
id. de Hungría, IV, 278.
id. de Larice, IV, 279.
id. de pino, IV, 278.
id. de Scio, id.
id. de Strasburgo, id.
id. de Venecia, id.
Triaca de Andromaco, III, 332.
id. celeste, III, 352.
id. oficinal, II, 229.
id. de pobres, III, 240.
Trichecus manatus, I, 461.
Tridacio, IV, 317.
Trifolio acuático, IV, 318.
id. pratense, IV, 322.
Trifolium acetosum, id.
id. antiescorbutum, IV, 318.
id. aquaticum, id.
id. fibrinum, id.
id. paludosum, id.
id. palustre, id.
id. pratense. IV, 322.
Trigonella fœsum græcum, I, 173.
Triosteum perfoliatum, id.
Tripoli, id.
Tripolitiana terra, id.
Triticum fraginum, III, 454.
id. repens, II, 405.
Trito-acetato de hierro, II, 480.
Trito-hidroclorato de hierro, II, 472.
Trito-hidrocianato ferruro de hierro, II, 496.
Trito-hidri-ferro-cianato de hierro, id.
Trito-nitrato de hierro, II, 470.
Trito-fosfato de hierro, II, 463.
Tritóxido de antimonio, I, 302.
id. de hierro, II, 453.
id. de plomo, III, 405.
Trociscos de acetato de mercurio, III, 226.
id. de agarico, I, 18.
id. de alhandal, II, 159.
id. de alkekengi, I, 175.
id. de alkermes, III, 63.
id. de alkermes y de goma, I, 189.
id. de ambar, I, 215.
id. antelmínticos, II, 466, 533; III, 184.
id. antelmínticos de Ching, III, 164.
id. de antimonio, I, 305.
id. béquicos blancos, I, 189; II, 387; IV, 76.
id. béquicos amarillos, II, 387.
id. béquicos negros, IV, 77.
id. béquicos opiados, III, 320; IV, 78.
id. blancos de Rasis, III, 406.
id. de carbonato de cal, I, 498.
id. de Chaussier, III, 324.
id. de cremor tártaro, III, 509.
id. cyfeos, IV, 293.
id. escaróticos, III, 195, 200.
id. de escila, II, 244.
id. de Gordon, II, 387.
id. de hierro citronado, II, 486.
id. de hedicroi, I, 480.
Trociscos de ipecacuana, II, 522.
id. de maná, III, 76.
id. masticatorios, I, 176.
id. de mercurio sacarinos, III, 116.
id. mercuriales, III, 211.
id. moscados, I, 193.
id. de mirra, I, 373.
id. de nitro, III, 484.
id. odoríferos, I, 215.
id. pectorales, I, 400.
id. refrigerantes, III, 492.
id. de regaliz, IV, 77.
id. de regaliz y de goma, id.
id. de succino, III, 328.
id. temperantes, III, 501.
id. vermífugos, III, 177.
id. de vívora, II, 343.
Trochisci de agarico, I, 118.
id. albi, III, 406.
id. albi ex Rhazis, id.
id. alhandali, II, 159.
id. alkekengi, I, 175.
id. alkekengi compositi, III, 64.
id. anthelmintici, III, 184; IV, 217.
id. anthelmintici Ching, III, 164.
id. aromatici, I, 518.
id. aromatico stomachici, id.
id. bechici albi, I, 189; II, 387; III, 34, 64.
id. bechici citrini, IV, 76.
id. bechici nigri, IV, 77.
id. calami aromatici, I, 480.
id. calcis carbonatis, I, 498.

Trochisci carbonatis magnesiæ, I, 498.
id. castorei, II, 48.
id. catechu, II, 60.
id. catechu cum ambra, II, 61.
id. citratis ferrici, II, 486.
id. colocynthidis, II, 159.
id. colocynthidis præparatæ, id.
id. de cremore tartari, III, 509.
id. cypheos, IV, 293.
id. cupressi fractuum, II, 111.
id. ad fœtorem oris, II, 60.
id. fumalis, I, 453.
id. galiæ moschatæ, I, 193.
id. glycyrrhizæ, IV, 77.
id. glycyrrhizæ cum opio, IV, 78.
id. glycyrrhizæ thebaici, id.
id. gummi acaciæ, II, 387.
id. gummosi, id.
id. hedychroi, I, 480.
id. hermetici, III, 177.
id. hermetici scretæ, III, 184.
id. hydrargyri, III, 211.
id. imperatoris, I, 518.
id. de karabe, III, 328.
id. liquiritiæ cum gummi, IV, 77.
id. masticatorii, I, 176.
id. menthæ piperitæ, IV, 364.
id. de minio, III, 200.
id. muriatis oxygenati hydrargyri, III, 195.
id. de mirra, I, 373.
id. mirrhæ compositi, id.
Trochisci nitratis potassæ, III, 484.
id. de nitro, id.
id. pectorales, II, 387.
id. pectorales regis Danorum, IV, 78.
id. Rhazis, III, 406.
id. refrigerantes, III, 492.
id. de scilla, II, 244.
id. scillitici, id.
id. sedativo—balsamici, IV, 78.
id. stibiati, I, 305.
id. stomachici, I, 518.
id. è sulphure, I, 400.
id. temperantes, III, 492.
id. contra vermes, III, 177.
id. viperarum, II, 343.
Tropœollum majus, II, 20.
Tubera cervina, III, 18.
Tucia, IV, 392.
Turbit, IV, 323.
id. mineral, III, 207.
Turpethum album, IV, 323.
id. minerale, III, 207.
id. nigrum, III, 210.
id. rubrum, III, 206.
id. vegetabile, IV, 323.
Tusílago, IV, 324.
id. farfara, id.
Tuthia, IV, 392.
Tutia, id.
id. Alexandrina, id.
Tyllelinum, III, 380.

U.

Ubas, IV, 345.
id. de América, II, 313.
Ulmaria, IV, 82.
Ulmus, III, 286.
id. campestris, id.
Ulmus fulva, III, 286.
Ulva lactuca, II, 177.
id. pavonia, id.
id. squamaria, id.
Umbilicus, III, 286.
id. marinus, I, 493.
Umbra, II, 453.
Ungüento de ácido fosfórico, I, 67.
id. de agallas, I, 115.
id. de agallas compuesto, I, 116.
id. de agallas opiado, id.
id. aglutinante marcial, IV, 317.
id. de Agripa, II, 262.
id. alabastrino, III, 75.
id. de albayalde, III, 408.
id. de altea, III, 71.
id. de álamo negro, I, 441.
id. amoniacal, I, 249.
id. anodino, I, 439; III, 323.
id. de los doce Apóstoles, III, 438.
id. antiartrítico, III, 123.
id. antielmíntico, I, 131.
id. antihemorroidal, I, 116, 390; II, 288; III, 419, 424, 431.
id. antiescrofuloso, IV, 247.
id. antioftalmico, III, 294.
id. antipsorico, III, 135, 141, 194, 223, 474; IV, 220.
id. antipsorico de Zeller, III 322.
id. antivenéreo, III, 147.
id. antivenéreo de Zeller, id.
id. aromático, IV, 97.

Ungüento aromático alcanforado, III, 72.
id. arsenical, I, 361.
id. de artanita, II, 166.
id. astringente, I, 207; IV, 70.
id. basilicon, IV, 314.
id. blanco, II, 271.
id. blanco alcanforado, III, 409.
id. blanco mercurial, id.
id. blanco de Razis, III, 408.
id. de beleño, I, 437.
id. de brionia, II, 262.
id. de calamina compuesto, IV, 400.
id. de calendula, I, 510.
id. calmante, III, 298.
id. de camuesas, II, 85.
id. de cantáridas infundidas, II, 2.
id. cardiaco, II, 205.
id. carminativo, III, 12, 93.
id. cateretico, II, 128.
id. de cera y de trementina, III, 71.
id. de cicuta, II, 94.
id. de cinabrio, III, 156.
id. de Cirilo, III, 193.
id. citrico, I, 64.
id. citrino, III, 215.
id. clysmatico, III, 75.
id. de cobre, II, 126, 130, 135.
id. de cobre compuesto, II, 135.
id. defensivo, I, 199.
id. defensivo azul, II, 119.
id. depilatorio, IV, 284.
id. depurativo, IV, 247.
id. desecante, III, 202, 409.
id. desecativo, IV, 396.
Ungüento desopilativo, II, 98.
id. de diaponfoligos, IV, 399.
id. digestivo animado, IV, 287.
id. digestivo compuesto, id.
id. digestivo opiado, IV, 288.
id. digestivo simple, IV, 286.
id. de digital, II, 198.
id. discuciente, III, 251.
id. diurético, II, 250.
id. egipciaco, II, 119.
id. eleborado blanco, II, 214.
id. eleborado verde, id.
id. de elemi, IV, 285.
id. de elemi y de trementina, id.
id. emoliente, III, 71; IV, 283.
id. de enebro, II, 226.
id. de énula, II, 228.
id. epispástico, II, 13, 309.
id. epispástico alcanforado, II, 15.
id. epispástico verde, II, 16.
id. de escila, II, 250.
id. escitante, II, 8.
id. estimulante, III, 148.
id. estomacal, I, 131; III, 443.
id. estomático, id.
id. de estoraque, II, id.
id. esplenético, 385.
id. etiopico, III, 135.
id. exutorio, II, 15.
id. de Falck, III, 151.
id. de fitolaca, II, 313.
id. de Fusco, III, 148; IV, 313.
id. de grafito, II, 447.
id. gris, III, 141; IV, 395.
Ungüento gris alcanforado, III, 142.
id. hemorroidal, I, 433; III, 410.
id. hypnotico, III, 328.
id. de jabon, III, 523.
id. de laurel, III, 8.
id. de linaria, III, 20.
id. de lupulo, III, 41.
id. de malva, III, 59.
id. martiaton, III, 12.
id. de médula mucilaginoso, II, 84.
id. mercurial, III, 120.
id. mercurial blanco, III, 222.
id. mercurial animado, III, 193.
id. mercurial azufrado, III, 135.
id. mercurial de Boecking, III, 148.
id. mercurial opiado, III, 130.
id. mercurial digestivo, III, 123.
id. de la Merè, III, 432.
id de minio, III, 404, 443.
id. de minio alcanforado, III, 404.
id. moreno, III, 432.
id. mundificante, III, 135, 222.
id. mundificante de Stahl, III, 128.
id. de myrra, III, 241.
id. narcótico, III, 319.
id. negro, III, 156.
id. nervino, I, 237; III, 8.
id. de nitrato de mercurio y de amoniaco, III, 217.
id. de nuez de agalla, I, 115.
id. de nuez de agalla opiado, I, 116.
id. ocular, IV, 396.

Ungüento ocular blanco, IV, 397.
id. oftálmico, I, 463; II, 137; III, 150, 424; IV, 395, 406.
id. oftálmico blanco, IV, 397.
id. oftálmico de Rischter, III, 147.
id. oftálmico rojo, IV, 397.
id. oftálmico verde, id.
id. oxigenado, II, 118.
id. de pan de puerco, II, 166.
id. contra la paralísis, III, 524.
id. paralítico, I, 98.
id. pardo, IV, 316.
id. pectoral, III, 34.
id. perpetuo, II, 15.
id. de pez, III, 387.
id. de pez y de cera, IV, 314.
id. de pez con oxido rojo de mercurio, III, 148.
id. de piedra calaminar, IV, 399.
id. de pimienta negra, III, 393.
id. contra los piojos, II, 285; III, 124, 372, 381.
id. de plomo, III, 417.
id. de plomo compuesto, III, 410.
id. populeon, I, 141, 441.
id. de precipitado verde, 229.
id. de propoli, III, 527.
id. purpureo, II, 121.
id. para las quemaduras, I, 438; III, 409, 419.
id. refrigerante, I, 156.
id. de regaliz, III, 410.
id. de renal, III, 324.
Ungüento resolutivo, II, 3.
id. de Ricourt, III, 447.
id. rojo, I, 270; III, 149.
id. de romero compuesto, IV, 96.
id. de ruda, IV, 122.
id. contra los sabañones, I, 157; III, 12; IV, 310.
id. sandalino, IV, 162.
id. contra la sarna, I, 405.
id. de sauce, IV, 172.
id. de sauco, IV, 177.
id. sedante, III, 425.
id. simple, IV, 310, 312.
id. de sub-acetato de plomo, III, 417.
id. de sub-acetato de plomo alcanforado, III, 420.
id. de sub-acetato de plomo jabonoso, id.
id. de sub-acetato de plomo opiado, id.
id. sulfúrico, I, 98.
id. supurativo, II, 73; III, 148.
id. de tabaco, IV, 247.
id. contra la tiña, III, 182.
id. de trementina, III, 408; IV, 283.
id. de trementina alcanforado, IV, 286, 289.
id. de trementina y de manteca, IV, 285.
id. de trementina y de pez, IV, 314.
id. de tritóxido de plomo, III, 405.
id. de tucia, IV, 395.
id. contra las úlceras escrofulosas, III, 148.
Ungüento verde, II, 135, 137, 505; III, 438.
id. vermífugo, I, 19.
id. vegigatorio, II, 13.
id. de vinagre, I, 56.
id. de yerba mora, IV, 369.
id. de Zeller, III, 222.
Unguentum acetatis plumbi, III, 417.
id. acetatum, I, 56.
id. alabastrinum, III, 75.
id. album, II, 271; III, 408.
id. album camphoratum, I, 409.
id. album simplex, III, 408.
id. althææ, III, 11.
id. ad ambusta, I, 438; IV, 397, 399.
id. ammoniatum, I, 249.
id. anodynum, I, 439.
id. antihelmiticum, I, 19, 131.
id. Apostolorum, III, 438.
id. Arcæi, IV, 285.
id. aromaticum, III, 8; IV, 97.
id. arsenici, I, 361.
id. de arthanita, II, 186.
id. aureum, IV, 314.
id. balsami et olei laricis, IV, 284.
id. balsamicum, IV, 285.
id. ad barices ani, I, 116.
id. basilicum, IV, 285, 314.
id. basilicum flavum, IV, 314.
id. basilicum nigrum, IV, 315.
id. de boco, I, 199.
id. bryoniæ, II, 262.
id. Burdenii, III, 474.

Unguentum calaminæ compositum, IV, 400.
id. calaminare, IV, 395.
id. calendulæ florum, I, 510.
id. cantharidis vexicatoriæ, II, 2.
id. cantharidum, II, 8.
id. cantharidum colatum, II, 16.
id. carbonatis plumbici, III, 408.
id. carbonatis zinci impuri, IV, 395.
id. carbonatis curcumæ, II, 84.
id. cerussæ, III, 408.
id. Cirilli, III, 193.
id. citricum, I, 64; III, 71.
id. citrinum, III, 215; IV, 314.
id. clysmaticum, III, 75.
id. comitissæ, I, 116.
id. conii, II, 94.
id. conyzæ, II, 309.
id. cupratum, II, 130, 135.
id. è cupro, II, 126.
id. defensivum, I, 199.
id. defensivum cæruleum, II, 119.
id. diapompholigos, IV, 395, 399.
id. digestivum, IV, 286.
id. digestivum aloeticum, IV, 287.
id. digestivum flavum, IV, 285.
id. digestivum myrrhatum, IV, 287.
id. digestivum simplex, IV, 286.
id. diureticum resolvens, II, 250.
id. dodecapharmacum, III, 438.
id. elemi, IV, 285.
Unguentum elemi cum alumine, III, 148.
id. elemi compositum, IV, 285.
id. elemi et terebinthinæ, id.
id. emolliens, II, 73; IV, 314.
id. emolliens et sedans, III, 298.
id. empiricum Tlaki in tumoribus hæmorroidalibus, II, 288.
id. enulatum, id.
id. epispasticum, II, 2.
id. exiccans, IV, 397, 399.
id. exsiccans rubrum Acrelii, IV, 400.
id. flavum, III, 71; IV, 311.
id. ad fonticulos Bergii, II, 16.
id. fuscum, III, 148, 432; IV, 316.
id. gallæ, I, 115.
id. gallarum, id.
id. è gallis opiatum, I, 116.
id. griseum, IV, 395.
id. hæmorrhoidale, I, 390.
id. ad hæmorrhoidas, III, 431.
id. heleni, II, 228.
id. hydrargyri, III, 120.
id. hydrargyri cinereum forcius, III, 193.
id. hydrargyri citrinum, III, 215.
id. hydrargyri compositum, id.
id. hydrargyri deutoxidi nitrati, id.
id. hydrargyri griseum, III, 141.
id. hydrargyri muriatis ammoniacalis, II, 222.
Unguentum hydrargyri nitrati, III, 215.
id. hydrargyri nitrico-oxidi, id.
id. hydrargyri sulphureti sublimati, III, 156.
id. hyoscyami, I, 437,
id. inulæ, II, 228.
id. irritans, II, 13.
id. juglandinum cum felletauri, I, 463.
id. lapidis calaminaris, IV, 395.
id. laurino camphoratum, III, 12.
id. laurinum, III, 8.
id. lenitivum, III, 71; IV, 283.
id. de liquiritia, III, 410.
id. lithargyri, III, 417.
id. lithargyri resinosum martiale, IV, 317.
id. de lithargyro, III, 417.
id. lupuli, III, 41.
id. luteum, IV, 286.
id. ad maculas cornæ, I, 463.
id. magistrale, III, 443.
id. malorum insanorum, II, 135.
id. matris, III, 432.
id. medullæ mucilagineum, II, 84.
id. mercuriale, III, 120.
id. mercuriale album, III, 222.
id. mercuriale aptyalizomenon, III, 193.
id. mercuriale citrinum, III, 215.
id. minii, III, 404.
id. de minio, III, 443.
id. mundificans Poterii, IV, 247.
id. mundificans Sthalii, III, 128.
id. mundificans Zelleri, III, 222.

Unguentum muriatis oxigenati hydrargyri, III, 193, 194.
id. myrrhæ, III, 241.
id. myrtium compositum, I, 116.
id. neapolitanum, III, 120.
id. nervinum, I, 237; III, 8.
id. nihili, IV, 396.
id. nihili ad oculos, IV, 395, 396.
id. de nihilo, IV, 395.
id. nihili hydrargyrici, III, 215.
id. nitricum, III, 417.
id. oculare, III, 424.
id. oculare Keiseri, IV, 397.
id. Ægypticum, II, 120.
id. ophthalmicum, IV, 396, 397, 406.
id. ophthalmicum album, IV, 395.
id. ophthalmicum Richteri, III, 147.
id. ophthalmicum Sloani, IV, 397.
id. opiatum, III, 319.
id. opodeldoch, I, 234.
id. oxydi cobalti, II, 119.
id. oxydi cupri mellеum, II, 120.
id. oxydi plumbi acetatum, III, 417.
id. oxydi plumbi carbonati, III, 408.
id. oxydi plumbi fuscum, III, 432.
id. oxydi plumbi rubrum, III, 443.
id. oxydi zinci, IV, 395.
id. oxydi zinci impuri, id.
id. oxydi zinci nativi, id.
id. oxyduli plumbi semi-vitrei adustum, III, 432.
Unguentum oxygenatum ex tempore parandum, II, 118.
id. pallidum, IV, 314.
id. paralyticum, III, 524.
id. pectorale, III, 34.
id. pediculorum, III, 124.
id. contra pediculos capitis, II, 285.
id. ad perniones, I, 157.
id. phosphoricatum, I, 67.
id. phytolaccæ radicis, II, 313.
id. piceum compositum, IV, 314.
id. picis, id.
id. picis empyreumaticum, id.
id. picis liquidæ, III, 387.
id. piperis nigri, III, 393.
id. pomadinum, IV, 112.
id. pompholigis, IV, 399.
id. populeum, I, 441.
id. propolicum, III; 527.
id. purpureum Wurzii, II, 121.
id. refrigerans, IV, 112.
id. regium, IV, 314.
id. de resina pini compositum, III, 71.
id. resinæ albæ, IV, 311.
id. resinæ elemi, IV, 285.
id. resinæ flavæ, IV, 285, 314.
id. resinosum, IV, 311.
id. resumptivum, III, 71.
id. aquæ rosæ, IV, 112.
id. rosarum, id.
Unguentum rosatum, IV, 112.
id. rosatum compositum, III, 222.
id. roris marini compositum, III, 8; IV, 96.
id. rubrum ad labia oris, I, 270.
id. rubrum potabile, id.
id. sabadillæ cum mercurio, III, 124.
id. salicis, IV, 172.
id. sambuci, IV, 177.
id. sambucinum, id.
id. santalinum, IV, 162.
id. saponaceum, III, 523.
id. saturninum, id.
id. saturninum saponaceum, III, 430.
id. ad scabiem, I, 405; III, 141, 215, 222.
id. contra scabiem, I, 405.
id. scillæ, II, 250.
id. sebi Arcæi, IV, 285.
id. sedativo-narcoticum, III, 319.
id. siccativum, III, 202.
id. sinapis, III, 251.
id. solani, IV, 369.
id. de staphysagria, III, 124.
id. subacetatis cupri, II, 135.
id. subacetatis plumbici, III, 417.
id. subcarbonatis plumbi, III, 408.
id. sulphuratum, I, 405.
id. sulphuratum simplex, I, 404.
id. è sulphuræ, id.
id. è sulphuræ hydrargyrato, III, 135.

Unguentum sulphuris, I, 404, 405.
id. sulphuris composi—tum, I, 405.
id. supernitratis hy—drargyri, III, 215.
id. suppurans, II, 73; III, 432.
id. suppurativum, III, 148.
id. de terebinthina, IV, 287.
id. terebinthinæ, IV, 286.
id. terebinthinæ resino-sum, IV, 314.
id. terebinthinatum, IV, 283, 284.
id. tetrapharmacum, IV, 314.
id. tripharmacum, III, 417.
id. tutiæ, IV, 395.
id. ad ulcera venerea, III, 148.
id. ad ulcera limphati-ca, id.
id. de uvis, II, 85.
id. ad varices ani, I, 116; III, 417, 431.
id. contra vermes, I, 19; II, 166.
id. ad vermes, I, 134.
id. ad vexicata, II, 13.
id. vexicatorium, id.
id. viride, II, 135.
id. viride potabile, II, 505.
id. Zelleri, III, 222.
id. zinci, IV, 395, 396.
Ungula caballina, IV, 324.
Ungulæ cancrorum, I, 494.
Unicornio mineral, I, 502.
Uña de caballo, IV, 324.
id. de la gran bestia, II, 342.
Uñas de cangrejo, I, 494.
Urtica dioica, III, 362.
id. hispanica, id.
id. major, id.
id. minor, id.
id. mortua, id.
id. pilulifera, id.
id. romana, id.
id. urens, id.
Usnea plicata, III, 24.
Uva, IV, 345.
id. ursi, II, 339.
id. versa, IV, 370.
id. vulpina, id.
Uvæ passæ, IV, 345.

V.

Vaca de san Anton, IV, 325.
Vaccinium myrtillus, III, 244.
id. oxicoccos, I, 345.
id. vitis idæa, id.
Vainilla, IV, 337.
Valeriana, IV, 325.
id. de jardin, id.
id. mayor, id.
id. menor, IV, 326.
id. oficinal, IV, 325.
id. silvestre, id.
Valeriana celtica, III, 277.
id. major, IV, 325.
id. minor, IV, 326.
id. officinalis, id.
id. phu, IV, 325.
id. sylvestris, IV, 326.
Valerianella olitoria, IV, 337.
Valerianilla, id.
Vanilla, id.
id. aromática, id.
Vanillia, id.
Vapor hidro-sulfurado, I, 84.
Vapor hepaticus, I, 84.
Vara de oro, IV, 339.
id. de oro oficinal, id.
Vauquelina, II, 293.
Vegigatorio de Lecomte, II, 16.
id. magistral, II, 11.
Vegigatorio perpetuo de Facin, II, 15.
Velesa y veleza, II, 199.
Vencetósigo, IV, 339.
Ventriculus gallinæ, II, 342.
Venus, II, 119.
Veratria, II, 206; IV, 340.
Veratrina, II, 71, 206; IV, 340.
Veratrinum, II, 206; IV, 340.
Veratro, II, 205.
Veratrum album, id.
id. sabadilla, II, 71.
Verbascum album, II, 402.
id. nigrum, id.
id. phlomoides, id.
id. thapsus, id.
Verbena, IV, 341.
id. comun, id.
id. oficinal, id.
Verbena officinalis, id.
id. triphylla, id.
Verde gris, II, 123, 134.
id. preparado, id.
id. de montaña, II, 123.
Verdete, II, 134.
id. cristalizado, II, 138.
Verdolaga, IV, 341.
id. comun, id.
Verónica, IV, 342.
id. acuática, I, 429.
id. macho, IV, 342.
id. oficinal, id.
id. teucrio, id.
id. de Virginia, IV, 343.
Veronica, IV, 342.
id. anagalis, I, 430.
id. becabunga, I, 429.
id. officinalis, IV, 342.
id. teucrifolia, id.
id. teucrium, id.
id. virginica, IV, 343.
Verrucaria, II, 181.
Verrucarium, id.

Vertebræ mustulæ piscis, I, 502.
Veza cultivada, IV, 344.
Vicia, id.
id. ervillia, III, 361.
id. sativa, IV, 344.
Victorial larga, id.
Victorialis longa, id.
id. mas, id.
Vid, id.
id. silvestre, II, 202.
Vidrio de antimonio, I, 295.
id. de antimonio con cera, id.
Vinagre, I, 46.
id. de ajos, I, 138.
id. de ajos compuesto, I, 139.
id. de angélica compuesto, I, 281.
id. antihisterico, I, 138; II, 57.
id. antiseptico, I, 139.
id. aromático, I, 281; II, 545; III, 35; IV, 90, 278.
id. aromático de ajos, I, 139.
id. de belladona, I, 446.
id. bezoardico, I, 281.
id. de café, I, 478.
id. de calendula, I, 510.
id. calibeado, II, 481.
id. de claveles, II, 114.
id. colchitico, II, 154.
id. concentrado, I, 46, 50.
id. crudo, id.
id. de digital azucarado, II, 195.
id. destilado, I, 47.
id. de eléboro blanco, II, 213.
id. de eléboro negro, id.
id. escilítico, II, 257.
id. de espliego, II, 279.
id. de espliego compuesto, II, 280.
Vinagre de estragon, II, 290.
id. de frambuesas, II, 319.
id. glacial, I, 50.
id. de los cuatro ladrones, I, 139; II, 280.
id. de los cuatro ladrones compuesto, id.
id. laxante, IV, 196.
id. de beleño, I, 48.
id. de lirio de los valles, III, 37.
id. de litargirio, III, 413.
id. marcial, II, 481.
id. de mirra, III, 244.
id. de narciso silvestre, III, 275.
id. de opio, III, 289.
id. de pimienta de la Guinea, III, 391.
id. de pimienta de la Jamaica, id.
id. de plomo, III, 411.
id. de primula, III, 527.
id. de rábanos, IV, 61.
id. radical, I, 49, 50,
id. de romero, IV, 90.
id. de rosas, IV, 109.
id. de rosas compuesto, IV, 110.
id. de ruda, IV, 121.
id. de ruda alcanforado, IV, 122.
id. de salvia, IV, 155.
id. saturnino, III, 413.
id. de sauco, IV, 175.
id. de tabaco, IV, 146.
id. teriacal, II, 232.
id. de trementina, I, 49.
Vinca pervinca, IV, 347.
id. mayor, id.
id. menor, id.
Vinca major, id.
id. minor, id.
Vincetoxicum, IV, 339.
Vino, IV, 347.
id. de acibar, I, 14.
Vino de acibar alcoholizado, I, 34.
id. de agenjos, I, 126.
id. de agenjos compuesto, I, 127.
id. alcanforado, I, 154.
id. amargo, II, 81, 363.
id. amargo alcahalizado, III, 269.
id. amargo aromático, I, 127.
id. amargo diurético, IV, 192.
id. amargo escilítico compuesto, II, 254.
id. antiapopléctico, II, 542.
id. antiartrítico, I, 106.
id. antielmíntico, I, 126.
id. antiescorbútico, IV, 62.
id. antihictérico, III, 267; IV, 192.
id. antileucorraico, IV, 49.
id. antimoniado, I, 328.
id. antimoniado de Huxham, id.
id. antiperiódico, II, 49.
id. antireumático, I, 331.
id. antiséptico, IV, 49.
id. aperitivo y tónico de Barthez, I, 158.
id. aromático, IV, 154.
id. aromático alcahalizado, III, 269.
id. aromático opiado, III, 291.
id. artificial de Portugal, I, 169.
id. astringente, II, 65, 111; IV, 120.
id. de azafran, I, 386.
id. de cálamo aromático, I, 483.
id. de catecú, II, 65.

Vino de ciprez compuesto, II, 111.
id. colchitico, II, 153.
id. de coloquíntida, II, 165.
id. cordial, I, 530, 532.
id. de corteza de naranja, III, 266.
id. de corteza de naranja alcalino, III, 269.
id. de corteza de naranja compuesto, III, 267.
id. de dictamo blanco marcial, II, 494.
id. de digital, II, 195.
id. diurético, II, 226; III, 235; IV, 62, 295.
id. diurético amargo, II, 254.
id. diurético de los ingleses, III, 511.
id. diurético de Sydenhan, id.
id. de eléboro blanco, II, 211.
id. de eléboro verde, II, 212.
id. emético, I, 328; II, 527.
id. de énula, II, 232.
id. de enebro alcahalizado, III, 511.
id. de escila alcalino, II, 254.
id. escilítico, II, 253.
id. escitante, II, 4; III, 511; IV, 321.
id. estibiado, I, 328.
id. estomacal, II, 31, 363; IV, 50.
id. de estractos, III, 267.
id. febrífugo, IV, 47.
id. de genciana, II, 363.
id. de genciana compuesto, id.
id. de graciola, II, 405.
Vino de guayaco eleborado, II, 211.
id. hipocrático, I, 530.
id. hydragogo, III, 511.
id. de ipecacuana, II, 526.
id. de ipecacuana compuesto, id.
id. lixivial, III, 511.
id. marcial amargo, II, 492.
id. marcial aromático, II, 493.
id. marcial compuesto, II, 494.
id. de membrillos, I, 169.
id. de mostaza, III, 253.
id. opiado, III, 290, 291.
id. opiado por fermentacion, III, 299.
id. de opio, III, 291.
id. de opio compuesto, III, 292.
id. purgante, IV, 192.
id. purgante y tónico, id.
id. de quina, IV, 45.
id. de quina aromatizado, IV, 47.
id. de quina compuesto, id.
id. de quina ferruginosa, IV, 46.
id. de rábanos compuesto, IV, 62.
id. de rábanos marcial, II, 494.
id. de rábanos silvestre, IV, 61.
id. de ruibarbo, IV, 139.
id. de ruibarbo amargo, IV, 140.
id. de salvia, IV, 154.
id. de sen, IV, 192.
id. de tabaco, IV, 246.
id. de tartrato de potasa y de antimonio, I, 328.
Vino tónico, II, 363.
id. tónico y antiperiódico, IV, 46.
id. de valeriana, IV, 332.
id. de vívoras, II, 343.
Vinum absinthiacum, I, 126.
id. absintii, id.
id. absinthitis, id.
id. abstringens, IV, 120.
id. adustum, I, 161.
id. ænos, IV, 347.
id. aloes, I, 14.
id. aloes socotrinæ, id.
id. aloetico alcalinum, I, 13, 34.
id. amarum, II, 363.
id. amarum alcalisatum, III, 269.
id. amarum scilliticum compositum, II, 254.
id. amarum cum spiritu ursi, II, 363.
id. ammoniatum cum tincturis analepticis, I, 266.
id. anthelminticum, I, 126.
id. antimoniale, I, 324.
id. antimoniatum Huxhami, id.
id. antimonii, id.
id. armoraciæ, IV, 61.
id. aromaticum alcalisatum, III, 269.
id. aromo-chalybeatum, II, 493.
id. aurantiorum compositum, III, 267.
id. calami, I, 483.
id. callidum, I, 530.
id. camphoratum, I, 154.
id. catechu, II, 65.
id. chalybeatum, II, 492.
id. chalybeatum compositum, II, 494.

Vinum chinæ amarum, IV, 47.
id. chinæ compositum, id.
id. chinæ martiatum, IV, 46.
id. chinatum, IV, 45.
id. cinnamomi, I, 530.
id. cochleariæ compositum, IV, 62.
id. colchici, II, 153.
id. colocynthidis, II, 165.
id. corticis peruviani, IV, 45.
id. crocato opiatum, III, 292.
id. crocatum, I, 387.
id. dictamni martiatum, II, 494.
id. diureticum amarum, II, 254.
id. emeticum, I, 324; II, 527.
id. enulæ, II, 232.
id. enulatum, id.
id. ferratum, II, 492.
id. ferri, id.
id. genistæ Sydenhami, III, 511.
id. gentianæ, II, 363.
id. gentianæ compositum, id.
id. hippocraticum, I, 530.
id. hipecacuanhæ, II, 526.
id. juniperinum, II, 226.
id. lusitanicum artificiale, I, 169.
id. martiatum, II, 492.
id. martis, id.
id. nicotianæ, IV, 246.
id. opii, III, 291.
id. opii aromaticum, III, 292.
id. opii compositum, id.
Vinum opii crocatum, III, 291.
id. opii oxydi antimonii, I, 324.
id. paregoricum, III, 292.
id. psychotriæ, II, 526.
id. psychotriæ emeticæ, id.
id. raphani martiatum, II, 494.
id. rhabarbari amarum, IV, 140.
id. rhei, id.
id. rhei aromaticum, IV, 139.
id. rhei compositum, id.
id. roborans, I, 127; IV, 46, 47.
id. salviæ, IV, 154.
id. scillæ, II, 251.
id. scilliticum, id.
id. sennæ, IV, 192.
id. sinapios, III, 253.
id. stibiatum cum extractis narcoticis, I, 106, 331.
id. stramonii, II, 292.
id. stypticum, II, 111.
id. tabaci, IV, 246.
id. ex tartrate antimonii, I, 324.
id. tonico-stimulans, IV, 47.
id. trifolii fibrini, IV, 321.
id. veratri, II, 211.
id. veratri albi, id.
id. veratri viridis, II, 212.
id. vincetoxici amarum, I, 81.
id. viperarum, II, 343.
Viola, IV, 348.
id. canina, id.
id. jatamarensis, III, 276.
id. odorata, IV, 348.
id. pedata, IV, 349.
Viola tricolor, III, 374.
Violaria, IV, 348.
Violeta, id.
id. de marzo, id.
id. olorosa, id.
id. silvestre, id.
Viperina, IV, 353.
Virga aurea, IV, 339.
Viridæ æris preparatum, II, 134.
id. montanum, II, 123.
Vísceras de liebre, II, 341.
Visco, IV, 352.
id. blanco, id.
id. comun, id.
id. quercino, id.
Viscum, id.
id. album, id.
id. quercinum, id.
id. quernum, id.
Vitex agnus castus, I, 135.
Vitis vinifera, IV, 344.
Vitriolo blanco, IV, 400.
id. blanco de Gostar, id.
id. de hierro, II, 463.
id. marcial, id.
id. de potasa, III, 476.
id. de sosa, IV, 230.
id. verde, II, 463.
id. de zinc, IV, 400.
Vitriolum album, id.
id. anglicum, II, 464.
id. cœruleum, II, 124.
id. cupri, id.
id. cypriscum, id.
id. cyprium, II, 124.
id. ferreum, II, 464.
id. ferri, id.
id. goslariense, IV, 400.
id. hungaricum, II, 464.
id. londinense, id.
id. magnesiæ, III, 52.
id. martis, II, 464.
id. martis calcinatum, II, 465.
id. romanum, II, 464.
id. veneris, II, 124.

Vitriolum viride, II, 464.
id. zinci, IV, 400.
Vitrum antimonii, I, 295.
id. stibii, id.
Vivorera comun, IV, 353.
Vizcochos purgantes, II, 532.
Volkameria azuleata, IV,
V.
Vulvaria, IV, 353.
Vulnerario suizo, I, 351.

W.

Wakaka de Indias, IV, 338.
Wrightia antidysenterica, I, 171; II, 149; IV, 7.

X.

Xanthium, I, 424.
id. strumarium, id.
Xilo aloes, III, 365.
Xilo balsamum, I, 258.

Y.

Yaro, IV, 353.
id. comun, IV, 354.
id. dragoncillo, id.
id. de tres hojas, id.
Yatropha curcas, IV, 356.
Yedra, id.
id. de cauterio, id.
id. comun, id.
id. de los poetas, id.
id. campana, II, 176.
id. terrestre, id.
Yerba del ballestero, II, 205.
id. buena, IV, 359.
id. buena rizada, id.
id. buena piperita, IV, 360.
id. cana, IV, 372.
Yerba del cancer, II, 199.
id. carmin, II, 313.
id. del fuego, III, 23.
id. ombriguera, IV, 255.
id. mora, IV, 369.
id. del Paraguay, IV, 370.
id. Paris, id.
id. pastel, IV, 372.
id. de la perlesía, IV, 370.
id. de la plata, IV, 371.
id. de pordiosero, II, 115.
id. de san Alberto, II, 235.
id. de santa Barbara, IV, 371.
id. de san Lorenzo, IV, 166.
id. de Santiago, IV, 371.
id. torera, III, 361.

Z.

Zafiro, I, 198.
Zanahoria, IV, 372.
id. comun, id.
id. cultivada, id.
id. de montaña, IV, 373.
Zandia, IV, id.
Zantorrize, IV, 374.
Zanthorriza apiifolia, id.
Zanthoxylo, ó clave de Hércules, id.
Zanthoxyllum clavatum, id.
Zarsaparrilla, IV, 375.
Zarza, IV, 374.
id. comun, id.
id. de montaña, id.
id. mora, id.
id. septentrional, id.
id. vellosa, IV, 375.
Zarzaparrilla, id.
Zarzaparrilla de Alemania, IV, 388.
id. del Brasil, IV, 375.
id. de Honduras, id.
id. de las Indias, IV, 376.
id. indigena, id.
id. de la Jamaica, IV, 395.
id. de Portugal, id.
id. roja, id.
Zarza perruna, IV, 100.
Zea mays, III, 56.
Zedoaria, IV, 388.
id. larga, IV, 389.
id. redonda, id.
Zedoariæ, IV, 214.
Zedoariæ longa, IV, 389.
id. rotunda, id.
Zibeta, I, 172.
Zibebæ, id.
Zibebco, IV, 345.
Zibethum; id.
Zicyphus sativus, I, 392.
Zinc, IV, 391.
id. oxidado calaminar, IV, 302.
Zincum oxydatum album, id.
id. precipitatum, IV, 393.
id. sulphuricum, IV, 400.
id. terrestre, IV, 392.
Zingiber, II, 368.
id. album, id.
id. commune, id.
id. nigrum, id.
id. vulgare, id.
Zinziben, id.
Zircona, IV, 408.
Postera marina, II, 177.
Zumaque, IV, 408.
id. fustete, IV, 143.
id. venenoso, IV, 409.
id. de zurradores, id.
Zumo, *véase Jugo.*

FIN.